SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-1-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 11:29:55 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:52:30 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-2-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 11:59:51 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:52:35 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.714	100.000	3951410	423215	3642	1.140	--
总计		100.000	3951410	423215			

图2 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-3-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 12:05:15 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:52:38 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.712	100.000	3952563	422766	3635	1.142	--
总计		100.000	3952563	422766			

图3 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-4-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 12:10:39 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:52:42 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.712	100.000	3945829	422042	3636	1.142	--
总计		100.000	3945829	422042			

图4 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-5-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 12:16:03 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:52:45 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.709	100.000	3942324	421135	3630	1.144	--
总计		100.000	3942324	421135			

图5 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-6-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 12:21:26 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:52:48 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.710	100.000	3938998	421231	3640	1.144	--
总计		100.000	3938998	421231			

图6 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-7-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 12:26:48 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:52:51 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.736	100.000	1274391	146554	4297	1.126	--
总计		100.000	1274391	146554			

图7 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-8-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 12:32:10 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:52:54 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	100.000	2395732	275019	4276	1.136	--
总计		100.000	2395732	275019			

图8 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温 :40℃
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-9-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2024/01/24 12:37:33
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:52:57
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：317nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.736	100.000	1482486	170497	4296	1.127	--
总计		100.000	1482486	170497			

图9 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-10-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 12:42:56 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:53:00 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	100.000	2150493	246953	4281	1.134	--
总计		100.000	2150493	246953			

图10 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-11-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 12:48:19 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:53:03 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.734	100.000	2288845	262525	4281	1.135	--
总计		100.000	2288845	262525			

图11 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-12-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 12:53:41 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:53:06 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.735	100.000	2174870	249403	4284	1.134	--
总计		100.000	2174870	249403			

图12 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-13-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 12:59:03 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:53:09 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	100.000	3011678	345542	4292	1.141	--
总计		100.000	3011678	345542			

图13 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-14-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 13:07:29 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:53:12 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.736	100.000	3932889	448171	4226	1.150	--
总计		100.000	3932889	448171			

图14 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-15-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 13:12:52 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:53:15 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.734	100.000	3063645	350727	4267	1.142	--
总计		100.000	3063645	350727			

图15 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-16-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 13:18:15 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:53:18 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.758	100.000	3841158	439730	4308	1.149	--
总计		100.000	3841158	439730			

图16 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-17-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 13:23:38 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:53:21 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	100.000	3876132	443710	4251	1.148	--
总计		100.000	3876132	443710			

图17 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-18-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 13:29:00 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:53:24 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.739	100.000	3849125	441056	4263	1.148	--
总计		100.000	3849125	441056			

图18 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-19-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 13:34:22 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:53:27 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.736	100.000	3705286	424410	4262	1.147	--
总计		100.000	3705286	424410			

图19 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-20-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 13:39:44 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:53:30 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.747	100.000	4218710	483626	4286	1.151	--
总计		100.000	4218710	483626			

图20 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-21-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 13:45:07 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:53:33 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.734	100.000	3790305	433483	4259	1.148	--
总计		100.000	3790305	433483			

图21 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-22-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 13:50:30 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:53:36 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.847	100.000	4270418	489220	4512	1.154	--
总计		100.000	4270418	489220			

图22 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-23-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 13:55:53 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:53:39 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.755	100.000	4255361	485232	4241	1.147	--
总计		100.000	4255361	485232			

图23 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-24-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 14:01:15 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:53:42 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.736	100.000	4185255	478544	4245	1.152	--
总计		100.000	4185255	478544			

图24 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-25-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 14:06:37 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:53:45 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.736	100.000	4043379	462703	4253	1.151	--
总计		100.000	4043379	462703			

图25 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温 :40℃
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-26-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2024/01/24 14:11:59
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:53:48
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：317nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.736	100.000	4298977	492254	4258	1.152	--
总计		100.000	4298977	492254			

图26 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-27-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 14:17:21 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:53:51 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.734	100.000	4098826	468572	4256	1.151	--
总计		100.000	4098826	468572			

图27 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-28-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 14:22:43 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:53:54 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.734	100.000	4377329	500048	4245	1.153	--
总计		100.000	4377329	500048			

图28 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-29-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 14:28:06 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:53:57 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.735	100.000	4331279	495111	4248	1.153	--
总计		100.000	4331279	495111			

图29 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温 :40℃
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-30-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2024/01/24 14:33:28
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:54:00
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：317nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.736	100.000	4262488	487578	4251	1.152	--
总计		100.000	4262488	487578			

图30 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-31-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 14:38:50 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:54:03 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.736	100.000	4238741	485224	4253	1.152	--
总计		100.000	4238741	485224			

图31 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-32-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 14:44:13 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:54:06 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	100.000	4342398	497293	4275	1.153	--
总计		100.000	4342398	497293			

图32 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-33-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 14:49:35 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:54:09 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.736	100.000	4263718	487683	4252	1.153	--
总计		100.000	4263718	487683			

图33 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温 :40℃
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-34-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2024/01/24 14:54:57
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:54:12
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：317nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.736	100.000	4432088	506994	4251	1.154	--
总计		100.000	4432088	506994			

图34 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-35-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 15:00:20 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:54:15 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.757	100.000	4373163	500424	4298	1.154	--
总计		100.000	4373163	500424			

图35 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温 :40℃
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-36-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2024/01/24 15:05:42
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:54:19
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：317nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.737	100.000	4299865	492235	4254	1.153	--
总计		100.000	4299865	492235			

图36 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-37-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 15:11:04 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:54:22 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.738	100.000	4288597	490955	4255	1.153	--
总计		100.000	4288597	490955			

图37 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温 :40℃
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-38-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2024/01/24 15:16:26
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:54:25
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：317nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.736	100.000	4355251	498140	4248	1.154	--
总计		100.000	4355251	498140			

图38 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-39-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 15:21:49 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:54:28 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.736	100.000	4296783	491734	4251	1.153	--
总计		100.000	4296783	491734			

图39 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温 :40℃
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-40-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2024/01/24 15:27:12
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:54:31
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：317nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.736	100.000	4440268	507806	4246	1.155	--
总计		100.000	4440268	507806			

图40 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温 :40℃
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-41-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2024/01/24 15:32:35
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:54:34
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：317nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.738	100.000	4382055	501085	4246	1.154	--
总计		100.000	4382055	501085			

图41 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温 :40℃
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-42-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2024/01/24 15:37:57
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:54:37
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：317nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.738	100.000	4297115	491966	4251	1.153	--
总计		100.000	4297115	491966			

图42 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温 :40℃
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-43-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2024/01/24 15:43:19
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:54:40
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：317nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.738	100.000	4309012	492011	4232	1.155	--
总计		100.000	4309012	492011			

图43 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温 :40℃
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-44-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2024/01/24 15:48:42
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:54:43
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：317nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.738	100.000	4356439	498391	4249	1.154	--
总计		100.000	4356439	498391			

图44 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-45-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 15:54:05 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:54:46 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.738	100.000	4301324	492422	4250	1.154	--
总计		100.000	4301324	492422			

图45 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温 :40℃
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-46-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2024/01/24 15:59:27
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:54:49
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：317nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.739	100.000	4449778	508526	4241	1.155	--
总计		100.000	4449778	508526			

图46 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-47-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 16:04:50 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:54:52 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.742	100.000	4383097	500075	4246	1.155	--
总计		100.000	4383097	500075			

图47 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-48-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 16:10:12 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:54:55 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.748	100.000	4298264	491663	4271	1.154	--
总计		100.000	4298264	491663			

图48 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-49-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 16:15:36 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:54:58 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.739	100.000	4289457	490839	4254	1.153	--
总计		100.000	4289457	490839			

图49 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-50-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 16:21:00 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:55:01 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.739	100.000	4361757	498799	4249	1.154	--
总计		100.000	4361757	498799			

图50 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-51-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 16:26:23 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:55:04 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.741	100.000	3790508	433371	4258	1.150	--
总计		100.000	3790508	433371			

图51 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-52-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 16:31:46 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:55:07 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.741	100.000	4263875	487011	4252	1.153	--
总计		100.000	4263875	487011			

图52 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-53-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 16:37:08 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:55:10 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.739	100.000	4229758	483703	4249	1.153	--
总计		100.000	4229758	483703			

图53 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-54-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 16:42:31 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:55:13 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.740	100.000	4177817	477832	4252	1.153	--
总计		100.000	4177817	477832			

图54 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-55-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 16:47:55 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:55:16 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.720	100.000	3981534	427905	3686	1.147	--
总计		100.000	3981534	427905			

图55 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-56-2 - 2024011311p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 16:53:18 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:55:19 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.720	100.000	3988006	428854	3691	1.147	--
总计		100.000	3988006	428854			

图56 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-57-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 16:58:43 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:55:22 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-58-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 17:04:07 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:55:25 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.721	100.000	4019033	431984	3688	1.148	--
总计		100.000	4019033	431984			

图58 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-59-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 17:09:32 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:55:28 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.722	100.000	4023343	432188	3684	1.148	--
总计		100.000	4023343	432188			

图59 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-60-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 17:14:57 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:55:31 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.722	100.000	4022567	432311	3687	1.148	--
总计		100.000	4022567	432311			

图60 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-61-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 17:20:21 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:55:34 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.722	100.000	4025536	432559	3685	1.148	--
总计		100.000	4025536	432559			

图61 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-62-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 17:25:45 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:55:37 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.721	100.000	4024438	432201	3682	1.148	--
总计		100.000	4024438	432201			

图62 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-63-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 17:31:09 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:55:40 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.747	100.000	2031082	232701	4281	1.135	--
总计		100.000	2031082	232701			

图63 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-64-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 17:36:33 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:55:43 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	100.000	2134520	244364	4276	1.136	--
总计		100.000	2134520	244364			

图64 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-65-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 17:41:57 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:55:46 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.746	100.000	2216760	253924	4278	1.136	--
总计		100.000	2216760	253924			

图65 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-66-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 17:47:21 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:55:49 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.749	100.000	2342091	268102	4282	1.138	--
总计		100.000	2342091	268102			

图66 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-67-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 17:52:45 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:55:52 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.747	100.000	1948170	223201	4282	1.134	--
总计		100.000	1948170	223201			

图67 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-68-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 17:58:08 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:55:55 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.748	100.000	1128356	129317	4291	1.126	--
总计		100.000	1128356	129317			

图68 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-69-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 18:03:32 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:55:59 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.743	100.000	3574250	408126	4260	1.149	--
总计		100.000	3574250	408126			

图69 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-70-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 18:08:56 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:56:02 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	100.000	3478143	396971	4248	1.148	--
总计		100.000	3478143	396971			

图70 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-71-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 18:14:19 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:56:05 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.746	100.000	3832749	438045	4259	1.150	--
总计		100.000	3832749	438045			

图71 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-72-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 18:19:43 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:56:08 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.747	100.000	3937004	449915	4260	1.151	--
总计		100.000	3937004	449915			

图72 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-73-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 18:25:07 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:56:11 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.744	100.000	3761136	429445	4256	1.150	--
总计		100.000	3761136	429445			

图73 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-74-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 18:30:31 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:56:14 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.746	100.000	2913123	333439	4271	1.143	--
总计		100.000	2913123	333439			

图74 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-75-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 18:35:55 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:56:17 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.743	100.000	4098495	467758	4255	1.152	--
总计		100.000	4098495	467758			

图75 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-76-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 18:41:19 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:56:20 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.744	100.000	4103598	468267	4252	1.153	--
总计		100.000	4103598	468267			

图76 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-77-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 18:46:43 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:56:23 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	100.000	4182845	477599	4250	1.153	--
总计		100.000	4182845	477599			

图77 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-78-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 18:52:06 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:56:26 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.743	100.000	4225886	482039	4251	1.154	--
总计		100.000	4225886	482039			

图78 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-79-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 18:57:30 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:56:29 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.744	100.000	4172935	476121	4251	1.153	--
总计		100.000	4172935	476121			

图79 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-80-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 19:02:54 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:56:32 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	100.000	3729959	426168	4257	1.149	--
总计		100.000	3729959	426168			

图80 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-81-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 19:08:18 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:56:35 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.744	100.000	4246127	484807	4249	1.154	--
总计		100.000	4246127	484807			

图81 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-82-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 19:13:43 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:56:38 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.744	100.000	4261404	486446	4250	1.154	--
总计		100.000	4261404	486446			

图82 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-83-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 19:19:07 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:56:41 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.746	100.000	4263211	486734	4249	1.154	--
总计		100.000	4263211	486734			

图83 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-84-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 19:24:31 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:56:45 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	100.000	4293882	490570	4254	1.154	--
总计		100.000	4293882	490570			

图84 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-85-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 19:29:55 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:56:47 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.744	100.000	4282898	488635	4250	1.154	--
总计		100.000	4282898	488635			

图85 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-86-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 19:35:18 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:56:50 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	100.000	4087913	467183	4255	1.153	--
总计		100.000	4087913	467183			

图86 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-87-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 19:40:43 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:56:54 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.744	100.000	4307881	491668	4248	1.155	--
总计		100.000	4307881	491668			

图87 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-88-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 19:46:07 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:56:56 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	100.000	4312407	492528	4248	1.155	--
总计		100.000	4312407	492528			

图88 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-89-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 19:51:30 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:56:59 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.759	100.000	4466088	492913	4017	1.159	--
总计		100.000	4466088	492913			

图89 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-90-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 19:56:55 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:57:02 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.836	100.000	4349028	495430	4463	1.152	--
总计		100.000	4349028	495430			

图90 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-91-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 20:02:19 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:57:05 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.748	100.000	4329683	494461	4259	1.155	--
总计		100.000	4329683	494461			

图91 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-92-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 20:07:43 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:57:09 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.744	100.000	4280456	488365	4248	1.155	--
总计		100.000	4280456	488365			

图92 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-93-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 20:13:08 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:57:12 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.744	100.000	4310982	491599	4244	1.155	--
总计		100.000	4310982	491599			

图93 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-94-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 20:18:33 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:57:15 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.748	100.000	4320584	492851	4248	1.154	--
总计		100.000	4320584	492851			

图94 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-95-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 20:23:58 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:57:18 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	100.000	4311397	491745	4245	1.155	--
总计		100.000	4311397	491745			

图95 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温 :40℃
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-96-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2024/01/24 20:29:22
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:57:22
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：317nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.746	100.000	4341540	495296	4244	1.155	--
总计		100.000	4341540	495296			

图96 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-97-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 20:34:46 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:57:25 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	100.000	4341381	495264	4242	1.156	--
总计		100.000	4341381	495264			

图97 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-98-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 20:40:10 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:57:28 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	100.000	4301735	490715	4245	1.155	--
总计		100.000	4301735	490715			

图98 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-99-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 20:45:34 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:57:31 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.744	100.000	4311522	491730	4238	1.155	--
总计		100.000	4311522	491730			

图99 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-100-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 20:50:59 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:57:34 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.744	100.000	4324708	493062	4243	1.155	--
总计		100.000	4324708	493062			

图100 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-101-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 20:56:23 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:57:37 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	100.000	4311176	491173	4239	1.156	--
总计		100.000	4311176	491173			

图101 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-102-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 21:01:48 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:57:40 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.744	100.000	4345306	495350	4241	1.156	--
总计		100.000	4345306	495350			

图102 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-103-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 21:07:13 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:57:43 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	100.000	4338077	494728	4241	1.156	--
总计		100.000	4338077	494728			

图103 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-104-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 21:12:37 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:57:46 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.746	100.000	4310674	491642	4243	1.156	--
总计		100.000	4310674	491642			

图104 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-105-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 21:18:02 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:57:49 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	100.000	4305720	491130	4242	1.155	--
总计		100.000	4305720	491130			

图105 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-106-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 21:23:26 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:57:52 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	100.000	4318616	492470	4242	1.156	--
总计		100.000	4318616	492470			

图106 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-107-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 21:28:50 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:57:55 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	100.000	4294783	489722	4242	1.156	--
总计		100.000	4294783	489722			

图107 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-108-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 21:34:15 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:57:58 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.772	100.000	4342399	493995	4278	1.156	--
总计		100.000	4342399	493995			

图108 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-109-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 21:39:39 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:58:01 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.746	100.000	4313693	492396	4245	1.156	--
总计		100.000	4313693	492396			

图109 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-110-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 21:45:04 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:58:04 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.745	100.000	4295161	489790	4241	1.156	--
总计		100.000	4295161	489790			

图110 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-111-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 21:50:29 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:58:07 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.725	100.000	3977912	426313	3688	1.149	--
总计		100.000	3977912	426313			

图111 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-112-2 - 2024011311p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 21:55:53 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:58:10 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.727	100.000	3977663	426517	3690	1.148	--
总计		100.000	3977663	426517			

图112 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011311批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-113-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-9
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 22:01:15 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:58:14 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-114-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 22:06:38 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:58:16 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.728	100.000	3993639	428333	3690	1.148	--
总计		100.000	3993639	428333			

图114 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-115-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 22:12:01 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:58:19 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.726	100.000	3994169	427965	3689	1.149	--
总计		100.000	3994169	427965			

图115 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-116-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 22:17:24 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:58:22 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.726	100.000	3990376	427829	3692	1.149	--
总计		100.000	3990376	427829			

图116 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-117-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 22:22:47 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:58:26 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.727	100.000	3991510	428149	3692	1.148	--
总计		100.000	3991510	428149			

图117 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-118-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 22:28:10 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:58:29 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.728	100.000	3989066	428093	3694	1.148	--
总计		100.000	3989066	428093			

图118 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-119-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-1
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 22:33:33 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:58:32 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.753	100.000	1118240	127817	4280	1.128	--
总计		100.000	1118240	127817			

图119 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-120-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-10
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 22:38:55 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:58:35 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.752	100.000	2157585	246104	4266	1.138	--
总计		100.000	2157585	246104			

图120 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-121-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-19
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 22:44:18 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:58:38 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.750	100.000	2266725	258279	4265	1.140	--
总计		100.000	2266725	258279			

图121 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-122-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-28
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 22:49:41 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:58:41 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.752	100.000	2342694	267076	4262	1.140	--
总计		100.000	2342694	267076			

图122 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-123-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-37
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 22:55:02 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:58:44 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.752	100.000	2252329	256779	4266	1.139	--
总计		100.000	2252329	256779			

图123 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-124-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 23:00:25 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:58:47 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.752	100.000	2343145	267134	4263	1.140	--
总计		100.000	2343145	267134			

图124 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-125-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-2
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 23:05:47 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:58:50 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.775	100.000	3030587	344675	4296	1.147	--
总计		100.000	3030587	344675			

图125 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-126-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-11
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 23:11:09 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:58:53 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.748	100.000	3721114	423822	4240	1.152	--
总计		100.000	3721114	423822			

图126 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-127-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-20
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 23:16:31 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:58:56 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.748	100.000	3801463	433079	4239	1.153	--
总计		100.000	3801463	433079			

图127 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-128-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-29
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 23:21:53 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:58:59 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.748	100.000	3782476	430725	4233	1.153	--
总计		100.000	3782476	430725			

图128 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-129-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-38
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 23:27:16 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:59:02 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.749	100.000	3637080	414174	4240	1.152	--
总计		100.000	3637080	414174			

图129 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-130-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-47
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 23:32:38 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:59:05 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.749	100.000	3761689	428270	4237	1.153	--
总计		100.000	3761689	428270			

图130 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-131-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-3
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 23:38:01 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:59:08 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.750	100.000	3767443	428250	4239	1.154	--
总计		100.000	3767443	428250			

图131 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-132-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-12
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 23:43:23 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:59:11 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.748	100.000	4088535	465371	4233	1.156	--
总计		100.000	4088535	465371			

图132 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-133-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-21
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 23:48:45 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:59:14 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.747	100.000	4150882	472879	4231	1.156	--
总计		100.000	4150882	472879			

图133 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-134-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-30
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 23:54:08 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:59:17 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.748	100.000	4177806	475534	4230	1.157	--
总计		100.000	4177806	475534			

图134 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-135-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/24 23:59:30 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:59:20 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.749	100.000	4082962	464437	4228	1.156	--
总计		100.000	4082962	464437			

图135 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-136-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-48
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 00:04:52 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:59:23 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.750	100.000	4111175	467430	4235	1.157	--
总计		100.000	4111175	467430			

图136 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-137-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-4
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 00:10:14 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:59:26 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.750	100.000	4040331	458835	4234	1.156	--
总计		100.000	4040331	458835			

图137 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-138-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-13
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 00:15:34 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:59:29 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.751	100.000	4189701	475531	4232	1.157	--
总计		100.000	4189701	475531			

图138 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-139-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-22
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 00:20:57 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:59:33 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.751	100.000	4237582	481064	4232	1.158	--
总计		100.000	4237582	481064			

图139 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-140-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-31
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 00:26:19 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:59:36 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.751	100.000	4281430	486086	4235	1.158	--
总计		100.000	4281430	486086			

图140 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-141-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-40
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 00:31:41 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:59:39 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.768	100.000	4237559	481305	4274	1.158	--
总计		100.000	4237559	481305			

图141 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-142-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 00:37:03 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:59:42 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.749	100.000	4206980	478003	4228	1.158	--
总计		100.000	4206980	478003			

图142 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-143-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 00:42:25 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:59:45 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.751	100.000	4218793	479073	4234	1.158	--
总计		100.000	4218793	479073			

图143 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-144-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-14
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 00:47:48 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:59:48 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.751	100.000	4247166	481977	4232	1.158	--
总计		100.000	4247166	481977			

图144 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-145-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-23
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 00:53:09 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:59:51 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.751	100.000	4282568	485982	4230	1.158	--
总计		100.000	4282568	485982			

图145 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-146-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-32
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 00:58:30 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:59:54 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.758	100.000	4445019	494451	4060	1.139	--
总计		100.000	4445019	494451			

图146 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-147-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-41
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 01:03:50 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 11:59:57 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.755	100.000	4336169	489343	4139	1.150	--
总计		100.000	4336169	489343			

图147 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-148-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-50
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 01:09:11 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:00:00 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.751	100.000	4248189	482228	4229	1.158	--
总计		100.000	4248189	482228			

图148 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-149-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-6
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 01:14:33 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:00:03 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.751	100.000	4282488	485676	4227	1.159	--
总计		100.000	4282488	485676			

图149 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-150-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-15
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 01:19:55 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:00:06 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.751	100.000	4260060	483162	4226	1.158	--
总计		100.000	4260060	483162			

图150 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-226-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-24
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 09:13:23 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:00:09 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.734	100.000	4298245	489321	4219	1.158	--
总计		100.000	4298245	489321			

图151 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-227-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-33
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 09:18:44 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:00:12 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.735	100.000	4342271	493543	4202	1.158	--
总计		100.000	4342271	493543			

图152 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-228-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-42
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 09:24:04 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:00:15 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.737	100.000	4315037	491766	4220	1.158	--
总计		100.000	4315037	491766			

图153 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-229-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-51
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 09:29:25 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:00:18 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.740	100.000	4281579	488142	4230	1.158	--
总计		100.000	4281579	488142			

图154 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-155-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-7
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 01:46:46 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:00:21 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.751	100.000	4286408	486190	4224	1.159	--
总计		100.000	4286408	486190			

图155 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-156-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-16
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 01:52:08 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:00:24 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.751	100.000	4257462	482751	4226	1.159	--
总计		100.000	4257462	482751			

图156 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-157-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-25
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 01:57:30 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:00:27 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.751	100.000	4293709	487133	4226	1.159	--
总计		100.000	4293709	487133			

图157 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-158-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-34
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 02:02:52 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:00:30 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.751	100.000	4346149	492641	4223	1.159	--
总计		100.000	4346149	492641			

图158 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-159-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-43
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 02:08:14 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:00:33 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.752	100.000	4313687	489598	4225	1.159	--
总计		100.000	4313687	489598			

图159 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-160-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-52
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 02:13:34 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:00:37 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.754	100.000	4279285	486481	4234	1.158	--
总计		100.000	4279285	486481			

图160 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-161-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-8
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 02:18:57 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:00:39 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.754	100.000	4257400	483729	4231	1.158	--
总计		100.000	4257400	483729			

图161 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-162-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-17
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 02:24:20 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:00:42 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.755	100.000	4229371	480429	4232	1.158	--
总计		100.000	4229371	480429			

图162 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-163-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-26
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 02:29:43 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:00:45 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.753	100.000	4289826	487205	4225	1.159	--
总计		100.000	4289826	487205			

图163 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-164-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-35
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 02:35:06 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:00:49 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.753	100.000	4333953	492266	4230	1.159	--
总计		100.000	4333953	492266			

图164 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-165-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-44
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 02:40:27 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:00:52 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.754	100.000	4293731	487914	4227	1.158	--
总计		100.000	4293731	487914			

图165 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-166-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-53
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 02:45:50 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:00:55 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.754	100.000	4274227	485594	4229	1.159	--
总计		100.000	4274227	485594			

图166 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-167-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 02:51:12 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:00:58 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.734	100.000	4081583	437719	3716	1.152	--
总计		100.000	4081583	437719			

图167 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-168-2 - 2024011411p-zzp-1-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 02:56:36 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:01:01 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	100.000	4082541	438485	3718	1.152	--
总计		100.000	4082541	438485			

图168 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-169-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-9
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 03:02:00 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:01:04 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-170-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 03:07:24 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:01:07 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	100.000	4100057	440057	3711	1.152	--
总计		100.000	4100057	440057			

图170 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-171-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 03:12:49 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:01:10 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	100.000	4100798	440211	3712	1.152	--
总计		100.000	4100798	440211			

图171 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-172-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 03:18:14 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:01:13 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	100.000	4099977	439683	3707	1.152	--
总计		100.000	4099977	439683			

图172 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-173-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 03:23:38 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:01:16 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	100.000	4100768	439638	3708	1.152	--
总计		100.000	4100768	439638			

图173 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-174-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 03:29:02 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:01:19 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.733	100.000	4098293	439560	3707	1.152	--
总计		100.000	4098293	439560			

图174 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-175-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-1
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 03:34:26 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:01:22 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.758	100.000	2162764	245874	4254	1.141	--
总计		100.000	2162764	245874			

图175 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-176-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-10
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 03:39:48 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:01:26 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.758	100.000	2216419	251987	4248	1.142	--
总计		100.000	2216419	251987			

图176 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-177-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-19
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 03:45:11 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:01:29 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.758	100.000	2176324	247230	4255	1.141	--
总计		100.000	2176324	247230			

图177 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-178-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-28
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 03:50:34 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:01:32 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.758	100.000	2431597	276102	4245	1.144	--
总计		100.000	2431597	276102			

图178 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-179-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-37
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 03:55:56 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:01:35 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.759	100.000	2378719	270015	4249	1.143	--
总计		100.000	2378719	270015			

图179 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-180-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-46
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 04:01:19 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:01:38 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.760	100.000	2277825	258655	4252	1.142	--
总计		100.000	2277825	258655			

图180 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-181-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-2
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 04:06:42 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:01:41 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.754	100.000	3729924	423876	4231	1.154	--
总计		100.000	3729924	423876			

图181 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-182-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-11
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 04:12:05 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:01:45 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.755	100.000	3784554	429911	4227	1.155	--
总计		100.000	3784554	429911			

图182 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-183-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-20
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 04:17:29 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:01:48 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.755	100.000	3721893	422863	4231	1.154	--
总计		100.000	3721893	422863			

图183 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-184-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-29
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 04:22:51 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:01:51 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.755	100.000	3925681	445984	4227	1.156	--
总计		100.000	3925681	445984			

图184 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-185-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-38
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 04:28:13 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:01:54 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.757	100.000	3751106	424698	4208	1.155	--
总计		100.000	3751106	424698			

图185 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-186-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-47
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 04:33:36 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:01:57 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.759	100.000	3807775	431329	4227	1.156	--
总计		100.000	3807775	431329			

图186 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-187-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-3
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 04:38:59 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:02:00 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.756	100.000	4118944	467776	4233	1.158	--
总计		100.000	4118944	467776			

图187 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-188-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-12
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 04:44:23 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:02:03 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.756	100.000	4110242	466484	4226	1.158	--
总计		100.000	4110242	466484			

图188 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-189-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-21
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 04:49:46 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:02:06 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.757	100.000	4144774	470192	4229	1.158	--
总计		100.000	4144774	470192			

图189 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-190-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 04:55:09 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:02:09 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.757	100.000	4262793	483544	4225	1.159	--
总计		100.000	4262793	483544			

图190 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-191-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 05:00:32 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:02:12 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.755	100.000	4148128	470984	4225	1.158	--
总计		100.000	4148128	470984			

图191 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-192-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-48
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 05:05:55 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:02:15 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.756	100.000	4196079	476229	4227	1.159	--
总计		100.000	4196079	476229			

图192 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-193-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-4
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 05:11:19 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:02:18 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.757	100.000	4203274	476957	4228	1.159	--
总计		100.000	4203274	476957			

图193 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-194-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-13
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 05:16:43 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:02:21 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.757	100.000	4200729	476575	4223	1.159	--
总计		100.000	4200729	476575			

图194 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-195-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-22
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 05:22:06 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:02:24 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.756	100.000	4251360	482244	4222	1.160	--
总计		100.000	4251360	482244			

图195 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-196-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-31
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 05:27:30 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:02:27 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.757	100.000	4352929	493692	4223	1.160	--
总计		100.000	4352929	493692			

图196 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-197-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-40
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 05:32:53 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:02:31 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.756	100.000	4251392	482341	4225	1.160	--
总计		100.000	4251392	482341			

图197 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-198-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-49
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 05:38:16 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:02:34 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.757	100.000	4314456	488195	4210	1.160	--
总计		100.000	4314456	488195			

图198 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-199-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-5
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 05:43:39 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:02:37 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.758	100.000	4264196	483249	4228	1.160	--
总计		100.000	4264196	483249			

图199 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-200-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-14
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 05:49:02 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:02:40 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.756	100.000	4250323	482432	4220	1.159	--
总计		100.000	4250323	482432			

图200 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-201-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-23
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 05:54:27 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:02:43 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.756	100.000	4301916	487920	4223	1.160	--
总计		100.000	4301916	487920			

图201 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-202-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-32
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 05:59:50 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:02:46 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.756	100.000	4404473	499731	4219	1.161	--
总计		100.000	4404473	499731			

图202 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-203-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-41
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 06:05:13 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:02:50 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.757	100.000	4303543	488244	4223	1.160	--
总计		100.000	4303543	488244			

图203 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-204-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-50
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 06:10:36 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:02:53 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.757	100.000	4344342	492450	4222	1.160	--
总计		100.000	4344342	492450			

图204 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-205-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-6
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 06:16:00 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:02:55 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.758	100.000	4275429	484561	4226	1.160	--
总计		100.000	4275429	484561			

图205 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-206-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-15
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 06:21:25 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:02:58 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.756	100.000	4272270	484555	4221	1.160	--
总计		100.000	4272270	484555			

图206 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-207-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-24
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 06:26:48 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:03:01 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.758	100.000	4311265	488214	4225	1.160	--
总计		100.000	4311265	488214			

图207 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-208-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-33
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 06:32:11 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:03:04 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.758	100.000	4409700	499360	4225	1.161	--
总计		100.000	4409700	499360			

图208 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-209-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-42
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 06:37:35 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:03:07 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.757	100.000	4309215	488736	4221	1.160	--
总计		100.000	4309215	488736			

图209 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-210-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-51
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 06:43:00 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:03:10 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.757	100.000	4350135	493560	4222	1.160	--
总计		100.000	4350135	493560			

图210 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-211-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-7
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 06:48:24 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:03:13 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.759	100.000	4259693	482074	4225	1.160	--
总计		100.000	4259693	482074			

图211 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-212-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-16
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 06:53:48 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:03:16 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.758	100.000	4271968	483951	4227	1.160	--
总计		100.000	4271968	483951			

图212 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-213-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-25
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 06:59:11 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:03:19 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.759	100.000	4300308	486484	4221	1.160	--
总计		100.000	4300308	486484			

图213 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-214-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-34
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 07:04:35 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:03:22 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.759	100.000	4398519	497909	4221	1.161	--
总计		100.000	4398519	497909			

图214 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-215-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-43
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 07:09:59 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:03:25 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.757	100.000	4302012	487930	4223	1.160	--
总计		100.000	4302012	487930			

图215 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-216-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-52
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 07:15:23 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:03:28 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.757	100.000	4353103	493251	4220	1.161	--
总计		100.000	4353103	493251			

图216 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-217-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-8
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 07:20:48 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:03:31 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.759	100.000	4263648	482297	4216	1.159	--
总计		100.000	4263648	482297			

图217 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-218-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-17
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 07:26:12 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:03:34 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.760	100.000	4273023	483613	4226	1.160	--
总计		100.000	4273023	483613			

图218 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-219-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-26
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 07:31:36 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:03:37 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.759	100.000	4287484	485118	4224	1.160	--
总计		100.000	4287484	485118			

图219 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-220-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-35
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 07:36:59 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:03:40 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.759	100.000	4384840	496069	4221	1.161	--
总计		100.000	4384840	496069			

图220 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-221-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-44
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 07:42:24 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:03:43 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.759	100.000	4289036	485311	4218	1.160	--
总计		100.000	4289036	485311			

图221 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-222-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-JX-P6.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-53
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 07:47:48 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:03:46 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.759	100.000	4322636	488844	4221	1.161	--
总计		100.000	4322636	488844			

图222 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-223-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 07:53:11 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:03:49 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.741	100.000	4105466	440533	3721	1.153	--
总计		100.000	4105466	440533			

图223 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

999

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱 温 :40℃ 波长：317nm
数据文件名 : RC$999 - 0-8/18-224-2 - 2024011411p-zzp-2-pH6.0jz-40mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC$999 - 20240124-rcqx-FX267-1.lcm
批处理文件名 : RC$999 - 20240124-Fx267.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 20μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/01/25 07:58:36 实验者:wangdan
处理时间（V2） : 2024/01/25 12:03:53 处理者:wangdan
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.741	100.000	4105994	440479	3718	1.153	--
总计		100.000	4105994	440479			

图224 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024011411批(40mg规格)-pH6.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2