



比索洛尔左氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	100711-202203	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.52	85213	85528	85304	85467	85308	85364	0.16
2	10.35	85049	85160				85104	0.10

单位质量响应值		RSD%	判断
8114.45	8222.61	0.94	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-G01RY4批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	69552	-	69552	76.482	72.02	10.36	76.48	72.02	10.36
	2	57953	-	57953	63.727			63.73		
	3	69340	-	69340	76.249			76.25		
	4	68331	-	68331	75.139			75.14		
	5	55869	-	55869	61.435			61.44		
	6	71905	-	71905	79.069			79.07		
10min	1	79155	-	79155	87.042	87.93	5.10	87.17	88.04	5.11
	2	74558	-	74558	81.987			82.09		
	3	83079	-	83079	91.357			91.48		
	4	80960	-	80960	89.026			89.15		
	5	76507	-	76507	84.130			84.23		
	6	85496	-	85496	94.014			94.15		
15min	1	82378	-	82378	90.586	94.24	3.59	90.86	94.51	3.59
	2	82089	-	82089	90.268			90.51		
	3	88883	-	88883	97.739			98.02		
	4	85769	-	85769	94.315			94.59		
	5	85812	-	85812	94.362			94.60		
	6	89300	-	89300	98.197			98.49		
20min	1	83238	-	83238	91.531	96.88	3.22	91.95	97.30	3.22
	2	87040	-	87040	95.712			96.11		
	3	90563	-	90563	99.586			100.03		
	4	87603	-	87603	96.331			96.76		
	5	89306	-	89306	98.204			98.60		
	6	90863	-	90863	99.916			100.37		
30min	1	83253	-	83253	91.548	98.27	3.65	92.12	98.86	3.64
	2	91227	-	91227	100.316			100.87		
	3	91311	-	91311	100.409			101.02		
	4	88017	-	88017	96.787			97.38		
	5	91351	-	91351	100.453			101.02		
	6	91044	-	91044	100.115			100.73		
45min	1	82852	-	82852	91.107	97.97	3.80	91.84	98.72	3.77
	2	91829	-	91829	100.978			101.70		
	3	90660	-	90660	99.693			100.47		
	4	87656	-	87656	96.390			97.14		
	5	91214	-	91214	100.302			101.03		
	6	90352	-	90352	99.354			100.14		
极限	1	82397	-	82397	90.607	97.42	3.79	91.49	98.33	3.76
	2	91303	-	91303	100.400			101.29		
	3	90235	-	90235	99.225			100.17		
	4	87173	-	87173	95.858			96.77		
	5	90697	-	90697	99.734			100.63		
	6	89734	-	89734	98.675			99.63		



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



比索洛尔左氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	100711-202203	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.52	85289	85316	85200	85311	85536	85330	0.15
2	10.35	85075	85051				85063	0.02
单位质量响应值				RSD%	判断			
8111.22				0.94	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-G01RY4批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	45433	-	45433	49.982	68.69	16.85	49.98	68.69	16.85
	2	54291	-	54291	59.727			59.73		
	3	73646	-	73646	81.019			81.02		
	4	67880	-	67880	74.676			74.68		
	5	64870	-	64870	71.365			71.36		
	6	68494	-	68494	75.351			75.35		
10min	1	62034	-	62034	68.245	84.22	12.12	68.33	84.34	12.12
	2	69035	-	69035	75.947			76.05		
	3	86457	-	86457	95.113			95.25		
	4	79768	-	79768	87.754			87.88		
	5	83686	-	83686	92.064			92.18		
	6	78380	-	78380	86.227			86.35		
15min	1	70795	-	70795	77.883	90.52	9.11	78.08	90.78	9.12
	2	76237	-	76237	83.870			84.10		
	3	91164	-	91164	100.291			100.58		
	4	84735	-	84735	93.218			93.49		
	5	87372	-	87372	96.120			96.39		
	6	83415	-	83415	91.766			92.04		
20min	1	77852	-	77852	85.646	93.95	6.28	85.97	94.36	6.30
	2	80896	-	80896	88.995			89.36		
	3	92777	-	92777	102.066			102.53		
	4	87093	-	87093	95.813			96.24		
	5	88380	-	88380	97.228			97.66		
	6	85424	-	85424	93.976			94.40		
30min	1	84379	-	84379	92.827	97.22	3.63	93.30	97.79	3.65
	2	86984	-	86984	95.693			96.21		
	3	93619	-	93619	102.992			103.62		
	4	89169	-	89169	98.096			98.68		
	5	89625	-	89625	98.598			99.19		
	6	86479	-	86479	95.137			95.72		
45min	1	88646	-	88646	97.521	98.26	2.56	98.15	98.98	2.56
	2	90378	-	90378	99.426			100.10		
	3	92982	-	92982	102.291			103.09		
	4	88485	-	88485	97.344			98.09		
	5	89323	-	89323	98.266			99.02		
	6	86097	-	86097	94.717			95.45		
极限	1	90148	-	90148	99.173	98.02	2.64	99.96	98.91	2.63
	2	88969	-	88969	97.876			98.72		
	3	92543	-	92543	101.808			102.78		
	4	88174	-	88174	97.002			97.91		
	5	89368	-	89368	98.315			99.24		
	6	85402	-	85402	93.952			94.85		



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



比索洛尔左氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	100711-202203	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.52	85269	85454	85310	85256	85194	85297	0.12
2	10.35	85381	85691				85536	0.26
单位质量响应值				RSD%	判断			
8108.08				1.35	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-G01RY4批-0.005HCL

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	70068	-	70068	76.886	76.10	6.21	76.89	76.10	6.21
	2	70756	-	70756	77.641			77.64		
	3	69003	-	69003	75.718			75.72		
	4	66877	-	66877	73.385			73.38		
	5	63227	-	63227	69.380			69.38		
	6	76168	-	76168	83.580			83.58		
10min	1	78255	-	78255	85.870	85.39	4.80	86.00	85.52	4.80
	2	78318	-	78318	85.939			86.07		
	3	77252	-	77252	84.769			84.90		
	4	76178	-	76178	83.591			83.71		
	5	72738	-	72738	79.816			79.93		
	6	84163	-	84163	92.353			92.49		
15min	1	82807	-	82807	90.865	89.84	4.28	91.14	90.11	4.28
	2	82299	-	82299	90.308			90.58		
	3	80768	-	80768	88.628			88.90		
	4	79536	-	79536	87.276			87.54		
	5	77847	-	77847	85.422			85.67		
	6	87970	-	87970	96.530			96.82		
20min	1	83923	-	83923	92.090	92.08	3.63	92.51	92.50	3.63
	2	84031	-	84031	92.208			92.63		
	3	82644	-	82644	90.686			91.10		
	4	81342	-	81342	89.257			89.66		
	5	81836	-	81836	89.800			90.19		
	6	89712	-	89712	98.442			98.90		
30min	1	84986	-	84986	93.256	94.65	3.51	93.83	95.23	3.51
	2	86607	-	86607	95.035			95.61		
	3	83731	-	83731	91.879			92.45		
	4	83621	-	83621	91.758			92.31		
	5	86855	-	86855	95.307			95.85		
	6	91759	-	91759	100.688			101.31		
45min	1	85960	-	85960	94.325	96.52	3.84	95.06	97.25	3.83
	2	88775	-	88775	97.414			98.15		
	3	84504	-	84504	92.727			93.45		
	4	85356	-	85356	93.662			94.37		
	5	89703	-	89703	98.432			99.13		
	6	93472	-	93472	102.568			103.35		
极限	1	86506	-	86506	94.924	96.02	5.06	95.81	96.91	5.03
	2	81524	-	81524	89.457			90.35		
	3	85365	-	85365	93.672			94.55		
	4	86651	-	86651	95.083			95.95		
	5	90775	-	90775	99.608			100.47		
	6	94215	-	94215	103.383			104.34		



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



比索洛尔左氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	100711-202203	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.52	85344	85339	85195	85284	85288	85290	0.08
2	10.35	85319	85412				85366	0.08
单位质量响应值				RSD%	判断			
8107.41				1.22	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-G01RY4批-0.005HCL

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	75633	-	75633	83.078	76.37	16.46	83.08	76.37	16.46
	2	76567	-	76567	84.104			84.10		
	3	72605	-	72605	79.752			79.75		
	4	46535	-	46535	51.116			51.12		
	5	74708	-	74708	82.062			82.06		
	6	71122	-	71122	78.123			78.12		
10min	1	85114	-	85114	93.492	87.00	14.83	93.63	87.12	14.83
	2	85561	-	85561	93.983			94.12		
	3	81523	-	81523	89.548			89.68		
	4	55477	-	55477	60.938			61.02		
	5	85149	-	85149	93.531			93.67		
	6	82385	-	82385	90.495			90.63		
15min	1	88109	-	88109	96.782	91.19	13.41	97.08	91.46	13.42
	2	89621	-	89621	98.443			98.74		
	3	84907	-	84907	93.265			93.55		
	4	60619	-	60619	66.586			66.77		
	5	89093	-	89093	97.863			98.16		
	6	85765	-	85765	94.208			94.49		
20min	1	88877	-	88877	97.626	93.19	12.11	98.08	93.61	12.12
	2	91722	-	91722	100.751			101.21		
	3	86716	-	86716	95.252			95.69		
	4	64229	-	64229	70.552			70.85		
	5	90258	-	90258	99.143			99.60		
	6	87225	-	87225	95.811			96.25		
30min	1	89774	-	89774	98.611	95.56	9.79	99.23	96.14	9.82
	2	93697	-	93697	102.920			103.55		
	3	88091	-	88091	96.763			97.36		
	4	70169	-	70169	77.076			77.49		
	5	91847	-	91847	100.888			101.51		
	6	88389	-	88389	97.090			97.69		
45min	1	90390	-	90390	99.288	97.00	7.15	100.07	97.74	7.19
	2	93858	-	93858	103.097			103.90		
	3	88305	-	88305	96.998			97.76		
	4	76138	-	76138	83.633			84.18		
	5	92231	-	92231	101.310			102.10		
	6	88918	-	88918	97.671			98.43		
极限	1	90902	-	90902	99.850	99.49	2.64	100.80	100.39	2.67
	2	94227	-	94227	103.503			104.47		
	3	88092	-	88092	96.764			97.68		
	4	88794	-	88794	97.535			98.22		
	5	92387	-	92387	101.481			102.44		
	6	89043	-	89043	97.808			98.73		



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:


未审阅版本

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-949-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 11:23:29 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:52:27 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-950-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 11:28:52 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:52:31 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.844	85213	100.000	23466	1267	1.228	--
总计		85213	100.000	23466			

图2 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-951-2 - G01RY4p-cbj-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 11:34:17 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:52:34 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.844	85528	100.000	23481	1267	1.233	--
总计		85528	100.000	23481			

图3 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-952-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 11:39:41 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:52:37 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.844	85304	100.000	23447	1270	1.230	--
总计		85304	100.000	23447			

图4 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-953-2 - G01RY4p-cbj-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 11:45:04 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:52:40 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.844	85467	100.000	23449	1271	1.232	--
总计		85467	100.000	23449			

图5 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-954-2 - G01RY4p-cbj-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 11:50:28 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:52:43 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.844	85308	100.000	23401	1269	1.233	--
总计		85308	100.000	23401			

图6 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-955-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 11:55:50 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:52:46 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	69552	100.000	20607	1500	1.232	--
总计		69552	100.000	20607			

图7 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-956-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 12:01:13 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:52:49 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	57953	100.000	17196	1502	1.233	--
总计		57953	100.000	17196			

图8 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-957-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 12:06:35 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:52:52 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	69340	100.000	20573	1501	1.227	--
总计		69340	100.000	20573			

图9 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-958-2 - G01RY4p-cbj-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 12:11:58 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:52:55 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	68331	100.000	20249	1503	1.233	--
总计		68331	100.000	20249			

图10 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-959-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 12:17:21 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:52:58 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	55869	100.000	16526	1500	1.233	--
总计		55869	100.000	16526			

图11 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-960-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 12:22:43 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:53:01 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	71905	100.000	21329	1503	1.229	--
总计		71905	100.000	21329			

图12 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-961-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 12:28:05 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:53:05 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	79155	100.000	23541	1505	1.227	--
总计		79155	100.000	23541			

图13 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-962-2 - G01RY4p-cbj-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 12:33:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:53:08 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	74558	100.000	22189	1504	1.228	--
总计		74558	100.000	22189			

图14 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-963-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 12:38:49 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:53:12 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	83079	100.000	24605	1502	1.231	--
总计		83079	100.000	24605			

图15 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-964-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 12:44:12 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:53:15 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	80960	100.000	24030	1505	1.230	--
总计		80960	100.000	24030			

图16 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-965-2 - G01RY4p-cbj-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 12:49:35 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:53:18 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	76507	100.000	22746	1504	1.229	--
总计		76507	100.000	22746			

图17 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-966-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 12:54:57 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:53:21 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	85496	100.000	25387	1501	1.227	--
总计		85496	100.000	25387			

图18 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-967-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 13:00:19 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:53:24 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	82378	100.000	24488	1506	1.227	--
总计		82378	100.000	24488			

图19 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-968-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 13:05:41 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:53:27 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	82089	100.000	24405	1502	1.227	--
总计		82089	100.000	24405			

图20 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-969-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 13:11:05 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:53:30 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	88883	100.000	26416	1506	1.228	--
总计		88883	100.000	26416			

图21 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-970-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 13:16:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:53:33 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	85769	100.000	25503	1506	1.227	--
总计		85769	100.000	25503			

图22 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-971-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 13:21:51 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:53:36 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	85812	100.000	25474	1504	1.231	--
总计		85812	100.000	25474			

图23 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-972-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 13:27:13 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:53:40 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	89300	100.000	26554	1506	1.227	--
总计		89300	100.000	26554			

图24 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-973-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 13:32:35 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:53:43 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	83238	100.000	24777	1503	1.231	--
总计		83238	100.000	24777			

图25 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-974-2 - G01RY4p-cbj-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 13:37:57 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:53:46 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	87040	100.000	25928	1507	1.227	--
总计		87040	100.000	25928			

图26 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-975-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 13:43:19 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:53:49 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	90563	100.000	26968	1508	1.226	--
总计		90563	100.000	26968			

图27 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-976-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 13:48:41 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:53:52 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	87603	100.000	26040	1506	1.229	--
总计		87603	100.000	26040			

图28 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-977-2 - G01RY4p-cbj-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 13:54:05 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:53:55 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	89306	100.000	26566	1506	1.227	--
总计		89306	100.000	26566			

图29 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-978-2 - G01RY4p-cbj-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 13:59:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:53:59 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	90863	100.000	26986	1505	1.230	--
总计		90863	100.000	26986			

图30 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-979-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 14:04:50 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:54:02 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	83253	100.000	24794	1508	1.228	--
总计		83253	100.000	24794			

图31 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-980-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 14:10:13 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:54:05 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	91227	100.000	27125	1505	1.228	--
总计		91227	100.000	27125			

图32 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-981-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 14:15:36 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:54:08 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	91311	100.000	27144	1506	1.231	--
总计		91311	100.000	27144			

图33 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-982-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 14:20:58 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:54:11 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	88017	100.000	26211	1508	1.229	--
总计		88017	100.000	26211			

图34 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-983-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 14:26:21 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:54:14 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	91351	100.000	27164	1506	1.229	--
总计		91351	100.000	27164			

图35 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-984-2 - G01RY4p-cbj-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 14:31:43 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:54:17 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	91044	100.000	27080	1505	1.227	--
总计		91044	100.000	27080			

图36 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-985-2 - G01RY4p-cbj-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 14:37:05 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:54:20 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	82852	100.000	24636	1507	1.231	--
总计		82852	100.000	24636			

图37 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-986-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 14:42:28 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:54:23 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	91829	100.000	27338	1507	1.228	--
总计		91829	100.000	27338			

图38 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-987-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 14:47:51 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:54:26 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	90660	100.000	26995	1507	1.228	--
总计		90660	100.000	26995			

图39 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-988-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 14:53:14 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:54:29 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	87656	100.000	26060	1506	1.229	--
总计		87656	100.000	26060			

图40 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-989-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 14:58:36 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:54:32 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	91214	100.000	27128	1508	1.229	--
总计		91214	100.000	27128			

图41 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-990-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 15:03:59 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:54:35 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	90352	100.000	26896	1505	1.228	--
总计		90352	100.000	26896			

图42 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-991-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 15:09:22 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:54:38 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	82397	100.000	24503	1502	1.227	--
总计		82397	100.000	24503			

图43 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-992-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 15:14:45 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:54:41 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	91303	100.000	27177	1503	1.227	--
总计		91303	100.000	27177			

图44 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-993-2 - G01RY4p-cbj-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 15:20:07 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:54:44 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	90235	100.000	26842	1504	1.229	--
总计		90235	100.000	26842			

图45 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-994-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 15:25:30 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:54:47 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	87173	100.000	25931	1504	1.227	--
总计		87173	100.000	25931			

图46 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-995-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 15:30:53 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:54:50 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	90697	100.000	26970	1505	1.230	--
总计		90697	100.000	26970			

图47 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-996-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 15:36:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:54:52 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	89734	100.000	26702	1504	1.228	--
总计		89734	100.000	26702			


图48 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-997-2 - G01RY4p-cbjz-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 15:41:39 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:54:55 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.842	85049	100.000	23281	1268	1.236	--
总计		85049	100.000	23281			

图49 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-998-2 - G01RY4p-cbj-1-pH1.2jz-5mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 15:47:02 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:54:58 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.842	85160	100.000	23318	1270	1.236	--
总计		85160	100.000	23318			

图50 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-999-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 15:52:26 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:55:01 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图51 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1000-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 15:57:51 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:55:04 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.843	85289	100.000	23356	1269	1.237	--
总计		85289	100.000	23356			

图52 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1001-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 16:03:16 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:55:07 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.842	85316	100.000	23309	1270	1.239	--
总计		85316	100.000	23309			

图53 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1002-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 16:08:40 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:55:10 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.843	85200	100.000	23363	1271	1.236	--
总计		85200	100.000	23363			

图54 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1003-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 16:14:04 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:55:13 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.843	85311	100.000	23362	1271	1.236	--
总计		85311	100.000	23362			

图55 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1004-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 16:19:29 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:55:16 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.843	85536	100.000	23390	1271	1.235	--
总计		85536	100.000	23390			

图56 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1005-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 16:24:53 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:55:19 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	45433	100.000	13457	1499	1.232	--
总计		45433	100.000	13457			

图57 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1006-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 16:30:17 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:55:22 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	54291	100.000	16058	1500	1.233	--
总计		54291	100.000	16058			

图58 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1007-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 16:35:41 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:55:25 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	73646	100.000	21884	1502	1.230	--
总计		73646	100.000	21884			

图59 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1008-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 16:41:04 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:55:28 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	67880	100.000	20153	1501	1.231	--
总计		67880	100.000	20153			

图60 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1009-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 16:46:28 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:55:31 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	64870	100.000	19233	1501	1.232	--
总计		64870	100.000	19233			

图61 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1010-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 16:51:52 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:55:34 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	68494	100.000	20335	1502	1.230	--
总计		68494	100.000	20335			

图62 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1011-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 16:57:17 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:55:38 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	62034	100.000	18428	1501	1.231	--
总计		62034	100.000	18428			

图63 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1012-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 17:02:41 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:55:41 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	69035	100.000	20516	1501	1.228	--
总计		69035	100.000	20516			

图64 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1013-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 17:08:05 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:55:44 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	86457	100.000	25739	1507	1.228	--
总计		86457	100.000	25739			

图65 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1014-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 17:13:29 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:55:47 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	79768	100.000	23728	1501	1.228	--
总计		79768	100.000	23728			

图66 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1015-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 17:18:52 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:55:50 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	83686	100.000	24882	1501	1.228	--
总计		83686	100.000	24882			

图67 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1016-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 17:24:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:55:53 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	78380	100.000	23329	1502	1.228	--
总计		78380	100.000	23329			

图68 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1017-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 17:29:39 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:55:56 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	70795	100.000	21054	1502	1.226	--
总计		70795	100.000	21054			

图69 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1018-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 17:35:04 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:55:59 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	76237	100.000	22681	1502	1.229	--
总计		76237	100.000	22681			

图70 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1019-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 17:40:28 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:56:02 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	91164	100.000	27117	1506	1.230	--
总计		91164	100.000	27117			

图71 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1020-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 17:45:52 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:56:05 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	84735	100.000	25214	1502	1.229	--
总计		84735	100.000	25214			

图72 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1021-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 17:51:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:56:08 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	87372	100.000	26005	1506	1.227	--
总计		87372	100.000	26005			

图73 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1022-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 17:56:39 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:56:12 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	83415	100.000	24841	1508	1.227	--
总计		83415	100.000	24841			

图74 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1023-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 18:02:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:56:15 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	77852	100.000	23158	1506	1.229	--
总计		77852	100.000	23158			

图75 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1024-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 18:07:31 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:56:18 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	80896	100.000	24035	1506	1.228	--
总计		80896	100.000	24035			

图76 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1025-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 18:12:55 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:56:21 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	92777	100.000	27613	1506	1.229	--
总计		92777	100.000	27613			

图77 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1026-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 18:18:19 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:56:24 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	87093	100.000	25896	1501	1.228	--
总计		87093	100.000	25896			

图78 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1027-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 18:23:43 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:56:27 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	88380	100.000	26316	1507	1.229	--
总计		88380	100.000	26316			

图79 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1028-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 18:29:07 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:56:30 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	85424	100.000	25410	1507	1.229	--
总计		85424	100.000	25410			

图80 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1029-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 18:34:31 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:56:33 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	84379	100.000	25109	1503	1.227	--
总计		84379	100.000	25109			

图81 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1030-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 18:39:56 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:56:36 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	86984	100.000	25890	1506	1.229	--
总计		86984	100.000	25890			

图82 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1031-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 18:45:20 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:56:39 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	93619	100.000	27849	1502	1.228	--
总计		93619	100.000	27849			

图83 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1032-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 18:50:44 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:56:42 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	89169	100.000	26506	1500	1.229	--
总计		89169	100.000	26506			

图84 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1033-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 18:56:09 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:56:45 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	89625	100.000	26655	1503	1.226	--
总计		89625	100.000	26655			

图85 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1034-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 19:01:33 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:56:49 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	86479	100.000	25736	1506	1.228	--
总计		86479	100.000	25736			

图86 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1035-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 19:06:58 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:56:52 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	88646	100.000	26418	1507	1.227	--
总计		88646	100.000	26418			

图87 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1036-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 19:12:23 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:56:55 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	90378	100.000	26928	1507	1.227	--
总计		90378	100.000	26928			

图88 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1037-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 19:17:48 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:56:58 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	92982	100.000	27680	1503	1.227	--
总计		92982	100.000	27680			

图89 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1038-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 19:23:12 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:57:01 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	88485	100.000	26334	1504	1.226	--
总计		88485	100.000	26334			

图90 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1039-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 19:28:36 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:57:04 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	89323	100.000	26580	1502	1.228	--
总计		89323	100.000	26580			

图91 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1040-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 19:34:00 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:57:07 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	86097	100.000	25610	1501	1.226	--
总计		86097	100.000	25610			

图92 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1041-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 19:39:25 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:57:10 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	90148	100.000	26822	1503	1.225	--
总计		90148	100.000	26822			

图93 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1042-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 19:44:50 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:57:13 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	88969	100.000	26476	1504	1.228	--
总计		88969	100.000	26476			

图94 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1043-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 19:50:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:57:16 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	92543	100.000	27509	1502	1.226	--
总计		92543	100.000	27509			

图95 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1044-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 19:55:39 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:57:19 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	88174	100.000	26154	1499	1.228	--
总计		88174	100.000	26154			

图96 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1045-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 20:01:04 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:57:22 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	89368	100.000	26554	1503	1.229	--
总计		89368	100.000	26554			

图97 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1046-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 20:06:28 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:57:26 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	85402	100.000	25382	1502	1.228	--
总计		85402	100.000	25382			

图98 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1047-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 20:11:53 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:57:29 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.842	85075	100.000	23405	1269	1.235	--
总计		85075	100.000	23405			

图99 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1048-2 - G01RY4p-cbjz-2-pH1.2jz-5mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 20:17:17 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:57:32 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.841	85051	100.000	23449	1269	1.235	--
总计		85051	100.000	23449			

图100 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1049-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 20:22:40 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:57:35 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图101 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1050-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 20:28:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:57:38 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.841	85269	100.000	23494	1270	1.237	--
总计		85269	100.000	23494			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1051-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 20:33:26 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:57:42 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.846	85454	100.000	23595	1272	1.229	--
总计		85454	100.000	23595			

图103 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1052-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 20:38:49 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:57:45 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.846	85310	100.000	23610	1276	1.230	--
总计		85310	100.000	23610			

图104 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1053-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 20:44:12 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:57:48 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.846	85256	100.000	23612	1275	1.227	--
总计		85256	100.000	23612			




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1054-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 20:49:35 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:57:52 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.846	85194	100.000	23618	1275	1.226	--
总计		85194	100.000	23618			

图106 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1055-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 20:54:58 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:57:55 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	70068	100.000	20647	1505	1.229	--
总计		70068	100.000	20647			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1056-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 21:00:20 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:57:58 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.859	70756	100.000	20717	1510	1.230	--
总计		70756	100.000	20717			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1057-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 21:05:43 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:58:01 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	69003	100.000	20299	1505	1.229	--
总计		69003	100.000	20299			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1058-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 21:11:05 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:58:04 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	66877	100.000	19680	1505	1.231	--
总计		66877	100.000	19680			

图110 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1059-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 21:16:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:58:07 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	63227	100.000	18614	1505	1.230	--
总计		63227	100.000	18614			

图111 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1060-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 21:21:50 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:58:10 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	76168	100.000	22404	1504	1.230	--
总计		76168	100.000	22404			

图112 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1061-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 21:27:12 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:58:14 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.859	78255	100.000	22942	1510	1.229	--
总计		78255	100.000	22942			

图113 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1062-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 21:32:34 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:58:16 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.859	78318	100.000	22970	1509	1.228	--
总计		78318	100.000	22970			

图114 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1063-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 21:37:57 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:58:20 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	77252	100.000	22785	1506	1.229	--
总计		77252	100.000	22785			

图115 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1064-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 21:43:19 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:58:23 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	76178	100.000	22407	1505	1.227	--
总计		76178	100.000	22407			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1065-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 21:48:41 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:58:27 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	72738	100.000	21445	1500	1.230	--
总计		72738	100.000	21445			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1066-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 21:54:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:58:30 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	84163	100.000	24856	1505	1.227	--
总计		84163	100.000	24856			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1067-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 21:59:25 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:58:33 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	82807	100.000	24321	1507	1.232	--
总计		82807	100.000	24321			

图119 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1068-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 22:04:47 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:58:36 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	82299	100.000	24308	1506	1.226	--
总计		82299	100.000	24308			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1069-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 22:10:09 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:58:39 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	80768	100.000	23861	1506	1.228	--
总计		80768	100.000	23861			

图121 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1070-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 22:15:31 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:58:42 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	79536	100.000	23500	1505	1.229	--
总计		79536	100.000	23500			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1071-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 22:20:53 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:58:45 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	77847	100.000	22909	1510	1.228	--
总计		77847	100.000	22909			

图123 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1072-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 22:26:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:58:48 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	87970	100.000	25957	1502	1.229	--
总计		87970	100.000	25957			

图124 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1073-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 22:31:37 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:58:51 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	83923	100.000	24825	1505	1.227	--
总计		83923	100.000	24825			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1074-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 22:36:59 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:58:54 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	84031	100.000	24849	1506	1.226	--
总计		84031	100.000	24849			

图126 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1075-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 22:42:21 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:58:57 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	82644	100.000	24370	1502	1.226	--
总计		82644	100.000	24370			

图127 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1076-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 22:47:43 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:59:00 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	81342	100.000	24050	1505	1.230	--
总计		81342	100.000	24050			

图128 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1077-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 22:53:05 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:59:03 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	81836	100.000	24180	1504	1.227	--
总计		81836	100.000	24180			

图129 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1078-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 22:58:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:59:06 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	89712	100.000	26522	1503	1.228	--
总计		89712	100.000	26522			

图130 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1079-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 23:03:50 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:59:09 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	84986	100.000	25186	1508	1.227	--
总计		84986	100.000	25186			

图131 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1080-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 23:09:13 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:59:12 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	86607	100.000	25518	1507	1.228	--
总计		86607	100.000	25518			

图132 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1081-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 23:14:35 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:59:15 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	83731	100.000	24650	1506	1.228	--
总计		83731	100.000	24650			

图133 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1082-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 23:19:57 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:59:18 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	83621	100.000	24679	1508	1.228	--
总计		83621	100.000	24679			

图134 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1083-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 23:25:19 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:59:21 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	86855	100.000	25597	1507	1.230	--
总计		86855	100.000	25597			

图135 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1084-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 23:30:41 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:59:24 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	91759	100.000	27076	1507	1.229	--
总计		91759	100.000	27076			

图136 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1085-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 23:36:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:59:28 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	85960	100.000	25354	1502	1.229	--
总计		85960	100.000	25354			

图137 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1086-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 23:41:25 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:59:31 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	88775	100.000	26189	1506	1.229	--
总计		88775	100.000	26189			

图138 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1087-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 23:46:46 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:59:34 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	84504	100.000	25030	1504	1.228	--
总计		84504	100.000	25030			

图139 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1088-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 23:52:07 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:59:37 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	85356	100.000	25178	1506	1.229	--
总计		85356	100.000	25178			

图140 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1089-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/25 23:57:29 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:59:40 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	89703	100.000	26481	1503	1.229	--
总计		89703	100.000	26481			

图141 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1090-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 00:02:51 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:59:43 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	93472	100.000	27532	1505	1.230	--
总计		93472	100.000	27532			

图142 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1091-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 00:08:13 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:59:46 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	86506	100.000	25492	1504	1.226	--
总计		86506	100.000	25492			

图143 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1092-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 00:13:35 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:59:49 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	81524	100.000	24050	1504	1.229	--
总计		81524	100.000	24050			

图144 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1093-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 00:18:57 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:59:52 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	85365	100.000	25170	1506	1.230	--
总计		85365	100.000	25170			

图145 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1094-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 00:24:19 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:59:55 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	86651	100.000	25547	1503	1.230	--
总计		86651	100.000	25547			

图146 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1095-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 00:29:41 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 11:59:58 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	90775	100.000	26807	1506	1.228	--
总计		90775	100.000	26807			

图147 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1096-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 00:35:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:00:01 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	94215	100.000	27840	1506	1.227	--
总计		94215	100.000	27840			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1097-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 00:40:26 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:00:03 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.846	85381	100.000	23674	1277	1.229	--
总计		85381	100.000	23674			

图149 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1098-2 - G01RY4p-cbjz-1-0.005HCLjz-5mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 00:45:49 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:00:07 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.846	85691	100.000	23688	1275	1.229	--
总计		85691	100.000	23688			

图150 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1099-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 00:51:14 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:00:10 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图151 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转
溶剂




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1100-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 00:56:39 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:00:13 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.846	85344	100.000	23594	1272	1.230	--
总计		85344	100.000	23594			

图152 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1101-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 01:02:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:00:16 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.846	85339	100.000	23624	1278	1.229	--
总计		85339	100.000	23624			

图153 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1102-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 01:07:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:00:19 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.846	85195	100.000	23606	1279	1.230	--
总计		85195	100.000	23606			

图154 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1103-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 01:12:52 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:00:22 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.846	85284	100.000	23578	1274	1.230	--
总计		85284	100.000	23578			

图155 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1104-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 01:18:16 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:00:25 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.846	85288	100.000	23620	1278	1.228	--
总计		85288	100.000	23620			

图156 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1105-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 01:23:39 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:00:29 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	75633	100.000	22383	1509	1.227	--
总计		75633	100.000	22383			

图157 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1106-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 01:29:02 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:00:32 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	76567	100.000	22588	1504	1.229	--
总计		76567	100.000	22588			

图158 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1107-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 01:34:25 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:00:35 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	72605	100.000	21441	1504	1.227	--
总计		72605	100.000	21441			

图159 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1108-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 01:39:48 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:00:38 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.858	46535	100.000	13710	1502	1.234	--
总计		46535	100.000	13710			

图160 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1109-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 01:45:11 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:00:41 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	74708	100.000	22102	1506	1.226	--
总计		74708	100.000	22102			

图161 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1110-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 01:50:34 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:00:45 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	71122	100.000	21073	1502	1.229	--
总计		71122	100.000	21073			

图162 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1111-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 01:55:57 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:00:48 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	85114	100.000	25156	1505	1.227	--
总计		85114	100.000	25156			

图163 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1112-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 02:01:20 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:00:51 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	85561	100.000	25300	1506	1.229	--
总计		85561	100.000	25300			

图164 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1113-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 02:06:43 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:00:54 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	81523	100.000	24086	1505	1.228	--
总计		81523	100.000	24086			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1114-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 02:12:06 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:00:57 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	55477	100.000	16368	1503	1.229	--
总计		55477	100.000	16368			

图166 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1115-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 02:17:29 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:01:00 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	85149	100.000	25124	1503	1.229	--
总计		85149	100.000	25124			

图167 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1116-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 02:22:52 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:01:03 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	82385	100.000	24365	1504	1.228	--
总计		82385	100.000	24365			




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1117-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 02:28:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:01:06 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	88109	100.000	26080	1507	1.228	--
总计		88109	100.000	26080			

图169 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1118-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 02:33:37 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:01:09 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	89621	100.000	26505	1505	1.229	--
总计		89621	100.000	26505			

图170 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1119-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 02:39:01 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:01:12 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	84907	100.000	25065	1504	1.228	--
总计		84907	100.000	25065			

图171 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1120-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 02:44:24 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:01:15 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	60619	100.000	17878	1502	1.231	--
总计		60619	100.000	17878			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1121-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 02:49:47 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:01:18 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	89093	100.000	26363	1506	1.227	--
总计		89093	100.000	26363			

图173 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1122-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 02:55:10 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:01:21 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	85765	100.000	25342	1505	1.228	--
总计		85765	100.000	25342			

图174 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1123-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 03:00:34 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:01:24 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	88877	100.000	26285	1506	1.227	--
总计		88877	100.000	26285			

图175 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1124-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 03:05:57 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:01:27 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	91722	100.000	27180	1507	1.226	--
总计		91722	100.000	27180			

图176 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1125-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 03:11:21 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:01:30 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	86716	100.000	25657	1505	1.228	--
总计		86716	100.000	25657			

图177 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1126-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 03:16:44 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:01:34 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	64229	100.000	18986	1505	1.229	--
总计		64229	100.000	18986			

图178 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1127-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 03:22:08 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:01:37 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	90258	100.000	26719	1505	1.228	--
总计		90258	100.000	26719			

图179 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1128-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 03:27:31 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:01:40 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	87225	100.000	25832	1505	1.226	--
总计		87225	100.000	25832			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1129-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 03:32:55 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:01:43 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	89774	100.000	26570	1505	1.229	--
总计		89774	100.000	26570			

图181 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1130-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 03:38:19 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:01:46 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	93697	100.000	27758	1506	1.227	--
总计		93697	100.000	27758			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1131-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 03:43:43 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:01:49 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	88091	100.000	26048	1505	1.228	--
总计		88091	100.000	26048			

图183 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1132-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 03:49:06 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:01:52 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	70169	100.000	20744	1504	1.228	--
总计		70169	100.000	20744			

图184 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1133-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 03:54:30 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:01:55 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	91847	100.000	27275	1500	1.222	--
总计		91847	100.000	27275			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1134-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 03:59:53 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:01:58 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	88389	100.000	26175	1507	1.226	--
总计		88389	100.000	26175			

图186 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1135-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 04:05:16 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:02:01 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	90390	100.000	26780	1505	1.226	--
总计		90390	100.000	26780			

图187 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1136-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 04:10:40 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:02:04 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	93858	100.000	27856	1496	1.226	--
总计		93858	100.000	27856			

图188 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1137-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 04:16:05 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:02:07 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	88305	100.000	26233	1497	1.225	--
总计		88305	100.000	26233			

图189 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1138-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 04:21:28 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:02:10 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	76138	100.000	22581	1500	1.228	--
总计		76138	100.000	22581			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1139-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 04:26:52 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:02:13 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	92231	100.000	27414	1503	1.225	--
总计		92231	100.000	27414			

图191 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1140-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 04:32:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:02:16 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	88918	100.000	26383	1500	1.225	--
总计		88918	100.000	26383			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1141-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 04:37:39 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:02:19 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.857	90902	100.000	26980	1507	1.227	--
总计		90902	100.000	26980			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1142-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 04:43:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:02:22 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	94227	100.000	27941	1499	1.227	--
总计		94227	100.000	27941			

图194 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1143-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 04:48:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:02:25 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	88092	100.000	26193	1500	1.224	--
总计		88092	100.000	26193			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1144-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 04:53:51 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:02:28 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	88794	100.000	26370	1497	1.226	--
总计		88794	100.000	26370			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1145-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 04:59:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:02:31 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	92387	100.000	27409	1497	1.226	--
总计		92387	100.000	27409			




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱 温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1146-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 05:04:38 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:02:34 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	89043	100.000	26417	1497	1.225	--
总计		89043	100.000	26417			

图198 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-215

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1147-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 05:10:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:02:38 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.844	85319	100.000	23559	1279	1.231	--
总计		85319	100.000	23559			

图199 比索洛尔左氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-G01RY4批(5mg规格)-0.005HCL介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
柱温:30℃ 波长:226nm
数据文件名: RC\$SMF-215 - 0-134/11-1148-2 - G01RY4p-cbjz-2-0.005HCLjz-5mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-215 - SMF-215-rcqx-20240125-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-215 - 20240125-rcqx-Fx260.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/01/26 05:15:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/01/26 12:02:41 处理者: wangdan
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 226nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.844	85412	100.000	23524	1273	1.232	--
总计		85412	100.000	23524			