


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150\*4.6mm, 5  $\mu$ m) 流速: 2.0ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 278nm  
数据文件名 : RC\$Y09 - 0-112/17-1-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd  
方法文件名 : RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm  
批处理文件名 : RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb  
样品瓶号 : 1-9  
进样体积 : 10  $\mu$ L 版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/03/04 11:17:27 实验者: jiangjinwei  
处理时间 (V2) : 2024/03/05 08:38:26 处理者: jiangjinwei  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX265)

## &lt;色谱图&gt;

mAU



## &lt;峰表&gt;

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-2-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 11:22:23	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:38:30	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.507	3942634	100.000	576753	6400	1.046	--
总计		3942634	100.000	576753			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-3-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 11:27:17	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:38:33	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.505	3940480	100.000	575659	6400	1.046	--
总计		3940480	100.000	575659			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-4-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 11:32:12	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:38:37	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.504	3942952	100.000	576402	6397	1.046	--
总计		3942952	100.000	576402			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-5-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 11:37:07	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:38:40	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.501	3941754	100.000	578346	6396	1.046	--
总计		3941754	100.000	578346			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-6-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 11:42:00	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:38:44	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.500	3942346	100.000	578364	6405	1.047	--
总计		3942346	100.000	578364			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-7-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p1-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-1	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 11:46:53	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:38:47	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.499	3636338	100.000	537741	6472	1.035	--
总计		3636338	100.000	537741			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-8-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p2-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-10	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 11:51:48	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:38:50	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.495	3765451	100.000	556982	6464	1.037	--
总计		3765451	100.000	556982			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-9-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p3-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-19	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 11:56:41	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:38:53	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.492	4113865	100.000	608674	6443	1.043	--
总计		4113865	100.000	608674			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-10-2 - zzp-24022901P-rcqx-ph1.2jz-p4-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-28	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:01:33	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:38:56	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.493	3705730	100.000	549776	6470	1.037	--
总计		3705730	100.000	549776			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-11-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p5-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-37	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:06:26	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:00	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.490	3870041	100.000	573115	6472	1.041	--
总计		3870041	100.000	573115			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-12-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p6-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-46	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:11:20	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:03	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.489	3857671	100.000	570738	6462	1.040	--
总计		3857671	100.000	570738			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-13-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p1-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-2	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:16:13	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:06	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.487	4153506	100.000	614944	6446	1.046	--
总计		4153506	100.000	614944			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-14-2 - zzp-24022901P-rcqx-ph1.2jz-p2-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-11	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:21:05	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:10	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.486	4319557	100.000	640687	6443	1.049	--
总计		4319557	100.000	640687			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-15-2 - zzp-24022901P-rcqx-ph1.2jz-p3-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-20	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:25:57	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:13	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.486	4413266	100.000	654420	6440	1.051	--
总计		4413266	100.000	654420			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-16-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p4-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-29	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:30:49	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:16	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.486	4221368	100.000	626921	6452	1.048	--
总计		4221368	100.000	626921			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-17-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p5-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-38	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:35:41	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:19	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.486	4250117	100.000	631166	6447	1.049	--
总计		4250117	100.000	631166			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-18-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p6-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-47	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:40:34	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:22	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.484	4324531	100.000	642118	6449	1.049	--
总计		4324531	100.000	642118			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-19-2 - zzp-24022901P-rcqx-ph1.2jz-p1-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-3	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:45:27	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:25	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.485	4260644	100.000	632968	6448	1.048	--
总计		4260644	100.000	632968			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-20-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p2-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-12	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:50:20	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:29	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.484	4328870	100.000	642965	6447	1.049	--
总计		4328870	100.000	642965			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-21-2 - zzp-24022901P-rcqx-ph1.2jz-p3-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-21	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:55:13	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:32	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.483	4407930	100.000	654257	6444	1.051	--
总计		4407930	100.000	654257			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-22-2 - zzp-24022901P-rcqx-ph1.2jz-p4-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-30	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:00:06	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:35	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.483	4302220	100.000	638159	6442	1.048	--
总计		4302220	100.000	638159			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-23-2 - zzp-24022901P-rcqx-ph1.2jz-p5-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-39	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:04:59	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:38	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.482	4258835	100.000	631887	6456	1.049	--
总计		4258835	100.000	631887			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-24-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p6-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-48	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:09:52	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:41	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.480	4330503	100.000	642376	6449	1.051	--
总计		4330503	100.000	642376			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-25-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p1-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-4	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:14:45	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:44	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.479	4268454	100.000	633608	6443	1.049	--
总计		4268454	100.000	633608			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-26-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p2-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-13	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:19:37	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:48	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.477	4333623	100.000	645643	6458	1.051	--
总计		4333623	100.000	645643			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-27-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p3-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-22	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:24:29	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:51	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.476	4401650	100.000	655690	6452	1.052	--
总计		4401650	100.000	655690			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-28-2 - zzp-24022901P-rcqx-ph1.2jz-p4-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-31	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:29:21	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:55	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.475	4308903	100.000	642190	6465	1.051	--
总计		4308903	100.000	642190			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-29-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p5-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-40	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:34:15	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:58	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.474	4251002	100.000	633181	6465	1.050	--
总计		4251002	100.000	633181			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-30-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p6-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-49	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:39:07	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:01	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.472	4322399	100.000	643232	6459	1.053	--
总计		4322399	100.000	643232			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-31-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p1-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-5	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:44:00	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:05	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.474	4261879	100.000	634553	6466	1.051	--
总计		4261879	100.000	634553			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-32-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p2-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-14	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:48:54	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:08	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	4340969	100.000	645587	6463	1.053	--
总计		4340969	100.000	645587			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-33-2 - zzp-24022901P-rcqx-ph1.2jz-p3-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-23	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:53:47	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:11	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	4393787	100.000	653020	6451	1.052	--
总计		4393787	100.000	653020			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-34-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p4-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-32	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:58:40	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:14	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	4307129	100.000	638704	6451	1.048	--
总计		4307129	100.000	638704			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-35-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p5-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-41	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:03:33	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:17	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	4256622	100.000	632886	6461	1.050	--
总计		4256622	100.000	632886			

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-36-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p6-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-50	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:08:25	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:20	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	4322095	100.000	642006	6454	1.052	--
总计		4322095	100.000	642006			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-37-2 - zzp-24022901P-rcqx-ph1.2jz-dz2-1.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-27	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:13:19	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:23	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.474	3942373	100.000	581868	6412	1.052	--
总计		3942373	100.000	581868			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-38-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-27	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:18:13	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:26	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.474	3939812	100.000	582157	6411	1.053	--
总计		3939812	100.000	582157			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-39-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-rj.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-9	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:23:08	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:30	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-40-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-dz1-1.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:28:03	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:33	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.474	3934922	100.000	581138	6421	1.052	--
总计		3934922	100.000	581138			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-41-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-dz1-2.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:32:58	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:36	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	3933229	100.000	580116	6419	1.052	--
总计		3933229	100.000	580116			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-42-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-dz1-3.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:37:53	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:39	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	3934461	100.000	580111	6417	1.052	--
总计		3934461	100.000	580111			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-43-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-dz1-4.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:42:48	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:42	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	3933847	100.000	579742	6416	1.051	--
总计		3933847	100.000	579742			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-44-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-dz1-5.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:47:43	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:45	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	3931040	100.000	580232	6420	1.051	--
总计		3931040	100.000	580232			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-45-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p1-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-1	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:52:37	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:48	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.474	3685189	100.000	544450	6434	1.046	--
总计		3685189	100.000	544450			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-46-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p2-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-10	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:57:32	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:51	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.472	3729074	100.000	549740	6427	1.045	--
总计		3729074	100.000	549740			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-47-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p3-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-19	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:02:26	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:54	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	3344045	100.000	494151	6436	1.038	--
总计		3344045	100.000	494151			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-48-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p4-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-28	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:07:20	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:57	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.474	3390612	100.000	501641	6439	1.040	--
总计		3390612	100.000	501641			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-49-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p5-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-37	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:12:14	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:01	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.474	3270791	100.000	482969	6440	1.035	--
总计		3270791	100.000	482969			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-50-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p6-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-46	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:17:08	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:04	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	3550408	100.000	524074	6438	1.041	--
总计		3550408	100.000	524074			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-51-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p1-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-2	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:22:03	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:07	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.470	4141322	100.000	612258	6407	1.054	--
总计		4141322	100.000	612258			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-52-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p2-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-11	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:26:57	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:10	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.471	4129584	100.000	611811	6414	1.055	--
总计		4129584	100.000	611811			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-53-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p3-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-20	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:31:52	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:13	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.469	3892685	100.000	576372	6418	1.049	--
总计		3892685	100.000	576372			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-54-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p4-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-29	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:36:47	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:16	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.470	3866333	100.000	573750	6429	1.051	--
总计		3866333	100.000	573750			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-55-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p5-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-38	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:41:41	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:19	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.470	3653113	100.000	541175	6434	1.044	--
总计		3653113	100.000	541175			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-56-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p6-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-47	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:46:35	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:23	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.468	4177055	100.000	619549	6420	1.057	--
总计		4177055	100.000	619549			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-57-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p1-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-3	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:51:30	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:26	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.469	4182472	100.000	615218	6407	1.050	--
总计		4182472	100.000	615218			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-58-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p2-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-12	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:56:25	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:29	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.468	4215171	100.000	623853	6398	1.056	--
总计		4215171	100.000	623853			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-59-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p3-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-21	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 16:01:19	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:33	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.469	4086403	100.000	605932	6418	1.054	--
总计		4086403	100.000	605932			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-60-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p4-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-30	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 16:06:13	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:36	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.468	4130899	100.000	611908	6410	1.054	--
总计		4130899	100.000	611908			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-61-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p5-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-39	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 16:11:08	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:39	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.469	4118623	100.000	610893	6416	1.054	--
总计		4118623	100.000	610893			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-62-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p6-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-48	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 16:16:01	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:42	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.467	4234342	100.000	627805	6415	1.057	--
总计		4234342	100.000	627805			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-63-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p1-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-4	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 16:20:56	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:45	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.467	4206686	100.000	623438	6411	1.057	--
总计		4206686	100.000	623438			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-64-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p2-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-13	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 16:25:51	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:48	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.465	4225573	100.000	624071	6408	1.057	--
总计		4225573	100.000	624071			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-65-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p3-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-22	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 16:30:45	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:51	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.466	4140397	100.000	612379	6410	1.055	--
总计		4140397	100.000	612379			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-66-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p4-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-31	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 16:35:39	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:54	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.466	4207783	100.000	623031	6414	1.057	--
总计		4207783	100.000	623031			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-67-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p5-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-40	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 16:40:33	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:57	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.465	4120768	100.000	603862	6408	1.050	--
总计		4120768	100.000	603862			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-68-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p6-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-49	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 16:45:28	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:00	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.464	4233166	100.000	626555	6416	1.059	--
总计		4233166	100.000	626555			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-69-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p1-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-5	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 16:50:22	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:04	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.465	4194808	100.000	616985	6415	1.053	--
总计		4194808	100.000	616985			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-70-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p2-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-14	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 16:55:18	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:07	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.464	4255311	100.000	625333	6399	1.054	--
总计		4255311	100.000	625333			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-71-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p3-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-23	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 17:00:13	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:10	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.466	4165863	100.000	616294	6418	1.055	--
总计		4165863	100.000	616294			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-72-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p4-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-32	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 17:05:08	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:13	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.466	4214252	100.000	623464	6419	1.056	--
总计		4214252	100.000	623464			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-73-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p5-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-41	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 17:10:01	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:16	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.465	4132099	100.000	611745	6424	1.056	--
总计		4132099	100.000	611745			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-74-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p6-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-50	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 17:14:56	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:19	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.464	4260191	100.000	631093	6417	1.059	--
总计		4260191	100.000	631093			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-75-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-dz2-1.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-27	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 17:19:51	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:22	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.467	3922227	100.000	581578	6424	1.051	--
总计		3922227	100.000	581578			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-76-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-dz2-2.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-27	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 17:24:46	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:25	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.466	3926573	100.000	581643	6420	1.051	--
总计		3926573	100.000	581643			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-77-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-9	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 17:29:40	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:29	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-78-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 17:34:33	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:32	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.466	3933433	100.000	581992	6423	1.052	--
总计		3933433	100.000	581992			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-79-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 17:39:27	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:35	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.465	3933960	100.000	581442	6420	1.052	--
总计		3933960	100.000	581442			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-80-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 17:44:20	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:38	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.466	3931926	100.000	582120	6425	1.052	--
总计		3931926	100.000	582120			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-81-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 17:49:13	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:41	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.465	3931892	100.000	581605	6422	1.052	--
总计		3931892	100.000	581605			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-82-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 17:54:07	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:44	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.465	3933190	100.000	581519	6425	1.052	--
总计		3933190	100.000	581519			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-83-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p1-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-1	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 17:58:59	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:47	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.477	1105544	100.000	164828	6525	1.004	--
总计		1105544	100.000	164828			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-84-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p2-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-10	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 18:03:51	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:50	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.476	1044396	100.000	155665	6515	1.002	--
总计		1044396	100.000	155665			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-85-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p3-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-19	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 18:08:44	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:53	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.477	1027995	100.000	153216	6523	1.002	--
总计		1027995	100.000	153216			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-86-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p4-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-28	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 18:13:37	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:57	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.476	1043598	100.000	155533	6522	1.002	--
总计		1043598	100.000	155533			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-87-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p5-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-37	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 18:18:30	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:43:00	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.475	1129783	100.000	168372	6524	1.004	--
总计		1129783	100.000	168372			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-88-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p6-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-46	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 18:23:22	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:43:03	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.475	1093210	100.000	162797	6513	1.004	--
总计		1093210	100.000	162797			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-89-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p1-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-2	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 18:28:15	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:43:06	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.470	2271232	100.000	338993	6515	1.024	--
总计		2271232	100.000	338993			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-90-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p2-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-11	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 18:33:08	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:43:09	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.466	2158249	100.000	322219	6513	1.022	--
总计		2158249	100.000	322219			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-91-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p3-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-20	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 18:38:01	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:43:13	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.466	2223286	100.000	331838	6522	1.025	--
总计		2223286	100.000	331838			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-92-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p4-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-29	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 18:42:53	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:43:16	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.463	2192853	100.000	328052	6520	1.026	--
总计		2192853	100.000	328052			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-93-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p5-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-38	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 18:47:45	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:43:19	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.461	2233536	100.000	334656	6520	1.027	--
总计		2233536	100.000	334656			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-94-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p6-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-47	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 18:52:38	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:43:22	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.460	2178410	100.000	326595	6527	1.026	--
总计		2178410	100.000	326595			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-95-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p1-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-3	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 18:57:30	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:43:25	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.456	3092791	100.000	462780	6509	1.044	--
总计		3092791	100.000	462780			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-96-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p2-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-12	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 19:02:23	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:43:28	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.448	3037823	100.000	455983	6516	1.045	--
总计		3037823	100.000	455983			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-97-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p3-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-21	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 19:07:16	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:43:31	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.448	3063141	100.000	458897	6510	1.045	--
总计		3063141	100.000	458897			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-98-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p4-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-30	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 19:12:08	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:43:34	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.448	2987332	100.000	447742	6519	1.044	--
总计		2987332	100.000	447742			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-99-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p5-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-39	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 19:17:01	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:43:37	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.447	3004465	100.000	451664	6517	1.045	--
总计		3004465	100.000	451664			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-100-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p6-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-48	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 19:21:54	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:43:40	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.446	2934299	100.000	441735	6518	1.044	--
总计		2934299	100.000	441735			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-101-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p1-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-4	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 19:26:46	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:43:43	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.442	3616545	100.000	543483	6493	1.057	--
总计		3616545	100.000	543483			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-102-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p2-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-13	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 19:31:40	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:43:47	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.443	3581756	100.000	538540	6500	1.056	--
总计		3581756	100.000	538540			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-103-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p3-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-22	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 19:36:31	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:43:50	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.441	3591753	100.000	539339	6502	1.057	--
总计		3591753	100.000	539339			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-104-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p4-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-31	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 19:41:24	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:43:53	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.441	3515394	100.000	527698	6504	1.056	--
总计		3515394	100.000	527698			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-105-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p5-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-40	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 19:46:16	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:43:56	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.441	3552411	100.000	533017	6506	1.057	--
总计		3552411	100.000	533017			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-106-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p6-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-49	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 19:51:08	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:43:59	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.440	3454787	100.000	518657	6506	1.055	--
总计		3454787	100.000	518657			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-107-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p1-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-5	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 19:56:01	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:44:03	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.438	4066667	100.000	612172	6478	1.067	--
总计		4066667	100.000	612172			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-108-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p2-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-14	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 20:00:53	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:44:06	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.437	4093748	100.000	616740	6484	1.067	--
总计		4093748	100.000	616740			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-109-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p3-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-23	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 20:05:45	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:44:09	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.436	4064456	100.000	612502	6486	1.067	--
总计		4064456	100.000	612502			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-110-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p4-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-32	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 20:10:36	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:44:12	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.436	4016848	100.000	605491	6488	1.066	--
总计		4016848	100.000	605491			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-111-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p5-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-41	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 20:15:29	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:44:15	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.435	4041194	100.000	608963	6486	1.067	--
总计		4041194	100.000	608963			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-112-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p6-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-50	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 20:20:21	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:44:19	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.435	3974136	100.000	598603	6488	1.066	--
总计		3974136	100.000	598603			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-113-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p1-45min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-6	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 20:25:13	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:44:22	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.434	4183814	100.000	629266	6475	1.070	--
总计		4183814	100.000	629266			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-114-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p2-45min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-15	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 20:30:06	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:44:25	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.434	4267918	100.000	641766	6474	1.072	--
总计		4267918	100.000	641766			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-115-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p3-45min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-24	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 20:34:58	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:44:28	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.434	4234062	100.000	636874	6477	1.072	--
总计		4234062	100.000	636874			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-116-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p4-45min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-33	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 20:39:52	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:44:32	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	4173200	100.000	627058	6480	1.070	--
总计		4173200	100.000	627058			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-117-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p5-45min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-42	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 20:44:44	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:44:35	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	4190361	100.000	629790	6481	1.070	--
总计		4190361	100.000	629790			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-118-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p6-45min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-51	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 20:49:35	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:44:38	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	4150182	100.000	624689	6481	1.070	--
总计		4150182	100.000	624689			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-119-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p1-60min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-7	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 20:54:28	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:44:41	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	4188362	100.000	629799	6479	1.071	--
总计		4188362	100.000	629799			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-120-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p2-60min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-16	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 20:59:20	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:44:44	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	4267100	100.000	642477	6477	1.072	--
总计		4267100	100.000	642477			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-121-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p3-60min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-25	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 21:04:12	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:44:47	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.432	4255694	100.000	640666	6478	1.072	--
总计		4255694	100.000	640666			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-122-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p4-60min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-34	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 21:09:04	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:44:50	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	4173486	100.000	628802	6486	1.071	--
总计		4173486	100.000	628802			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-123-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p5-60min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-43	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 21:13:56	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:44:53	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	4207328	100.000	634398	6486	1.072	--
总计		4207328	100.000	634398			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-124-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p6-60min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-52	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 21:18:48	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:44:56	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	4122649	100.000	622324	6490	1.069	--
总计		4122649	100.000	622324			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-125-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p1-jx.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-8	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 21:23:41	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:45:00	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	4138563	100.000	624435	6487	1.070	--
总计		4138563	100.000	624435			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-126-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p2-jx.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-17	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 21:28:33	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:45:03	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.431	4262859	100.000	642657	6480	1.073	--
总计		4262859	100.000	642657			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-127-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p3-jx.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-26	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 21:33:25	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:45:06	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	4272430	100.000	644467	6472	1.073	--
总计		4272430	100.000	644467			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-128-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p4-jx.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-35	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 21:38:18	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:45:09	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	4208579	100.000	635341	6481	1.072	--
总计		4208579	100.000	635341			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-129-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p5-jx.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-44	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 21:43:10	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:45:12	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	4175987	100.000	630745	6484	1.071	--
总计		4175987	100.000	630745			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-130-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-p6-jx.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-53	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 21:48:02	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:45:15	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	4141582	100.000	625274	6480	1.070	--
总计		4141582	100.000	625274			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-131-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-27	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 21:52:54	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:45:18	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	3922011	100.000	590193	6454	1.064	--
总计		3922011	100.000	590193			




# Y09

## <样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-132-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 3-27	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 21:57:47	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:45:22	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

## <色谱图>

mAU



## <峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.429	3926797	100.000	590393	6453	1.064	--
总计		3926797	100.000	590393			