




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-1-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-9	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 11:17:27	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:38:26	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-2-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 11:22:23	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:38:30	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.507	3942634	100.000	576753	6400	1.046	--
总计		3942634	100.000	576753			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-3-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 11:27:17	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:38:33	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.505	3940480	100.000	575659	6400	1.046	--
总计		3940480	100.000	575659			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-4-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 11:32:12	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:38:37	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.504	3942952	100.000	576402	6397	1.046	--
总计		3942952	100.000	576402			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-5-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 11:37:07	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:38:40	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.501	3941754	100.000	578346	6396	1.046	--
总计		3941754	100.000	578346			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-6-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 11:42:00	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:38:44	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.500	3942346	100.000	578364	6405	1.047	--
总计		3942346	100.000	578364			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-7-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p1-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-1	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 11:46:53	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:38:47	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.499	3636338	100.000	537741	6472	1.035	--
总计		3636338	100.000	537741			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-8-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p2-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-10	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 11:51:48	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:38:50	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.495	3765451	100.000	556982	6464	1.037	--
总计		3765451	100.000	556982			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-9-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p3-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-19	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 11:56:41	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:38:53	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.492	4113865	100.000	608674	6443	1.043	--
总计		4113865	100.000	608674			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-10-2 - zzp-24022901P-rcqx-ph1.2jz-p4-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-28	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:01:33	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:38:56	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.493	3705730	100.000	549776	6470	1.037	--
总计		3705730	100.000	549776			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-11-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p5-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-37	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:06:26	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:00	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.490	3870041	100.000	573115	6472	1.041	--
总计		3870041	100.000	573115			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-12-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p6-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-46	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:11:20	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:03	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.489	3857671	100.000	570738	6462	1.040	--
总计		3857671	100.000	570738			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-13-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p1-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-2	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:16:13	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:06	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.487	4153506	100.000	614944	6446	1.046	--
总计		4153506	100.000	614944			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-14-2 - zzp-24022901P-rcqx-ph1.2jz-p2-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-11	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:21:05	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:10	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.486	4319557	100.000	640687	6443	1.049	--
总计		4319557	100.000	640687			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-15-2 - zzp-24022901P-rcqx-ph1.2jz-p3-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-20	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:25:57	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:13	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.486	4413266	100.000	654420	6440	1.051	--
总计		4413266	100.000	654420			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-16-2 - zzp-24022901P-rcqx-ph1.2jz-p4-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-29	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:30:49	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:16	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.486	4221368	100.000	626921	6452	1.048	--
总计		4221368	100.000	626921			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-17-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p5-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-38	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:35:41	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:19	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.486	4250117	100.000	631166	6447	1.049	--
总计		4250117	100.000	631166			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-18-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p6-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-47	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:40:34	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:22	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.484	4324531	100.000	642118	6449	1.049	--
总计		4324531	100.000	642118			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-19-2 - zzp-24022901P-rcqx-ph1.2jz-p1-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-3	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:45:27	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:25	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.485	4260644	100.000	632968	6448	1.048	--
总计		4260644	100.000	632968			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-20-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p2-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-12	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:50:20	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:29	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.484	4328870	100.000	642965	6447	1.049	--
总计		4328870	100.000	642965			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-21-2 - zzp-24022901P-rcqx-ph1.2jz-p3-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-21	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 12:55:13	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:32	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.483	4407930	100.000	654257	6444	1.051	--
总计		4407930	100.000	654257			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-22-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p4-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-30	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:00:06	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:35	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.483	4302220	100.000	638159	6442	1.048	--
总计		4302220	100.000	638159			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-23-2 - zzp-24022901P-rcqx-ph1.2jz-p5-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-39	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:04:59	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:38	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.482	4258835	100.000	631887	6456	1.049	--
总计		4258835	100.000	631887			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-24-2 - zzp-24022901P-rcqx-ph1.2jz-p6-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-48	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:09:52	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:41	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.480	4330503	100.000	642376	6449	1.051	--
总计		4330503	100.000	642376			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-25-2 - zzp-24022901P-rcqx-ph1.2jz-p1-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-4	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:14:45	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:44	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.479	4268454	100.000	633608	6443	1.049	--
总计		4268454	100.000	633608			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-26-2 - zzp-24022901P-rcqx-ph1.2jz-p2-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-13	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:19:37	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:48	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.477	4333623	100.000	645643	6458	1.051	--
总计		4333623	100.000	645643			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-27-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p3-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-22	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:24:29	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:51	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.476	4401650	100.000	655690	6452	1.052	--
总计		4401650	100.000	655690			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-28-2 - zzp-24022901P-rcqx-ph1.2jz-p4-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-31	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:29:21	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:55	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.475	4308903	100.000	642190	6465	1.051	--
总计		4308903	100.000	642190			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-29-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p5-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-40	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:34:15	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:39:58	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.474	4251002	100.000	633181	6465	1.050	--
总计		4251002	100.000	633181			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-30-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p6-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-49	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:39:07	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:01	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.472	4322399	100.000	643232	6459	1.053	--
总计		4322399	100.000	643232			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-31-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p1-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-5	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:44:00	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:05	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.474	4261879	100.000	634553	6466	1.051	--
总计		4261879	100.000	634553			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-32-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p2-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-14	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:48:54	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:08	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	4340969	100.000	645587	6463	1.053	--
总计		4340969	100.000	645587			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-33-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p3-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-23	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:53:47	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:11	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	4393787	100.000	653020	6451	1.052	--
总计		4393787	100.000	653020			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-34-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p4-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-32	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 13:58:40	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:14	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	4307129	100.000	638704	6451	1.048	--
总计		4307129	100.000	638704			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-35-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p5-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-41	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:03:33	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:17	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	4256622	100.000	632886	6461	1.050	--
总计		4256622	100.000	632886			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-36-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-p6-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-50	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:08:25	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:20	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	4322095	100.000	642006	6454	1.052	--
总计		4322095	100.000	642006			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-37-2 - zzp-24022901P-rcqx-ph1.2jz-dz2-1.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-27	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:13:19	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:23	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.474	3942373	100.000	581868	6412	1.052	--
总计		3942373	100.000	581868			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-38-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 1-27	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:18:13	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:26	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.474	3939812	100.000	582157	6411	1.053	--
总计		3939812	100.000	582157			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-39-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-rj.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-9	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:23:08	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:30	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-40-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-dz1-1.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:28:03	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:33	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.474	3934922	100.000	581138	6421	1.052	--
总计		3934922	100.000	581138			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-41-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-dz1-2.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:32:58	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:36	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	3933229	100.000	580116	6419	1.052	--
总计		3933229	100.000	580116			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-42-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-dz1-3.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:37:53	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:39	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	3934461	100.000	580111	6417	1.052	--
总计		3934461	100.000	580111			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-43-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-dz1-4.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:42:48	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:42	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	3933847	100.000	579742	6416	1.051	--
总计		3933847	100.000	579742			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-44-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-dz1-5.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-18	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:47:43	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:45	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	3931040	100.000	580232	6420	1.051	--
总计		3931040	100.000	580232			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-45-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p1-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-1	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:52:37	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:48	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.474	3685189	100.000	544450	6434	1.046	--
总计		3685189	100.000	544450			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-46-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p2-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-10	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 14:57:32	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:51	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.472	3729074	100.000	549740	6427	1.045	--
总计		3729074	100.000	549740			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-47-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p3-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-19	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:02:26	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:54	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	3344045	100.000	494151	6436	1.038	--
总计		3344045	100.000	494151			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-48-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p4-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-28	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:07:20	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:40:57	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.474	3390612	100.000	501641	6439	1.040	--
总计		3390612	100.000	501641			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-49-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p5-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-37	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:12:14	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:01	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.474	3270791	100.000	482969	6440	1.035	--
总计		3270791	100.000	482969			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-50-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p6-5min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-46	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:17:08	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:04	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.473	3550408	100.000	524074	6438	1.041	--
总计		3550408	100.000	524074			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-51-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p1-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-2	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:22:03	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:07	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.470	4141322	100.000	612258	6407	1.054	--
总计		4141322	100.000	612258			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-52-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p2-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-11	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:26:57	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:10	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.471	4129584	100.000	611811	6414	1.055	--
总计		4129584	100.000	611811			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-53-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p3-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-20	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:31:52	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:13	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.469	3892685	100.000	576372	6418	1.049	--
总计		3892685	100.000	576372			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-54-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p4-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-29	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:36:47	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:16	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.470	3866333	100.000	573750	6429	1.051	--
总计		3866333	100.000	573750			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-55-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p5-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-38	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:41:41	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:19	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.470	3653113	100.000	541175	6434	1.044	--
总计		3653113	100.000	541175			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-56-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p6-10min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-47	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:46:35	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:23	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.468	4177055	100.000	619549	6420	1.057	--
总计		4177055	100.000	619549			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-57-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p1-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-3	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:51:30	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:26	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.469	4182472	100.000	615218	6407	1.050	--
总计		4182472	100.000	615218			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-58-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p2-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-12	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 15:56:25	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:29	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.468	4215171	100.000	623853	6398	1.056	--
总计		4215171	100.000	623853			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-59-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p3-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-21	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 16:01:19	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:33	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.469	4086403	100.000	605932	6418	1.054	--
总计		4086403	100.000	605932			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-60-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p4-15min.lcd		
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm		
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb		
样品瓶号	: 2-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μL	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/03/04 16:06:13	处理者	: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)		

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.468	4130899	100.000	611908	6410	1.054	--
总计		4130899	100.000	611908			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-61-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p5-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-39	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 16:11:08	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:39	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.469	4118623	100.000	610893	6416	1.054	--
总计		4118623	100.000	610893			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-62-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p6-15min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-48	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 16:16:01	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:42	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.467	4234342	100.000	627805	6415	1.057	--
总计		4234342	100.000	627805			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-63-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p1-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-4	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 16:20:56	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:45	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.467	4206686	100.000	623438	6411	1.057	--
总计		4206686	100.000	623438			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-64-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p2-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-13	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 16:25:51	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:48	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.465	4225573	100.000	624071	6408	1.057	--
总计		4225573	100.000	624071			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-65-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p3-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-22	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 16:30:45	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:51	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.466	4140397	100.000	612379	6410	1.055	--
总计		4140397	100.000	612379			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-66-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p4-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-31	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 16:35:39	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:54	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.466	4207783	100.000	623031	6414	1.057	--
总计		4207783	100.000	623031			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-67-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p5-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-40	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 16:40:33	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:41:57	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.465	4120768	100.000	603862	6408	1.050	--
总计		4120768	100.000	603862			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-68-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p6-20min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-49	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 16:45:28	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:00	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.464	4233166	100.000	626555	6416	1.059	--
总计		4233166	100.000	626555			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-69-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p1-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-5	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 16:50:22	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:04	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.465	4194808	100.000	616985	6415	1.053	--
总计		4194808	100.000	616985			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-70-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p2-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-14	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 16:55:18	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:07	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.464	4255311	100.000	625333	6399	1.054	--
总计		4255311	100.000	625333			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-71-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p3-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-23	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 17:00:13	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:10	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.466	4165863	100.000	616294	6418	1.055	--
总计		4165863	100.000	616294			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-72-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p4-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-32	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 17:05:08	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:13	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.466	4214252	100.000	623464	6419	1.056	--
总计		4214252	100.000	623464			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-73-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p5-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-41	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 17:10:01	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:16	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.465	4132099	100.000	611745	6424	1.056	--
总计		4132099	100.000	611745			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-74-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-p6-30min.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-50	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 17:14:56	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:19	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.464	4260191	100.000	631093	6417	1.059	--
总计		4260191	100.000	631093			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-75-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-dz2-1.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-27	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 17:19:51	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:22	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.467	3922227	100.000	581578	6424	1.051	--
总计		3922227	100.000	581578			




Y09

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(150*4.6mm, 5 μm)	流速: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长: 278nm
数据文件名	: RC\$Y09 - 0-112/17-76-2 - zzp-24022901P-rcqx-pH4.0jz-dz2-2.lcd	
方法文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcm	
批处理文件名	: RC\$Y09 - Y09-20240304-FX265.lcb	
样品瓶号	: 2-27	
进样体积	: 10 μL	版本号: 6.115
进样时间	: 2024/03/04 17:24:46	实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2)	: 2024/03/05 08:42:25	处理者: jiangjinwei
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX265)	

<色谱图>

mAU



<峰表>

PDA Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.466	3926573	100.000	581643	6420	1.051	--
总计		3926573	100.000	581643			