



奥司他韦干糖浆项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	101096-202103	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.7	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	500
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	0.7612

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.82	307737	307789	307542	306521	307784	307475	0.18
2	9.83	308441	309310				308876	0.20

单位质量响应值		RSD%	判断
31311.10	31421.77	0.25	数据可信



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24031501批-pH1.0

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	309168	-	309168	134.647	134.45	2.70	134.65	134.45	2.70
	2	319857	-	319857	139.302			139.30		
	3	315326	-	315326	137.329			137.33		
	4	297177	-	297177	129.425			129.42		
	5	308827	-	308827	134.499			134.50		
	6	301989	-	301989	131.521			131.52		
10min	1	327011	-	327011	142.418	144.31	1.01	143.17	145.05	1.02
	2	336033	-	336033	146.347			147.12		
	3	334556	-	334556	145.704			146.47		
	4	329550	-	329550	143.524			144.24		
	5	330541	-	330541	143.955			144.70		
	6	330395	-	330395	143.892			144.62		
15min	1	329204	-	329204	143.373	145.01	1.51	144.91	146.56	1.49
	2	333792	-	333792	145.371			146.96		
	3	329946	-	329946	143.696			145.27		
	4	333700	-	333700	145.331			146.85		
	5	328933	-	328933	143.255			144.80		
	6	342144	-	342144	149.009			150.54		
20min	1	325727	-	325727	141.859	144.07	1.02	144.19	146.42	1.02
	2	334283	-	334283	145.585			147.98		
	3	331431	-	331431	144.343			146.71		
	4	330400	-	330400	143.894			146.22		
	5	328518	-	328518	143.074			145.42		
	6	334404	-	334404	145.638			148.00		
极限	1	312387	-	312387	136.049	139.78	1.69	139.17	142.94	1.67
	2	327364	-	327364	142.572			145.78		
	3	317137	-	317137	138.118			141.29		
	4	321172	-	321172	139.875			143.00		
	5	323122	-	323122	140.724			143.86		
	6	324562	-	324562	141.351			144.52		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



奥司他韦干糖浆项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	101096-202103	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.7	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	500
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	0.7612

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.82	308303	307163	307572	306711	306604	307271	0.23
2	9.83	309005	308020				308512	0.23
单位质量响应值				RSD%	判断			
31290.33				0.22	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24031502批-pH1.0

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	316527	-	316527	137.979	135.94	2.72	137.98	135.94	2.72
	2	306567	-	306567	133.637			133.64		
	3	326689	-	326689	142.409			142.41		
	4	308096	-	308096	134.304			134.30		
	5	309850	-	309850	135.069			135.07		
	6	303423	-	303423	132.267			132.27		
10min	1	323451	-	323451	140.997	141.24	2.34	141.76	142.00	2.34
	2	318575	-	318575	138.872			139.61		
	3	329568	-	329568	143.664			144.46		
	4	335808	-	335808	146.384			147.13		
	5	321638	-	321638	140.207			140.96		
	6	315004	-	315004	137.315			138.05		
15min	1	330037	-	330037	143.868	142.66	2.33	145.42	144.20	2.33
	2	318586	-	318586	138.877			140.39		
	3	330868	-	330868	144.231			145.82		
	4	338320	-	338320	147.479			149.04		
	5	326990	-	326990	142.540			144.07		
	6	318792	-	318792	138.966			140.46		
20min	1	327098	-	327098	142.587	138.96	2.75	144.94	141.29	2.73
	2	317085	-	317085	138.222			140.51		
	3	322384	-	322384	140.532			142.92		
	4	328134	-	328134	143.039			145.42		
	5	311929	-	311929	135.975			138.30		
	6	306034	-	306034	133.405			135.67		
极限	1	296112	-	296112	129.080	138.52	3.65	132.22	141.63	3.57
	2	325629	-	325629	141.947			145.00		
	3	322292	-	322292	140.492			143.66		
	4	328652	-	328652	143.265			146.44		
	5	317087	-	317087	138.223			141.30		
	6	316900	-	316900	138.142			141.15		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



奥司他韦干糖浆项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	101096-202103	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.7	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	500
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	0.7612

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.82	309017	308986	307901	306185	308823	308182	0.40
2	9.83	308942	309772				309357	0.19
单位质量响应值				RSD%	判断			
31383.10				0.20	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24031503批-pH1.0

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	309381	-	309381	134.481	133.05	5.95	134.48	133.05	5.95
	2	331049	-	331049	143.899			143.90		
	3	308458	-	308458	134.079			134.08		
	4	312192	-	312192	135.702			135.70		
	5	275402	-	275402	119.711			119.71		
	6	300096	-	300096	130.445			130.44		
10min	1	319804	-	319804	139.011	137.51	3.69	139.76	138.25	3.70
	2	336688	-	336688	146.350			147.15		
	3	313481	-	313481	136.263			137.01		
	4	315308	-	315308	137.057			137.81		
	5	301504	-	301504	131.057			131.72		
	6	311379	-	311379	135.349			136.07		
15min	1	313476	-	313476	136.261	135.97	3.82	137.78	137.48	3.83
	2	333635	-	333635	145.023			146.64		
	3	303266	-	303266	131.822			133.32		
	4	315060	-	315060	136.949			138.46		
	5	299354	-	299354	130.122			131.52		
	6	312079	-	312079	135.653			137.13		
20min	1	313589	-	313589	136.310	136.06	4.36	138.59	138.32	4.35
	2	339506	-	339506	147.575			149.99		
	3	302137	-	302137	131.332			133.57		
	4	310970	-	310970	135.171			137.45		
	5	304304	-	304304	132.274			134.39		
	6	307538	-	307538	133.679			135.91		
极限	1	313104	-	313104	136.099	135.01	2.95	139.13	138.02	2.97
	2	326553	-	326553	141.945			145.18		
	3	306171	-	306171	133.085			136.05		
	4	312814	-	312814	135.973			139.00		
	5	301766	-	301766	131.170			134.02		
	6	303184	-	303184	131.787			134.76		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



奥司他韦干糖浆项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	101096-202103	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.7	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	500
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	0.7612

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.82	309083	307759	309225	307102	307761	308186	0.31
2	9.83	307993	308517				308255	0.13
单位质量响应值				RSD%	判断			
31383.50				0.06	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24031501批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	301780	-	301780	131.410	135.81	2.80	131.41	135.81	2.80
	2	304173	-	304173	132.452			132.45		
	3	322946	-	322946	140.627			140.63		
	4	307194	-	307194	133.767			133.77		
	5	319539	-	319539	139.143			139.14		
	6	315701	-	315701	137.472			137.47		
10min	1	309345	-	309345	134.704	141.22	2.66	135.43	141.97	2.66
	2	330333	-	330333	143.843			144.58		
	3	328971	-	328971	143.250			144.03		
	4	321039	-	321039	139.796			140.54		
	5	323033	-	323033	140.664			141.44		
	6	333082	-	333082	145.040			145.80		
15min	1	315497	-	315497	137.383	140.80	1.78	138.86	142.34	1.78
	2	318995	-	318995	138.906			140.44		
	3	331955	-	331955	144.550			146.13		
	4	323338	-	323338	140.797			142.32		
	5	323802	-	323802	140.999			142.55		
	6	326458	-	326458	142.156			143.73		
20min	1	309539	-	309539	134.788	140.37	2.22	137.03	142.69	2.21
	2	320844	-	320844	139.711			142.02		
	3	329990	-	329990	143.694			146.07		
	4	325980	-	325980	141.948			144.25		
	5	326262	-	326262	142.071			144.41		
	6	321513	-	321513	140.003			142.36		
极限	1	307403	-	307403	133.858	140.38	2.62	136.85	143.48	2.60
	2	328281	-	328281	142.950			146.03		
	3	330107	-	330107	143.745			146.92		
	4	317997	-	317997	138.472			141.56		
	5	325990	-	325990	141.952			145.08		
	6	324463	-	324463	141.287			144.42		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



奥司他韦干糖浆项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	101096-202103	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.7	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	500
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	0.7612

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.82	309451	309058	308386	308156	308502	308711	0.18
2	9.83	309736	308968				309352	0.18
单位质量响应值				RSD%	判断			
31436.97				0.08	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24031502批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	273807	-	273807	118.916	125.58	4.11	118.92	125.58	4.11
	2	291109	-	291109	126.431			126.43		
	3	298262	-	298262	129.537			129.54		
	4	298904	-	298904	129.816			129.82		
	5	274774	-	274774	119.336			119.34		
	6	298058	-	298058	129.449			129.45		
10min	1	309070	-	309070	134.231	138.49	1.73	134.89	139.19	1.73
	2	315738	-	315738	137.127			137.83		
	3	322191	-	322191	139.930			140.65		
	4	321303	-	321303	139.544			140.27		
	5	323395	-	323395	140.453			141.12		
	6	321573	-	321573	139.661			140.38		
15min	1	314120	-	314120	136.424	138.80	2.04	137.83	140.27	2.02
	2	317661	-	317661	137.962			139.43		
	3	312744	-	312744	135.827			137.32		
	4	319828	-	319828	138.903			140.40		
	5	330677	-	330677	143.615			145.06		
	6	322512	-	322512	140.069			141.56		
20min	1	308058	-	308058	133.792	138.16	2.14	135.96	140.40	2.13
	2	316255	-	316255	137.352			139.58		
	3	317159	-	317159	137.744			140.00		
	4	323549	-	323549	140.519			142.79		
	5	327717	-	327717	142.330			144.57		
	6	316028	-	316028	137.253			139.53		
极限	1	308681	-	308681	134.062	136.74	1.60	136.97	139.75	1.60
	2	311443	-	311443	135.262			138.26		
	3	313758	-	313758	136.267			139.28		
	4	320121	-	320121	139.031			142.08		
	5	321644	-	321644	139.692			142.72		
	6	313448	-	313448	136.133			139.17		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-1-3 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 10:51:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/03/23 08:52:02 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-桨法-50转
溶剂



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-2-3 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 10:55:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/03/23 08:52:06 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.443	307737	100.000	39964	2607	1.434	--
总计		307737	100.000	39964			

图2 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-3-3 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 11:00:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/03/23 08:52:09 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.444	307789	100.000	39954	2609	1.437	--
总计		307789	100.000	39954			

图3 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-4-3 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 11:04:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/03/23 08:52:11 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.445	307542	100.000	39938	2606	1.435	--
总计		307542	100.000	39938			

图4 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-5-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 11:09:09 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:52:14 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.437	306521	100.000	39915	2601	1.440	--
总计		306521	100.000	39915			

图5 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-6-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/22 11:13:32

处理时间(V2) : 2024/03/23 08:52:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.440	307784	100.000	39951	2599	1.443	--
总计		307784	100.000	39951			

图6 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-7-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 11:17:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:52:20 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.448	309168	100.000	42345	2935	1.452	--
总计		309168	100.000	42345			

图7 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-8-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 11:22:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:52:23 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.449	319857	100.000	43717	2934	1.449	--
总计		319857	100.000	43717			

图8 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-9-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 11:26:39 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:52:25 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.449	315326	100.000	43191	2933	1.450	--
总计		315326	100.000	43191			

图9 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-10-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-5min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/22 11:31:00

处理时间(V2) : 2024/03/23 08:52:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min

波 长: 207nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.449	297177	100.000	40610	2936	1.455	--
总计		297177	100.000	40610			

图10 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-11-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 11:39:29 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:52:30 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.450	308827	100.000	42302	2945	1.451	--
总计		308827	100.000	42302			

图11 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-12-3 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 11:43:52 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/03/23 08:52:33 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.449	301989	100.000	41220	2932	1.455	--
总计		301989	100.000	41220			

图12 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-13-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 11:48:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:52:36 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.448	327011	100.000	44695	2938	1.450	--
总计		327011	100.000	44695			

图13 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-14-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 11:52:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:52:38 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.449	336033	100.000	45963	2939	1.458	--
总计		336033	100.000	45963			

图14 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-15-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 11:56:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:52:41 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.449	334556	100.000	45690	2929	1.456	--
总计		334556	100.000	45690			

图15 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-16-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 12:01:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:52:43 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.449	329550	100.000	45101	2932	1.454	--
总计		329550	100.000	45101			

图16 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-17-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 12:05:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:52:46 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.450	330541	100.000	45169	2931	1.456	--
总计		330541	100.000	45169			

图17 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-18-3 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 12:10:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V3) : 2024/03/23 08:52:48 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.450	330395	100.000	45031	2943	1.462	--
总计		330395	100.000	45031			

图18 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-19-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 12:14:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:52:51 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.449	329204	100.000	44913	2928	1.460	--
总计		329204	100.000	44913			

图19 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-20-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 12:18:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:52:54 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.450	333792	100.000	45582	2937	1.457	--
总计		333792	100.000	45582			

图20 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-21-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 12:23:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:52:56 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.451	329946	100.000	44954	2934	1.462	--
总计		329946	100.000	44954			

图21 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-22-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 12:27:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:52:59 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.451	333700	100.000	45423	2934	1.464	--
总计		333700	100.000	45423			

图22 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-23-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 12:31:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:53:01 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.451	328933	100.000	44709	2929	1.462	--
总计		328933	100.000	44709			

图23 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-24-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 12:36:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:53:04 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.451	342144	100.000	46458	2928	1.464	--
总计		342144	100.000	46458			

图24 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-25-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 12:40:39 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:53:06 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.450	325727	100.000	44430	2926	1.460	--
总计		325727	100.000	44430			

图25 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-26-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 12:45:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:53:09 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.450	334283	100.000	45624	2929	1.459	--
总计		334283	100.000	45624			

图26 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-27-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 12:49:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:53:11 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.451	331431	100.000	45068	2925	1.463	--
总计		331431	100.000	45068			

图27 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-28-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 12:53:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:53:14 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.451	330400	100.000	44936	2926	1.460	--
总计		330400	100.000	44936			

图28 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-29-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 12:58:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:53:17 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.451	328518	100.000	44618	2926	1.463	--
总计		328518	100.000	44618			

图29 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-30-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 13:02:29 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:53:19 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.451	334404	100.000	45375	2928	1.466	--
总计		334404	100.000	45375			

图30 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-31-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 13:06:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:53:22 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.450	312387	100.000	42509	2924	1.463	--
总计		312387	100.000	42509			

图31 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-32-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 13:11:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:53:25 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.450	327364	100.000	44598	2927	1.461	--
总计		327364	100.000	44598			

图32 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-33-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 13:15:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:53:27 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.450	317137	100.000	43203	2925	1.459	--
总计		317137	100.000	43203			

图33 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-34-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 13:19:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:53:30 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.451	321172	100.000	43704	2925	1.462	--
总计		321172	100.000	43704			

图34 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-35-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 13:31:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:53:32 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.452	323122	100.000	44550	2842	1.346	--
总计		323122	100.000	44550			

图35 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-36-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 13:35:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:53:35 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.456	324562	100.000	44749	2866	1.349	--
总计		324562	100.000	44749			

图36 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-37-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 13:40:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:53:38 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.455	308441	100.000	40384	2541	1.335	--
总计		308441	100.000	40384			

图37 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-38-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 13:44:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:53:40 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.455	309310	100.000	40474	2553	1.333	--
总计		309310	100.000	40474			

图38 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-39-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 13:48:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:53:43 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图39 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-桨法-50转
溶剂



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-40-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 13:53:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:53:45 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.454	308303	100.000	40386	2547	1.336	--
总计		308303	100.000	40386			

图40 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-41-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 13:57:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:53:48 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.454	307163	100.000	40397	2554	1.332	--
总计		307163	100.000	40397			

图41 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-42-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 14:02:05 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:53:50 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.455	307572	100.000	40398	2558	1.330	--
总计		307572	100.000	40398			

图42 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-43-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 14:06:29 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:53:53 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.456	306711	100.000	40323	2555	1.331	--
总计		306711	100.000	40323			

图43 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-44-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 14:10:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:53:55 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.451	306604	100.000	40101	2544	1.335	--
总计		306604	100.000	40101			

图44 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-45-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 14:15:16 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:53:58 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.461	316527	100.000	43742	2867	1.341	--
总计		316527	100.000	43742			

图45 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-46-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 14:19:39 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:54:01 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.461	306567	100.000	42228	2867	1.346	--
总计		306567	100.000	42228			

图46 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-47-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 14:24:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:54:03 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.462	326689	100.000	45087	2871	1.346	--
总计		326689	100.000	45087			

图47 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-48-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 14:28:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:54:06 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.464	308096	100.000	42558	2866	1.344	--
总计		308096	100.000	42558			

图48 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-49-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 14:32:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:54:08 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.452	309850	100.000	43110	2869	1.305	--
总计		309850	100.000	43110			

图49 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-50-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 14:37:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:54:11 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.457	303423	100.000	42475	2882	1.305	--
总计		303423	100.000	42475			

图50 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-51-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 14:41:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:54:14 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	323451	100.000	45252	2886	1.306	--
总计		323451	100.000	45252			

图51 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-52-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 14:46:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:54:17 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	318575	100.000	44477	2891	1.309	--
总计		318575	100.000	44477			

图52 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-53-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 14:50:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:54:20 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	329568	100.000	45981	2893	1.311	--
总计		329568	100.000	45981			

图53 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-54-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 14:54:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:54:22 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	335808	100.000	46947	2893	1.309	--
总计		335808	100.000	46947			

图54 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-55-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 14:59:09 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:54:25 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	321638	100.000	44934	2888	1.310	--
总计		321638	100.000	44934			

图55 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-56-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 15:03:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:54:28 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	315004	100.000	44040	2900	1.310	--
总计		315004	100.000	44040			

图56 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-57-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 15:07:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:54:30 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	330037	100.000	46100	2882	1.308	--
总计		330037	100.000	46100			

图57 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-58-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 15:12:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:54:33 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	318586	100.000	44432	2894	1.310	--
总计		318586	100.000	44432			

图58 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-59-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 15:16:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:54:35 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.453	330868	100.000	46278	2872	1.306	--
总计		330868	100.000	46278			

图59 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-60-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 15:21:05 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:54:38 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.459	338320	100.000	47096	2885	1.312	--
总计		338320	100.000	47096			

图60 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-61-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 15:25:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:54:40 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.459	326990	100.000	45550	2890	1.312	--
总计		326990	100.000	45550			

图61 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-62-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 15:29:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:54:43 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	318792	100.000	44503	2891	1.311	--
总计		318792	100.000	44503			

图62 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-63-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 15:34:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:54:45 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	327098	100.000	45619	2887	1.311	--
总计		327098	100.000	45619			

图63 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-64-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 15:38:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:54:48 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.459	317085	100.000	44153	2882	1.311	--
总计		317085	100.000	44153			

图64 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-65-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 15:43:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:54:51 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.454	322384	100.000	44911	2872	1.311	--
总计		322384	100.000	44911			

图65 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-66-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 15:47:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:54:54 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	328134	100.000	45857	2891	1.310	--
总计		328134	100.000	45857			

图66 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-67-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 15:51:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:54:56 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.459	311929	100.000	43549	2888	1.310	--
总计		311929	100.000	43549			

图67 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-68-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 15:56:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:54:59 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.459	306034	100.000	42562	2884	1.314	--
总计		306034	100.000	42562			

图68 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-69-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 16:00:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:55:02 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	296112	100.000	41271	2893	1.311	--
总计		296112	100.000	41271			

图69 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-70-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 16:05:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:55:04 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.459	325629	100.000	45331	2883	1.313	--
总计		325629	100.000	45331			

图70 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-71-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 16:09:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:55:07 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.453	322292	100.000	45049	2872	1.308	--
总计		322292	100.000	45049			

图71 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-72-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 16:13:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:55:10 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.459	328652	100.000	45792	2893	1.312	--
总计		328652	100.000	45792			

图72 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-73-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 16:18:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:55:12 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.459	317087	100.000	44161	2903	1.312	--
总计		317087	100.000	44161			

图73 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-74-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 16:22:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:55:15 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.459	316900	100.000	44223	2883	1.310	--
总计		316900	100.000	44223			

图74 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-75-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 16:27:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:55:17 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.453	309005	100.000	40967	2578	1.302	--
总计		309005	100.000	40967			

图75 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-76-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 16:31:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:55:20 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.453	308020	100.000	40916	2579	1.299	--
总计		308020	100.000	40916			

图76 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-77-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-9
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 16:35:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:55:22 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图77 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-桨法-50转
溶剂



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-78-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 16:40:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:55:25 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.453	309017	100.000	40916	2575	1.303	--
总计		309017	100.000	40916			

图78 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-79-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 16:44:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:55:27 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.454	308986	100.000	40899	2574	1.303	--
总计		308986	100.000	40899			

图79 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-80-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 16:48:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:55:30 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.454	307901	100.000	40899	2579	1.299	--
总计		307901	100.000	40899			

图80 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-81-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 16:53:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:55:32 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.454	306185	100.000	40795	2583	1.293	--
总计		306185	100.000	40795			

图81 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-82-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 16:57:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:55:35 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.454	308823	100.000	40810	2573	1.303	--
总计		308823	100.000	40810			

图82 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-83-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-1
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 17:02:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:55:37 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	309381	100.000	43016	2882	1.313	--
总计		309381	100.000	43016			

图83 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-84-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-10
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 17:06:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:55:40 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.459	331049	100.000	46203	2891	1.309	--
总计		331049	100.000	46203			

图84 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-85-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-19
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 17:10:46 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:55:43 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.459	308458	100.000	42755	2878	1.316	--
总计		308458	100.000	42755			

图85 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-86-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-28
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 17:15:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:55:46 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.459	312192	100.000	43340	2876	1.314	--
总计		312192	100.000	43340			

图86 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-87-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-37
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 17:19:30 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:55:49 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	275402	100.000	38302	2873	1.312	--
总计		275402	100.000	38302			

图87 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-88-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 17:23:52 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:55:51 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	300096	100.000	41761	2876	1.312	--
总计		300096	100.000	41761			

图88 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-89-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-2
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 17:28:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:55:54 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	319804	100.000	44467	2881	1.315	--
总计		319804	100.000	44467			

图89 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-90-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-11
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 17:32:35 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:55:57 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.459	336688	100.000	46987	2886	1.310	--
总计		336688	100.000	46987			

图90 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-91-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-20
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 17:36:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:55:59 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	313481	100.000	43542	2878	1.313	--
总计		313481	100.000	43542			

图91 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-92-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-29
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 17:41:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:56:02 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	315308	100.000	43918	2880	1.312	--
总计		315308	100.000	43918			

图92 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-93-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-38
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 17:45:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:56:05 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.457	301504	100.000	41989	2879	1.314	--
总计		301504	100.000	41989			

图93 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-94-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-47
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 17:50:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:56:08 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.457	311379	100.000	43399	2878	1.311	--
总计		311379	100.000	43399			

图94 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-95-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-3
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 17:54:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:56:10 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.455	313476	100.000	43782	2881	1.311	--
总计		313476	100.000	43782			

图95 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-96-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-12
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 17:58:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:56:13 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.456	333635	100.000	46404	2871	1.315	--
总计		333635	100.000	46404			

图96 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-97-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-21
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 18:03:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:56:16 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	303266	100.000	42390	2881	1.309	--
总计		303266	100.000	42390			

图97 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-98-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-30
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 18:07:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:56:19 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	315060	100.000	43881	2880	1.314	--
总计		315060	100.000	43881			

图98 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-99-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 18:11:49 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:56:21 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	299354	100.000	41731	2883	1.312	--
总计		299354	100.000	41731			

图99 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-100-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-48
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 18:16:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:56:24 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.457	312079	100.000	43457	2883	1.314	--
总计		312079	100.000	43457			

图100 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-101-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-4
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 18:20:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:56:26 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.457	313589	100.000	43664	2874	1.317	--
总计		313589	100.000	43664			

图101 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-102-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-13
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 18:24:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:56:29 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.457	339506	100.000	47188	2873	1.316	--
总计		339506	100.000	47188			

图102 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-103-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-22
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 18:29:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:56:31 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	302137	100.000	41986	2879	1.316	--
总计		302137	100.000	41986			

图103 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-104-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-31
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 18:33:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:56:34 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.457	310970	100.000	43403	2877	1.314	--
总计		310970	100.000	43403			

图104 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-105-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-40
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 18:37:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:56:37 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	304304	100.000	42332	2879	1.314	--
总计		304304	100.000	42332			



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-106-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 18:42:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:56:39 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.457	307538	100.000	42829	2874	1.312	--
总计		307538	100.000	42829			

图106 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-107-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 18:46:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:56:42 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.457	313104	100.000	43525	2874	1.316	--
总计		313104	100.000	43525			

图107 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-108-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-14
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 18:51:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:56:45 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.457	326553	100.000	45665	2883	1.311	--
总计		326553	100.000	45665			

图108 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-109-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-23
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 18:55:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:56:47 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	306171	100.000	42578	2875	1.316	--
总计		306171	100.000	42578			

图109 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-110-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-32
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 18:59:46 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:56:50 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	312814	100.000	43472	2876	1.315	--
总计		312814	100.000	43472			

图110 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-111-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-41
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 19:04:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:56:52 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.457	301766	100.000	42010	2875	1.313	--
总计		301766	100.000	42010			

图111 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-112-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-50
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 19:08:29 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:56:55 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.458	303184	100.000	42209	2878	1.314	--
总计		303184	100.000	42209			

图112 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-113-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 19:12:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:56:57 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.445	308942	100.000	41059	2562	1.299	--
总计		308942	100.000	41059			

图113 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-114-2 - zzp-24031503p-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 19:17:14 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:00 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.452	309772	100.000	41034	2575	1.304	--
总计		309772	100.000	41034			

图114 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031503批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-115-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-9

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/22 19:21:37

处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图115 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH1.0介质-桨法-50转
溶剂



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-116-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 19:26:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:05 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.454	309083	100.000	40922	2569	1.306	--
总计		309083	100.000	40922			

图116 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-117-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 19:30:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:07 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.454	307759	100.000	40910	2576	1.302	--
总计		307759	100.000	40910			

图117 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-118-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 19:34:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:10 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.454	309225	100.000	40944	2575	1.304	--
总计		309225	100.000	40944			

图118 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-119-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 19:39:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:13 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.454	307102	100.000	40839	2577	1.300	--
总计		307102	100.000	40839			

图119 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-120-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 19:43:35 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:16 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.454	307761	100.000	40903	2579	1.302	--
总计		307761	100.000	40903			

图120 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-121-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P1-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-1
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 19:47:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:18 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	301780	100.000	42920	3021	1.310	--
总计		301780	100.000	42920			

图121 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-122-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P2-5min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-10

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/22 19:52:20

处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	304173	100.000	43029	3016	1.314	--
总计		304173	100.000	43029			

图122 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-123-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P3-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-19
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 19:56:43 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:23 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	322946	100.000	45718	3015	1.315	--
总计		322946	100.000	45718			

图123 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-124-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P4-5min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-28

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/22 20:01:06

处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	307194	100.000	43540	3015	1.314	--
总计		307194	100.000	43540			

图124 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-125-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P5-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-37
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 20:05:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:28 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	319539	100.000	45195	3019	1.316	--
总计		319539	100.000	45195			

图125 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-126-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P6-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-46
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 20:09:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:31 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	315701	100.000	44665	3020	1.315	--
总计		315701	100.000	44665			

图126 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-127-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P1-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-2
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 20:14:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:33 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.471	309345	100.000	43699	3014	1.316	--
总计		309345	100.000	43699			

图127 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-128-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P2-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-11
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 20:18:35 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:36 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	330333	100.000	46665	3018	1.317	--
总计		330333	100.000	46665			

图128 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-129-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P3-10min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-20

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/22 20:22:58

处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	328971	100.000	46514	3018	1.316	--
总计		328971	100.000	46514			

图129 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-130-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P4-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-29
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 20:27:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:41 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	321039	100.000	45452	3020	1.314	--
总计		321039	100.000	45452			

图130 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-131-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P5-10min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-38

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/22 20:31:42

处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	323033	100.000	45820	3019	1.314	--
总计		323033	100.000	45820			

图131 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-132-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P6-10min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-47

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/22 20:36:04

处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	333082	100.000	47109	3016	1.317	--
总计		333082	100.000	47109			

图132 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-133-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P1-15min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-3

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/22 20:40:27

处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	315497	100.000	44591	3017	1.318	--
总计		315497	100.000	44591			

图133 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-134-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P2-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-12
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 20:44:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:51 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	318995	100.000	45204	3020	1.313	--
总计		318995	100.000	45204			

图134 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-135-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P3-15min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-21

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/22 20:49:12

处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	331955	100.000	47009	3018	1.315	--
总计		331955	100.000	47009			

图135 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-136-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P4-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 20:53:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:56 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	323338	100.000	45680	3016	1.317	--
总计		323338	100.000	45680			

图136 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-137-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P5-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 20:57:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:57:59 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	323802	100.000	45864	3020	1.315	--
总计		323802	100.000	45864			

图137 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-138-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P6-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-48
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 21:02:18 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:58:01 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	326458	100.000	46292	3020	1.315	--
总计		326458	100.000	46292			

图138 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-139-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P1-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-4
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 21:06:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:58:04 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	309539	100.000	43813	3015	1.315	--
总计		309539	100.000	43813			

图139 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-140-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P2-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-13
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 21:11:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:58:07 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	320844	100.000	45332	3021	1.318	--
总计		320844	100.000	45332			

图140 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-141-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P3-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-22
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 21:15:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:58:09 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	329990	100.000	46609	3020	1.318	--
总计		329990	100.000	46609			

图141 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-142-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P4-20min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-31

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/22 21:19:47

处理时间(V2) : 2024/03/23 08:58:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	325980	100.000	46006	3019	1.319	--
总计		325980	100.000	46006			

图142 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-143-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P5-20min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-40

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/22 21:24:10

处理时间(V2) : 2024/03/23 08:58:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	326262	100.000	46034	3019	1.316	--
总计		326262	100.000	46034			

图143 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-144-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P6-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-49
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 21:28:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:58:18 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	321513	100.000	45465	3020	1.318	--
总计		321513	100.000	45465			

图144 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-145-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P1-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-5
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 21:32:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:58:21 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	307403	100.000	43422	3020	1.316	--
总计		307403	100.000	43422			

图145 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-146-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P2-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-14
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 21:37:18 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:58:23 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	328281	100.000	46524	3020	1.314	--
总计		328281	100.000	46524			

图146 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-147-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P3-jxzs.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-23

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/22 21:41:41

处理时间(V2) : 2024/03/23 08:58:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	330107	100.000	46538	3019	1.318	--
总计		330107	100.000	46538			

图147 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-148-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P4-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-32
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 21:46:05 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:58:28 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	317997	100.000	44851	3017	1.317	--
总计		317997	100.000	44851			

图148 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-149-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P5-jxzs.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-41

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/22 21:50:28

处理时间(V2) : 2024/03/23 08:58:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	325990	100.000	46016	3022	1.318	--
总计		325990	100.000	46016			

图149 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-150-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P6-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-50
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 21:54:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:58:33 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	324463	100.000	45799	3018	1.317	--
总计		324463	100.000	45799			

图150 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-151-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb

样品瓶号 : 4-27

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/22 21:59:13

处理时间(V2) : 2024/03/23 08:58:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.457	307993	100.000	40813	2580	1.304	--
总计		307993	100.000	40813			

图151 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-152-2 - zzp-24031501p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 22:03:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:58:38 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.457	308517	100.000	40791	2580	1.307	--
总计		308517	100.000	40791			

图152 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031501批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-153-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 22:08:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:58:41 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图153 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-154-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 22:12:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:58:43 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.456	309451	100.000	40813	2563	1.306	--
总计		309451	100.000	40813			

图154 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-155-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 22:16:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:58:46 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.456	309058	100.000	40823	2567	1.308	--
总计		309058	100.000	40823			

图155 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-156-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/22 22:21:09

处理时间(V2) : 2024/03/23 08:58:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.457	308386	100.000	40845	2576	1.304	--
总计		308386	100.000	40845			

图156 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-157-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 22:25:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:58:51 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.456	308156	100.000	40816	2576	1.306	--
总计		308156	100.000	40816			

图157 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-158-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 22:29:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:58:53 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.456	308502	100.000	40832	2574	1.308	--
总计		308502	100.000	40832			

图158 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-159-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P1-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 22:34:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:58:56 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	273807	100.000	38872	3013	1.313	--
总计		273807	100.000	38872			

图159 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-160-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P2-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-10
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 22:38:39 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:58:59 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.470	291109	100.000	41159	3024	1.317	--
总计		291109	100.000	41159			

图160 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-161-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P3-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 22:43:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:59:01 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	298262	100.000	42070	3007	1.320	--
总计		298262	100.000	42070			

图161 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-162-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P4-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 22:47:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:59:04 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	298904	100.000	42242	3012	1.318	--
总计		298904	100.000	42242			

图162 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-163-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P5-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 22:51:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:59:06 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	274774	100.000	38921	3019	1.315	--
总计		274774	100.000	38921			

图163 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-164-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P6-5min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 22:56:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:59:09 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	298058	100.000	42281	3016	1.315	--
总计		298058	100.000	42281			

图164 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波 长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-165-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P1-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 23:00:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:59:11 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	309070	100.000	43816	3017	1.314	--
总计		309070	100.000	43816			

图165 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-166-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P2-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 23:04:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:59:14 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	315738	100.000	44646	3011	1.318	--
总计		315738	100.000	44646			

图166 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50 $^{\circ}$ C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-167-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P3-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 23:09:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:59:17 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.472	322191	100.000	45556	3009	1.319	--
总计		322191	100.000	45556			

图167 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-168-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P4-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 23:13:35 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:59:19 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.473	321303	100.000	45350	3014	1.320	--
总计		321303	100.000	45350			

图168 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-169-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P5-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 23:17:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:59:22 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.474	323395	100.000	45588	3014	1.320	--
总计		323395	100.000	45588			

图169 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-170-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P6-10min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 23:22:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:59:25 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.475	321573	100.000	45243	3016	1.319	--
总计		321573	100.000	45243			

图170 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-171-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P1-15min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/22 23:26:41

处理时间(V2) : 2024/03/23 08:59:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.476	314120	100.000	44182	3016	1.321	--
总计		314120	100.000	44182			

图171 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-172-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P2-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 23:31:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:59:30 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.476	317661	100.000	44767	3025	1.318	--
总计		317661	100.000	44767			

图172 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-173-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P3-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 23:35:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:59:32 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.477	312744	100.000	44051	3021	1.319	--
总计		312744	100.000	44051			

图173 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-174-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P4-15min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/22 23:39:48

处理时间(V2) : 2024/03/23 08:59:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.477	319828	100.000	45070	3022	1.320	--
总计		319828	100.000	45070			

图174 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-175-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P5-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 23:44:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:59:38 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.478	330677	100.000	46615	3023	1.319	--
总计		330677	100.000	46615			

图175 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-176-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P6-15min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 23:48:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:59:41 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.478	322512	100.000	45532	3025	1.318	--
总计		322512	100.000	45532			

图176 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-177-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P1-20min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/22 23:52:54

处理时间(V2) : 2024/03/23 08:59:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.478	308058	100.000	43486	3031	1.319	--
总计		308058	100.000	43486			

图177 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-178-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P2-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/22 23:57:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:59:46 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	316255	100.000	44713	3025	1.318	--
总计		316255	100.000	44713			

图178 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-179-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P3-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/23 00:01:39 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:59:48 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	317159	100.000	44785	3027	1.318	--
总计		317159	100.000	44785			

图179 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-180-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P4-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/23 00:06:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:59:51 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	323549	100.000	45705	3029	1.320	--
总计		323549	100.000	45705			

图180 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-181-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P5-20min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-40

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/23 00:10:24

处理时间(V2) : 2024/03/23 08:59:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.480	327717	100.000	46302	3029	1.319	--
总计		327717	100.000	46302			

图181 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-182-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P6-20min.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/23 00:14:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:59:56 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.480	316028	100.000	44539	3030	1.322	--
总计		316028	100.000	44539			

图182 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-183-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P1-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/23 00:19:09 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 08:59:58 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.481	308681	100.000	43614	3032	1.317	--
总计		308681	100.000	43614			

图183 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-184-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P2-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/23 00:23:30 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 09:00:01 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.481	311443	100.000	43948	3029	1.320	--
总计		311443	100.000	43948			

图184 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-185-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P3-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/23 00:27:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 09:00:04 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.481	313758	100.000	44317	3031	1.319	--
总计		313758	100.000	44317			

图185 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-186-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P4-jxzs.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/23 00:32:13

处理时间(V2) : 2024/03/23 09:00:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.481	320121	100.000	45123	3029	1.321	--
总计		320121	100.000	45123			

图186 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-187-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P5-jxzs.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/23 00:36:35

处理时间(V2) : 2024/03/23 09:00:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.481	321644	100.000	45403	3030	1.320	--
总计		321644	100.000	45403			

图187 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-188-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-P6-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/23 00:40:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 09:00:13 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.481	313448	100.000	44274	3032	1.319	--
总计		313448	100.000	44274			

图188 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU LabSolutions QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 50℃

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-189-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2024/03/23 00:45:19

处理时间(V2) : 2024/03/23 09:00:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 207nm

版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.465	309736	100.000	40883	2587	1.309	--
总计		309736	100.000	40883			

图189 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 50°C 波长: 207nm
数据文件名 : RC\$QTL-373 - 31-5/31-190-2 - zzp-24031502p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-20240322-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20240322-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/03/23 00:49:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/03/23 09:00:19 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.465	308968	100.000	40902	2597	1.309	--
总计		308968	100.000	40902			

图190 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24031502批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2