



培哚普利氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	DJ468-220103	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	94.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.95	20708	20585	20665	20536	20674	20634	0.35
2	9.99	20644	20709				20676	0.23

单位质量响应值		RSD%	判断
2073.77	2069.67	0.14	数据可信



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022081601批-培哌普利-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	22311	-	22311	91.884	91.80	2.17	91.88	91.80	2.17
	2	23098	-	23098	95.125			95.13		
	3	22100	-	22100	91.015			91.01		
	4	21607	-	21607	88.985			88.98		
	5	22349	-	22349	92.040			92.04		
	6	22275	-	22275	91.736			91.74		
10min	1	23038	-	23038	94.878	95.58	1.67	95.90	96.60	1.67
	2	23638	-	23638	97.349			98.41		
	3	23642	-	23642	97.365			98.38		
	4	22674	-	22674	93.379			94.37		
	5	23280	-	23280	95.875			96.90		
	6	22983	-	22983	94.651			95.67		
15min	1	22809	-	22809	93.935	95.15	1.17	96.01	97.24	1.18
	2	23519	-	23519	96.859			99.00		
	3	23225	-	23225	95.648			97.74		
	4	22812	-	22812	93.947			95.97		
	5	23092	-	23092	95.100			97.19		
	6	23174	-	23174	95.438			97.51		
20min	1	22757	-	22757	93.721	94.15	1.72	96.84	97.28	1.70
	2	23545	-	23545	96.966			100.18		
	3	22921	-	22921	94.396			97.55		
	4	22624	-	22624	93.173			96.24		
	5	22388	-	22388	92.201			95.35		
	6	22926	-	22926	94.417			97.55		
30min	1	22416	-	22416	92.316	93.53	1.56	96.48	97.72	1.55
	2	23321	-	23321	96.043			100.34		
	3	22908	-	22908	94.343			98.55		
	4	22464	-	22464	92.514			96.62		
	5	22454	-	22454	92.473			96.64		
	6	22703	-	22703	93.498			97.68		
45min	1	22222	-	22222	91.517	92.97	1.76	96.70	98.19	1.74
	2	23194	-	23194	95.520			100.88		
	3	22611	-	22611	93.119			98.37		
	4	22079	-	22079	90.928			96.06		
	5	22752	-	22752	93.700			98.90		
	6	22589	-	22589	93.029			98.25		
极限	1	21982	-	21982	90.529	91.67	1.12	96.73	97.92	1.11
	2	22663	-	22663	93.334			99.75		
	3	22141	-	22141	91.184			97.47		
	4	22418	-	22418	92.325			98.47		
	5	22083	-	22083	90.945			97.18		
	6	22265	-	22265	91.694			97.95		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



培哚普利氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	2	系数	0.721

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.93	163934	163640	163337	163776	163407	163619	0.16
2	14.00	163202	163263				163232	0.03

单位质量响应值		RSD%	判断
11745.80	11659.43	0.53	数据可信



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022081601批-氨氯地平-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	58727	-	58727	32.532	35.23	6.77	32.53	35.23	6.78
	2	69011	-	69011	38.228			38.23		
	3	58529	-	58529	32.422			32.42		
	4	63149	-	63149	34.981			34.98		
	5	65326	-	65326	36.187			36.19		
	6	66857	-	66857	37.035			37.04		
10min	1	106637	-	106637	59.071	59.40	1.38	59.43	59.79	1.37
	2	108832	-	108832	60.287			60.71		
	3	109058	-	109058	60.412			60.77		
	4	105811	-	105811	58.613			59.00		
	5	105621	-	105621	58.508			58.91		
	6	107391	-	107391	59.489			59.90		
15min	1	127808	-	127808	70.799	70.65	1.63	71.82	71.70	1.62
	2	130554	-	130554	72.320			73.41		
	3	127908	-	127908	70.854			71.89		
	4	126639	-	126639	70.151			71.19		
	5	124215	-	124215	68.808			69.86		
	6	128123	-	128123	70.973			72.05		
20min	1	136450	-	136450	75.586	75.72	2.32	77.39	77.55	2.30
	2	141085	-	141085	78.153			80.05		
	3	138373	-	138373	76.651			78.47		
	4	133084	-	133084	73.721			75.54		
	5	133087	-	133087	73.723			75.54		
	6	138026	-	138026	76.459			78.32		
30min	1	144887	-	144887	80.259	81.07	2.05	82.90	83.74	2.04
	2	150407	-	150407	83.317			86.08		
	3	148447	-	148447	82.231			84.90		
	4	142035	-	142035	78.680			81.32		
	5	144870	-	144870	80.250			82.89		
	6	147408	-	147408	81.656			84.37		
45min	1	150771	-	150771	83.519	84.20	2.16	87.05	87.78	2.15
	2	156720	-	156720	86.814			90.51		
	3	152491	-	152491	84.472			88.06		
	4	146765	-	146765	81.300			84.81		
	5	151785	-	151785	84.080			87.61		
	6	153482	-	153482	85.021			88.64		
极限	1	156165	-	156165	86.507	87.84	1.58	90.97	92.36	1.56
	2	162592	-	162592	90.067			94.72		
	3	156982	-	156982	86.959			91.48		
	4	160125	-	160125	88.700			93.12		
	5	156578	-	156578	86.736			91.20		
	6	159004	-	159004	88.079			92.64		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



培哚普利氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	DJ468-220103	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	94.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.95	20655	20571	20690	20734	20658	20662	0.29
2	9.99	20741	20593				20667	0.51
单位质量响应值				RSD%	判断			
2076.58				0.27	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022081601批-培哌普利-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	20377	-	20377	83.881	88.36	2.82	83.88	88.36	2.82
	2	21392	-	21392	88.059			88.06		
	3	21730	-	21730	89.450			89.45		
	4	21355	-	21355	87.906			87.91		
	5	21802	-	21802	89.746			89.75		
	6	22132	-	22132	91.105			91.10		
10min	1	22365	-	22365	92.064	94.12	1.58	93.00	95.10	1.58
	2	22460	-	22460	92.455			93.43		
	3	23219	-	23219	95.579			96.57		
	4	23006	-	23006	94.703			95.68		
	5	23041	-	23041	94.847			95.84		
	6	23101	-	23101	95.094			96.11		
15min	1	22380	-	22380	92.126	93.15	1.44	94.08	95.18	1.44
	2	22186	-	22186	91.327			93.33		
	3	22956	-	22956	94.497			96.55		
	4	22491	-	22491	92.583			94.61		
	5	22802	-	22802	93.863			95.91		
	6	22963	-	22963	94.526			96.59		
20min	1	22398	-	22398	92.200	92.95	1.07	95.18	96.01	1.08
	2	22294	-	22294	91.772			94.79		
	3	22822	-	22822	93.945			97.05		
	4	22480	-	22480	92.537			95.60		
	5	22909	-	22909	94.303			97.40		
	6	22574	-	22574	92.924			96.04		
30min	1	22478	-	22478	92.529	92.14	1.87	96.53	96.23	1.82
	2	21934	-	21934	90.290			94.33		
	3	22914	-	22914	94.324			98.47		
	4	22047	-	22047	90.755			94.84		
	5	22107	-	22107	91.002			95.14		
	6	22817	-	22817	93.925			98.08		
45min	1	22049	-	22049	90.763	91.51	0.82	95.79	96.63	0.82
	2	22024	-	22024	90.660			95.70		
	3	22409	-	22409	92.245			97.44		
	4	22461	-	22461	92.459			97.55		
	5	22187	-	22187	91.331			96.48		
	6	22259	-	22259	91.628			96.82		
极限	1	21746	-	21746	89.516	90.85	1.03	95.56	96.99	1.02
	2	21956	-	21956	90.380			96.43		
	3	22285	-	22285	91.735			97.96		
	4	22111	-	22111	91.018			97.14		
	5	22356	-	22356	92.027			98.19		
	6	21968	-	21968	90.430			96.64		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



培哚普利氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	2	系数	0.721

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.93	163377	163517	163688	163245	163096	163385	0.15
2	14.00	163323	163470				163396	0.07
单位质量响应值			RSD%	判断				
11729.00			0.35	数据可信				



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022081601批-氨氯地平-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	55287	-	55287	30.632	36.64	8.78	30.63	36.64	8.79
	2	66170	-	66170	36.662			36.66		
	3	68709	-	68709	38.069			38.07		
	4	67404	-	67404	37.346			37.35		
	5	66529	-	66529	36.861			36.86		
	6	72645	-	72645	40.250			40.25		
10min	1	101603	-	101603	56.294	59.31	2.88	56.63	59.72	2.92
	2	105975	-	105975	58.717			59.12		
	3	109269	-	109269	60.542			60.96		
	4	109187	-	109187	60.496			60.91		
	5	106606	-	106606	59.066			59.48		
	6	109655	-	109655	60.756			61.20		
15min	1	125648	-	125648	69.617	69.47	1.63	70.58	70.53	1.63
	2	123576	-	123576	68.469			69.53		
	3	126269	-	126269	69.961			71.06		
	4	123566	-	123566	68.463			69.55		
	5	124308	-	124308	68.874			69.94		
	6	128881	-	128881	71.408			72.53		
20min	1	136267	-	136267	75.500	74.93	1.03	77.24	76.77	1.00
	2	132694	-	132694	73.521			75.34		
	3	135675	-	135675	75.172			77.05		
	4	134694	-	134694	74.629			76.48		
	5	136360	-	136360	75.552			77.38		
	6	135745	-	135745	75.211			77.13		
30min	1	148601	-	148601	82.334	80.27	1.93	84.91	82.94	1.86
	2	142909	-	142909	79.180			81.82		
	3	146779	-	146779	81.324			84.03		
	4	141566	-	141566	78.436			81.11		
	5	142872	-	142872	79.160			81.83		
	6	146520	-	146520	81.181			83.93		
45min	1	145105	-	145105	80.397	82.50	1.61	83.89	86.06	1.60
	2	147553	-	147553	81.753			85.27		
	3	150243	-	150243	83.244			86.86		
	4	150456	-	150456	83.362			86.91		
	5	148403	-	148403	82.224			85.77		
	6	151680	-	151680	84.040			87.69		
极限	1	159861	-	159861	88.573	88.31	1.21	92.96	92.79	1.14
	2	158358	-	158358	87.740			92.17		
	3	159838	-	159838	88.560			93.10		
	4	157370	-	157370	87.193			91.67		
	5	162764	-	162764	90.181			94.64		
	6	158141	-	158141	87.620			92.21		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



培哚普利氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	DJ468-220103	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	94.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.95	21002	20762	20879	20784	20751	20836	0.51
2	9.99	21002	21025				21014	0.08
单位质量响应值				RSD%	判断			
2094.07				0.32	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022081901批-培哌普利-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	20825	-	20825	84.658	72.13	14.90	84.66	72.13	14.90
	2	19542	-	19542	79.443			79.44		
	3	19059	-	19059	77.479			77.48		
	4	17943	-	17943	72.942			72.94		
	5	14560	-	14560	59.190			59.19		
	6	14533	-	14533	59.080			59.08		
10min	1	22617	-	22617	91.943	89.73	3.40	92.88	90.54	3.47
	2	22044	-	22044	89.614			90.50		
	3	22188	-	22188	90.199			91.06		
	4	23112	-	23112	93.956			94.77		
	5	21110	-	21110	85.817			86.47		
	6	21371	-	21371	86.878			87.53		
15min	1	22904	-	22904	93.110	91.04	2.20	95.07	92.84	2.29
	2	22549	-	22549	91.667			93.55		
	3	22182	-	22182	90.175			92.04		
	4	22951	-	22951	93.301			95.16		
	5	21722	-	21722	88.305			89.92		
	6	22058	-	22058	89.671			91.29		
20min	1	22474	-	22474	91.362	90.69	2.11	94.36	93.50	2.19
	2	22580	-	22580	91.793			94.69		
	3	22145	-	22145	90.024			92.89		
	4	22979	-	22979	93.415			96.31		
	5	22036	-	22036	89.581			92.17		
	6	21634	-	21634	87.947			90.57		
30min	1	22362	-	22362	90.907	90.14	2.20	94.92	93.96	2.27
	2	22649	-	22649	92.073			95.99		
	3	21910	-	21910	89.069			92.93		
	4	22771	-	22771	92.569			96.50		
	5	21681	-	21681	88.138			91.73		
	6	21668	-	21668	88.085			91.68		
45min	1	21704	-	21704	88.232	89.28	1.83	93.25	94.10	1.87
	2	22354	-	22354	90.874			95.81		
	3	21920	-	21920	89.110			93.96		
	4	22539	-	22539	91.626			96.58		
	5	21733	-	21733	88.350			92.92		
	6	21524	-	21524	87.500			92.07		
极限	1	21668	-	21668	88.085	89.62	2.09	94.09	95.43	2.06
	2	22394	-	22394	91.037			96.99		
	3	21676	-	21676	88.118			93.96		
	4	22807	-	22807	92.716			98.69		
	5	21931	-	21931	89.154			94.70		
	6	21791	-	21791	88.585			94.13		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



培哚普利氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	2	系数	0.721

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.93	81489	81959	81482	81730	81725	81677	0.25
2	14.00	81302	81695				81498	0.35
单位质量响应值			RSD%		判断			
5863.39			5821.29		0.51 数据可信			



操作者:
日期: 2026-07-30

复核者:
未审阅版本



供试品溶液-2022081901批-氨氯地平-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	26297	-	26297	29.179	24.84	13.73	29.18	24.84	13.74
	2	24312	-	24312	26.976			26.98		
	3	24085	-	24085	26.724			26.72		
	4	21851	-	21851	24.246			24.25		
	5	19298	-	19298	21.413			21.41		
	6	18451	-	18451	20.473			20.47		
10min	1	50480	-	50480	56.012	52.75	5.42	56.34	53.02	5.47
	2	48318	-	48318	53.613			53.91		
	3	48552	-	48552	53.873			54.17		
	4	49124	-	49124	54.507			54.78		
	5	43905	-	43905	48.717			48.95		
	6	44859	-	44859	49.775			50.00		
15min	1	62497	-	62497	69.346	67.22	2.80	70.29	68.08	2.85
	2	60492	-	60492	67.121			68.02		
	3	60783	-	60783	67.444			68.34		
	4	62175	-	62175	68.989			69.86		
	5	57918	-	57918	64.265			65.04		
	6	59608	-	59608	66.140			66.92		
20min	1	67022	-	67022	74.367	73.37	2.82	76.08	74.98	2.85
	2	66174	-	66174	73.426			75.07		
	3	66295	-	66295	73.560			75.21		
	4	68966	-	68966	76.524			78.17		
	5	63625	-	63625	70.598			72.09		
	6	64645	-	64645	71.729			73.24		
30min	1	72389	-	72389	80.322	78.62	2.72	82.87	81.04	2.76
	2	70246	-	70246	77.944			80.40		
	3	72297	-	72297	80.220			82.68		
	4	72818	-	72818	80.798			83.29		
	5	68208	-	68208	75.683			77.96		
	6	69175	-	69175	76.756			79.07		
45min	1	72953	-	72953	80.948	81.91	2.47	84.38	85.21	2.47
	2	73624	-	73624	81.692			85.02		
	3	76042	-	76042	84.375			87.73		
	4	75895	-	75895	84.212			87.60		
	5	71397	-	71397	79.221			82.34		
	6	73016	-	73016	81.018			84.18		
极限	1	78255	-	78255	86.831	89.26	2.49	91.17	93.47	2.42
	2	81333	-	81333	90.246			94.48		
	3	80057	-	80057	88.830			93.12		
	4	83958	-	83958	93.159			97.48		
	5	79856	-	79856	88.607			92.61		
	6	79226	-	79226	87.908			91.97		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



培哚普利氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	DJ468-220103	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	94.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.95	20875	20815	20864	20894	20947	20879	0.23
2	9.99	20873	20920				20896	0.16
单位质量响应值				RSD%	判断			
2098.39				0.23	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022081901批-培哌普利-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	20361	-	20361	82.920	83.35	6.67	82.92	83.35	6.67
	2	17815	-	17815	72.551			72.55		
	3	21525	-	21525	87.660			87.66		
	4	20803	-	20803	84.720			84.72		
	5	21379	-	21379	87.066			87.07		
	6	20910	-	20910	85.156			85.16		
10min	1	22392	-	22392	91.191	94.77	3.15	92.11	95.69	3.17
	2	22464	-	22464	91.484			92.29		
	3	24015	-	24015	97.801			98.77		
	4	23630	-	23630	96.233			97.17		
	5	24011	-	24011	97.784			98.75		
	6	23113	-	23113	94.127			95.07		
15min	1	22577	-	22577	91.944	94.59	3.15	93.88	96.57	3.16
	2	22438	-	22438	91.378			93.20		
	3	24014	-	24014	97.797			99.86		
	4	23829	-	23829	97.043			99.05		
	5	23812	-	23812	96.974			99.03		
	6	22686	-	22686	92.388			94.38		
20min	1	22037	-	22037	89.745	93.19	3.24	92.70	96.22	3.25
	2	22270	-	22270	90.694			93.53		
	3	23797	-	23797	96.913			100.06		
	4	23234	-	23234	94.620			97.71		
	5	23560	-	23560	95.948			99.08		
	6	22400	-	22400	91.224			94.24		
30min	1	22010	-	22010	89.635	92.57	3.07	93.59	96.63	3.09
	2	21910	-	21910	89.228			93.07		
	3	23545	-	23545	95.887			100.11		
	4	23184	-	23184	94.416			98.56		
	5	23270	-	23270	94.767			98.96		
	6	22462	-	22462	91.476			95.51		
45min	1	21919	-	21919	89.265	91.41	2.32	94.21	96.50	2.38
	2	21798	-	21798	88.772			93.61		
	3	22919	-	22919	93.337			98.63		
	4	22988	-	22988	93.618			98.81		
	5	22772	-	22772	92.739			97.99		
	6	22275	-	22275	90.715			95.76		
极限	1	21653	-	21653	88.181	90.55	2.36	94.12	96.66	2.42
	2	21673	-	21673	88.263			94.09		
	3	22743	-	22743	92.620			98.95		
	4	22546	-	22546	91.818			98.05		
	5	22793	-	22793	92.824			99.10		
	6	22002	-	22002	89.603			95.66		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



培哚普利氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	2	系数	0.721

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.93	81316	81574	81409	81555	81568	81484	0.15
2	14.00	81812	81561				81686	0.22
单位质量响应值				RSD%	判断			
5849.53				0.18	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022081901批-氨氯地平-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	25240	-	25240	28.007	29.11	11.06	28.01	29.11	11.06
	2	21394	-	21394	23.739			23.74		
	3	29659	-	29659	32.910			32.91		
	4	26373	-	26373	29.264			29.26		
	5	28660	-	28660	31.802			31.80		
	6	26085	-	26085	28.944			28.94		
10min	1	50623	-	50623	56.172	56.32	3.84	56.48	56.65	3.87
	2	47798	-	47798	53.037			53.30		
	3	53638	-	53638	59.518			59.88		
	4	51371	-	51371	57.002			57.33		
	5	51404	-	51404	57.039			57.39		
	6	49724	-	49724	55.175			55.50		
15min	1	62041	-	62041	68.842	69.57	3.44	69.78	70.52	3.47
	2	60111	-	60111	66.700			67.55		
	3	64628	-	64628	71.712			72.74		
	4	64346	-	64346	71.399			72.36		
	5	64719	-	64719	71.813			72.80		
	6	60330	-	60330	66.943			67.88		
20min	1	67493	-	67493	74.891	75.41	3.11	76.59	77.14	3.13
	2	65917	-	65917	73.143			74.74		
	3	68950	-	68950	76.508			78.33		
	4	69372	-	69372	76.976			78.73		
	5	70754	-	70754	78.510			80.29		
	6	65291	-	65291	72.448			74.13		
30min	1	71562	-	71562	79.406	81.51	3.52	81.94	84.08	3.52
	2	70674	-	70674	78.421			80.83		
	3	74697	-	74697	82.885			85.56		
	4	76106	-	76106	84.449			87.06		
	5	76425	-	76425	84.802			87.46		
	6	71301	-	71301	79.117			81.60		
45min	1	75083	-	75083	83.313	84.45	2.84	86.73	87.92	2.87
	2	73401	-	73401	81.447			84.73		
	3	76957	-	76957	85.393			88.99		
	4	78100	-	78100	86.661			90.21		
	5	78769	-	78769	87.403			91.00		
	6	74356	-	74356	82.507			85.87		
极限	1	79094	-	79094	87.764	88.96	1.91	92.10	93.36	1.96
	2	79598	-	79598	88.323			92.51		
	3	80842	-	80842	89.704			94.25		
	4	81381	-	81381	90.302			94.81		
	5	82075	-	82075	91.072			95.64		
	6	78019	-	78019	86.571			90.85		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5726-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-rj.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 13:45:49 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/03/21 10:45:15 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计						

图1 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
溶剂




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5727-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 13:50:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/21 10:45:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.429	20708	3223	1116	1.015	--
2	3.152	163934	20731	3698	1.098	9.104
总计		184641	23955			

图2 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5728-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 13:54:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:45:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	20585	3215	1121	1.014	--
2	3.146	163640	20801	3715	1.098	9.127
总计		184225	24015			

图3 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5729-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 13:59:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:45:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.425	20665	3218	1112	1.016	--
2	3.145	163337	20752	3698	1.095	9.106
总计		184002	23969			

图4 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5730-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 14:03:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:45:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.424	20536	3219	1119	1.029	--
2	3.145	163776	20769	3695	1.095	9.126
总计		184312	23989			

图5 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5731-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 14:07:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:45:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	20674	3215	1120	1.014	--
2	3.148	163407	20767	3715	1.098	9.133
总计		184081	23982			

图6 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5732-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 14:12:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:45:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.439	22311	3462	1131	0.981	--
2	3.162	58727	7720	3972	1.085	9.270
总计		81038	11182			

图7 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5733-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 14:16:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:45:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	23098	3570	1125	0.984	--
2	3.165	69011	9065	3989	1.085	9.269
总计		92109	12635			

图8 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5734-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 14:21:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:45:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.437	22100	3422	1114	0.985	--
2	3.163	58529	7702	3986	1.082	9.261
总计		80629	11123			

图9 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5735-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 14:25:31 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/03/21 10:45:43 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.438	21607	3330	1109	0.979	--
2	3.166	63149	8259	3967	1.085	9.250
总计		84756	11589			

图10 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5736-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 14:29:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:45:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.436	22349	3467	1122	0.984	--
2	3.160	65326	8564	3977	1.083	9.269
总计		87675	12032			

图11 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5737-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 14:34:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:45:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.436	22275	3444	1120	0.979	--
2	3.160	66857	8735	3949	1.085	9.252
总计		89131	12180			

图12 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5738-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 14:38:43 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/03/21 10:45:52 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.437	23038	3556	1112	0.987	--
2	3.160	106637	13939	3964	1.092	9.236
总计		129676	17495			

图13 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5739-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 14:43:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:45:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.440	23638	3641	1123	0.982	--
2	3.166	108832	14221	3970	1.090	9.259
总计		132470	17861			

图14 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5740-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 14:47:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:45:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.436	23642	3635	1113	0.973	--
2	3.159	109058	14207	3946	1.092	9.234
总计		132700	17842			

图15 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5741-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 14:51:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:46:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.437	22674	3505	1120	0.981	--
2	3.161	105811	13821	3956	1.089	9.251
总计		128485	17326			

图16 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5742-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 14:56:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:46:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.435	23280	3567	1103	0.982	--
2	3.161	105621	13781	3947	1.089	9.226
总计		128901	17348			

图17 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5743-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 15:00:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:46:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.436	22983	3569	1127	0.983	--
2	3.159	107391	14019	3972	1.093	9.271
总计		130374	17588			

图18 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5744-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 15:05:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:46:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.436	22809	3528	1121	0.983	--
2	3.163	127808	16701	3961	1.094	9.268
总计		150618	20229			

图19 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5745-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 15:09:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/21 10:46:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.434	23519	3628	1115	0.982	--
2	3.161	130554	17044	3964	1.095	9.267
总计		154073	20672			

图20 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5746-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 15:13:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:46:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.436	23225	3583	1113	0.978	--
2	3.159	127908	16696	3967	1.093	9.244
总计		151133	20279			

图21 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5747-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 15:18:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:46:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.436	22812	3516	1120	0.976	--
2	3.162	126639	16478	3917	1.095	9.238
总计		149451	19993			

图22 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5748-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 15:22:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:46:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.434	23092	3547	1107	0.975	--
2	3.158	124215	16228	3961	1.092	9.244
总计		147308	19775			

图23 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5749-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 15:27:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/21 10:46:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.435	23174	3579	1123	0.978	--
2	3.159	128123	16659	3939	1.094	9.254
总计		151297	20238			

图24 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5750-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 15:31:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:46:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.434	22757	3489	1115	0.985	--
2	3.158	136450	17777	3954	1.093	9.252
总计		159207	21265			

图25 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5751-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 15:36:00 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/21 10:46:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.434	23545	3625	1115	0.986	--
2	3.156	141085	18423	3944	1.096	9.241
总计		164629	22047			

图26 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5752-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 15:40:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:46:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.434	22921	3519	1110	0.973	--
2	3.158	138373	18031	3947	1.094	9.234
总计		161294	21551			

图27 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5753-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 15:44:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:46:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.434	22624	3464	1110	0.986	--
2	3.156	133084	17381	3941	1.094	9.231
总计		155708	20844			

图28 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5754-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 15:49:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:46:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.433	22388	3463	1117	0.970	--
2	3.157	133087	17352	3935	1.093	9.245
总计		155475	20815			

图29 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5755-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 15:53:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:46:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.433	22926	3533	1109	0.980	--
2	3.156	138026	17971	3927	1.095	9.221
总计		160951	21505			

图30 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5756-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 15:58:02 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/03/21 10:46:44 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.436	22416	3458	1113	0.979	--
2	3.159	144887	18841	3946	1.095	9.235
总计		167303	22299			

图31 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5757-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 16:02:27 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/21 10:46:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.434	23321	3585	1115	0.982	--
2	3.156	150407	19653	3954	1.094	9.244
总计		173729	23239			

图32 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5758-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 16:06:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:46:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.435	22908	3553	1121	0.986	--
2	3.157	148447	19383	3951	1.097	9.250
总计		171354	22936			

图33 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5759-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 16:11:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/21 10:46:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.434	22464	3445	1107	0.975	--
2	3.156	142035	18554	3950	1.099	9.226
总计		164500	21999			

图34 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5760-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 16:15:41 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/21 10:46:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.433	22454	3478	1125	0.981	--
2	3.160	144870	18877	3963	1.099	9.293
总计		167325	22355			

图35 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5761-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 16:20:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:46:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.434	22703	3491	1111	0.969	--
2	3.157	147408	19185	3929	1.096	9.228
总计		170111	22676			

图36 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5762-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 16:24:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:47:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.433	22222	3431	1115	0.975	--
2	3.155	150771	19680	3936	1.096	9.243
总计		172993	23111			

图37 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5763-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 16:28:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/21 10:47:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.433	23194	3564	1112	0.979	--
2	3.157	156720	20428	3944	1.097	9.242
总计		179914	23991			

图38 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5764-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 16:33:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:47:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.433	22611	3496	1124	0.976	--
2	3.155	152491	19914	3941	1.098	9.258
总计		175102	23410			

图39 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5765-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 16:37:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:47:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.435	22079	3417	1120	0.982	--
2	3.157	146765	19149	3945	1.097	9.240
总计		168844	22566			

图40 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5766-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 16:42:10 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/21 10:47:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.432	22752	3497	1095	0.981	--
2	3.154	151785	19821	3942	1.100	9.202
总计		174537	23318			

图41 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5767-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 16:46:35 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/21 10:47:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.434	22589	3468	1110	0.976	--
2	3.155	153482	19980	3921	1.098	9.213
总计		176071	23448			

图42 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5768-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 16:51:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:47:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.432	21982	3394	1106	0.983	--
2	3.155	156165	20396	3944	1.099	9.230
总计		178147	23790			

图43 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5769-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 16:55:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:47:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.433	22663	3499	1112	0.980	--
2	3.154	162592	21153	3911	1.099	9.212
总计		185255	24652			

图44 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5770-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 16:59:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/21 10:47:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.437	22141	3422	1129	0.995	--
2	3.157	156982	20507	3942	1.095	9.243
总计		179123	23929			

图45 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5771-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 17:04:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:47:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.434	22418	3447	1109	0.982	--
2	3.155	160125	20872	3935	1.098	9.221
总计		182543	24319			

图46 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5772-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 17:08:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/21 10:47:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.434	22083	3400	1113	0.979	--
2	3.156	156578	20444	3949	1.098	9.240
总计		178661	23845			

图47 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5773-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 17:13:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:47:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.433	22265	3436	1122	0.979	--
2	3.154	159004	20749	3938	1.099	9.246
总计		181269	24185			

图48 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5774-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 17:17:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:47:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.423	20644	3231	1124	1.022	--
2	3.142	163202	20740	3718	1.102	9.147
总计		183847	23971			

图49 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5775-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 17:21:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:47:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.423	20709	3228	1103	1.025	--
2	3.141	163263	20755	3709	1.100	9.100
总计		183972	23983			

图50 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5776-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-rj.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 17:26:21 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/21 10:47:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计						

图51 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5777-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 17:30:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:47:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.421	20655	3237	1122	1.035	--
2	3.141	163377	20757	3705	1.100	9.143
总计		184032	23994			

图52 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5778-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 17:35:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:47:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.425	20571	3223	1127	1.017	--
2	3.144	163517	20762	3712	1.101	9.136
总计		184088	23985			

图53 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5779-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 17:39:33 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/03/21 10:47:51 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.421	20690	3244	1118	1.015	--
2	3.141	163688	20768	3696	1.101	9.136
总计		184378	24012			

图54 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5780-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 17:43:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:47:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.421	20734	3242	1112	1.015	--
2	3.141	163245	20755	3712	1.100	9.136
总计		183979	23997			

图55 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5781-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 17:48:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:47:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.421	20658	3239	1114	1.024	--
2	3.140	163096	20769	3712	1.101	9.133
总计		183754	24009			

图56 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5782-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 17:52:45 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/21 10:47:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.432	20377	3156	1119	0.974	--
2	3.156	55287	7265	3967	1.087	9.274
总计		75664	10420			

图57 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5783-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 17:57:08 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/03/21 10:48:02 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.432	21392	3285	1104	0.981	--
2	3.156	66170	8701	3965	1.092	9.243
总计		87562	11986			

图58 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5784-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 18:01:31 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/03/21 10:48:05 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.433	21730	3351	1123	0.985	--
2	3.157	68709	9027	3982	1.092	9.289
总计		90438	12379			

图59 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5785-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 18:05:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:48:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.433	21355	3292	1106	0.980	--
2	3.155	67404	8860	3982	1.090	9.251
总计		88759	12152			

图60 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5786-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 18:10:17 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/03/21 10:48:10 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	21802	3347	1107	0.980	--
2	3.157	66529	8719	3959	1.091	9.258
总计		88331	12065			

图61 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5787-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 18:14:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:48:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	22132	3442	1123	0.985	--
2	3.152	72645	9510	3950	1.092	9.271
总计		94777	12953			

图62 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5788-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 18:19:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:48:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.432	22365	3459	1121	0.985	--
2	3.154	101603	13327	3969	1.094	9.276
总计		123968	16786			

图63 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5789-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 18:23:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:48:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	22460	3469	1111	0.984	--
2	3.154	105975	13823	3941	1.096	9.242
总计		128436	17293			

图64 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5790-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 18:27:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:48:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.435	23219	3580	1116	0.981	--
2	3.155	109269	14316	3969	1.097	9.247
总计		132489	17896			

图65 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5791-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 18:32:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:48:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.430	23006	3548	1101	0.987	--
2	3.150	109187	14266	3952	1.094	9.224
总计		132192	17814			

图66 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5792-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 18:36:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:48:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.432	23041	3565	1109	0.986	--
2	3.151	106606	13898	3948	1.100	9.225
总计		129647	17462			

图67 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5793-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 18:40:58 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/21 10:48:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	23101	3570	1109	0.974	--
2	3.152	109655	14344	3954	1.097	9.243
总计		132755	17914			

图68 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5794-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 18:45:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:48:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	22380	3476	1117	0.972	--
2	3.156	125648	16382	3922	1.097	9.254
总计		148028	19857			

图69 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5795-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 18:49:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:48:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	22186	3446	1113	0.981	--
2	3.149	123576	16157	3948	1.099	9.237
总计		145762	19602			

图70 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5796-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 18:54:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:48:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	22956	3552	1109	0.981	--
2	3.149	126269	16505	3946	1.098	9.229
总计		149225	20057			

图71 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5797-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 18:58:30 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/03/21 10:48:43 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.434	22491	3465	1113	0.973	--
2	3.152	123566	16149	3958	1.099	9.225
总计		146057	19614			

图72 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5798-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 19:02:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:48:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.435	22802	3517	1113	0.989	--
2	3.163	124308	16258	3973	1.101	9.270
总计		147110	19775			

图73 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5799-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 19:07:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:48:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.438	22963	3553	1121	0.988	--
2	3.163	128881	16822	3964	1.098	9.258
总计		151844	20376			

图74 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5800-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 19:11:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:48:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	22398	3471	1110	0.976	--
2	3.149	136267	17806	3942	1.098	9.228
总计		158665	21277			

图75 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5801-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 19:16:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:48:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.435	22294	3430	1118	0.975	--
2	3.154	132694	17355	3965	1.102	9.239
总计		154988	20785			

图76 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5802-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 19:20:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:48:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.436	22822	3530	1118	0.995	--
2	3.155	135675	17743	3972	1.100	9.247
总计		158498	21273			

图77 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5803-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 19:24:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:49:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	22480	3495	1120	0.984	--
2	3.149	134694	17598	3952	1.101	9.256
总计		157174	21093			

图78 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5804-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 19:29:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:49:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	22909	3549	1120	0.991	--
2	3.149	136360	17837	3946	1.100	9.248
总计		159269	21386			

图79 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5805-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 19:33:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:49:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	22574	3485	1116	0.990	--
2	3.148	135745	17727	3938	1.100	9.232
总计		158319	21211			

图80 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5806-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 19:37:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:49:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	22478	3472	1106	0.984	--
2	3.157	148601	19345	3934	1.101	9.244
总计		171080	22818			

图81 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5807-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 19:42:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:49:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	21934	3400	1115	0.978	--
2	3.149	142909	18688	3954	1.102	9.245
总计		164843	22088			

图82 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5808-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 19:46:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:49:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.438	22914	3542	1119	0.984	--
2	3.165	146779	19115	3961	1.106	9.254
总计		169693	22658			

图83 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5809-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 19:51:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:49:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	22047	3420	1113	0.983	--
2	3.151	141566	18411	3940	1.104	9.238
总计		163612	21831			

图84 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5810-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 19:55:25 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/03/21 10:49:20 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.430	22107	3438	1125	0.982	--
2	3.149	142872	18673	3946	1.103	9.263
总计		164979	22111			

图85 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5811-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 19:59:48 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/21 10:49:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	22817	3503	1096	0.989	--
2	3.151	146520	19105	3958	1.101	9.214
总计		169336	22608			

图86 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5812-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 20:04:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:49:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	22049	3399	1111	0.985	--
2	3.149	145105	18976	3955	1.102	9.236
总计		167154	22375			

图87 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5813-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 20:08:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:49:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.430	22024	3404	1108	0.981	--
2	3.150	147553	19226	3951	1.103	9.240
总计		169577	22630			

图88 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5814-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 20:12:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:49:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.430	22409	3458	1109	0.987	--
2	3.148	150243	19643	3949	1.100	9.234
总计		172653	23101			

图89 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5815-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 20:17:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:49:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.430	22461	3477	1107	0.989	--
2	3.148	150456	19692	3948	1.099	9.225
总计		172917	23169			

图90 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5816-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 20:21:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:49:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	22187	3426	1101	0.975	--
2	3.152	148403	19344	3952	1.102	9.229
总计		170590	22771			

图91 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5817-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 20:26:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:49:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.429	22259	3457	1121	0.987	--
2	3.146	151680	19860	3954	1.105	9.260
总计		173940	23317			

图92 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5818-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 20:30:24 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/03/21 10:49:43 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.430	21746	3365	1104	0.976	--
2	3.148	159861	20883	3942	1.104	9.215
总计		181607	24248			

图93 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5819-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 20:34:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/21 10:49:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	21956	3398	1106	0.984	--
2	3.149	158358	20697	3955	1.103	9.223
总计		180315	24095			

图94 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5820-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 20:39:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:49:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.430	22285	3451	1108	0.979	--
2	3.148	159838	20879	3943	1.105	9.231
总计		182122	24330			

图95 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5821-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 20:43:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/21 10:49:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.430	22111	3409	1105	0.988	--
2	3.148	157370	20573	3953	1.103	9.233
总计		179481	23982			

图96 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5822-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 20:47:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:49:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.430	22356	3464	1112	0.980	--
2	3.152	162764	21127	3922	1.104	9.239
总计		185120	24590			

图97 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5823-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 20:52:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:49:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.430	21968	3383	1097	0.988	--
2	3.153	158141	20583	3923	1.106	9.211
总计		180109	23966			

图98 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5824-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 20:56:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:50:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	20741	3243	1122	1.022	--
2	3.133	163323	20814	3719	1.107	9.147
总计		184064	24057			

图99 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5825-2 - zzp-2022081601p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 21:01:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:50:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	20593	3228	1118	1.020	--
2	3.134	163470	20774	3711	1.105	9.135
总计		184063	24002			

图100 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081601批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5826-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-rj.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 21:05:25 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/03/21 10:50:06 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计						

图101 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5827-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 21:09:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:50:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	21002	3267	1105	1.023	--
2	3.138	81489	10411	3711	1.095	9.123
总计		102491	13678			

图102 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5828-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 21:14:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:50:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	20762	3250	1111	1.027	--
2	3.140	81959	10435	3713	1.097	9.139
总计		102721	13685			

图103 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5829-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 21:18:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/21 10:50:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.417	20879	3246	1105	1.025	--
2	3.135	81482	10403	3714	1.100	9.130
总计		102360	13649			

图104 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5830-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 21:23:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:50:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.417	20784	3243	1113	1.031	--
2	3.134	81730	10392	3703	1.105	9.133
总计		102513	13636			

图105 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5831-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 21:27:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:50:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.417	20751	3236	1107	1.028	--
2	3.133	81725	10394	3697	1.102	9.115
总计		102476	13630			

图106 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5832-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 21:31:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:50:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.429	20825	3237	1126	0.982	--
2	3.149	26297	3506	4021	1.098	9.325
总计		47122	6743			

图107 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5833-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 21:36:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:50:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	19542	3050	1128	0.987	--
2	3.152	24312	3249	4050	1.080	9.338
总计		43854	6299			

图108 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5834-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 21:40:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:50:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.430	19059	2948	1113	0.985	--
2	3.150	24085	3222	4030	1.087	9.301
总计		43145	6171			

图109 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5835-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 21:45:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:50:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.435	17943	2784	1127	0.989	--
2	3.157	21851	2943	4080	1.067	9.338
总计		39794	5727			

图110 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5836-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 21:49:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:50:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.429	14560	2296	1143	0.982	--
2	3.151	19298	2591	4059	1.099	9.384
总计		33858	4887			

图111 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5837-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 21:53:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:50:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	14533	2283	1144	0.983	--
2	3.151	18451	2494	4120	1.084	9.408
总计		32984	4778			

图112 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5838-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 21:58:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:50:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.428	22617	3523	1119	0.975	--
2	3.149	50480	6660	3995	1.087	9.300
总计		73097	10183			

图113 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5839-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 22:02:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:50:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.428	22044	3436	1118	0.988	--
2	3.148	48318	6378	3987	1.091	9.291
总计		70362	9814			

图114 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5840-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 22:07:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:50:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.429	22188	3444	1118	0.982	--
2	3.149	48552	6420	3980	1.085	9.283
总计		70740	9864			

图115 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5841-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 22:11:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:50:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.431	23112	3556	1105	0.993	--
2	3.152	49124	6442	3964	1.096	9.247
总计		72236	9999			

图116 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5842-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 22:15:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:50:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.437	21110	3281	1124	0.987	--
2	3.164	43905	5797	4026	1.093	9.309
总计		65016	9079			

图117 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5843-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 22:20:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:50:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.433	21371	3320	1121	0.991	--
2	3.155	44859	5938	4001	1.097	9.291
总计		66230	9257			

图118 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5844-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 22:24:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:51:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.429	22904	3556	1114	0.980	--
2	3.147	62497	8233	3979	1.092	9.267
总计		85401	11789			

图119 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5845-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 22:28:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:51:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.427	22549	3507	1115	0.986	--
2	3.142	60492	7962	3976	1.098	9.261
总计		83040	11469			

图120 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5846-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 22:33:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:51:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.428	22182	3445	1120	0.990	--
2	3.142	60783	8007	3982	1.094	9.270
总计		82965	11452			

图121 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5847-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 22:37:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:51:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.428	22951	3579	1120	0.983	--
2	3.143	62175	8179	3960	1.103	9.260
总计		85126	11758			

图122 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5848-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 22:42:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:51:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.428	21722	3385	1121	0.987	--
2	3.142	57918	7593	3958	1.096	9.257
总计		79640	10978			

图123 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5849-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 22:46:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:51:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.429	22058	3452	1133	0.985	--
2	3.142	59608	7815	3952	1.094	9.265
总计		81666	11267			

图124 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5850-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 22:50:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:51:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.428	22474	3512	1130	0.987	--
2	3.140	67022	8852	3977	1.096	9.280
总计		89497	12364			

图125 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5851-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 22:55:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:51:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.427	22580	3495	1113	0.993	--
2	3.138	66174	8741	3991	1.100	9.256
总计		88754	12236			

图126 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5852-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 22:59:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:51:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.428	22145	3448	1124	0.986	--
2	3.139	66295	8751	3977	1.101	9.264
总计		88440	12200			

图127 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5853-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 23:04:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:51:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.428	22979	3583	1126	0.983	--
2	3.141	68966	9092	3987	1.098	9.281
总计		91945	12674			

图128 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5854-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 23:08:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:51:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.430	22036	3422	1123	0.995	--
2	3.141	63625	8407	3996	1.104	9.265
总计		85662	11829			

图129 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5855-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 23:12:57 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/21 10:51:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.427	21634	3373	1135	0.988	--
2	3.138	64645	8540	3993	1.098	9.300
总计		86278	11912			

图130 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5856-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 23:17:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:51:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.427	22362	3496	1133	0.988	--
2	3.136	72389	9552	3982	1.098	9.279
总计		94751	13048			

图131 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5857-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 23:21:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:51:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.429	22649	3501	1118	0.990	--
2	3.138	70246	9289	3992	1.103	9.248
总计		92895	12791			

图132 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5858-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 23:26:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:51:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.428	21910	3415	1127	0.986	--
2	3.140	72297	9520	3975	1.111	9.270
总计		94207	12935			

图133 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5859-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 23:30:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:51:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.433	22771	3539	1133	0.985	--
2	3.144	72818	9601	4010	1.101	9.271
总计		95589	13140			

图134 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5860-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 23:34:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:51:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.427	21681	3379	1118	0.981	--
2	3.136	68208	9023	3986	1.101	9.252
总计		89890	12402			

图135 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5861-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 23:39:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:51:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.427	21668	3380	1131	0.991	--
2	3.138	69175	9167	3988	1.094	9.289
总计		90843	12547			

图136 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5862-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 23:43:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:51:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.430	21704	3391	1129	0.988	--
2	3.138	72953	9643	3982	1.105	9.254
总计		94657	13034			

图137 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5863-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 23:48:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:51:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.428	22354	3487	1118	0.985	--
2	3.136	73624	9713	3975	1.101	9.233
总计		95978	13199			

图138 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5864-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 23:52:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:51:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.429	21920	3427	1128	0.981	--
2	3.138	76042	9994	3946	1.104	9.236
总计		97962	13420			

图139 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5865-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 23:56:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:52:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.427	22539	3523	1132	0.984	--
2	3.134	75895	10001	3980	1.104	9.266
总计		98434	13524			

图140 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5866-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 00:01:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:52:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.429	21733	3402	1133	0.983	--
2	3.137	71397	9448	4001	1.104	9.281
总计		93130	12850			

图141 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5867-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 00:05:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:52:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.427	21524	3367	1131	0.990	--
2	3.135	73016	9610	3973	1.103	9.263
总计		94540	12977			

图142 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5868-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 00:10:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:52:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.429	21668	3392	1130	0.987	--
2	3.135	78255	10316	3998	1.105	9.268
总计		99922	13707			

图143 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5869-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 00:14:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:52:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.428	22394	3491	1127	0.991	--
2	3.135	81333	10708	3984	1.103	9.259
总计		103727	14199			

图144 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5870-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 00:19:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:52:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.427	21676	3369	1124	0.995	--
2	3.134	80057	10529	3984	1.109	9.253
总计		101733	13898			

图145 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5871-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 00:23:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:52:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.428	22807	3560	1124	0.988	--
2	3.134	83958	11053	3998	1.109	9.258
总计		106765	14614			

图146 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5872-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 00:27:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:52:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.428	21931	3417	1132	0.988	--
2	3.136	79856	10509	3974	1.101	9.261
总计		101787	13926			

图147 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5873-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 00:32:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:52:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.429	21791	3407	1130	0.988	--
2	3.137	79226	10500	4003	1.104	9.273
总计		101017	13907			

图148 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5874-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 00:36:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:52:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.415	21002	3296	1119	1.032	--
2	3.120	81302	10475	3742	1.105	9.133
总计		102303	13771			

图149 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5875-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx1-jf50z-pH6.8-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 00:41:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:52:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.417	21025	3291	1123	1.029	--
2	3.121	81695	10481	3731	1.106	9.122
总计		102720	13772			

图150 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5876-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-rj.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 00:45:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:52:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计						

图151 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5877-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 00:49:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:52:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.415	20875	3285	1120	1.024	--
2	3.121	81316	10455	3734	1.105	9.136
总计		102191	13741			

图152 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5878-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 00:54:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:52:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.415	20815	3268	1113	1.033	--
2	3.122	81574	10469	3732	1.107	9.123
总计		102389	13737			

图153 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5879-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 00:58:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:52:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.416	20864	3269	1112	1.026	--
2	3.121	81409	10465	3734	1.104	9.115
总计		102274	13734			

图154 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5880-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 01:03:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:52:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.415	20894	3283	1123	1.039	--
2	3.120	81555	10470	3718	1.109	9.131
总计		102449	13753			

图155 培哌普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5881-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 01:07:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:52:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.415	20947	3275	1111	1.027	--
2	3.119	81568	10452	3731	1.109	9.108
总计		102515	13727			

图156 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5882-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 01:11:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:52:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	20361	3181	1137	0.992	--
2	3.133	25240	3390	4059	1.100	9.331
总计		45601	6571			

图157 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5883-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 01:16:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:52:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.427	17815	2779	1116	0.988	--
2	3.135	21394	2875	4085	1.090	9.307
总计		39209	5654			

图158 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5884-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 01:20:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:52:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	21525	3356	1129	0.984	--
2	3.134	29659	3966	4053	1.089	9.313
总计		51184	7322			

图159 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5885-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 01:25:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:52:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	20803	3239	1124	0.993	--
2	3.133	26373	3525	4027	1.104	9.290
总计		47176	6764			

图160 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5886-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 01:29:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:53:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.427	21379	3334	1131	0.990	--
2	3.134	28660	3830	4013	1.108	9.291
总计		50039	7164			

图161 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5887-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 01:33:50 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/03/21 10:53:04 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.428	20910	3260	1118	0.986	--
2	3.139	26085	3505	4076	1.090	9.310
总计		46995	6765			

图162 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5888-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 01:38:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:53:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.427	22392	3493	1135	0.993	--
2	3.135	50623	6685	3984	1.110	9.283
总计		73015	10179			

图163 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5889-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 01:42:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:53:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	22464	3501	1131	0.991	--
2	3.136	47798	6351	4000	1.109	9.299
总计		70261	9852			

图164 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5890-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 01:47:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:53:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.427	24015	3720	1126	0.985	--
2	3.135	53638	7097	3992	1.106	9.271
总计		77653	10817			

图165 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5891-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 01:51:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:53:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.428	23630	3682	1130	0.994	--
2	3.137	51371	6819	4019	1.099	9.291
总计		75001	10501			

图166 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5892-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 01:55:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:53:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	24011	3721	1125	0.981	--
2	3.137	51404	6815	4000	1.103	9.282
总计		75415	10536			

图167 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5893-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 02:00:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:53:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	23113	3571	1121	0.987	--
2	3.134	49724	6566	3990	1.101	9.264
总计		72837	10137			

图168 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5894-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 02:04:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:53:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.427	22577	3520	1124	0.991	--
2	3.135	62041	8190	3996	1.104	9.265
总计		84618	11710			

图169 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5895-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 02:08:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:53:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.430	22438	3490	1127	0.990	--
2	3.147	60111	7933	3991	1.104	9.289
总计		82549	11423			

图170 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5896-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 02:13:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:53:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	24014	3720	1120	0.987	--
2	3.134	64628	8505	3983	1.106	9.257
总计		88642	12224			

图171 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5897-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 02:17:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/21 10:53:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	23829	3686	1113	0.991	--
2	3.136	64346	8517	4003	1.102	9.260
总计		88175	12202			

图172 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5898-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 02:22:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:53:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	23812	3699	1127	0.998	--
2	3.135	64719	8538	3995	1.104	9.279
总计		88531	12237			

图173 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5899-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 02:26:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:53:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	22686	3531	1122	0.994	--
2	3.135	60330	7975	3994	1.103	9.267
总计		83016	11506			

图174 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5900-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 02:30:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:53:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	22037	3439	1124	0.998	--
2	3.134	67493	8872	3963	1.106	9.254
总计		89530	12311			

图175 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5901-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 02:35:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:53:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.425	22270	3454	1128	0.994	--
2	3.133	65917	8684	3973	1.102	9.268
总计		88187	12138			

图176 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5902-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 02:39:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:53:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.425	23797	3681	1113	0.990	--
2	3.133	68950	9097	3986	1.109	9.247
总计		92747	12778			

图177 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5903-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 02:44:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:53:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.425	23234	3606	1123	0.986	--
2	3.133	69372	9176	3993	1.102	9.273
总计		92605	12781			

图178 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5904-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 02:48:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:53:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.428	23560	3668	1126	0.996	--
2	3.140	70754	9332	3981	1.107	9.274
总计		94315	13000			

图179 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5905-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 02:52:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:53:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	22400	3479	1129	0.990	--
2	3.137	65291	8632	3998	1.107	9.298
总计		87691	12111			

图180 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5906-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 02:57:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:53:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	22010	3418	1130	0.993	--
2	3.134	71562	9425	3979	1.104	9.270
总计		93572	12843			

图181 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5907-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 03:01:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:54:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	21910	3425	1135	0.992	--
2	3.136	70674	9346	3996	1.106	9.297
总计		92584	12770			

图182 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5908-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 03:05:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:54:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.427	23545	3634	1112	0.983	--
2	3.135	74697	9831	3983	1.108	9.238
总计		98243	13465			

图183 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5909-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 03:10:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:54:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.427	23184	3611	1125	0.990	--
2	3.137	76106	10015	3966	1.107	9.261
总计		99290	13627			

图184 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5910-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 03:14:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:54:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	23270	3614	1122	0.980	--
2	3.135	76425	10055	3982	1.109	9.260
总计		99694	13669			

图185 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5911-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 03:19:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:54:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	22462	3497	1128	0.995	--
2	3.136	71301	9397	3981	1.105	9.274
总计		93763	12895			

图186 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5912-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 03:23:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:54:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.429	21919	3429	1134	0.989	--
2	3.139	75083	9881	3966	1.106	9.269
总计		97002	13310			

图187 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5913-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 03:27:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:54:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.427	21798	3410	1131	0.993	--
2	3.135	73401	9683	3989	1.104	9.277
总计		95200	13093			

图188 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5914-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 03:32:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:54:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.427	22919	3570	1134	0.989	--
2	3.136	76957	10154	3987	1.106	9.285
总计		99876	13724			

图189 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5915-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 03:36:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:54:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.425	22988	3569	1116	0.983	--
2	3.135	78100	10275	3978	1.107	9.256
总计		101089	13844			

图190 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5916-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 03:40:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:54:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.425	22772	3552	1128	0.992	--
2	3.134	78769	10364	3980	1.107	9.274
总计		101541	13916			

图191 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5917-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 03:45:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:54:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.427	22275	3465	1128	0.981	--
2	3.134	74356	9771	3976	1.110	9.264
总计		96632	13237			

图192 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5918-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 03:49:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:54:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	21653	3373	1135	0.988	--
2	3.134	79094	10400	3979	1.106	9.277
总计		100747	13773			

图193 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5919-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 03:54:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:54:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	21673	3386	1139	0.989	--
2	3.134	79598	10471	3988	1.110	9.293
总计		101271	13857			

图194 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5920-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 03:58:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:54:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.427	22743	3554	1124	0.982	--
2	3.136	80842	10664	3994	1.106	9.266
总计		103585	14218			

图195 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5921-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 04:02:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:54:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	22546	3501	1124	0.979	--
2	3.135	81381	10723	3977	1.106	9.269
总计		103927	14223			

图196 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5922-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 04:07:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:54:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	22793	3535	1121	0.987	--
2	3.134	82075	10792	3980	1.108	9.258
总计		104869	14327			

图197 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5923-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 04:11:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:54:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.426	22002	3431	1127	0.984	--
2	3.136	78019	10308	3990	1.105	9.277
总计		100021	13738			

图198 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5924-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 04:16:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:54:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.415	20873	3283	1113	1.035	--
2	3.121	81812	10476	3722	1.110	9.116
总计		102685	13759			

图199 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-38/30-5925-2 - zzp-2022081901p-rcqx-jyx2-jf50z-pH6.8-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240320-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240320-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/21 04:20:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/21 10:54:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.415	20920	3282	1114	1.036	--
2	3.120	81561	10466	3734	1.109	9.125
总计		102480	13748			

图200 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081901批-磷酸盐缓冲液 (pH6.8)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2