



培哚普利氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	DJ468-220103	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	94.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.95	41399	41465	41419	41436	41385	41421	0.08
2	9.99	41489	41485				41487	0.01

单位质量响应值		RSD%	判断
4162.91	4152.85	0.18	数据可信



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022081001批-培哌普利-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	37679	-	37679	77.318	76.47	12.68	77.32	76.47	12.68
	2	31988	-	31988	65.640			65.64		
	3	33105	-	33105	67.932			67.93		
	4	44790	-	44790	91.909			91.91		
	5	35951	-	35951	73.772			73.77		
	6	40077	-	40077	82.238			82.24		
10min	1	45829	-	45829	94.041	93.96	4.75	94.90	94.81	4.76
	2	43229	-	43229	88.706			89.44		
	3	47202	-	47202	96.859			97.61		
	4	48984	-	48984	100.516			101.54		
	5	45902	-	45902	94.191			95.01		
	6	43598	-	43598	89.463			90.38		
15min	1	45725	-	45725	93.828	94.66	3.25	95.73	96.56	3.26
	2	44654	-	44654	91.630			93.35		
	3	47736	-	47736	97.955			99.79		
	4	47612	-	47612	97.700			99.84		
	5	46831	-	46831	96.098			97.96		
	6	44232	-	44232	90.764			92.67		
20min	1	45890	-	45890	94.167	95.48	2.64	97.11	98.43	2.62
	2	46723	-	46723	95.876			98.61		
	3	47549	-	47549	97.571			100.49		
	4	47727	-	47727	97.936			101.16		
	5	46886	-	46886	96.210			99.14		
	6	44417	-	44417	91.144			94.06		
30min	1	45836	-	45836	94.056	94.61	1.72	98.05	98.61	1.75
	2	45783	-	45783	93.947			97.75		
	3	46666	-	46666	95.759			99.76		
	4	46850	-	46850	96.137			100.45		
	5	46695	-	46695	95.819			99.82		
	6	44795	-	44795	91.920			95.85		
45min	1	45461	-	45461	93.286	94.46	2.09	98.32	99.52	2.11
	2	46189	-	46189	94.780			99.62		
	3	46258	-	46258	94.922			99.99		
	4	47474	-	47474	97.417			102.80		
	5	46219	-	46219	94.842			99.91		
	6	44588	-	44588	91.495			96.45		
极限	1	45650	-	45650	93.674	95.62	1.73	99.75	101.72	1.66
	2	47703	-	47703	97.887			103.78		
	3	47014	-	47014	96.473			102.60		
	4	47076	-	47076	96.600			103.06		
	5	46340	-	46340	95.090			101.21		
	6	45798	-	45798	93.978			99.94		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



培哚普利氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	2	系数	0.721

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.93	161368	161738	161540	161624	161482	161550	0.09
2	14.00	161534	161229				161382	0.14

单位质量响应值		RSD%	判断
11597.27	11527.29	0.43	数据可信



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022081001批-氨氯地平-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	117908	-	117908	66.107	65.14	12.99	66.11	65.14	12.99
	2	100699	-	100699	56.458			56.46		
	3	102130	-	102130	57.261			57.26		
	4	142117	-	142117	79.680			79.68		
	5	113689	-	113689	63.741			63.74		
	6	120574	-	120574	67.602			67.60		
10min	1	159582	-	159582	89.472	88.97	6.03	90.21	89.70	6.04
	2	147428	-	147428	82.658			83.29		
	3	164526	-	164526	92.244			92.88		
	4	172819	-	172819	96.894			97.78		
	5	158894	-	158894	89.086			89.79		
	6	148916	-	148916	83.492			84.24		
15min	1	161900	-	161900	90.772	91.23	4.76	92.50	92.94	4.76
	2	154895	-	154895	86.844			88.39		
	3	168512	-	168512	94.479			96.14		
	4	170381	-	170381	95.527			97.49		
	5	168474	-	168474	94.458			96.16		
	6	152131	-	152131	85.295			86.97		
20min	1	163112	-	163112	91.451	92.41	3.93	94.19	95.14	3.92
	2	165155	-	165155	92.597			95.11		
	3	167493	-	167493	93.908			96.62		
	4	170929	-	170929	95.834			98.86		
	5	169344	-	169344	94.945			97.69		
	6	152914	-	152914	85.734			88.36		
30min	1	160714	-	160714	90.107	91.21	3.32	93.86	94.96	3.36
	2	158981	-	158981	89.135			92.67		
	3	164324	-	164324	92.131			95.89		
	4	168284	-	168284	94.351			98.44		
	5	168693	-	168693	94.580			98.38		
	6	155107	-	155107	86.963			90.54		
45min	1	162486	-	162486	91.100	91.49	3.56	95.85	96.26	3.59
	2	160966	-	160966	90.248			94.78		
	3	163064	-	163064	91.424			96.20		
	4	170933	-	170933	95.836			100.97		
	5	167600	-	167600	93.968			98.82		
	6	154074	-	154074	86.384			90.93		
极限	1	168314	-	168314	94.368	96.21	1.54	100.13	102.00	1.52
	2	175204	-	175204	98.231			103.76		
	3	171981	-	171981	96.424			102.22		
	4	173402	-	173402	97.221			103.42		
	5	171855	-	171855	96.353			102.25		
	6	168877	-	168877	94.684			100.19		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



培哚普利氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	DJ468-220103	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	94.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.95	41453	41480	41457	41434	41399	41445	0.08
2	9.99	41484	41479				41482	0.01
单位质量响应值				RSD%	判断			
4165.33				0.23	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022081001批-培哌普利-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	41462	-	41462	85.061	79.00	7.04	85.06	79.00	7.05
	2	38972	-	38972	79.953			79.95		
	3	39140	-	39140	80.297			80.30		
	4	40314	-	40314	82.706			82.71		
	5	33708	-	33708	69.153			69.15		
	6	37461	-	37461	76.853			76.85		
10min	1	44770	-	44770	91.847	89.68	3.73	92.79	90.56	3.76
	2	44576	-	44576	91.449			92.34		
	3	44443	-	44443	91.177			92.07		
	4	44813	-	44813	91.936			92.85		
	5	40691	-	40691	83.479			84.25		
	6	43003	-	43003	88.222			89.08		
15min	1	44463	-	44463	91.218	90.69	2.43	93.18	92.57	2.48
	2	44923	-	44923	92.161			94.07		
	3	44496	-	44496	91.285			93.19		
	4	45177	-	45177	92.682			94.62		
	5	42187	-	42187	86.548			88.24		
	6	43997	-	43997	90.262			92.10		
20min	1	45273	-	45273	92.879	90.78	2.08	95.86	93.67	2.13
	2	44709	-	44709	91.722			94.65		
	3	44467	-	44467	91.226			94.15		
	4	44799	-	44799	91.907			94.88		
	5	42918	-	42918	88.048			90.71		
	6	43339	-	43339	88.912			91.75		
30min	1	44783	-	44783	91.874	90.61	2.00	95.89	94.50	2.06
	2	44751	-	44751	91.808			95.76		
	3	44605	-	44605	91.509			95.44		
	4	44791	-	44791	91.890			95.88		
	5	42910	-	42910	88.032			91.67		
	6	43164	-	43164	88.553			92.38		
45min	1	44441	-	44441	91.172	90.70	1.36	96.20	95.60	1.44
	2	44339	-	44339	90.963			95.93		
	3	44673	-	44673	91.648			96.60		
	4	44868	-	44868	92.048			97.06		
	5	43423	-	43423	89.084			93.70		
	6	43532	-	43532	89.308			94.12		
极限	1	44427	-	44427	91.144	91.95	0.88	97.19	97.86	0.88
	2	44990	-	44990	92.299			98.28		
	3	45423	-	45423	93.187			99.16		
	4	44948	-	44948	92.213			98.25		
	5	44777	-	44777	91.862			97.47		
	6	44366	-	44366	91.019			96.82		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



培哚普利氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	2	系数	0.721

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.93	161268	161395	161397	161423	161086	161314	0.09
2	14.00	161353	161452				161402	0.05
单位质量响应值				RSD%	判断			
11580.33				0.32	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022081001批-氨氯地平-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	130736	-	130736	73.348	67.39	7.41	73.35	67.39	7.41
	2	121580	-	121580	68.211			68.21		
	3	119894	-	119894	67.265			67.27		
	4	126708	-	126708	71.088			71.09		
	5	105091	-	105091	58.960			58.96		
	6	116714	-	116714	65.481			65.48		
10min	1	156169	-	156169	87.617	84.55	3.88	88.43	85.30	3.90
	2	155116	-	155116	87.026			87.78		
	3	149929	-	149929	84.116			84.86		
	4	153164	-	153164	85.931			86.72		
	5	140050	-	140050	78.574			79.23		
	6	149805	-	149805	84.047			84.77		
15min	1	156543	-	156543	87.827	86.38	2.96	89.62	88.07	2.99
	2	157737	-	157737	88.497			90.22		
	3	152234	-	152234	85.409			87.09		
	4	157155	-	157155	88.170			89.91		
	5	145662	-	145662	81.722			83.25		
	6	154476	-	154476	86.667			88.33		
20min	1	159317	-	159317	89.383	86.44	2.52	92.15	89.09	2.57
	2	156162	-	156162	87.613			90.32		
	3	152725	-	152725	85.685			88.32		
	4	155874	-	155874	87.451			90.18		
	5	148230	-	148230	83.163			85.60		
	6	152125	-	152125	85.348			87.97		
30min	1	157822	-	157822	88.544	86.19	2.44	92.30	89.80	2.50
	2	155693	-	155693	87.350			91.03		
	3	152435	-	152435	85.522			89.11		
	4	156482	-	156482	87.793			91.49		
	5	147765	-	147765	82.902			86.26		
	6	151579	-	151579	85.042			88.61		
45min	1	157744	-	157744	88.501	86.64	1.97	93.24	91.21	2.05
	2	155096	-	155096	87.015			91.67		
	3	154247	-	154247	86.539			91.07		
	4	157261	-	157261	88.230			92.90		
	5	149586	-	149586	83.924			88.20		
	6	152656	-	152656	85.646			90.16		
极限	1	161875	-	161875	90.818	92.31	0.95	96.54	97.84	0.85
	2	164871	-	164871	92.499			98.12		
	3	166746	-	166746	93.551			99.05		
	4	164805	-	164805	92.462			98.11		
	5	164572	-	164572	92.331			97.55		
	6	164374	-	164374	92.220			97.69		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



培哚普利氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	DJ468-220103	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	94.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.95	41449	41457	41512	41427	41435	41456	0.09
2	9.99	41452	41423				41438	0.05
单位质量响应值				RSD%	判断			
4166.43				0.32	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022081302批-培哌普利-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	40158	-	40158	82.419	87.06	4.58	82.42	87.06	4.58
	2	44248	-	44248	90.813			90.81		
	3	42635	-	42635	87.502			87.50		
	4	45046	-	45046	92.451			92.45		
	5	40708	-	40708	83.547			83.55		
	6	41712	-	41712	85.608			85.61		
10min	1	43345	-	43345	88.959	91.71	2.50	89.88	92.68	2.51
	2	44663	-	44663	91.664			92.67		
	3	44386	-	44386	91.096			92.07		
	4	46727	-	46727	95.901			96.93		
	5	44287	-	44287	90.893			91.82		
	6	44697	-	44697	91.734			92.69		
15min	1	43712	-	43712	89.713	91.61	2.15	91.62	93.59	2.16
	2	44169	-	44169	90.651			92.68		
	3	44407	-	44407	91.139			93.12		
	4	46482	-	46482	95.398			97.49		
	5	44560	-	44560	91.453			93.39		
	6	44476	-	44476	91.281			93.25		
20min	1	43409	-	43409	89.091	91.06	2.20	91.99	94.06	2.21
	2	44430	-	44430	91.186			94.22		
	3	43790	-	43790	89.873			92.87		
	4	46182	-	46182	94.782			97.93		
	5	43938	-	43938	90.177			93.13		
	6	44469	-	44469	91.266			94.25		
30min	1	43651	-	43651	89.587	91.25	2.48	93.48	95.27	2.48
	2	44243	-	44243	90.802			94.85		
	3	43834	-	43834	89.963			93.96		
	4	46558	-	46558	95.554			99.76		
	5	43760	-	43760	89.811			93.77		
	6	44722	-	44722	91.786			95.78		
45min	1	43370	-	43370	89.011	90.31	2.23	93.90	95.34	2.22
	2	43674	-	43674	89.635			94.69		
	3	43968	-	43968	90.238			95.23		
	4	45814	-	45814	94.027			99.29		
	5	44187	-	44187	90.688			95.64		
	6	43015	-	43015	88.282			93.30		
极限	1	44143	-	44143	90.597	91.37	1.45	96.47	97.40	1.49
	2	44046	-	44046	90.398			96.45		
	3	44061	-	44061	90.429			96.43		
	4	45730	-	45730	93.854			100.17		
	5	44703	-	44703	91.747			97.71		
	6	44432	-	44432	91.190			97.19		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



培哚普利氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	2	系数	0.721

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.93	79942	79955	79865	79938	79757	79891	0.11
2	14.00	79651	79684				79668	0.03
单位质量响应值				RSD%	判断			
5735.18				0.56	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022081302批-氨氯地平-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	61698	-	61698	70.011	76.75	6.91	70.01	76.75	6.91
	2	71776	-	71776	81.447			81.45		
	3	68833	-	68833	78.107			78.11		
	4	73874	-	73874	83.828			83.83		
	5	64372	-	64372	73.045			73.05		
	6	65264	-	65264	74.057			74.06		
10min	1	73772	-	73772	83.712	87.96	3.51	84.49	88.81	3.54
	2	78717	-	78717	89.323			90.23		
	3	76226	-	76226	86.496			87.36		
	4	81951	-	81951	92.993			93.92		
	5	77106	-	77106	87.495			88.31		
	6	77301	-	77301	87.716			88.54		
15min	1	75685	-	75685	85.883	88.68	2.97	87.59	90.50	2.99
	2	77962	-	77962	88.466			90.36		
	3	76798	-	76798	87.146			88.97		
	4	82455	-	82455	93.565			95.53		
	5	78382	-	78382	88.943			90.73		
	6	77593	-	77593	88.048			89.85		
20min	1	75641	-	75641	85.833	88.59	3.22	88.49	91.40	3.24
	2	78714	-	78714	89.320			92.20		
	3	75919	-	75919	86.148			88.95		
	4	82587	-	82587	93.715			96.72		
	5	77631	-	77631	88.091			90.86		
	6	77930	-	77930	88.430			91.21		
30min	1	76102	-	76102	86.356	88.85	3.25	89.97	92.64	3.26
	2	78650	-	78650	89.247			93.12		
	3	76297	-	76297	86.577			90.33		
	4	82929	-	82929	94.103			98.15		
	5	77009	-	77009	87.385			91.14		
	6	78789	-	78789	89.405			93.16		
45min	1	76308	-	76308	86.590	88.75	3.10	91.17	93.54	3.11
	2	78090	-	78090	88.612			93.48		
	3	76969	-	76969	87.340			92.06		
	4	82803	-	82803	93.960			99.05		
	5	78591	-	78591	89.180			93.90		
	6	76498	-	76498	86.805			91.56		
极限	1	81812	-	81812	92.835	92.83	1.38	98.37	98.60	1.46
	2	81723	-	81723	92.734			98.58		
	3	80575	-	80575	91.431			97.12		
	4	83834	-	83834	95.130			101.26		
	5	81920	-	81920	92.958			98.67		
	6	80984	-	80984	91.896			97.61		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



培哚普利氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	DJ468-220103	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	94.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	9.95	41373	41295	41406	41338	41287	41340	0.13
2	9.99	41402	41371				41386	0.06
单位质量响应值				RSD%	判断			
4154.77				0.21	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022081302批-培哌普利-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	41376	-	41376	85.091	84.82	8.28	85.09	84.82	8.29
	2	38379	-	38379	78.927			78.93		
	3	44743	-	44743	92.015			92.02		
	4	37591	-	37591	77.307			77.31		
	5	45876	-	45876	94.345			94.35		
	6	39503	-	39503	81.239			81.24		
10min	1	43964	-	43964	90.413	94.00	3.46	91.36	94.94	3.49
	2	44434	-	44434	91.380			92.26		
	3	46581	-	46581	95.795			96.82		
	4	45804	-	45804	94.197			95.06		
	5	48308	-	48308	99.347			100.39		
	6	45160	-	45160	92.873			93.78		
15min	1	44329	-	44329	91.164	93.57	3.30	93.11	95.55	3.29
	2	44604	-	44604	91.729			93.62		
	3	44348	-	44348	91.203			93.29		
	4	45843	-	45843	94.277			96.18		
	5	48252	-	48252	99.231			101.38		
	6	45614	-	45614	93.806			95.74		
20min	1	44361	-	44361	91.229	94.62	3.05	94.19	97.65	3.07
	2	44546	-	44546	91.610			94.52		
	3	46827	-	46827	96.301			99.40		
	4	46287	-	46287	95.190			98.14		
	5	48061	-	48061	98.839			102.09		
	6	45988	-	45988	94.575			97.55		
30min	1	44589	-	44589	91.698	93.51	4.00	95.67	97.59	3.96
	2	42410	-	42410	87.217			91.15		
	3	45679	-	45679	93.940			98.11		
	4	46266	-	46266	95.147			99.16		
	5	47761	-	47761	98.222			102.57		
	6	46123	-	46123	94.853			98.88		
45min	1	44195	-	44195	90.888	93.66	2.45	95.88	98.78	2.50
	2	44500	-	44500	91.515			96.41		
	3	45527	-	45527	93.627			98.84		
	4	45673	-	45673	93.928			99.00		
	5	47264	-	47264	97.200			102.64		
	6	46110	-	46110	94.826			99.91		
极限	1	44916	-	44916	92.371	94.08	1.88	98.38	100.23	1.94
	2	44627	-	44627	91.776			97.69		
	3	45864	-	45864	94.320			100.57		
	4	45731	-	45731	94.047			100.16		
	5	46773	-	46773	96.190			102.71		
	6	46560	-	46560	95.752			101.89		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



培哚普利氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	2	系数	0.721

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.93	79610	79514	79943	79783	79835	79737	0.22
2	14.00	79958	79793				79876	0.15
单位质量响应值				RSD%	判断			
5724.12				0.24	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022081302批-氨氯地平-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	67053	-	67053	76.061	75.18	9.59	76.06	75.18	9.59
	2	59442	-	59442	67.428			67.43		
	3	71974	-	71974	81.643			81.64		
	4	59206	-	59206	67.160			67.16		
	5	74707	-	74707	84.744			84.74		
	6	65278	-	65278	74.048			74.05		
10min	1	77301	-	77301	87.686	90.40	3.98	88.53	91.23	4.01
	2	76073	-	76073	86.293			87.04		
	3	80495	-	80495	91.309			92.22		
	4	78591	-	78591	89.149			89.90		
	5	85026	-	85026	96.449			97.39		
	6	80659	-	80659	91.495			92.32		
15min	1	78021	-	78021	88.503	90.59	4.16	90.32	92.43	4.15
	2	77295	-	77295	87.679			89.39		
	3	76905	-	76905	87.237			89.16		
	4	79626	-	79626	90.323			92.06		
	5	85573	-	85573	97.069			99.08		
	6	81755	-	81755	92.738			94.58		
20min	1	78538	-	78538	89.089	92.08	3.67	91.89	94.92	3.70
	2	77218	-	77218	87.592			90.27		
	3	81971	-	81971	92.983			95.87		
	4	81115	-	81115	92.012			94.75		
	5	85504	-	85504	96.991			100.08		
	6	82705	-	82705	93.816			96.69		
30min	1	78472	-	78472	89.014	91.15	5.16	92.81	95.02	5.12
	2	73576	-	73576	83.461			87.12		
	3	80262	-	80262	91.045			94.97		
	4	81114	-	81114	92.011			95.77		
	5	85729	-	85729	97.246			101.42		
	6	83000	-	83000	94.151			98.06		
45min	1	78691	-	78691	89.263	91.74	3.08	94.04	96.62	3.15
	2	78227	-	78227	88.736			93.32		
	3	80706	-	80706	91.548			96.48		
	4	80220	-	80220	90.997			95.78		
	5	84867	-	84867	96.268			101.52		
	6	82529	-	82529	93.616			98.57		
极限	1	82048	-	82048	93.071	95.18	1.88	98.84	101.08	2.00
	2	82099	-	82099	93.129			98.70		
	3	84492	-	84492	95.843			101.80		
	4	83790	-	83790	95.047			100.84		
	5	85806	-	85806	97.334			103.65		
	6	85203	-	85203	96.650			102.65		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3057-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-rj.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μ L 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 11:59:02 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:28:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3058-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 12:03:26 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:28:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.391	41399	20.417	6783	1176	1.008	--
2	3.182	161368	79.583	20751	3835	1.018	9.742
总计		202766	100.000	27534			

图2 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3059-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 12:07:49 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:28:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	41465	20.406	6797	1175	1.009	--
2	3.180	161738	79.594	20799	3832	1.017	9.739
总计		203203	100.000	27597			

图3 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3060-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 12:12:13 实验者:jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/03/20 09:28:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	41419	20.408	6790	1174	1.008	--
2	3.180	161540	79.592	20777	3833	1.017	9.737
总计		202959	100.000	27567			

图4 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3061-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 12:16:35 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:28:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	41436	20.406	6794	1176	1.009	--
2	3.180	161624	79.594	20790	3830	1.018	9.736
总计		203060	100.000	27584			

图5 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3062-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 12:20:58 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:28:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	41385	20.400	6789	1176	1.009	--
2	3.179	161482	79.600	20768	3826	1.018	9.734
总计		202866	100.000	27557			

图6 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3063-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 12:25:20 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:28:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.397	37679	24.217	6185	1186	0.981	--
2	3.194	117908	75.783	15636	4121	1.008	9.943
总计		155587	100.000	21821			

图7 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3064-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 12:29:42 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:28:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.397	31988	24.108	5256	1187	0.982	--
2	3.194	100699	75.892	13373	4126	1.009	9.948
总计		132687	100.000	18629			

图8 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3065-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 12:34:04 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:29:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.396	33105	24.480	5480	1205	0.988	--
2	3.191	102130	75.520	13534	4098	1.009	9.964
总计		135236	100.000	19014			

图9 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3066-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 12:38:27 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:29:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.397	44790	23.964	7350	1189	0.982	--
2	3.193	142117	76.036	18799	4116	1.009	9.941
总计		186907	100.000	26149			

图10 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3067-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 12:42:50 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:29:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.396	35951	24.025	5930	1196	0.987	--
2	3.190	113689	75.975	15084	4097	1.010	9.946
总计		149640	100.000	21014			

图11 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3068-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 12:47:12 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:29:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.397	40077	24.947	6571	1185	0.983	--
2	3.191	120574	75.053	16016	4116	1.010	9.934
总计		160651	100.000	22587			

图12 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3069-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 12:51:35 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:29:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.396	45829	22.311	7511	1183	0.980	--
2	3.190	159582	77.689	21188	4111	1.010	9.932
总计		205411	100.000	28700			

图13 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3070-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 12:55:58 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:29:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.396	43229	22.674	7088	1182	0.980	--
2	3.190	147428	77.326	19572	4109	1.010	9.926
总计		190656	100.000	26660			

图14 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3071-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 13:00:21 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:29:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.396	47202	22.294	7750	1188	0.982	--
2	3.190	164526	77.706	21844	4110	1.011	9.936
总计		211728	100.000	29594			

图15 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3072-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 13:04:44 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:29:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.396	48984	22.084	8032	1183	0.981	--
2	3.189	172819	77.916	22958	4115	1.011	9.930
总计		221803	100.000	30990			

图16 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3073-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 13:09:07 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:29:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.396	45902	22.414	7530	1186	0.982	--
2	3.189	158894	77.586	21118	4115	1.011	9.932
总计		204796	100.000	28648			

图17 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3074-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 13:13:29 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:29:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.396	43598	22.647	7162	1189	0.982	--
2	3.189	148916	77.353	19795	4114	1.010	9.939
总计		192514	100.000	26958			

图18 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3075-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 13:17:52 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:29:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.395	45725	22.023	7507	1186	0.983	--
2	3.187	161900	77.977	21535	4117	1.012	9.938
总计		207625	100.000	29042			

图19 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3076-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 13:22:15 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:29:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.394	44654	22.377	7331	1185	0.981	--
2	3.187	154895	77.623	20582	4108	1.011	9.933
总计		199548	100.000	27913			

图20 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3077-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ L 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 13:26:38 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:29:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.395	47736	22.075	7835	1185	0.982	--
2	3.188	168512	77.925	22381	4110	1.010	9.928
总计		216248	100.000	30215			

图21 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3078-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 13:31:01 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:29:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.396	47612	21.841	7814	1187	0.981	--
2	3.188	170381	78.159	22614	4103	1.010	9.923
总计		217993	100.000	30428			

图22 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3079-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 13:35:24 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:29:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.395	46831	21.751	7697	1190	0.983	--
2	3.187	168474	78.249	22388	4114	1.011	9.938
总计		215305	100.000	30084			

图23 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3080-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 13:39:46 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:29:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.395	44232	22.526	7254	1185	0.981	--
2	3.187	152131	77.474	20220	4113	1.011	9.932
总计		196362	100.000	27474			

图24 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3081-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 13:44:09 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:29:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.395	45890	21.957	7544	1190	0.982	--
2	3.187	163112	78.043	21665	4111	1.010	9.934
总计		209002	100.000	29208			

图25 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3082-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 13:48:33 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:29:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.395	46723	22.052	7664	1184	0.981	--
2	3.187	165155	77.948	21933	4113	1.010	9.927
总计		211878	100.000	29597			

图26 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3083-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 13:52:55 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:29:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.395	47549	22.111	7781	1180	0.980	--
2	3.185	167493	77.889	22251	4122	1.011	9.924
总计		215042	100.000	30033			

图27 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3084-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 13:57:18 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:29:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.394	47727	21.828	7827	1185	0.982	--
2	3.185	170929	78.172	22670	4107	1.011	9.925
总计		218657	100.000	30497			

图28 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3085-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 14:01:40 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:29:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.394	46886	21.683	7699	1187	0.980	--
2	3.185	169344	78.317	22451	4109	1.011	9.929
总计		216230	100.000	30149			

图29 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3086-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 14:06:02 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:29:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.394	44417	22.509	7293	1186	0.980	--
2	3.185	152914	77.491	20278	4108	1.010	9.929
总计		197331	100.000	27571			

图30 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3087-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 14:10:25 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:30:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.395	45836	22.191	7531	1189	0.981	--
2	3.185	160714	77.809	21318	4111	1.010	9.935
总计		206549	100.000	28849			

图31 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3088-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 14:14:48 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:30:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.395	45783	22.359	7539	1193	0.982	--
2	3.186	158981	77.641	21115	4113	1.010	9.941
总计		204763	100.000	28654			

图32 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3089-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 14:19:11 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:30:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.395	46666	22.118	7657	1186	0.981	--
2	3.185	164324	77.882	21805	4110	1.011	9.926
总计		210990	100.000	29462			

图33 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3090-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 14:23:33 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:30:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.394	46850	21.777	7694	1188	0.981	--
2	3.184	168284	78.223	22290	4105	1.011	9.929
总计		215134	100.000	29984			

图34 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3091-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 14:27:55 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:30:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.394	46695	21.679	7672	1188	0.981	--
2	3.185	168693	78.321	22392	4116	1.012	9.936
总计		215388	100.000	30064			

图35 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3092-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 14:32:17 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:30:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.394	44795	22.408	7358	1188	0.981	--
2	3.185	155107	77.592	20596	4114	1.011	9.937
总计		199902	100.000	27954			

图36 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3093-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 14:36:41 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:30:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.393	45461	21.862	7459	1187	0.981	--
2	3.184	162486	78.138	21553	4110	1.011	9.936
总计		207947	100.000	29012			

图37 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3094-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 14:41:04 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:30:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.393	46189	22.297	7572	1188	0.981	--
2	3.183	160966	77.703	21361	4110	1.011	9.939
总计		207155	100.000	28933			

图38 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3095-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 14:45:27 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:30:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.394	46258	22.099	7599	1189	0.981	--
2	3.184	163064	77.901	21621	4112	1.011	9.937
总计		209323	100.000	29220			

图39 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3096-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 14:49:48 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:30:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.394	47474	21.736	7772	1181	0.979	--
2	3.184	170933	78.264	22658	4111	1.011	9.922
总计		218407	100.000	30430			

图40 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3097-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 14:54:11 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:30:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.394	46219	21.616	7589	1188	0.980	--
2	3.184	167600	78.384	22213	4107	1.011	9.930
总计		213819	100.000	29802			

图41 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3098-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 14:58:34 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:30:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.393	44588	22.444	7310	1187	0.980	--
2	3.183	154074	77.556	20447	4110	1.009	9.935
总计		198662	100.000	27756			

图42 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3099-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 15:02:57 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:30:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.393	45650	21.335	7491	1191	0.980	--
2	3.182	168314	78.665	22353	4102	1.011	9.935
总计		213963	100.000	29844			

图43 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3100-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 15:07:20 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:30:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.393	47703	21.400	7796	1182	0.979	--
2	3.182	175204	78.600	23292	4111	1.012	9.926
总计		222907	100.000	31087			

图44 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3101-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 15:11:44 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:30:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.393	47014	21.468	7711	1189	0.981	--
2	3.182	171981	78.532	22873	4113	1.012	9.939
总计		218994	100.000	30585			

图45 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3102-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 15:16:06 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:30:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.394	47076	21.352	7735	1190	0.980	--
2	3.183	173402	78.648	23029	4111	1.012	9.935
总计		220478	100.000	30764			

图46 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3103-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 15:20:29 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:30:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.394	46340	21.238	7603	1188	0.982	--
2	3.183	171855	78.762	22817	4107	1.011	9.929
总计		218196	100.000	30421			

图47 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3104-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 15:24:51 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:30:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.393	45798	21.334	7509	1187	0.981	--
2	3.182	168877	78.666	22444	4111	1.011	9.932
总计		214675	100.000	29953			

图48 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3105-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 15:29:15 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:30:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	41489	20.436	6806	1175	1.009	--
2	3.168	161534	79.564	20802	3829	1.018	9.731
总计		203023	100.000	27608			

图49 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3106-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ L 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 15:33:38 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:30:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	41485	20.465	6806	1174	1.009	--
2	3.168	161229	79.535	20790	3843	1.017	9.736
总计		202715	100.000	27596			

图50 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3107-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-rj.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 15:38:03 实验者:jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/03/20 09:30:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图51 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3108-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 15:42:28 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:30:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	41453	20.448	6787	1173	1.010	--
2	3.166	161268	79.552	20793	3826	1.018	9.724
总计		202720	100.000	27580			

图52 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3109-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 15:46:53 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:30:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.384	41480	20.446	6789	1172	1.009	--
2	3.167	161395	79.554	20800	3825	1.018	9.725
总计		202875	100.000	27589			

图53 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3110-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 15:51:19 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:31:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.384	41457	20.437	6793	1175	1.009	--
2	3.166	161397	79.563	20825	3829	1.018	9.731
总计		202854	100.000	27617			

图54 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3111-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 15:55:43 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:31:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.384	41434	20.425	6796	1177	1.009	--
2	3.166	161423	79.575	20834	3830	1.018	9.737
总计		202857	100.000	27630			

图55 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3112-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 16:00:08 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:31:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.384	41399	20.446	6775	1171	1.009	--
2	3.166	161086	79.554	20768	3825	1.018	9.725
总计		202485	100.000	27543			

图56 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3113-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 16:04:33 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:31:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.393	41462	24.078	6800	1190	0.980	--
2	3.182	130736	75.922	17403	4112	1.008	9.943
总计		172198	100.000	24203			

图57 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3114-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 16:08:56 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:31:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.392	38972	24.274	6396	1188	0.982	--
2	3.181	121580	75.726	16217	4117	1.010	9.943
总计		160552	100.000	22614			

图58 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3115-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 16:13:20 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:31:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.392	39140	24.611	6423	1187	0.981	--
2	3.181	119894	75.389	16005	4124	1.010	9.945
总计		159034	100.000	22428			

图59 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3116-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 16:17:45 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:31:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.392	40314	24.137	6597	1186	0.983	--
2	3.181	126708	75.863	16863	4106	1.008	9.930
总计		167022	100.000	23460			

图60 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3117-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 16:22:08 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:31:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.392	33708	24.286	5529	1190	0.981	--
2	3.182	105091	75.714	14010	4117	1.008	9.946
总计		138800	100.000	19539			

图61 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3118-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 16:26:31 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:31:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.392	37461	24.298	6153	1188	0.983	--
2	3.182	116714	75.702	15536	4108	1.010	9.941
总计		154175	100.000	21689			

图62 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3119-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 16:30:55 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:31:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.391	44770	22.280	7360	1186	0.982	--
2	3.180	156169	77.720	20791	4102	1.010	9.935
总计		200939	100.000	28152			

图63 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3120-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 16:35:19 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:31:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.391	44576	22.322	7319	1186	0.982	-
2	3.180	155116	77.678	20661	4109	1.010	9.942
总计		199691	100.000	27980			

图64 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3121-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 16:39:43 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:31:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.391	44443	22.865	7298	1184	0.981	--
2	3.180	149929	77.135	19971	4111	1.010	9.938
总计		194372	100.000	27269			

图65 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3122-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 16:44:07 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:31:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.391	44813	22.636	7380	1190	0.981	--
2	3.180	153164	77.364	20394	4105	1.010	9.947
总计		197978	100.000	27774			

图66 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3123-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 16:48:32 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:31:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	40691	22.513	6695	1184	0.982	--
2	3.181	140050	77.487	18638	4102	1.009	9.938
总计		180741	100.000	25333			

图67 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3124-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 16:52:56 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:31:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.392	43003	22.304	7065	1190	0.981	-
2	3.181	149805	77.696	19932	4106	1.010	9.943
总计		192809	100.000	26997			

图68 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3125-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 16:57:20 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:31:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	44463	22.120	7317	1186	0.981	--
2	3.180	156543	77.880	20852	4107	1.011	9.942
总计		201006	100.000	28169			

图69 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3126-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 17:01:43 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:31:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.391	44923	22.167	7397	1187	0.981	--
2	3.180	157737	77.833	20994	4100	1.010	9.939
总计		202660	100.000	28391			

图70 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3127-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 17:06:08 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:31:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	44496	22.618	7318	1184	0.981	--
2	3.180	152234	77.382	20273	4100	1.011	9.935
总计		196730	100.000	27591			

图71 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3128-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 17:10:32 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:31:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.391	45177	22.328	7425	1189	0.981	--
2	3.181	157155	77.672	20913	4102	1.010	9.941
总计		202332	100.000	28338			

图72 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3129-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 17:14:56 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:31:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.391	42187	22.458	6934	1188	0.984	--
2	3.181	145662	77.542	19382	4104	1.009	9.941
总计		187849	100.000	26317			

图73 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3130-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 17:19:18 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:31:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.392	43997	22.168	7229	1190	0.982	--
2	3.182	154476	77.832	20564	4108	1.010	9.944
总计		198473	100.000	27793			

图74 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3131-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 17:23:42 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:31:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.391	45273	22.129	7438	1184	0.981	--
2	3.180	159317	77.871	21231	4109	1.012	9.938
总计		204590	100.000	28669			

图75 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3132-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 17:28:07 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:31:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	44709	22.258	7374	1189	0.981	--
2	3.180	156162	77.742	20791	4104	1.010	9.950
总计		200871	100.000	28165			

图76 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3133-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 17:32:31 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:32:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	44467	22.550	7310	1184	0.980	--
2	3.180	152725	77.450	20334	4103	1.009	9.938
总计		197192	100.000	27644			

图77 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3134-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 17:36:54 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:32:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	44799	22.324	7382	1187	0.982	--
2	3.179	155874	77.676	20756	4107	1.010	9.946
总计		200673	100.000	28138			

图78 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3135-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 17:41:19 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:32:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.391	42918	22.453	7057	1187	0.981	--
2	3.180	148230	77.547	19737	4104	1.010	9.940
总计		191148	100.000	26794			

图79 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3136-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 17:45:42 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:32:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.391	43339	22.172	7130	1188	0.981	--
2	3.180	152125	77.828	20251	4104	1.010	9.940
总计		195465	100.000	27381			

图80 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3137-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 17:50:06 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:32:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	44783	22.104	7373	1185	0.982	--
2	3.179	157822	77.896	21023	4106	1.012	9.940
总计		202606	100.000	28396			

图81 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3138-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 17:54:32 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:32:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	44751	22.326	7361	1184	0.981	--
2	3.179	155693	77.674	20722	4101	1.011	9.936
总计		200444	100.000	28083			

图82 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3139-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 17:58:56 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:32:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	44605	22.637	7344	1186	0.981	--
2	3.179	152435	77.363	20308	4109	1.010	9.945
总计		197040	100.000	27652			

图83 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3140-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 18:03:19 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:32:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	44791	22.254	7372	1184	0.980	--
2	3.179	156482	77.746	20821	4098	1.010	9.934
总计		201272	100.000	28193			

图84 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3141-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 18:07:44 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:32:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.391	42910	22.504	7069	1189	0.982	--
2	3.179	147765	77.496	19683	4109	1.009	9.945
总计		190674	100.000	26752			

图85 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3142-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 18:12:08 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:32:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	43164	22.165	7111	1188	0.981	--
2	3.179	151579	77.835	20177	4101	1.010	9.938
总计		194743	100.000	27288			

图86 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3143-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 18:16:33 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:32:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	44441	21.980	7320	1186	0.980	--
2	3.178	157744	78.020	20962	4096	1.009	9.934
总计		202185	100.000	28282			

图87 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3144-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 18:20:58 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:32:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	44339	22.232	7304	1184	0.982	--
2	3.177	155096	77.768	20599	4098	1.010	9.934
总计		199435	100.000	27903			

图88 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3145-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 18:25:21 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:32:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	44673	22.458	7366	1186	0.981	--
2	3.177	154247	77.542	20493	4099	1.009	9.938
总计		198921	100.000	27859			

图89 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3146-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 18:29:46 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:32:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	44868	22.198	7399	1185	0.981	--
2	3.177	157261	77.802	20892	4103	1.010	9.938
总计		202129	100.000	28291			

图90 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3147-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 18:34:09 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:32:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	43423	22.498	7158	1187	0.982	--
2	3.177	149586	77.502	19874	4104	1.009	9.939
总计		193009	100.000	27032			

图91 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3148-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 18:38:34 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:32:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.390	43532	22.189	7176	1188	0.981	--
2	3.177	152656	77.811	20342	4112	1.012	9.945
总计		196188	100.000	27518			

图92 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3149-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 18:42:59 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:32:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	44427	21.535	7325	1188	0.981	--
2	3.176	161875	78.465	21485	4105	1.011	9.939
总计		206303	100.000	28810			

图93 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3150-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 18:47:24 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:32:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	44990	21.438	7427	1188	0.982	--
2	3.175	164871	78.562	21876	4092	1.011	9.932
总计		209860	100.000	29303			

图94 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3151-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 18:51:48 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:32:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	45423	21.409	7492	1185	0.982	--
2	3.176	166746	78.591	22142	4102	1.012	9.935
总计		212169	100.000	29634			

图95 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3152-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 18:56:12 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:32:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	44948	21.429	7421	1188	0.982	--
2	3.175	164805	78.571	21895	4098	1.010	9.940
总计		209754	100.000	29316			

图96 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3153-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 19:00:35 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:32:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	44777	21.389	7383	1185	0.980	--
2	3.175	164572	78.611	21873	4098	1.011	9.935
总计		209349	100.000	29256			

图97 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3154-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 19:05:00 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:32:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	44366	21.254	7322	1190	0.983	--
2	3.176	164374	78.746	21818	4102	1.011	9.939
总计		208741	100.000	29140			

图98 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3155-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 19:09:23 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:33:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.381	41484	20.452	6843	1173	1.008	--
2	3.161	161353	79.548	20855	3832	1.018	9.737
总计		202837	100.000	27698			

图99 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3156-2 - zzp-2022081001p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20μL 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/19 19:13:49 实验者:jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:33:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.382	41479	20.440	6840	1174	1.009	--
2	3.162	161452	79.560	20878	3832	1.018	9.739
总计		202932	100.000	27718			

图100 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081001批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3157-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-rj.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 19:18:11 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/03/20 09:33:07 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计						

图101 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3158-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 19:22:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:33:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.381	41449	6822	1165	1.009	--
2	3.161	79942	10347	3823	1.016	9.723
总计		121390	17170			

图102 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3159-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 19:26:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:33:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.380	41457	6822	1167	1.010	--
2	3.161	79955	10350	3822	1.016	9.725
总计		121411	17173			

图103 培哌普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3160-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 19:31:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:33:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.380	41512	6827	1164	1.010	--
2	3.161	79865	10349	3833	1.016	9.729
总计		121377	17177			

图104 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3161-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 19:35:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:33:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.380	41427	6822	1168	1.010	--
2	3.161	79938	10349	3822	1.016	9.726
总计		121365	17170			

图105 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3162-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 19:40:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:33:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.380	41435	6821	1166	1.009	--
2	3.160	79757	10338	3835	1.016	9.732
总计		121193	17160			

图106 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3163-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 19:44:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:33:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	40158	6655	1196	0.981	--
2	3.175	61698	8258	4126	1.010	9.973
总计		101856	14913			

图107 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3164-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 19:48:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:33:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	44248	7317	1191	0.983	--
2	3.176	71776	9573	4118	1.008	9.962
总计		116024	16890			

图108 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3165-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 19:53:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:33:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	42635	7051	1188	0.982	--
2	3.175	68833	9231	4132	1.012	9.967
总计		111469	16282			

图109 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3166-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 19:57:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:33:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	45046	7463	1197	0.984	--
2	3.176	73874	9858	4121	1.008	9.972
总计		118920	17321			

图110 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3167-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 20:01:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:33:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	40708	6757	1200	0.984	--
2	3.176	64372	8619	4133	1.010	9.987
总计		105081	15376			

图111 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3168-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 20:06:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:33:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	41712	6907	1193	0.984	--
2	3.175	65264	8748	4142	1.010	9.985
总计		106975	15655			

图112 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3169-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 20:10:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:33:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	43345	7181	1194	0.982	--
2	3.176	73772	9856	4134	1.009	9.980
总计		117118	17038			

图113 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3170-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 20:15:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:33:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	44663	7378	1188	0.983	--
2	3.175	78717	10538	4125	1.012	9.959
总计		123380	17916			

图114 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3171-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 20:19:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:33:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	44386	7340	1192	0.984	--
2	3.175	76226	10193	4127	1.008	9.970
总计		120611	17533			

图115 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3172-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 20:23:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:33:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	46727	7739	1194	0.984	--
2	3.175	81951	10942	4117	1.009	9.968
总计		128677	18681			

图116 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3173-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 20:28:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:33:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	44287	7339	1196	0.984	--
2	3.175	77106	10302	4119	1.009	9.973
总计		121394	17641			

图117 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3174-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 20:32:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:33:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	44697	7399	1193	0.984	--
2	3.175	77301	10328	4116	1.008	9.964
总计		121998	17728			

图118 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3175-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 20:36:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:33:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	43712	7235	1191	0.982	--
2	3.174	75685	10111	4116	1.009	9.962
总计		119397	17347			

图119 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3176-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 20:41:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:34:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	44169	7303	1189	0.983	--
2	3.175	77962	10417	4113	1.009	9.958
总计		122130	17720			

图120 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3177-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 20:45:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:34:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	44407	7343	1191	0.984	--
2	3.176	76798	10241	4124	1.008	9.966
总计		121204	17584			

图121 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3178-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 20:50:04 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/03/20 09:34:08 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.389	46482	7699	1196	0.984	--
2	3.176	82455	10996	4124	1.009	9.972
总计		128937	18695			

图122 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3179-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 20:54:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:34:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	44560	7379	1194	0.984	--
2	3.176	78382	10457	4120	1.007	9.972
总计		122941	17836			

图123 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3180-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 20:58:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:34:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	44476	7365	1194	0.984	--
2	3.176	77593	10358	4126	1.008	9.971
总计		122069	17723			

图124 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3181-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 21:03:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:34:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	43409	7180	1190	0.982	--
2	3.174	75641	10113	4113	1.009	9.963
总计		119050	17293			

图125 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3182-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 21:07:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:34:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	44430	7353	1192	0.983	--
2	3.175	78714	10516	4124	1.009	9.970
总计		123144	17869			

图126 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3183-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 21:11:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:34:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	43790	7245	1190	0.982	--
2	3.174	75919	10159	4123	1.010	9.967
总计		119708	17404			

图127 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3184-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 21:16:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:34:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	46182	7651	1192	0.983	--
2	3.174	82587	11052	4121	1.010	9.967
总计		128769	18703			

图128 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3185-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 21:20:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:34:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	43938	7279	1195	0.983	--
2	3.175	77631	10368	4122	1.010	9.969
总计		121570	17647			

图129 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3186-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 21:25:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:34:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.388	44469	7377	1197	0.982	--
2	3.175	77930	10423	4130	1.009	9.979
总计		122399	17800			

图130 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3187-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 21:29:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:34:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	43651	7217	1187	0.982	--
2	3.174	76102	10199	4128	1.011	9.964
总计		119754	17415			

图131 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3188-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 21:33:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:34:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	44243	7314	1188	0.983	--
2	3.174	78650	10531	4122	1.010	9.966
总计		122893	17845			

图132 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3189-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 21:38:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:34:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	43834	7254	1191	0.983	--
2	3.174	76297	10208	4117	1.009	9.966
总计		120130	17462			

图133 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3190-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 21:42:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:34:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	46558	7702	1191	0.983	--
2	3.173	82929	11105	4118	1.009	9.964
总计		129487	18807			

图134 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3191-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 21:46:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:34:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	43760	7257	1196	0.983	--
2	3.173	77009	10349	4142	1.009	9.988
总计		120770	17606			

图135 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3192-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 21:51:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:34:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	44722	7420	1198	0.983	--
2	3.173	78789	10563	4124	1.010	9.983
总计		123511	17983			

图136 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3193-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 21:55:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:34:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	43370	7178	1191	0.981	--
2	3.172	76308	10233	4125	1.010	9.973
总计		119679	17410			

图137 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3194-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 21:59:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:34:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	43674	7232	1193	0.982	--
2	3.172	78090	10478	4123	1.009	9.975
总计		121764	17709			

图138 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3195-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 22:04:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:34:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	43968	7293	1197	0.984	--
2	3.171	76969	10346	4137	1.011	9.984
总计		120938	17639			

图139 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3196-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 22:08:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:34:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	45814	7600	1198	0.984	--
2	3.170	82803	11107	4131	1.009	9.975
总计		128617	18707			

图140 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3197-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 22:13:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:35:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	44187	7331	1197	0.984	--
2	3.169	78591	10530	4127	1.010	9.967
总计		122779	17861			

图141 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3198-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 22:17:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:35:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	43015	7144	1199	0.985	--
2	3.167	76498	10258	4138	1.010	9.978
总计		119513	17401			

图142 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3199-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 22:21:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:35:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	44143	7324	1198	0.985	--
2	3.166	81812	10995	4135	1.013	9.970
总计		125955	18319			

图143 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3200-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 22:26:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:35:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	44046	7313	1201	0.985	--
2	3.165	81723	11004	4148	1.011	9.981
总计		125768	18317			

图144 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3201-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 22:30:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:35:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	44061	7322	1203	0.984	--
2	3.164	80575	10866	4149	1.011	9.979
总计		124636	18188			

图145 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3202-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 22:34:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:35:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	45730	7598	1202	0.984	--
2	3.164	83834	11292	4140	1.013	9.971
总计		129564	18890			

图146 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3203-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 22:39:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:35:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	44703	7438	1205	0.984	--
2	3.164	81920	11057	4154	1.014	9.983
总计		126623	18495			

图147 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3204-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 22:43:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:35:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	44432	7391	1204	0.985	--
2	3.163	80984	10920	4144	1.011	9.974
总计		125417	18311			

图148 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3205-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 22:48:02 实验者 : jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/03/20 09:35:23 处理者 : jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	41452	6832	1171	1.013	--
2	3.148	79651	10408	3846	1.020	9.727
总计		121103	17240			

图149 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3206-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx1-jf50z-pH4.5-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 22:52:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:35:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	41423	6843	1174	1.013	--
2	3.148	79684	10411	3849	1.020	9.727
总计		121107	17253			

图150 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3207-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-rj.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 22:56:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:35:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计						

图151 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3208-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 23:01:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:35:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	41373	6827	1175	1.013	--
2	3.146	79610	10413	3854	1.021	9.736
总计		120984	17240			

图152 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3209-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 23:05:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:35:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.378	41295	6824	1176	1.011	--
2	3.147	79514	10399	3852	1.021	9.735
总计		120809	17223			

图153 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3210-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 23:10:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:35:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	41406	6833	1174	1.013	--
2	3.145	79943	10438	3852	1.019	9.732
总计		121350	17271			

图154 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3211-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 23:14:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:35:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	41338	6819	1174	1.012	--
2	3.146	79783	10415	3845	1.018	9.730
总计		121121	17234			

图155 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3212-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 23:18:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/20 09:35:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.377	41287	6827	1178	1.011	--
2	3.146	79835	10418	3844	1.018	9.732
总计		121122	17245			

图156 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3213-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 23:23:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:35:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	41376	6901	1213	0.986	--
2	3.161	67053	9052	4153	1.012	9.996
总计		108429	15954			

图157 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3214-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 23:27:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:35:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	38379	6414	1217	0.987	--
2	3.161	59442	8032	4159	1.011	10.009
总计		97821	14445			

图158 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3215-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 23:32:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:35:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.387	44743	7480	1217	0.986	--
2	3.162	71974	9724	4164	1.013	10.002
总计		116716	17203			

图159 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3216-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 23:36:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:35:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	37591	6265	1213	0.987	--
2	3.160	59206	7992	4161	1.012	10.003
总计		96797	14257			

图160 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3217-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 23:40:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:35:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	45876	7645	1208	0.985	--
2	3.162	74707	10091	4160	1.012	9.986
总计		120583	17736			

图161 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3218-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 23:45:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:35:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	39503	6594	1213	0.987	--
2	3.161	65278	8817	4163	1.012	9.996
总计		104781	15410			

图162 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3219-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 23:49:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:36:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	43964	7336	1214	0.987	--
2	3.160	77301	10429	4156	1.014	9.996
总计		121265	17765			

图163 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3220-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 23:53:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:36:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	44434	7414	1213	0.985	--
2	3.160	76073	10270	4163	1.014	9.997
总计		120507	17684			

图164 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3221-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/19 23:58:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:36:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	46581	7760	1211	0.986	--
2	3.160	80495	10842	4151	1.012	9.990
总计		127077	18602			

图165 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3222-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 00:02:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:36:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	45804	7651	1217	0.986	--
2	3.160	78591	10584	4150	1.011	9.993
总计		124395	18235			

图166 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3223-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 00:07:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:36:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	48308	8033	1208	0.986	--
2	3.159	85026	11441	4148	1.012	9.982
总计		133334	19474			

图167 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3224-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 00:11:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:36:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	45160	7537	1216	0.986	--
2	3.160	80659	10862	4152	1.011	9.998
总计		125819	18399			

图168 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3225-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 00:15:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:36:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	44329	7392	1213	0.986	--
2	3.160	78021	10542	4169	1.013	10.004
总计		122350	17935			

图169 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3226-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 00:20:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:36:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	44604	7436	1213	0.985	--
2	3.161	77295	10449	4166	1.013	10.005
总计		121900	17885			

图170 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3227-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 00:24:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:36:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	44348	7388	1212	0.988	--
2	3.160	76905	10377	4162	1.014	9.998
总计		121253	17765			

图171 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3228-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 00:28:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:36:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	45843	7637	1210	0.986	--
2	3.160	79626	10720	4155	1.012	9.989
总计		125469	18357			

图172 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3229-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 00:33:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:36:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	48252	8044	1212	0.986	--
2	3.161	85573	11541	4156	1.012	9.997
总计		133824	19586			

图173 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3230-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 00:37:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:36:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	45614	7609	1211	0.985	--
2	3.160	81755	11014	4156	1.012	9.991
总计		127369	18623			

图174 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3231-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 00:42:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:36:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.384	44361	7390	1213	0.988	--
2	3.159	78538	10569	4152	1.012	9.996
总计		122899	17959			

图175 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3232-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 00:46:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:36:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	44546	7427	1214	0.986	--
2	3.160	77218	10432	4170	1.015	10.007
总计		121765	17858			

图176 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3233-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 00:50:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:36:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	46827	7809	1213	0.986	--
2	3.160	81971	11054	4165	1.012	9.998
总计		128798	18863			

图177 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3234-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 00:55:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:36:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	46287	7728	1217	0.987	--
2	3.159	81115	10921	4157	1.013	10.003
总计		127402	18648			

图178 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3235-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 00:59:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:36:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.384	48061	8004	1213	0.986	--
2	3.158	85504	11527	4161	1.013	10.002
总计		133565	19531			

图179 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3236-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 01:04:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/20 09:36:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	45988	7692	1220	0.985	--
2	3.160	82705	11150	4162	1.012	10.010
总计		128693	18842			

图180 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3237-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 01:08:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:36:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	44589	7443	1216	0.987	--
2	3.160	78472	10604	4165	1.015	10.006
总计		123061	18046			

图181 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3238-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 01:12:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:36:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	42410	7079	1216	0.988	--
2	3.159	73576	9927	4165	1.015	10.005
总计		115987	17006			

图182 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3239-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 01:17:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:36:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	45679	7596	1209	0.985	--
2	3.160	80262	10812	4161	1.013	9.994
总计		125941	18408			

图183 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3240-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 01:21:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:37:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	46266	7714	1212	0.986	--
2	3.159	81114	10926	4163	1.012	9.996
总计		127380	18640			

图184 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3241-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 01:26:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:37:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	47761	7987	1221	0.986	--
2	3.160	85729	11566	4172	1.012	10.018
总计		133490	19553			

图185 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3242-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 01:30:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:37:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	46123	7700	1218	0.985	--
2	3.159	83000	11192	4159	1.013	10.004
总计		129123	18892			

图186 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3243-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 01:34:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:37:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.384	44195	7365	1214	0.988	--
2	3.158	78691	10615	4158	1.013	9.997
总计		122885	17981			

图187 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3244-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 01:39:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:37:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	44500	7427	1216	0.987	--
2	3.159	78227	10539	4159	1.012	10.003
总计		122727	17966			

图188 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3245-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 01:43:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:37:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	45527	7605	1217	0.986	--
2	3.160	80706	10874	4164	1.013	10.007
总计		126233	18479			

图189 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3246-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 01:48:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:37:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.384	45673	7615	1215	0.988	--
2	3.159	80220	10811	4157	1.013	9.999
总计		125893	18426			

图190 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3247-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 01:52:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:37:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	47264	7894	1216	0.987	--
2	3.160	84867	11447	4168	1.013	10.003
总计		132131	19341			

图191 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3248-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 01:56:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:37:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	46110	7721	1221	0.986	--
2	3.161	82529	11166	4177	1.014	10.018
总计		128639	18887			

图192 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3249-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 02:01:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:37:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.384	44916	7494	1218	0.987	--
2	3.159	82048	11049	4157	1.013	10.010
总计		126964	18542			

图193 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3250-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 02:05:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:37:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	44627	7446	1215	0.987	--
2	3.159	82099	11066	4166	1.012	10.004
总计		126726	18513			

图194 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3251-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 02:10:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:37:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.384	45864	7627	1211	0.988	--
2	3.159	84492	11378	4155	1.014	9.994
总计		130356	19005			

图195 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3252-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 02:14:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:37:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.384	45731	7641	1219	0.988	--
2	3.158	83790	11294	4158	1.013	10.008
总计		129520	18934			

图196 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3253-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 02:18:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2024/03/20 09:37:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	46773	7794	1214	0.986	--
2	3.158	85806	11573	4158	1.014	9.997
总计		132578	19367			

图197 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3254-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 02:23:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:37:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	46560	7770	1216	0.985	--
2	3.159	85203	11481	4162	1.012	10.007
总计		131763	19251			

图198 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3255-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 02:27:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:37:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	41402	6835	1176	1.012	--
2	3.145	79958	10450	3857	1.019	9.739
总计		121361	17285			

图199 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 27-32/27-3256-2 - zzp-2022081302p-rcqx-jyx2-jf50z-pH4.5-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240319-FX276.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240319-rcqx-FX276.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/20 02:32:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2024/03/20 09:37:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm						
峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.376	41371	6821	1175	1.013	--
2	3.144	79793	10427	3858	1.020	9.741
总计		121164	17249			

图200 培哌普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302批-醋酸盐缓冲液 (pH4.5)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2