



诺氟沙星项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	130450-201907	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.60	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.12	3942802	3942758	3944085	3942399	3944384	3943286	0.03
2	10.18	3941224	3939165				3940194	0.04

单位质量响应值		RSD%	判断
389652.77	387052.46	0.48	数据可信



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24032101批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	974348	-	974348	22.490	21.13	14.45	22.49	21.13	14.44
	2	818760	-	818760	18.899			18.90		
	3	696914	-	696914	16.086			16.09		
	4	1053025	-	1053025	24.306			24.31		
	5	995631	-	995631	22.982			22.98		
	6	954185	-	954185	22.025			22.02		
10min	1	2100837	-	2100837	48.492	48.77	3.83	48.53	48.81	3.83
	2	2018648	-	2018648	46.595			46.63		
	3	2123060	-	2123060	49.005			49.03		
	4	2220051	-	2220051	51.244			51.28		
	5	2185111	-	2185111	50.438			50.48		
	6	2030469	-	2030469	46.868			46.90		
15min	1	2921367	-	2921367	67.432	68.32	2.67	67.55	68.44	2.67
	2	2906241	-	2906241	67.083			67.19		
	3	2989779	-	2989779	69.011			69.12		
	4	3045545	-	3045545	70.298			70.42		
	5	3044075	-	3044075	70.264			70.39		
	6	2852569	-	2852569	65.844			65.96		
20min	1	3494818	-	3494818	80.669	81.39	1.99	80.90	81.62	1.99
	2	3509987	-	3509987	81.019			81.24		
	3	3558416	-	3558416	82.137			82.36		
	4	3588986	-	3588986	82.842			83.09		
	5	3594437	-	3594437	82.968			83.21		
	6	3409164	-	3409164	78.692			78.92		
30min	1	4060094	-	4060094	93.717	94.45	1.59	94.08	94.82	1.59
	2	4048469	-	4048469	93.448			93.80		
	3	4163509	-	4163509	96.104			96.46		
	4	4142013	-	4142013	95.607			95.99		
	5	4137328	-	4137328	95.499			95.88		
	6	4000384	-	4000384	92.338			92.69		
45min	1	4283878	-	4283878	98.882	99.91	1.45	99.40	100.43	1.45
	2	4269071	-	4269071	98.540			99.05		
	3	4384510	-	4384510	101.205			101.73		
	4	4415679	-	4415679	101.924			102.46		
	5	4344305	-	4344305	100.277			100.81		
	6	4273454	-	4273454	98.641			99.15		
60min	1	4378493	-	4378493	101.066	101.61	2.42	101.75	102.30	2.41
	2	4295197	-	4295197	99.143			99.82		
	3	4393148	-	4393148	101.404			102.09		
	4	4607247	-	4607247	106.346			107.06		
	5	4366038	-	4366038	100.779			101.48		
	6	4372851	-	4372851	100.936			101.61		
极限	1	4365848	-	4365848	100.774	101.90	1.95	101.63	102.76	1.94
	2	4311032	-	4311032	99.509			100.35		
	3	4456931	-	4456931	102.877			103.73		
	4	4522670	-	4522670	104.394			105.28		
	5	4343205	-	4343205	100.251			101.12		
	6	4487366	-	4487366	103.579			104.42		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



诺氟沙星项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	130450-201907	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.60	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.12	3940331	3941097	3942091	3945734	3942755	3942402	0.06
2	10.18	3935899	3937993				3936946	0.04
单位质量响应值				RSD%	判断			
389565.42				0.52	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24032102批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	807908	-	807908	18.658	20.46	7.95	18.66	20.46	7.95
	2	935981	-	935981	21.616			21.62		
	3	938891	-	938891	21.683			21.68		
	4	844545	-	844545	19.504			19.50		
	5	818098	-	818098	18.894			18.89		
	6	969903	-	969903	22.399			22.40		
10min	1	1997870	-	1997870	46.140	47.61	3.15	46.17	47.64	3.15
	2	2088403	-	2088403	48.231			48.27		
	3	2088661	-	2088661	48.237			48.27		
	4	1963047	-	1963047	45.336			45.37		
	5	2120620	-	2120620	48.975			49.01		
	6	2109487	-	2109487	48.718			48.75		
15min	1	2866830	-	2866830	66.208	67.05	1.88	66.32	67.17	1.88
	2	2918855	-	2918855	67.410			67.53		
	3	2899929	-	2899929	66.972			67.09		
	4	2833645	-	2833645	65.442			65.55		
	5	2994907	-	2994907	69.166			69.28		
	6	2905948	-	2905948	67.111			67.23		
20min	1	3453001	-	3453001	79.745	80.47	1.26	79.96	80.70	1.26
	2	3489077	-	3489077	80.579			80.81		
	3	3462344	-	3462344	79.961			80.19		
	4	3437141	-	3437141	79.379			79.60		
	5	3556670	-	3556670	82.140			82.37		
	6	3507690	-	3507690	81.008			81.24		
30min	1	4020310	-	4020310	92.847	93.40	0.68	93.20	93.76	0.68
	2	4038186	-	4038186	93.260			93.62		
	3	4018511	-	4018511	92.806			93.17		
	4	4033458	-	4033458	93.151			93.50		
	5	4086298	-	4086298	94.371			94.74		
	6	4067994	-	4067994	93.948			94.31		
45min	1	4288693	-	4288693	99.045	99.24	1.00	99.55	99.75	0.99
	2	4338621	-	4338621	100.198			100.72		
	3	4334592	-	4334592	100.105			100.62		
	4	4272768	-	4272768	98.677			99.18		
	5	4228089	-	4228089	97.646			98.17		
	6	4319545	-	4319545	99.758			100.28		
60min	1	4345518	-	4345518	100.358	100.33	1.59	101.03	101.01	1.58
	2	4412975	-	4412975	101.915			102.60		
	3	4425724	-	4425724	102.210			102.89		
	4	4319494	-	4319494	99.757			100.43		
	5	4237092	-	4237092	97.854			98.54		
	6	4325706	-	4325706	99.900			100.59		
极限	1	4333036	-	4333036	100.069	100.67	1.96	100.91	101.52	1.95
	2	4472775	-	4472775	103.297			104.15		
	3	4456396	-	4456396	102.918			103.77		
	4	4331232	-	4331232	100.028			100.86		
	5	4267634	-	4267634	98.559			99.41		
	6	4294229	-	4294229	99.173			100.03		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



诺氟沙星项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	130450-201907	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.60	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.12	3942314	3943319	3954638	3943119	3943818	3945442	0.14
2	10.18	3944449	3944684				3944566	0.01
单位质量响应值				RSD%	判断			
389865.81				0.44	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24032103批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	1010394	-	1010394	23.303	21.11	8.59	23.30	21.11	8.58
	2	1015844	-	1015844	23.429			23.43		
	3	834637	-	834637	19.249			19.25		
	4	898835	-	898835	20.730			20.73		
	5	874203	-	874203	20.162			20.16		
	6	858473	-	858473	19.799			19.80		
10min	1	2249544	-	2249544	51.882	49.01	5.79	51.92	49.04	5.80
	2	2307439	-	2307439	53.217			53.26		
	3	2002620	-	2002620	46.187			46.22		
	4	2070541	-	2070541	47.753			47.79		
	5	2045980	-	2045980	47.187			47.22		
	6	2073311	-	2073311	47.817			47.85		
15min	1	3078024	-	3078024	70.989	68.07	4.21	71.11	68.18	4.21
	2	3135854	-	3135854	72.323			72.45		
	3	2842550	-	2842550	65.558			65.67		
	4	2857083	-	2857083	65.894			66.01		
	5	2886322	-	2886322	66.568			66.68		
	6	2908051	-	2908051	67.069			67.18		
20min	1	3643376	-	3643376	84.028	80.80	3.83	84.27	81.03	3.83
	2	3686027	-	3686027	85.012			85.26		
	3	3343248	-	3343248	77.106			77.32		
	4	3411621	-	3411621	78.683			78.91		
	5	3480847	-	3480847	80.280			80.50		
	6	3456487	-	3456487	79.718			79.94		
30min	1	4193697	-	4193697	96.720	93.95	2.54	97.10	94.32	2.55
	2	4205478	-	4205478	96.992			97.38		
	3	3985970	-	3985970	91.929			92.28		
	4	3989606	-	3989606	92.013			92.37		
	5	4077012	-	4077012	94.029			94.39		
	6	3990826	-	3990826	92.041			92.40		
45min	1	4330136	-	4330136	99.867	98.49	1.78	100.41	99.01	1.79
	2	4361813	-	4361813	100.598			101.15		
	3	4208943	-	4208943	97.072			97.57		
	4	4204685	-	4204685	96.974			97.48		
	5	4322757	-	4322757	99.697			100.21		
	6	4193812	-	4193812	96.723			97.23		
60min	1	4346498	-	4346498	100.244	99.36	2.02	100.96	100.05	2.02
	2	4384128	-	4384128	101.112			101.83		
	3	4241255	-	4241255	97.817			98.48		
	4	4209933	-	4209933	97.095			97.76		
	5	4420468	-	4420468	101.950			102.63		
	6	4246815	-	4246815	97.945			98.62		
极限	1	4353225	-	4353225	100.400	99.80	2.13	101.28	100.65	2.12
	2	4358192	-	4358192	100.514			101.40		
	3	4245402	-	4245402	97.913			98.74		
	4	4211016	-	4211016	97.120			97.95		
	5	4469525	-	4469525	103.082			103.93		
	6	4326621	-	4326621	99.786			100.62		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



诺氟沙星项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	130450-201907	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.60	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.12	3946432	3948252	3947768	3948061	3948610	3947825	0.03
2	10.18	3947257	3948903				3948080	0.03
单位质量响应值			RSD%	判断				
390101.28			0.42	数据可信				



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24032104批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	781135	-	781135	18.002	17.23	11.54	18.00	17.22	11.53
	2	660057	-	660057	15.212			15.21		
	3	850234	-	850234	19.595			19.59		
	4	833833	-	833833	19.217			19.22		
	5	703627	-	703627	16.216			16.22		
	6	655696	-	655696	15.111			15.11		
10min	1	1958789	-	1958789	45.142	42.91	5.54	45.17	42.94	5.53
	2	1795529	-	1795529	41.380			41.41		
	3	1860792	-	1860792	42.884			42.92		
	4	2012110	-	2012110	46.371			46.40		
	5	1755121	-	1755121	40.449			40.48		
	6	1789095	-	1789095	41.232			41.26		
15min	1	2793302	-	2793302	64.374	61.71	3.88	64.48	61.81	3.89
	2	2591655	-	2591655	59.727			59.82		
	3	2592352	-	2592352	59.743			59.85		
	4	2824285	-	2824285	65.089			65.20		
	5	2640082	-	2640082	60.843			60.94		
	6	2623488	-	2623488	60.461			60.55		
20min	1	3397584	-	3397584	78.301	74.67	4.34	78.51	74.87	4.34
	2	3153759	-	3153759	72.682			72.88		
	3	3100311	-	3100311	71.450			71.65		
	4	3425358	-	3425358	78.941			79.16		
	5	3128103	-	3128103	72.090			72.29		
	6	3233982	-	3233982	74.530			74.73		
30min	1	3967894	-	3967894	91.444	87.98	3.51	91.79	88.31	3.51
	2	3722058	-	3722058	85.779			86.09		
	3	3619943	-	3619943	83.425			83.75		
	4	3947637	-	3947637	90.977			91.33		
	5	3796437	-	3796437	87.493			87.81		
	6	3851919	-	3851919	88.771			89.09		
45min	1	4187590	-	4187590	96.507	93.51	3.41	97.00	93.98	3.41
	2	3958717	-	3958717	91.233			91.69		
	3	3852779	-	3852779	88.791			89.25		
	4	4219913	-	4219913	97.252			97.75		
	5	4048553	-	4048553	93.303			93.76		
	6	4078509	-	4078509	93.993			94.46		
60min	1	4210816	-	4210816	97.043	95.61	2.78	97.70	96.24	2.78
	2	4108435	-	4108435	94.683			95.29		
	3	3954338	-	3954338	91.132			91.74		
	4	4295943	-	4295943	99.004			99.67		
	5	4183169	-	4183169	96.405			97.02		
	6	4140103	-	4140103	95.413			96.04		
极限	1	4281160	-	4281160	98.664	97.37	1.91	99.48	98.16	1.91
	2	4210186	-	4210186	97.028			97.80		
	3	4179874	-	4179874	96.329			97.09		
	4	4340638	-	4340638	100.034			100.86		
	5	4228510	-	4228510	97.450			98.23		
	6	4109092	-	4109092	94.698			95.48		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



诺氟沙星项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	130450-201907	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.60	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.12	3938058	3939827	3939424	3936659	3935232	3937840	0.05
2	10.18	3941988	3945123				3943556	0.06
单位质量响应值			RSD%	判断				
389114.62			0.32	数据可信				



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24032105批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	891306	-	891306	20.579	19.96	10.73	20.58	19.96	10.73
	2	963678	-	963678	22.250			22.25		
	3	833575	-	833575	19.246			19.25		
	4	949556	-	949556	21.924			21.92		
	5	837396	-	837396	19.334			19.33		
	6	711247	-	711247	16.422			16.42		
10min	1	1943102	-	1943102	44.863	44.43	6.46	44.90	44.46	6.46
	2	2050575	-	2050575	47.345			47.38		
	3	1881175	-	1881175	43.433			43.47		
	4	2079221	-	2079221	48.006			48.04		
	5	1827141	-	1827141	42.186			42.22		
	6	1764242	-	1764242	40.734			40.76		
15min	1	2745661	-	2745661	63.393	62.46	4.79	63.50	62.56	4.80
	2	2807024	-	2807024	64.810			64.93		
	3	2658164	-	2658164	61.373			61.48		
	4	2883696	-	2883696	66.580			66.70		
	5	2578261	-	2578261	59.528			59.63		
	6	2557787	-	2557787	59.055			59.15		
20min	1	3248088	-	3248088	74.993	74.47	3.79	75.21	74.68	3.79
	2	3324640	-	3324640	76.761			76.98		
	3	3214538	-	3214538	74.219			74.43		
	4	3387662	-	3387662	78.216			78.44		
	5	3081574	-	3081574	71.149			71.35		
	6	3095153	-	3095153	71.462			71.66		
30min	1	3915030	-	3915030	90.392	88.10	3.92	90.73	88.44	3.92
	2	3878456	-	3878456	89.547			89.90		
	3	3798462	-	3798462	87.700			88.03		
	4	4010639	-	4010639	92.599			92.96		
	5	3615192	-	3615192	83.469			83.79		
	6	3677644	-	3677644	84.911			85.22		
45min	1	4184340	-	4184340	96.610	95.06	3.85	97.10	95.54	3.85
	2	4122727	-	4122727	95.187			95.69		
	3	4168492	-	4168492	96.244			96.72		
	4	4313198	-	4313198	99.585			100.10		
	5	3837531	-	3837531	88.602			89.06		
	6	4076923	-	4076923	94.130			94.58		
60min	1	4279525	-	4279525	98.807	97.24	3.66	99.46	97.88	3.66
	2	4237425	-	4237425	97.835			98.50		
	3	4304595	-	4304595	99.386			100.02		
	4	4339703	-	4339703	100.197			100.88		
	5	3915561	-	3915561	90.404			91.01		
	6	4192995	-	4192995	96.810			97.42		
极限	1	4279737	-	4279737	98.812	99.38	1.99	99.63	100.19	2.00
	2	4332247	-	4332247	100.025			100.85		
	3	4418429	-	4418429	102.015			102.82		
	4	4371251	-	4371251	100.925			101.77		
	5	4192639	-	4192639	96.801			97.56		
	6	4232461	-	4232461	97.721			98.49		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1244-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 11:28:15

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:30:59

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1245-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 11:33:09

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:31:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.461	3942802	100.000	559056	5709	1.083	--
总计		3942802	100.000	559056			

图2 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1246-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 11:38:02

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:31:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.458	3942758	100.000	559066	5707	1.084	--
总计		3942758	100.000	559066			

图3 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1247-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 11:42:57

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:31:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.458	3944085	100.000	559889	5709	1.084	--
总计		3944085	100.000	559889			

图4 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1248-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 11:47:49

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:31:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.453	3942399	100.000	560841	5704	1.084	--
总计		3942399	100.000	560841			

图5 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1249-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 11:52:43


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:31:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.451	3944384	100.000	559650	5705	1.085	--
总计		3944384	100.000	559650			

图6 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1250-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 11:57:36

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/23 16:31:19

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.459	974348	100.000	140320	5859	1.051	--
总计		974348	100.000	140320			

图7 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1251-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 12:02:28

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:31:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.456	818760	100.000	118393	5846	1.049	--
总计		818760	100.000	118393			

图8 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1252-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-19

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 12:07:20


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:31:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.455	696914	100.000	100282	5769	1.048	--
总计		696914	100.000	100282			

图9 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1253-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 12:12:11

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:31:28

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.451	1053025	100.000	151758	5842	1.049	--
总计		1053025	100.000	151758			

图10 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1254-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-37

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 12:17:03


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:31:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.451	995631	100.000	143385	5832	1.050	--
总计		995631	100.000	143385			

图11 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1255-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 12:21:56

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:31:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.450	954185	100.000	137847	5852	1.050	--
总计		954185	100.000	137847			

图12 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1256-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 12:26:48

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:31:37

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.445	2100837	100.000	302505	5807	1.061	--
总计		2100837	100.000	302505			

图13 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1257-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 12:31:41

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/23 16:31:40

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.445	2018648	100.000	290919	5810	1.059	--
总计		2018648	100.000	290919			

图14 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1258-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 12:36:34

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:31:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.443	2123060	100.000	305385	5805	1.062	--
总计		2123060	100.000	305385			

图15 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1259-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 12:41:26

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:31:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.442	2220051	100.000	318970	5805	1.063	--
总计		2220051	100.000	318970			

图16 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1260-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 12:46:19

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:31:48

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.443	2185111	100.000	313926	5806	1.063	--
总计		2185111	100.000	313926			

图17 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1261-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-47

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 12:51:10


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:31:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.442	2030469	100.000	291861	5809	1.061	--
总计		2030469	100.000	291861			

图18 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1262-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 12:56:02

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:31:54

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.440	2921367	100.000	419960	5769	1.073	--
总计		2921367	100.000	419960			

图19 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1263-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 13:00:55

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:31:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.438	2906241	100.000	418199	5770	1.073	--
总计		2906241	100.000	418199			

图20 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1264-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 13:05:47

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:32:01

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.437	2989779	100.000	429867	5766	1.074	--
总计		2989779	100.000	429867			

图21 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1265-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-30

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 13:10:41


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:32:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.434	3045545	100.000	436795	5760	1.076	--
总计		3045545	100.000	436795			

图22 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1266-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-39

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 13:15:34


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:32:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	3044075	100.000	436951	5760	1.074	--
总计		3044075	100.000	436951			

图23 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1267-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-48

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 13:20:26


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:32:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.433	2852569	100.000	410406	5769	1.074	--
总计		2852569	100.000	410406			

图24 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1268-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-4

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 13:25:19


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:32:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	3494818	100.000	502843	5741	1.083	--
总计		3494818	100.000	502843			

图25 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1269-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 13:30:11

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:32:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	3509987	100.000	500967	5646	1.082	--
总计		3509987	100.000	500967			

图26 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1270-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 13:35:03

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:32:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	3558416	100.000	511164	5729	1.085	--
总计		3558416	100.000	511164			

图27 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1271-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-31

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 13:39:55


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:32:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	3588986	100.000	514698	5730	1.085	--
总计		3588986	100.000	514698			

图28 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30°C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1272-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-40

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 13:44:49


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:32:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.422	3594437	100.000	517720	5725	1.084	--
总计		3594437	100.000	517720			

图29 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1273-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-49

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 13:49:41


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:32:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.425	3409164	100.000	489882	5730	1.082	--
总计		3409164	100.000	489882			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1274-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 13:54:33

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:32:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.424	4060094	100.000	582364	5693	1.092	--
总计		4060094	100.000	582364			

图31 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1275-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 13:59:25

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:32:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.423	4048469	100.000	580844	5687	1.092	--
总计		4048469	100.000	580844			

图32 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1276-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 14:04:18

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:32:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.423	4163509	100.000	596840	5682	1.091	--
总计		4163509	100.000	596840			

图33 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1277-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 14:09:10

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:32:39

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.422	4142013	100.000	594819	5694	1.093	--
总计		4142013	100.000	594819			

图34 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1278-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 14:14:02

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:32:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.421	4137328	100.000	594175	5690	1.092	--
总计		4137328	100.000	594175			

图35 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1279-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 14:18:54

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:32:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.421	4000384	100.000	574762	5695	1.091	--
总计		4000384	100.000	574762			

图36 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1280-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 14:23:46

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:32:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.419	4283878	100.000	613387	5673	1.096	--
总计		4283878	100.000	613387			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1281-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 14:28:40

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:32:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.418	4269071	100.000	611276	5675	1.096	--
总计		4269071	100.000	611276			

图38 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1282-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 14:33:32

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:32:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.417	4384510	100.000	627148	5670	1.097	--
总计		4384510	100.000	627148			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1283-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 14:38:25

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:32:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.417	4415679	100.000	631758	5670	1.097	--
总计		4415679	100.000	631758			

图40 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1284-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 14:43:20

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:32:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.417	4344305	100.000	621684	5670	1.096	--
总计		4344305	100.000	621684			

图41 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1285-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-51

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 14:48:12


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:33:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.418	4273454	100.000	604701	5617	1.062	--
总计		4273454	100.000	604701			

图42 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1286-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 14:53:05

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:33:05

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.417	4378493	100.000	620315	5614	1.065	--
总计		4378493	100.000	620315			

图43 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1287-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 14:57:58

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:33:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.416	4295197	100.000	609977	5627	1.067	--
总计		4295197	100.000	609977			

图44 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1288-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 15:02:51

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:33:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.415	4393148	100.000	624748	5619	1.069	--
总计		4393148	100.000	624748			

图45 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1289-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 15:07:43

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:33:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.414	4607247	100.000	655662	5611	1.073	--
总计		4607247	100.000	655662			

图46 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1290-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-43

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 15:12:35


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2024/03/23 16:33:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.414	4366038	100.000	622245	5624	1.070	--
总计		4366038	100.000	622245			

图47 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1291-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-52

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 15:17:26


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:33:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.414	4372851	100.000	623443	5628	1.070	--
总计		4372851	100.000	623443			

图48 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1292-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 15:22:21

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/23 16:33:22

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.414	4365848	100.000	622229	5623	1.071	--
总计		4365848	100.000	622229			

图49 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1293-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-17

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 15:27:14


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2024/03/23 16:33:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.415	4311032	100.000	614189	5636	1.070	--
总计		4311032	100.000	614189			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1294-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-26

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 15:32:07


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2024/03/23 16:33:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.414	4456931	100.000	634991	5619	1.073	--
总计		4456931	100.000	634991			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1295-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-35

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 15:37:00


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2024/03/23 16:33:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	4522670	100.000	644209	5621	1.074	--
总计		4522670	100.000	644209			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1296-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 15:41:53

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:33:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	4343205	100.000	619254	5632	1.071	--
总计		4343205	100.000	619254			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1297-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-53

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 15:46:46


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:33:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	4487366	100.000	639410	5621	1.074	--
总计		4487366	100.000	639410			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1298-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-27

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 15:51:40


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2024/03/23 16:33:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.414	3941224	100.000	561397	5607	1.065	--
总计		3941224	100.000	561397			

图55 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1299-2 - zzp-24032101p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-27

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 15:56:34


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:33:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.414	3939165	100.000	561312	5611	1.065	--
总计		3939165	100.000	561312			

图56 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032101批-pH6.8介质
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1300-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 16:01:30

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:33:46

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1301-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 16:06:25

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:33:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.415	3940331	100.000	561554	5619	1.064	--
总计		3940331	100.000	561554			

图58 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1302-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-18

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 16:11:20


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:33:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.414	3941097	100.000	561722	5619	1.065	--
总计		3941097	100.000	561722			

图59 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1303-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 16:16:16

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:33:55

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.415	3942091	100.000	561577	5617	1.065	--
总计		3942091	100.000	561577			

图60 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1304-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 16:21:11

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:33:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.415	3945734	100.000	561735	5601	1.065	--
总计		3945734	100.000	561735			

图61 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1305-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-18

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 16:26:05


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:34:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.414	3942755	100.000	561975	5614	1.065	--
总计		3942755	100.000	561975			

图62 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1306-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 16:31:00

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:34:04

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.427	807908	100.000	116993	5803	1.032	--
总计		807908	100.000	116993			

图63 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1307-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 16:35:54

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:34:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.424	935981	100.000	135571	5792	1.033	--
总计		935981	100.000	135571			

图64 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1308-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 16:40:47

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/23 16:34:10

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.423	938891	100.000	136054	5790	1.033	--
总计		938891	100.000	136054			

图65 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1309-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 16:45:40

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/23 16:34:13

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.423	844545	100.000	122329	5789	1.033	--
总计		844545	100.000	122329			

图66 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1310-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 16:50:33

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:34:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.423	818098	100.000	118642	5795	1.032	--
总计		818098	100.000	118642			

图67 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1311-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-46

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 16:55:26


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2024/03/23 16:34:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.421	969903	100.000	140703	5787	1.034	--
总计		969903	100.000	140703			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1312-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 17:00:20

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:34:21

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.417	1997870	100.000	286983	5750	1.043	--
总计		1997870	100.000	286983			

图69 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1313-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 17:05:14

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:34:24

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.417	2088403	100.000	300187	5750	1.044	--
总计		2088403	100.000	300187			

图70 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1314-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 17:10:07

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:34:27

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.417	2088661	100.000	300106	5748	1.045	--
总计		2088661	100.000	300106			

图71 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1315-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 17:15:00

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/23 16:34:30

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.417	1963047	100.000	282466	5749	1.042	--
总计		1963047	100.000	282466			

图72 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1316-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 17:19:54

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:34:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.417	2120620	100.000	304868	5753	1.045	--
总计		2120620	100.000	304868			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1317-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-47

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 17:24:48


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:34:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.418	2109487	100.000	302847	5731	1.045	--
总计		2109487	100.000	302847			

图74 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1318-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 17:29:42

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:34:38

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.413	2866830	100.000	412506	5715	1.054	--
总计		2866830	100.000	412506			

图75 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1319-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 17:34:36

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:34:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.413	2918855	100.000	420124	5717	1.055	--
总计		2918855	100.000	420124			

图76 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1320-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 17:39:30

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:34:44

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.413	2899929	100.000	417175	5704	1.054	--
总计		2899929	100.000	417175			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1321-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 17:44:23

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:34:47

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.413	2833645	100.000	407838	5717	1.053	--
总计		2833645	100.000	407838			

图78 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1322-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 17:49:17

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:34:50

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.413	2994907	100.000	430835	5707	1.055	--
总计		2994907	100.000	430835			

图79 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1323-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-48

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 17:54:11


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:34:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.414	2905948	100.000	417910	5714	1.054	--
总计		2905948	100.000	417910			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1324-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 17:59:05

版本号: 6.115

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:34:56


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.413	3453001	100.000	495803	5694	1.061	--
总计		3453001	100.000	495803			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1325-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 18:03:59

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:34:59

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	3489077	100.000	500827	5686	1.061	--
总计		3489077	100.000	500827			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1326-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 18:08:53

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:35:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.413	3462344	100.000	497281	5693	1.061	--
总计		3462344	100.000	497281			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1327-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-31

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 18:13:46


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:35:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	3437141	100.000	493397	5693	1.061	--
总计		3437141	100.000	493397			

图84 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1328-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 18:18:40

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:35:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	3556670	100.000	510548	5691	1.063	--
总计		3556670	100.000	510548			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1329-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-49

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 18:23:34


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:35:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	3507690	100.000	503741	5696	1.062	--
总计		3507690	100.000	503741			

图86 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1330-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 18:28:28

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:35:14

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	4020310	100.000	574631	5643	1.071	--
总计		4020310	100.000	574631			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1331-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 18:33:22

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:35:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.411	4038186	100.000	578340	5670	1.070	--
总计		4038186	100.000	578340			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1332-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 18:38:16

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:35:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	4018511	100.000	576016	5669	1.070	--
总计		4018511	100.000	576016			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1333-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 18:43:10

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:35:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.411	4033458	100.000	577516	5665	1.070	--
总计		4033458	100.000	577516			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1334-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 18:48:04

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:35:25

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.410	4086298	100.000	584347	5657	1.071	--
总计		4086298	100.000	584347			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1335-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 18:52:58

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:35:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.411	4067994	100.000	582376	5662	1.070	--
总计		4067994	100.000	582376			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1336-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 18:57:53

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/23 16:35:31

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.411	4288693	100.000	613509	5656	1.074	--
总计		4288693	100.000	613509			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1337-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 19:02:47

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:35:34

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.411	4338621	100.000	620069	5651	1.074	--
总计		4338621	100.000	620069			

图94 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1338-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 19:07:41

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:35:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.413	4334592	100.000	620454	5659	1.074	--
总计		4334592	100.000	620454			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1339-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 19:12:35

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:35:39

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.413	4272768	100.000	612010	5666	1.073	--
总计		4272768	100.000	612010			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1340-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 19:17:28

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:35:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.411	4228089	100.000	605363	5669	1.071	--
总计		4228089	100.000	605363			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30°C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1341-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-51

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 19:22:22


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2024/03/23 16:35:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	4319545	100.000	618343	5659	1.072	--
总计		4319545	100.000	618343			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1342-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 19:27:15

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:35:48

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	4345518	100.000	622047	5657	1.072	--
总计		4345518	100.000	622047			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1343-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 19:32:10

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:35:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.413	4412975	100.000	631735	5657	1.073	--
总计		4412975	100.000	631735			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1344-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 19:37:04

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:35:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.414	4425724	100.000	633605	5662	1.073	--
总计		4425724	100.000	633605			

图101 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1345-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 19:41:59

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:35:56

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.417	4319494	100.000	615470	5654	1.071	--
总计		4319494	100.000	615470			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1346-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 19:46:52

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:35:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.416	4237092	100.000	605623	5672	1.071	--
总计		4237092	100.000	605623			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1347-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-52

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 19:51:46


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:36:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.414	4325706	100.000	619257	5663	1.071	--
总计		4325706	100.000	619257			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1348-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 19:56:40

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:36:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.416	4333036	100.000	619191	5677	1.072	--
总计		4333036	100.000	619191			



Y09

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1349-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/22 20:01:34
处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:36:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.415	4472775	100.000	639799	5665	1.074	--
总计		4472775	100.000	639799			

图106 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1350-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 20:06:28

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/23 16:36:11

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.415	4456396	100.000	637082	5656	1.075	--
总计		4456396	100.000	637082			



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1351-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/22 20:11:22
处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:36:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.415	4331232	100.000	620287	5671	1.072	--
总计		4331232	100.000	620287			

图108 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1352-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 20:16:16

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:36:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.416	4267634	100.000	610182	5683	1.071	--
总计		4267634	100.000	610182			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1353-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-53

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 20:21:10


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:36:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.414	4294229	100.000	613921	5652	1.072	--
总计		4294229	100.000	613921			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1354-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 20:26:04

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:36:23

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.415	3935899	100.000	561771	5630	1.065	--
总计		3935899	100.000	561771			

图111 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1355-2 - zzp-24032102p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 2-27

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 20:30:58


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:36:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.415	3937993	100.000	562127	5626	1.065	--
总计		3937993	100.000	562127			

图112 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032102批-pH6.8介质
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1356-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 20:35:51

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:36:29

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1357-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-18

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 20:40:44


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:36:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.415	3942314	100.000	562799	5634	1.065	--
总计		3942314	100.000	562799			

图114 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1358-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-18

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 20:45:36


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:36:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.415	3943319	100.000	562938	5630	1.065	--
总计		3943319	100.000	562938			

图115 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1359-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-18

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 20:50:29


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:36:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.416	3954638	100.000	562593	5612	1.064	--
总计		3954638	100.000	562593			

图116 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1360-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-18

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 20:55:21


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:36:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.415	3943119	100.000	562694	5629	1.066	--
总计		3943119	100.000	562694			

图117 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1361-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-18

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 21:00:13


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:36:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.415	3943818	100.000	562980	5627	1.065	--
总计		3943818	100.000	562980			

图118 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1362-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 21:05:05

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:36:46

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	1010394	100.000	146384	5816	1.032	--
总计		1010394	100.000	146384			

图119 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1363-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-10

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 21:09:57


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:36:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	1015844	100.000	146805	5816	1.032	--
总计		1015844	100.000	146805			

图120 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1364-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 21:14:49

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:36:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.425	834637	100.000	120959	5822	1.033	--
总计		834637	100.000	120959			

图121 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1365-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 21:19:41

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/23 16:36:55

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	898835	100.000	130016	5822	1.030	--
总计		898835	100.000	130016			

图122 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1366-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 21:24:33

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:36:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.428	874203	100.000	127007	5834	1.031	--
总计		874203	100.000	127007			

图123 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1367-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-46

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 21:29:25


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2024/03/23 16:37:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.430	858473	100.000	124901	5846	1.031	--
总计		858473	100.000	124901			

图124 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1368-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 21:34:17

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/23 16:37:03

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.420	2249544	100.000	324880	5779	1.043	--
总计		2249544	100.000	324880			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1369-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-11

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 21:39:09


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:37:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.426	2307439	100.000	331426	5771	1.043	--
总计		2307439	100.000	331426			

图126 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1370-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 21:44:01

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:37:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.422	2002620	100.000	289629	5790	1.042	--
总计		2002620	100.000	289629			

图127 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30°C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1371-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-29

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 21:48:53


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:37:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.420	2070541	100.000	298780	5768	1.042	--
总计		2070541	100.000	298780			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1372-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-38

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 21:53:45


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:37:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.421	2045980	100.000	295714	5786	1.040	--
总计		2045980	100.000	295714			

图129 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1373-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-47

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 21:58:37


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:37:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.421	2073311	100.000	299306	5770	1.040	--
总计		2073311	100.000	299306			

图130 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1374-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 22:03:29

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/23 16:37:20

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.415	3078024	100.000	443492	5737	1.053	--
总计		3078024	100.000	443492			

图131 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1375-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 22:08:20

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:37:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.416	3135854	100.000	450917	5732	1.055	--
总计		3135854	100.000	450917			

图132 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1376-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 22:13:12

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:37:26

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.416	2842550	100.000	409312	5748	1.051	--
总计		2842550	100.000	409312			

图133 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1377-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 22:18:04

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:37:29

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.415	2857083	100.000	411723	5746	1.051	--
总计		2857083	100.000	411723			

图134 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1378-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 22:22:55

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:37:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.416	2886322	100.000	415632	5753	1.052	--
总计		2886322	100.000	415632			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1379-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-48

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 22:27:46


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:37:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.415	2908051	100.000	418935	5745	1.052	--
总计		2908051	100.000	418935			

图136 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1380-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 22:32:38

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:37:37

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.413	3643376	100.000	524223	5714	1.062	--
总计		3643376	100.000	524223			

图137 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1381-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 22:37:30

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:37:40


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.413	3686027	100.000	530363	5714	1.062	--
总计		3686027	100.000	530363			

图138 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1382-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-22

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 22:42:22


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:37:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.414	3343248	100.000	481429	5725	1.057	--
总计		3343248	100.000	481429			

图139 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1383-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-31

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 22:47:13


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:37:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.414	3411621	100.000	491379	5726	1.059	--
总计		3411621	100.000	491379			

图140 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1384-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-40

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 22:52:05


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:37:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.416	3480847	100.000	499332	5710	1.059	--
总计		3480847	100.000	499332			

图141 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1385-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-49

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 22:56:57


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:37:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.414	3456487	100.000	497462	5715	1.059	--
总计		3456487	100.000	497462			

图142 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1386-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 23:01:49

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/23 16:37:55

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.412	4193697	100.000	601822	5679	1.069	--
总计		4193697	100.000	601822			

图143 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1387-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/22 23:06:40

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/23 16:37:57

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.411	4205478	100.000	602847	5683	1.071	--
总计		4205478	100.000	602847			

图144 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1388-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 23:11:32

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:38:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.408	3985970	100.000	572035	5696	1.070	--
总计		3985970	100.000	572035			

图145 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1389-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-32

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 23:16:23


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:38:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.405	3989606	100.000	574632	5694	1.070	--
总计		3989606	100.000	574632			

图146 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1390-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-41

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 23:21:15


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:38:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.400	4077012	100.000	585046	5674	1.073	--
总计		4077012	100.000	585046			

图147 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1391-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 23:26:07

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:38:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.399	3990826	100.000	574408	5677	1.072	--
总计		3990826	100.000	574408			

图148 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1392-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/22 23:30:59
处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:38:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.395	4330136	100.000	622471	5638	1.078	--
总计		4330136	100.000	622471			

图149 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1393-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-15

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/22 23:35:51


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2024/03/23 16:38:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.392	4361813	100.000	626925	5648	1.079	--
总计		4361813	100.000	626925			

图150 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1394-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 23:40:43

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:38:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.391	4208943	100.000	606641	5654	1.077	--
总计		4208943	100.000	606641			

图151 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30°C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1395-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 23:45:34

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:38:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.388	4204685	100.000	606790	5654	1.077	--
总计		4204685	100.000	606790			

图152 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1396-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/22 23:50:25

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:38:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.386	4322757	100.000	622957	5644	1.080	--
总计		4322757	100.000	622957			

图153 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1397-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/22 23:55:16

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:38:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.386	4193812	100.000	605078	5653	1.077	--
总计		4193812	100.000	605078			

图154 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1398-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 00:00:08

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:38:30

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.384	4346498	100.000	625340	5638	1.081	--
总计		4346498	100.000	625340			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1399-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/23 00:04:59

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:38:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.382	4384128	100.000	631410	5618	1.080	--
总计		4384128	100.000	631410			

图156 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1400-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 00:09:51

版本号: 6.115

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:38:36


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.380	4241255	100.000	612291	5629	1.079	--
总计		4241255	100.000	612291			

图157 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1401-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/23 00:14:43

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:38:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.381	4209933	100.000	608926	5645	1.080	--
总计		4209933	100.000	608926			

图158 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1402-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-43

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 00:19:34


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:38:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.377	4420468	100.000	637195	5623	1.083	--
总计		4420468	100.000	637195			

图159 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1403-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 00:24:25

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:38:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.378	4246815	100.000	612764	5626	1.080	--
总计		4246815	100.000	612764			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1404-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-8

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 00:29:18


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:38:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.375	4353225	100.000	626686	5618	1.084	--
总计		4353225	100.000	626686			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1405-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-17

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 00:34:10


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2024/03/23 16:38:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.376	4358192	100.000	627350	5623	1.084	--
总计		4358192	100.000	627350			

图162 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1406-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p3-jx.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/23 00:39:02
处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:38:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.377	4245402	100.000	612037	5633	1.082	--
总计		4245402	100.000	612037			

图163 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1407-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 00:43:55

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/23 16:38:55

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.375	4211016	100.000	607198	5633	1.082	--
总计		4211016	100.000	607198			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1408-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/23 00:48:47

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:38:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.374	4469525	100.000	645648	5614	1.085	--
总计		4469525	100.000	645648			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1409-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 00:53:39

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:39:01

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	4326621	100.000	625746	5614	1.083	--
总计		4326621	100.000	625746			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1410-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-27

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 00:58:31


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:39:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.373	3944449	100.000	568156	5569	1.077	--
总计		3944449	100.000	568156			

图167 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1411-2 - zzp-24032103p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 3-27

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 01:03:24


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:39:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	3944684	100.000	568335	5565	1.077	--
总计		3944684	100.000	568335			

图168 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032103批-pH6.8介质
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1412-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-9

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 01:08:18

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:39:09

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1413-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-18

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 01:13:12


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2024/03/23 16:39:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.371	3946432	100.000	568751	5566	1.078	--
总计		3946432	100.000	568751			

图170 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1414-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 01:18:06

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:39:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.369	3948252	100.000	568225	5561	1.078	--
总计		3948252	100.000	568225			

图171 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1415-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 01:22:59

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:39:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.370	3947768	100.000	568829	5567	1.078	--
总计		3947768	100.000	568829			

图172 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1416-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 01:27:53

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:39:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.370	3948061	100.000	569050	5566	1.078	--
总计		3948061	100.000	569050			

图173 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1417-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-18

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 01:32:47


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:39:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.370	3948610	100.000	568929	5569	1.078	--
总计		3948610	100.000	568929			

图174 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1418-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 01:37:39

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:39:27

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.379	781135	100.000	114772	5765	1.043	--
总计		781135	100.000	114772			

图175 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1419-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-10

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 01:42:31


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:39:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.380	660057	100.000	97015	5768	1.042	--
总计		660057	100.000	97015			

图176 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1420-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-19

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 01:47:24


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2024/03/23 16:39:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.379	850234	100.000	124633	5750	1.042	--
总计		850234	100.000	124633			

图177 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1421-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 01:52:16

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:39:35

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.378	833833	100.000	122284	5756	1.043	--
总计		833833	100.000	122284			

图178 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1422-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 01:57:08

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:39:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.378	703627	100.000	103358	5763	1.042	--
总计		703627	100.000	103358			

图179 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1423-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 02:02:00

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:39:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.378	655696	100.000	96400	5775	1.042	--
总计		655696	100.000	96400			

图180 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1424-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 02:06:53

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/23 16:39:44

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	1958789	100.000	286203	5718	1.054	--
总计		1958789	100.000	286203			

图181 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1425-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 02:11:46

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/23 16:39:47

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.373	1795529	100.000	262351	5727	1.052	--
总计		1795529	100.000	262351			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1426-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 02:16:39

版本号: 6.115

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:39:50


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	1860792	100.000	272273	5725	1.052	--
总计		1860792	100.000	272273			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1427-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 02:21:32

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:39:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.371	2012110	100.000	294026	5718	1.054	--
总计		2012110	100.000	294026			

图184 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1428-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 02:26:24

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/23 16:39:55

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	1755121	100.000	256857	5727	1.051	--
总计		1755121	100.000	256857			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1429-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-47

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 02:31:16


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:39:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.372	1789095	100.000	261868	5728	1.052	--
总计		1789095	100.000	261868			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1430-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 02:36:09

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:40:01

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.368	2793302	100.000	405758	5681	1.065	--
总计		2793302	100.000	405758			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1431-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 02:41:01

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:40:04

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.368	2591655	100.000	376910	5691	1.062	--
总计		2591655	100.000	376910			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1432-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-21

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 02:45:53


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:40:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.368	2592352	100.000	377095	5696	1.062	--
总计		2592352	100.000	377095			

图189 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1433-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/23 02:50:46

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:40:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.369	2824285	100.000	410759	5690	1.065	--
总计		2824285	100.000	410759			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1434-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-39

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 02:55:39


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:40:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.369	2640082	100.000	384283	5695	1.063	--
总计		2640082	100.000	384283			

图191 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1435-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 03:00:31

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:40:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.367	2623488	100.000	381699	5691	1.063	--
总计		2623488	100.000	381699			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1436-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 03:05:24

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:40:19

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.362	3397584	100.000	494046	5639	1.073	--
总计		3397584	100.000	494046			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1437-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-13

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 03:10:17

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:40:22

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.363	3153759	100.000	459410	5652	1.070	--
总计		3153759	100.000	459410			

图194 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1438-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-22

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/23 03:15:10

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:40:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.363	3100311	100.000	451901	5665	1.070	--
总计		3100311	100.000	451901			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1439-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-31

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 03:20:03


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:40:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.363	3425358	100.000	497937	5640	1.072	--
总计		3425358	100.000	497937			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1440-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 03:24:56

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:40:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.362	3128103	100.000	455541	5659	1.071	--
总计		3128103	100.000	455541			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1441-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-49

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 03:29:49


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:40:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.362	3233982	100.000	470919	5658	1.072	--
总计		3233982	100.000	470919			

图198 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1442-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-5

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 03:34:42

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:40:37

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.359	3967894	100.000	574361	5615	1.083	--
总计		3967894	100.000	574361			

图199 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1443-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 03:39:35

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:40:39


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.360	3722058	100.000	539310	5629	1.080	--
总计		3722058	100.000	539310			



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1444-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 03:44:29

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:40:42

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.360	3619943	100.000	524907	5639	1.078	--
总计		3619943	100.000	524907			

图201 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1445-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 03:49:23

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:40:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.358	3947637	100.000	571862	5611	1.083	--
总计		3947637	100.000	571862			

图202 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1446-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-41

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 03:54:16


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:40:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.359	3796437	100.000	550147	5627	1.081	--
总计		3796437	100.000	550147			



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1447-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-50

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/23 03:59:09

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:40:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.359	3851919	100.000	558236	5632	1.081	--
总计		3851919	100.000	558236			

图204 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1448-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-6

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 04:04:03

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:40:54


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.357	4187590	100.000	607528	5604	1.086	--
总计		4187590	100.000	607528			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1449-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-15

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 04:08:57


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2024/03/23 16:40:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.360	3958717	100.000	573305	5622	1.082	--
总计		3958717	100.000	573305			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1450-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-24

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 04:13:51

版本号: 6.115

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:40:59


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.359	3852779	100.000	557759	5619	1.081	--
总计		3852779	100.000	557759			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1451-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-33

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/23 04:18:44

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:41:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.358	4219913	100.000	609883	5587	1.086	--
总计		4219913	100.000	609883			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1452-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-42

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 04:23:37

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:41:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.356	4048553	100.000	588320	5602	1.083	--
总计		4048553	100.000	588320			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1453-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-51

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 04:28:31

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:41:08


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.357	4078509	100.000	592296	5610	1.084	--
总计		4078509	100.000	592296			

图210 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1454-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-7

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 04:33:24

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:41:11

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.358	4210816	100.000	609926	5607	1.086	--
总计		4210816	100.000	609926			

图211 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1455-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-16

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 04:38:18

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:41:14

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.355	4108435	100.000	596995	5607	1.084	--
总计		4108435	100.000	596995			

图212 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1456-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-25

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 04:43:12

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:41:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.356	3954338	100.000	574901	5619	1.082	--
总计		3954338	100.000	574901			

图213 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1457-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-34

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/23 04:48:06

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:41:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.356	4295943	100.000	623479	5601	1.088	--
总计		4295943	100.000	623479			

图214 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1458-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-43

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 04:53:00

版本号: 6.115

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:41:22


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.357	4183169	100.000	605430	5583	1.087	--
总计		4183169	100.000	605430			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1459-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-52

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 04:57:54

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:41:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.355	4140103	100.000	601533	5605	1.085	--
总计		4140103	100.000	601533			

图216 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1460-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-8

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 05:02:49

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:41:28

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.355	4281160	100.000	621671	5597	1.087	--
总计		4281160	100.000	621671			

图217 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1461-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-17

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/23 05:07:43

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:41:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.355	4210186	100.000	611521	5601	1.086	--
总计		4210186	100.000	611521			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1462-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-26

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 05:12:37

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:41:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.355	4179874	100.000	607331	5604	1.086	--
总计		4179874	100.000	607331			

图219 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1463-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-35

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/23 05:17:31

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:41:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.354	4340638	100.000	629246	5575	1.089	--
总计		4340638	100.000	629246			

图220 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1464-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-44

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 05:22:25

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:41:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.356	4228510	100.000	614236	5600	1.086	--
总计		4228510	100.000	614236			

图221 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1465-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-53

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/23 05:27:18

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:41:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.355	4109092	100.000	597229	5610	1.084	--
总计		4109092	100.000	597229			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1466-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-27

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 05:32:12


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:41:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.356	3947257	100.000	570344	5538	1.082	--
总计		3947257	100.000	570344			

图223 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1467-2 - zzp-24032104p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 05:37:05

版本号: 6.115

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:41:48


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.356	3948903	100.000	570244	5536	1.082	--
总计		3948903	100.000	570244			

图224 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032104批-pH6.8介质
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1468-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 05:41:59

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:41:51

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图225 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1469-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 05:46:53


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:41:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.356	3938058	100.000	568935	5539	1.082	--
总计		3938058	100.000	568935			

图226 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1470-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 05:51:46

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:41:56

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.356	3939827	100.000	569012	5534	1.082	--
总计		3939827	100.000	569012			

图227 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1471-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 05:56:39

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:41:59

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.356	3939424	100.000	568973	5533	1.082	--
总计		3939424	100.000	568973			

图228 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1472-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 06:01:32

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:42:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.355	3936659	100.000	568559	5536	1.082	--
总计		3936659	100.000	568559			

图229 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1473-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 06:06:26


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:42:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.355	3935232	100.000	568434	5534	1.082	--
总计		3935232	100.000	568434			

图230 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1474-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 06:11:18

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:42:08

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.366	891306	100.000	130892	5736	1.047	--
总计		891306	100.000	130892			

图231 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1475-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/23 06:16:10

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:42:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.366	963678	100.000	141465	5738	1.048	--
总计		963678	100.000	141465			

图232 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1476-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 06:21:02

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:42:13

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.366	833575	100.000	122478	5744	1.047	--
总计		833575	100.000	122478			

图233 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1477-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 06:25:54

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:42:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.365	949556	100.000	139642	5740	1.048	--
总计		949556	100.000	139642			

图234 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1478-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 06:30:46

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:42:20

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.365	837396	100.000	123234	5744	1.046	--
总计		837396	100.000	123234			

图235 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1479-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 06:35:38

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:42:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.366	711247	100.000	104629	5735	1.048	--
总计		711247	100.000	104629			

图236 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1480-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 06:40:31

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:42:25

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.362	1943102	100.000	284672	5708	1.056	--
总计		1943102	100.000	284672			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1481-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-11

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 06:45:23


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:42:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.360	2050575	100.000	299278	5697	1.057	--
总计		2050575	100.000	299278			

图238 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1482-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 06:50:15

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:42:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.360	1881175	100.000	274975	5703	1.055	--
总计		1881175	100.000	274975			

图239 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1483-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-29

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 06:55:07


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:42:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.359	2079221	100.000	303317	5700	1.058	--
总计		2079221	100.000	303317			

图240 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1484-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 07:00:00

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:42:36

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.362	1827141	100.000	267762	5710	1.055	--
总计		1827141	100.000	267762			

图241 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1485-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-47

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 07:04:53


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:42:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.361	1764242	100.000	258137	5702	1.054	--
总计		1764242	100.000	258137			

图242 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1486-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 07:09:46

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:42:42

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.361	2745661	100.000	400875	5690	1.066	--
总计		2745661	100.000	400875			

图243 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1487-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 07:14:38

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:42:45

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.359	2807024	100.000	408696	5671	1.067	--
总计		2807024	100.000	408696			

图244 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1488-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 07:19:31

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:42:48

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.357	2658164	100.000	388364	5673	1.065	--
总计		2658164	100.000	388364			

图245 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1489-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-30

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 07:24:23


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:42:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.357	2883696	100.000	420515	5666	1.068	--
总计		2883696	100.000	420515			

图246 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1490-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-39

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 07:29:15


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:42:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.359	2578261	100.000	375601	5677	1.065	--
总计		2578261	100.000	375601			

图247 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1491-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-48

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 07:34:08


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:42:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.357	2557787	100.000	373831	5677	1.064	--
总计		2557787	100.000	373831			

图248 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1492-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 07:39:00

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:43:00

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.355	3248088	100.000	473778	5647	1.073	--
总计		3248088	100.000	473778			

图249 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1493-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 07:43:53

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:43:03

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.355	3324640	100.000	484777	5638	1.074	--
总计		3324640	100.000	484777			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1494-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 07:48:46

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:43:06

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.355	3214538	100.000	469019	5647	1.073	--
总计		3214538	100.000	469019			

图251 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1495-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 07:53:39

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:43:09

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.357	3387662	100.000	493566	5647	1.074	--
总计		3387662	100.000	493566			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1496-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-40

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 07:58:32


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:43:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.356	3081574	100.000	449871	5657	1.071	--
总计		3081574	100.000	449871			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1497-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 08:03:24

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:43:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.359	3095153	100.000	449865	5671	1.070	--
总计		3095153	100.000	449865			

图254 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1498-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 08:08:16

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:43:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.359	3915030	100.000	567374	5638	1.080	--
总计		3915030	100.000	567374			

图255 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1499-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 08:13:08

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:43:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.369	3878456	100.000	563145	5663	1.077	--
总计		3878456	100.000	563145			

图256 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1500-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-23

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 08:18:00


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:43:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.369	3798462	100.000	551357	5661	1.076	--
总计		3798462	100.000	551357			

图257 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1501-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 08:22:53

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:43:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.371	4010639	100.000	580412	5616	1.078	--
总计		4010639	100.000	580412			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1502-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 08:27:46

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:43:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.373	3615192	100.000	523370	5638	1.073	--
总计		3615192	100.000	523370			

图259 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1503-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 08:32:39

版本号: 6.115

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:43:32


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.373	3677644	100.000	534053	5661	1.072	--
总计		3677644	100.000	534053			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1504-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 08:37:32

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/23 16:43:34

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.373	4184340	100.000	606207	5648	1.079	--
总计		4184340	100.000	606207			

图261 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1505-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 08:42:24

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:43:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.377	4122727	100.000	595933	5664	1.077	--
总计		4122727	100.000	595933			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1506-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 08:47:17

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:43:40

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.379	4168492	100.000	603943	5662	1.077	--
总计		4168492	100.000	603943			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1507-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/23 08:52:09

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:43:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.377	4313198	100.000	623253	5645	1.080	--
总计		4313198	100.000	623253			

图264 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1508-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-42

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 08:57:02


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:43:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.380	3837531	100.000	556679	5680	1.072	--
总计		3837531	100.000	556679			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1509-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 09:01:53

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:43:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.382	4076923	100.000	590663	5677	1.076	--
总计		4076923	100.000	590663			

图266 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1510-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 09:06:46

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:43:51

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.384	4279525	100.000	616832	5670	1.079	--
总计		4279525	100.000	616832			

图267 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1511-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 09:11:39

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:43:54


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.380	4237425	100.000	613466	5660	1.078	--
总计		4237425	100.000	613466			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1512-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 09:16:32

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:43:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.380	4304595	100.000	622542	5647	1.079	--
总计		4304595	100.000	622542			

图269 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1513-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/23 09:21:24

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:44:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.382	4339703	100.000	627503	5660	1.079	--
总计		4339703	100.000	627503			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1514-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-43

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 09:26:16


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2024/03/23 16:44:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.384	3915561	100.000	565874	5685	1.073	--
总计		3915561	100.000	565874			

图271 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1515-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-52

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 09:31:08


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:44:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.383	4192995	100.000	605090	5657	1.077	--
总计		4192995	100.000	605090			

图272 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1516-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 09:36:01

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/23 16:44:09

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.381	4279737	100.000	618995	5651	1.078	--
总计		4279737	100.000	618995			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1517-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 09:40:54

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2024/03/23 16:44:11

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.381	4332247	100.000	626217	5645	1.078	--
总计		4332247	100.000	626217			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1518-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/03/23 09:45:47

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2024/03/23 16:44:14

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.381	4418429	100.000	638297	5650	1.080	--
总计		4418429	100.000	638297			



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1519-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/23 09:50:40
处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:44:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.383	4371251	100.000	630628	5661	1.079	--
总计		4371251	100.000	630628			

图276 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1520-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 09:55:34

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:44:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.383	4192639	100.000	605001	5664	1.076	--
总计		4192639	100.000	605001			



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1521-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/23 10:00:26
处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:44:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.383	4232461	100.000	610856	5660	1.077	--
总计		4232461	100.000	610856			

图278 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1522-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/23 10:05:20

处理时间 (V2) : 2024/03/23 16:44:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.383	3941988	100.000	565484	5588	1.074	--
总计		3941988	100.000	565484			

图279 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 0-115/30-1523-2 - zzp-24032105p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-20240322-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20240322-FX279.lcb

样品瓶号: 1-27

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2024/03/23 10:10:14


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2024/03/23 16:44:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.383	3945123	100.000	566594	5586	1.074	--
总计		3945123	100.000	566594			

图280 诺氟沙星溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032105批-pH6.8介质
对照品溶液-2-2