



依折麦布片项目信息

介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	ZT-705-231101-1-D	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	500
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.39	338690	338498	339270	340199	338877	339107	0.20
2	10.41	340004	339789				339896	0.05

单位质量响应值		RSD%	判断
32637.82	32650.91	0.03	数据可信



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



影响因素30天-裸放高温-供试品溶液-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	146584	-	146584	44.903	48.53	20.17	44.90	48.54	20.17
	2	143460	-	143460	43.946			43.95		
	3	156799	-	156799	48.032			48.03		
	4	133396	-	133396	40.863			40.86		
	5	148615	-	148615	45.525			45.53		
	6	221782	-	221782	67.939			67.94		
10min	1	279036	-	279036	85.478	83.21	9.24	85.61	83.35	9.25
	2	237612	-	237612	72.788			72.92		
	3	283778	-	283778	86.930			87.07		
	4	256490	-	256490	78.571			78.69		
	5	262708	-	262708	80.476			80.61		
	6	310081	-	310081	94.988			95.19		
15min	1	310482	-	310482	95.110	92.51	5.00	95.50	92.90	5.02
	2	275889	-	275889	84.514			84.86		
	3	311718	-	311718	95.489			95.89		
	4	293416	-	293416	89.883			90.24		
	5	303941	-	303941	93.107			93.48		
	6	316562	-	316562	96.973			97.46		
20min	1	314921	-	314921	96.470	94.99	3.19	97.15	95.66	3.21
	2	296649	-	296649	90.873			91.48		
	3	318101	-	318101	97.444			98.14		
	4	298191	-	298191	91.345			91.97		
	5	316352	-	316352	96.909			97.57		
	6	316233	-	316233	96.872			97.65		
30min	1	320312	-	320312	98.122	96.58	2.19	99.09	97.54	2.20
	2	315176	-	315176	96.548			97.42		
	3	320376	-	320376	98.141			99.12		
	4	301913	-	301913	92.485			93.39		
	5	318006	-	318006	97.415			98.36		
	6	315962	-	315962	96.789			97.86		
45min	1	322509	-	322509	98.795	97.26	2.57	100.05	98.50	2.55
	2	324211	-	324211	99.316			100.48		
	3	322242	-	322242	98.713			99.99		
	4	302175	-	302175	92.566			93.75		
	5	318292	-	318292	97.503			98.74		
	6	315505	-	315505	96.649			98.01		
60min	1	322983	-	322983	98.940	97.30	2.67	100.50	98.84	2.64
	2	326043	-	326043	99.877			101.34		
	3	321078	-	321078	98.356			99.93		
	4	302126	-	302126	92.551			94.01		
	5	318277	-	318277	97.498			99.03		
	6	315200	-	315200	96.556			98.21		
极限	1	327134	-	327134	100.211	100.13	1.23	102.06	101.96	1.19
	2	331903	-	331903	101.672			103.44		
	3	327268	-	327268	100.253			102.12		
	4	328834	-	328834	100.732			102.47		
	5	319773	-	319773	97.957			99.78		
	6	326292	-	326292	99.954			101.89		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



依折麦布片项目信息

介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	ZT-705-231101-1-D	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	500
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.39	339427	339754	339007	339409	340116	339543	0.13
2	10.41	340024	338921				339472	0.23
单位质量响应值				RSD%	判断			
32679.79				0.16	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



影响因素30天-裸放高湿-供试品溶液-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	179872	-	179872	55.099	53.42	10.03	55.10	53.42	10.03
	2	157543	-	157543	48.260			48.26		
	3	167060	-	167060	51.175			51.17		
	4	168391	-	168391	51.583			51.58		
	5	166540	-	166540	51.016			51.02		
	6	207002	-	207002	63.410			63.41		
10min	1	277366	-	277366	84.964	84.51	6.74	85.13	84.67	6.74
	2	254034	-	254034	77.817			77.96		
	3	286393	-	286393	87.730			87.88		
	4	264080	-	264080	80.895			81.05		
	5	267161	-	267161	81.838			81.99		
	6	306212	-	306212	93.801			93.99		
15min	1	309907	-	309907	94.933	94.46	3.94	95.35	94.87	3.95
	2	296997	-	296997	90.978			91.36		
	3	321948	-	321948	98.621			99.04		
	4	293101	-	293101	89.784			90.18		
	5	306250	-	306250	93.812			94.21		
	6	321931	-	321931	98.616			99.09		
20min	1	318647	-	318647	97.610	97.27	3.24	98.31	97.97	3.24
	2	311146	-	311146	95.312			95.96		
	3	330510	-	330510	101.244			101.96		
	4	301094	-	301094	92.233			92.90		
	5	320016	-	320016	98.029			98.71		
	6	323842	-	323842	99.201			99.97		
30min	1	325385	-	325385	99.674	99.31	2.94	100.67	100.30	2.94
	2	326222	-	326222	99.930			100.87		
	3	335171	-	335171	102.672			103.69		
	4	306337	-	306337	93.839			94.78		
	5	327084	-	327084	100.194			101.17		
	6	324920	-	324920	99.531			100.60		
45min	1	327183	-	327183	100.225	99.88	3.00	101.52	101.17	2.98
	2	330700	-	330700	101.302			102.54		
	3	337551	-	337551	103.401			104.73		
	4	308210	-	308210	94.413			95.64		
	5	327296	-	327296	100.259			101.53		
	6	325412	-	325412	99.682			101.05		
60min	1	326540	-	326540	100.028	100.16	2.82	101.63	101.74	2.81
	2	330324	-	330324	101.187			102.73		
	3	337371	-	337371	103.346			104.98		
	4	309771	-	309771	94.891			96.40		
	5	328705	-	328705	100.691			102.27		
	6	329067	-	329067	100.802			102.46		
极限	1	332018	-	332018	101.706	101.93	1.46	103.60	103.82	1.49
	2	333500	-	333500	102.160			104.00		
	3	339679	-	339679	104.053			106.00		
	4	326458	-	326458	100.003			101.80		
	5	328643	-	328643	100.672			102.55		
	6	336237	-	336237	102.998			104.96		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



依折麦布片项目信息

介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	ZT-705-231101-1-D	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	500
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.39	341888	341016	341514	339697	341700	341163	0.26
2	10.41	340964	341298				341131	0.07
单位质量响应值				RSD%	判断			
32835.71		32769.55		0.15	数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



影响因素30天-裸放光照-供试品溶液-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	151929	-	151929	46.316	51.44	18.08	46.32	51.44	18.07
	2	123149	-	123149	37.542			37.54		
	3	179030	-	179030	54.578			54.58		
	4	180606	-	180606	55.058			55.06		
	5	213651	-	213651	65.132			65.13		
	6	163966	-	163966	49.986			49.99		
10min	1	271100	-	271100	82.646	85.41	7.26	82.78	85.56	7.28
	2	244035	-	244035	74.395			74.51		
	3	300840	-	300840	91.712			91.88		
	4	283934	-	283934	86.558			86.72		
	5	293853	-	293853	89.582			89.78		
	6	287230	-	287230	87.563			87.71		
15min	1	304170	-	304170	92.727	94.35	2.32	93.11	94.76	2.33
	2	301109	-	301109	91.794			92.13		
	3	314864	-	314864	95.988			96.43		
	4	308808	-	308808	94.141			94.57		
	5	307392	-	307392	93.710			94.17		
	6	320600	-	320600	97.736			98.15		
20min	1	315633	-	315633	96.222	96.65	1.57	96.89	97.34	1.53
	2	322240	-	322240	98.236			98.85		
	3	317300	-	317300	96.730			97.46		
	4	313611	-	313611	95.606			96.31		
	5	310318	-	310318	94.602			95.35		
	6	323126	-	323126	98.506			99.21		
30min	1	323791	-	323791	98.709	98.24	2.17	99.66	99.22	2.12
	2	330195	-	330195	100.661			101.57		
	3	322157	-	322157	98.211			99.23		
	4	316240	-	316240	96.407			97.40		
	5	312323	-	312323	95.213			96.24		
	6	328834	-	328834	100.246			101.25		
45min	1	325803	-	325803	99.322	98.53	2.83	100.57	99.81	2.77
	2	333593	-	333593	101.697			102.91		
	3	325129	-	325129	99.117			100.43		
	4	314802	-	314802	95.969			97.25		
	5	309813	-	309813	94.448			95.76		
	6	330092	-	330092	100.630			101.93		
60min	1	323496	-	323496	98.619	98.34	2.76	100.17	99.91	2.71
	2	333146	-	333146	101.561			103.07		
	3	326468	-	326468	99.525			101.13		
	4	313900	-	313900	95.694			97.26		
	5	309997	-	309997	94.504			96.10		
	6	328455	-	328455	100.131			101.73		
极限	1	328135	-	328135	100.033	101.14	0.91	101.88	103.01	0.89
	2	335193	-	335193	102.185			104.00		
	3	330840	-	330840	100.858			102.77		
	4	335081	-	335081	102.151			104.01		
	5	328901	-	328901	100.267			102.15		
	6	332466	-	332466	101.354			103.26		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1020-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 13:29:26 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:46:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
溶剂



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1021-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 13:35:50

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:46:16

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.989	338690	100.000	51229	13552	0.907	--
总计		338690	100.000	51229			

图2 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1022-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 13:42:14

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:46:20

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.987	338498	100.000	51192	13467	0.907	--
总计		338498	100.000	51192			

图3 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1023-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 13:48:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:46:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.984	339270	100.000	51226	13563	0.914	--
总计		339270	100.000	51226			

图4 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1024-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 13:55:00

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:46:25

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.983	340199	100.000	51847	13786	0.919	--
总计		340199	100.000	51847			

图5 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1025-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 14:01:23

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:46:28

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.982	338877	100.000	51506	13626	0.915	--
总计		338877	100.000	51506			

图6 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1026-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/25 14:07:45
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:46:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.981	146584	100.000	22428	13810	0.919	--
总计		146584	100.000	22428			

图7 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1027-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/25 14:14:08
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:46:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.980	143460	100.000	22067	13923	0.926	--
总计		143460	100.000	22067			

图8 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1028-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/25 14:20:30
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:46:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.979	156799	100.000	24101	13830	0.923	--
总计		156799	100.000	24101			

图9 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1029-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 14:26:53

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:46:37

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.979	133396	100.000	20610	14019	0.924	--
总计		133396	100.000	20610			

图10 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1030-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/25 14:33:15
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:46:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.978	148615	100.000	22873	14057	0.927	--
总计		148615	100.000	22873			

图11 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1031-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 14:39:37

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:46:42

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	221782	100.000	34323	14047	0.929	--
总计		221782	100.000	34323			

图12 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1032-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P1.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 14:46:00

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/03/26 08:46:45

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.978	279036	100.000	43222	14083	0.925	--
总计		279036	100.000	43222			

图13 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1033-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P2.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 14:52:22

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:46:47

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.978	237612	100.000	36794	14034	0.930	--
总计		237612	100.000	36794			

图14 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1034-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P3.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 14:58:44

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:46:49

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	283778	100.000	44111	14212	0.936	--
总计		283778	100.000	44111			

图15 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1035-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P4.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 15:05:06

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:46:52

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	256490	100.000	39826	14223	0.930	--
总计		256490	100.000	39826			

图16 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1036-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P5.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 15:11:28

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:46:54

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	262708	100.000	40746	14256	0.932	--
总计		262708	100.000	40746			

图17 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1037-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P6.lc
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 15:17:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:46:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.975	310081	100.000	48263	14248	0.932	--
总计		310081	100.000	48263			

图18 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1038-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P1.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 15:24:12

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:46:59

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	310482	100.000	48335	14299	0.934	--
总计		310482	100.000	48335			

图19 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1039-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P2.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 15:30:35

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:47:01

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	275889	100.000	42962	14304	0.934	--
总计		275889	100.000	42962			

图20 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1040-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P3.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 15:36:58

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:47:03

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	311718	100.000	48518	14337	0.933	--
总计		311718	100.000	48518			

图21 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1041-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P4.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 15:43:20

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:47:06

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.975	293416	100.000	45790	14290	0.933	--
总计		293416	100.000	45790			

图22 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1042-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P5.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 15:49:42

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:47:08

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.975	303941	100.000	47258	14226	0.930	--
总计		303941	100.000	47258			

图23 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1043-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P6.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 15:56:04

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:47:10

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.975	316562	100.000	49324	14278	0.934	--
总计		316562	100.000	49324			

图24 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1044-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P1.lc
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 16:02:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:47:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	314921	100.000	48950	14240	0.933	--
总计		314921	100.000	48950			

图25 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1045-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P2.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 16:08:48

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/03/26 08:47:15

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	296649	100.000	46140	14253	0.934	--
总计		296649	100.000	46140			

图26 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1046-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P3.lc
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 16:15:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:47:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.975	318101	100.000	49313	14207	0.932	--
总计		318101	100.000	49313			

图27 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1047-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P4.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 16:21:32

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:47:20

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.975	298191	100.000	46542	14267	0.935	--
总计		298191	100.000	46542			

图28 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1048-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P5.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 16:27:54

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:47:22

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	316352	100.000	49157	14285	0.936	--
总计		316352	100.000	49157			

图29 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1049-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P6.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 16:34:16

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:47:25

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	316233	100.000	49216	14242	0.934	--
总计		316233	100.000	49216			

图30 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1050-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P1.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 16:40:39

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:47:27

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	320312	100.000	49784	14255	0.935	--
总计		320312	100.000	49784			

图31 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1051-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P2.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 16:47:01

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:47:30

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	315176	100.000	49024	14268	0.936	--
总计		315176	100.000	49024			

图32 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1052-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P3.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 16:53:23

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:47:32

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.975	320376	100.000	49918	14267	0.931	--
总计		320376	100.000	49918			

图33 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1053-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P4.lc
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/25 16:59:46
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:47:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	301913	100.000	46942	14237	0.937	--
总计		301913	100.000	46942			

图34 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1054-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P5.lc
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 17:06:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:47:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	318006	100.000	49543	14283	0.936	--
总计		318006	100.000	49543			

图35 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1055-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P6.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 17:12:30

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:47:39

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	315962	100.000	49190	14254	0.937	--
总计		315962	100.000	49190			

图36 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1056-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P1.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 17:18:52

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/03/26 08:47:42

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.974	322509	100.000	50361	14334	0.936	--
总计		322509	100.000	50361			

图37 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1057-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P2.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 17:25:14

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:47:44

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.979	324211	100.000	50661	14289	0.935	--
总计		324211	100.000	50661			

图38 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1058-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P3.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 17:31:36

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:47:46

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	322242	100.000	50359	14301	0.936	--
总计		322242	100.000	50359			

图39 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1059-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P4.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 17:37:58

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:47:49

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.979	302175	100.000	47218	14275	0.938	--
总计		302175	100.000	47218			

图40 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1060-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P5.lc
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 17:44:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:47:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.979	318292	100.000	49810	14315	0.936	--
总计		318292	100.000	49810			

图41 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1061-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P6.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 17:50:42

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:47:53

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.979	315505	100.000	49392	14367	0.936	--
总计		315505	100.000	49392			

图42 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1062-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P1.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 17:57:04

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:47:56

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.978	322983	100.000	50552	14321	0.938	--
总计		322983	100.000	50552			

图43 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1063-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P2.lc
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/25 18:03:27
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:47:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.978	326043	100.000	51052	14316	0.936	--
总计		326043	100.000	51052			

图44 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1064-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P3.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 18:09:49

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:48:00

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.978	321078	100.000	50440	14381	0.937	--
总计		321078	100.000	50440			

图45 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1065-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P4.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 18:16:12

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:48:03

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.978	302126	100.000	47415	14394	0.938	--
总计		302126	100.000	47415			

图46 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1066-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P5.lc
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 18:22:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:48:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.979	318277	100.000	49874	14375	0.940	--
总计		318277	100.000	49874			

图47 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1067-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P6.lc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 18:28:56

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:48:08

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.978	315200	100.000	49336	14328	0.939	--
总计		315200	100.000	49336			

图48 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1068-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 18:35:19

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:48:10

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	327134	100.000	51234	14344	0.939	--
总计		327134	100.000	51234			

图49 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1069-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 18:41:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:48:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.978	331903	100.000	51895	14377	0.939	--
总计		331903	100.000	51895			

图50 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1070-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 18:48:06

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:48:15

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	327268	100.000	51402	14459	0.942	--
总计		327268	100.000	51402			

图51 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1071-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 18:54:29

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:48:17

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.978	328834	100.000	51694	14517	0.943	--
总计		328834	100.000	51694			

图52 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1072-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 19:00:53

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:48:20

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	319773	100.000	50474	14596	0.944	--
总计		319773	100.000	50474			

图53 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1073-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 19:07:16

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:48:22

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	326292	100.000	51637	14671	0.946	--
总计		326292	100.000	51637			

图54 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1074-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/25 19:13:38
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:48:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.978	340004	100.000	53810	14692	0.944	--
总计		340004	100.000	53810			

图55 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1075-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 19:20:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:48:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	339789	100.000	53794	14701	0.944	--
总计		339789	100.000	53794			

图56 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1076-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/25 19:26:26
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:48:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
溶剂




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1077-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/25 19:32:50
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:48:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	339427	100.000	53871	14728	0.943	--
总计		339427	100.000	53871			

图58 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1078-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 19:39:14

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/03/26 08:48:34

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	339754	100.000	53931	14774	0.946	--
总计		339754	100.000	53931			

图59 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1079-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 19:45:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:48:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	339007	100.000	53935	14843	0.947	--
总计		339007	100.000	53935			

图60 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1080-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 19:52:03

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/03/26 08:48:38

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	339409	100.000	53943	14847	0.949	--
总计		339409	100.000	53943			

图61 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1081-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 19:58:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:48:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	340116	100.000	54008	14856	0.950	--
总计		340116	100.000	54008			

图62 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1082-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 20:04:51

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:48:43

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	179872	100.000	28708	14934	0.949	--
总计		179872	100.000	28708			

图63 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1083-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 20:11:14

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:48:46

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	157543	100.000	25114	14894	0.946	--
总计		157543	100.000	25114			

图64 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1084-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 20:17:37

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:48:48

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	167060	100.000	26769	14920	0.944	--
总计		167060	100.000	26769			

图65 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1085-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 20:24:01

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:48:50

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.978	168391	100.000	26898	14849	0.945	--
总计		168391	100.000	26898			

图66 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1086-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 20:30:25

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:48:53

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	166540	100.000	26478	14847	0.953	--
总计		166540	100.000	26478			

图67 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1087-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 20:36:48

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:48:55

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	207002	100.000	33045	14877	0.956	--
总计		207002	100.000	33045			

图68 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1088-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P1.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 20:43:12

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:48:57

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	277366	100.000	44305	14982	0.952	--
总计		277366	100.000	44305			

图69 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1089-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P2.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 20:49:35

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:49:00

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	254034	100.000	40522	14915	0.949	--
总计		254034	100.000	40522			

图70 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1090-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P3.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 20:55:58

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:49:02

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	286393	100.000	45774	15009	0.952	--
总计		286393	100.000	45774			

图71 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1091-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P4.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 21:02:22

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:49:04

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	264080	100.000	42172	15006	0.953	--
总计		264080	100.000	42172			

图72 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1092-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P5.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 21:08:46

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:49:07

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	267161	100.000	42853	15040	0.953	--
总计		267161	100.000	42853			

图73 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1093-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P6.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 21:15:09

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:49:10

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	306212	100.000	48919	15051	0.950	--
总计		306212	100.000	48919			

图74 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1094-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P1.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 21:21:32

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:49:12

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.975	309907	100.000	49736	15071	0.952	--
总计		309907	100.000	49736			

图75 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1095-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P2.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 21:27:56

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:49:15

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	296997	100.000	47385	15024	0.954	--
总计		296997	100.000	47385			

图76 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1096-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P3.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 21:34:19

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/03/26 08:49:18

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	321948	100.000	51674	15036	0.952	--
总计		321948	100.000	51674			

图77 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1097-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P4.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 21:40:43

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:49:20

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	293101	100.000	46918	15099	0.956	--
总计		293101	100.000	46918			

图78 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1098-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P5.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 21:47:06

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:49:22

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	306250	100.000	49076	15060	0.950	--
总计		306250	100.000	49076			

图79 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1099-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P6.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 21:53:29

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:49:25

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	321931	100.000	51593	15059	0.955	--
总计		321931	100.000	51593			

图80 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1100-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P1.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 21:59:53

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:49:27

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	318647	100.000	51125	15087	0.956	--
总计		318647	100.000	51125			

图81 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

柱温 :40℃

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1101-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P2.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/25 22:06:17

处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:49:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min


波长:230nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	311146	100.000	50144	15192	0.959	--
总计		311146	100.000	50144			

图82 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1102-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P3.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 22:12:41

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:49:32

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	330510	100.000	53177	15132	0.958	--
总计		330510	100.000	53177			

图83 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1103-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P4.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 22:19:05

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:49:35

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	301094	100.000	48538	15204	0.955	--
总计		301094	100.000	48538			

图84 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1104-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P5.lcc
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 22:25:29 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:49:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.975	320016	100.000	51455	15174	0.956	--
总计		320016	100.000	51455			

图85 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1105-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P6.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 22:31:53

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:49:40

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	323842	100.000	52259	15251	0.957	--
总计		323842	100.000	52259			

图86 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1106-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P1.lcc
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/25 22:38:17
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:49:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	325385	100.000	52443	15267	0.957	--
总计		325385	100.000	52443			

图87 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1107-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P2.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 22:44:40

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:49:44

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	326222	100.000	52639	15286	0.959	--
总计		326222	100.000	52639			

图88 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1108-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P3.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 22:51:03

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:49:47

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	335171	100.000	54243	15349	0.961	--
总计		335171	100.000	54243			

图89 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1109-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P4.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 22:57:26

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:49:49

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	306337	100.000	49684	15421	0.960	--
总计		306337	100.000	49684			

图90 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1110-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 23:03:50

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:49:52

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	327084	100.000	52966	15458	0.961	--
总计		327084	100.000	52966			

图91 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1111-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 23:10:13

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/03/26 08:49:54

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	324920	100.000	52731	15405	0.963	--
总计		324920	100.000	52731			

图92 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1112-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 23:16:37

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:49:57

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.975	327183	100.000	53071	15450	0.962	--
总计		327183	100.000	53071			

图93 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1113-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 23:23:01

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/03/26 08:49:59

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.975	330700	100.000	53637	15398	0.963	--
总计		330700	100.000	53637			

图94 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1114-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 23:29:25

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:50:01

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	337551	100.000	54755	15386	0.960	--
总计		337551	100.000	54755			

图95 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1115-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 23:35:49

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:50:04

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	308210	100.000	49949	15382	0.961	--
总计		308210	100.000	49949			

图96 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1116-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 23:42:13

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:50:06

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	327296	100.000	53047	15408	0.962	--
总计		327296	100.000	53047			

图97 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1117-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 23:48:37

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:50:08

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.975	325412	100.000	52706	15398	0.960	--
总计		325412	100.000	52706			

图98 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1118-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 23:55:02

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:50:11

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	326540	100.000	52856	15403	0.963	--
总计		326540	100.000	52856			

图99 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1119-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 00:01:26

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:50:13

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	330324	100.000	53657	15358	0.963	--
总计		330324	100.000	53657			

图100 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1120-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P3.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 00:07:51

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/03/26 08:50:16

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	337371	100.000	54812	15427	0.963	--
总计		337371	100.000	54812			

图101 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

柱 温 :40℃

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1121-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P4.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/26 00:14:14

处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:50:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min


波长:230nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	309771	100.000	50224	15464	0.963	--
总计		309771	100.000	50224			

图102 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1122-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P5.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 00:20:38

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:50:20

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	328705	100.000	53496	15496	0.965	--
总计		328705	100.000	53496			

图103 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1123-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P6.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 00:27:02

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:50:23

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	329067	100.000	53395	15454	0.963	--
总计		329067	100.000	53395			

图104 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1124-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/26 00:33:26
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:50:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	332018	100.000	54019	15518	0.965	--
总计		332018	100.000	54019			



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1125-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 00:39:50

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:50:27

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	333500	100.000	54200	15509	0.964	--
总计		333500	100.000	54200			

图106 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1126-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 00:46:14

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/03/26 08:50:30

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.975	339679	100.000	55350	15540	0.965	--
总计		339679	100.000	55350			

图107 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1127-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/26 00:52:39
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:50:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	326458	100.000	53243	15595	0.964	--
总计		326458	100.000	53243			

图108 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1128-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 00:59:04

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/03/26 08:50:36

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	328643	100.000	53514	15571	0.965	--
总计		328643	100.000	53514			

图109 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1129-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 01:05:28

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:50:38

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	336237	100.000	54788	15581	0.968	--
总计		336237	100.000	54788			

图110 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1130-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 01:11:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:50:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	340024	100.000	55380	15560	0.967	--
总计		340024	100.000	55380			

图111 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1131-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/26 01:18:17
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:50:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	338921	100.000	55317	15619	0.967	--
总计		338921	100.000	55317			

图112 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放高湿HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1132-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/26 01:24:39
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:50:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
溶剂



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1133-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 01:31:01

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:50:47

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	341888	100.000	55688	15620	0.968	--
总计		341888	100.000	55688			

图114 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1134-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 01:37:24

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:50:50

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	341016	100.000	55673	15652	0.966	--
总计		341016	100.000	55673			

图115 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1135-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 01:43:48

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/03/26 08:50:52

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	341514	100.000	55728	15612	0.965	--
总计		341514	100.000	55728			

图116 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1136-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 01:50:10

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:50:55

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	339697	100.000	55693	15682	0.966	--
总计		339697	100.000	55693			

图117 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1137-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 01:56:32

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/03/26 08:50:57

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	341700	100.000	55692	15657	0.966	--
总计		341700	100.000	55692			

图118 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1138-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 02:02:54

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:50:59

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	151929	100.000	24876	15679	0.970	--
总计		151929	100.000	24876			

图119 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1139-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/26 02:09:17
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:51:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	123149	100.000	20250	15669	0.968	--
总计		123149	100.000	20250			

图120 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1140-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 02:15:38

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/03/26 08:51:05

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	179030	100.000	29394	15689	0.966	--
总计		179030	100.000	29394			

图121 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1141-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 02:21:59

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:51:07

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.978	180606	100.000	29537	15728	0.966	--
总计		180606	100.000	29537			

图122 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1142-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/26 02:28:22
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:51:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.978	213651	100.000	35075	15678	0.966	--
总计		213651	100.000	35075			

图123 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1143-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 02:34:45

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:51:12

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	163966	100.000	26782	15594	0.972	--
总计		163966	100.000	26782			

图124 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1144-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P1.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 02:41:06

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:51:15

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.978	271100	100.000	44541	15681	0.969	--
总计		271100	100.000	44541			

图125 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1145-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P2.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 02:47:28

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/03/26 08:51:17

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.978	244035	100.000	40096	15740	0.967	--
总计		244035	100.000	40096			

图126 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

柱温 :40℃

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1146-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P3.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/26 02:53:49

处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:51:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min


波长:230nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.978	300840	100.000	49215	15623	0.968	--
总计		300840	100.000	49215			

图127 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1147-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P4.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 03:00:11

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:51:22

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.978	283934	100.000	46582	15755	0.968	--
总计		283934	100.000	46582			

图128 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1148-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P5.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 03:06:34

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:51:24

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.978	293853	100.000	48397	15767	0.969	--
总计		293853	100.000	48397			

图129 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1149-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P6.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 03:12:55

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:51:27

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.978	287230	100.000	47286	15769	0.967	--
总计		287230	100.000	47286			

图130 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1150-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P1.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 03:19:16

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:51:29

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	304170	100.000	49958	15706	0.967	--
总计		304170	100.000	49958			

图131 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1151-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P2.lcc
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/26 03:25:38
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:51:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.979	301109	100.000	49480	15707	0.971	--
总计		301109	100.000	49480			

图132 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1152-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P3.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 03:32:00

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/03/26 08:51:34

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.979	314864	100.000	51825	15733	0.967	--
总计		314864	100.000	51825			

图133 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1153-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P4.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 03:38:22

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/03/26 08:51:37

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.979	308808	100.000	50813	15704	0.969	--
总计		308808	100.000	50813			

图134 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1154-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P5.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 03:44:44

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:51:39

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.979	307392	100.000	50560	15703	0.968	--
总计		307392	100.000	50560			

图135 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1155-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P6.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 03:51:06

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:51:41

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.979	320600	100.000	52474	15689	0.969	--
总计		320600	100.000	52474			

图136 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1156-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P1.lcc
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 03:57:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:51:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.979	315633	100.000	51845	15668	0.966	--
总计		315633	100.000	51845			

图137 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1157-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P2.lcc
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/26 04:03:48
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:51:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.978	322240	100.000	52793	15652	0.971	--
总计		322240	100.000	52793			

图138 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1158-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P3.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 04:10:11

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:51:48

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.978	317300	100.000	52216	15699	0.969	--
总计		317300	100.000	52216			

图139 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1159-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P4.lcc
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/26 04:16:32
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:51:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.980	313611	100.000	51577	15718	0.969	--
总计		313611	100.000	51577			

图140 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1160-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P5.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 04:22:53

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:51:53

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.980	310318	100.000	51041	15729	0.968	--
总计		310318	100.000	51041			

图141 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1161-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P6.lcc
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/26 04:29:15
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:51:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.981	323126	100.000	53277	15732	0.969	--
总计		323126	100.000	53277			

图142 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1162-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P1.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 04:35:37

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:51:58

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.980	323791	100.000	53276	15672	0.971	--
总计		323791	100.000	53276			

图143 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1163-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P2.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 04:41:58

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:52:00

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.980	330195	100.000	54379	15747	0.969	--
总计		330195	100.000	54379			

图144 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1164-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P3.lcc
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/26 04:48:20
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:52:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.979	322157	100.000	52981	15753	0.971	--
总计		322157	100.000	52981			

图145 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1165-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P4.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 04:54:41

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:52:05

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.981	316240	100.000	52020	15732	0.970	--
总计		316240	100.000	52020			

图146 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1166-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P5.lcc
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/26 05:01:03
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:52:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.981	312323	100.000	51196	15664	0.971	--
总计		312323	100.000	51196			

图147 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1167-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P6.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 05:07:24

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:52:10

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.980	328834	100.000	54081	15734	0.971	--
总计		328834	100.000	54081			

图148 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1168-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P1.lcc
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 05:13:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:52:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.980	325803	100.000	53526	15668	0.973	--
总计		325803	100.000	53526			

图149 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1169-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P2.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 05:20:07

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:52:14

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.981	333593	100.000	54764	15713	0.971	--
总计		333593	100.000	54764			

图150 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1170-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P3.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 05:26:28

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/03/26 08:52:17

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.981	325129	100.000	53471	15681	0.970	--
总计		325129	100.000	53471			

图151 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1171-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P4.lcc
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/26 05:32:49
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:52:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.982	314802	100.000	51795	15743	0.972	--
总计		314802	100.000	51795			

图152 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1172-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P5.lcc
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 05:39:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:52:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.982	309813	100.000	50885	15727	0.969	--
总计		309813	100.000	50885			

图153 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1173-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P6.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 05:45:33

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:52:24

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.982	330092	100.000	54208	15743	0.970	--
总计		330092	100.000	54208			

图154 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1174-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P1.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 05:51:54

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/03/26 08:52:26

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.983	323496	100.000	53263	15748	0.971	--
总计		323496	100.000	53263			

图155 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1175-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P2.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 05:58:15

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/03/26 08:52:29

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.982	333146	100.000	54607	15710	0.974	--
总计		333146	100.000	54607			

图156 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1176-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P3.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 06:04:38

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:52:31

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.983	326468	100.000	53362	15713	0.973	--
总计		326468	100.000	53362			

图157 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1177-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P4.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 06:11:00

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:52:33

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.983	313900	100.000	51640	15828	0.971	--
总计		313900	100.000	51640			

图158 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1178-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P5.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 06:17:21

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:52:36

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.983	309997	100.000	50826	15764	0.970	--
总计		309997	100.000	50826			

图159 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1179-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P6.lcc

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 06:23:43

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/03/26 08:52:38

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.983	328455	100.000	54022	15789	0.971	--
总计		328455	100.000	54022			

图160 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1180-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/26 06:30:06
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:52:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.983	328135	100.000	53877	15739	0.971	--
总计		328135	100.000	53877			

图161 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1181-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/26 06:36:29
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:52:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.984	335193	100.000	54777	15745	0.969	--
总计		335193	100.000	54777			

图162 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1182-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 06:42:50

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:52:45

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.983	330840	100.000	54115	15745	0.972	--
总计		330840	100.000	54115			

图163 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

柱温 :40℃

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1183-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/26 06:49:12

处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:52:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min


波长:230nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.984	335081	100.000	54855	15735	0.971	--
总计		335081	100.000	54855			

图164 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1184-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/26 06:55:35
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:52:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.984	328901	100.000	53938	15790	0.969	--
总计		328901	100.000	53938			

图165 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1185-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 07:01:57

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/03/26 08:52:53

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.984	332466	100.000	54314	15747	0.969	--
总计		332466	100.000	54314			

图166 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1186-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 07:08:20

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:52:55

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.984	340964	100.000	55836	15807	0.970	--
总计		340964	100.000	55836			

图167 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-10/10-1187-2 - zzp-2024012321p-rcqx-yxys30t-lpgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX259.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX259.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 07:14:42

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:52:57

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.984	341298	100.000	55862	15767	0.972	--
总计		341298	100.000	55862			

图168 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
自制品-2024012321批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2