



依折麦布片项目信息

介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	ZT-705-231101-1-D	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	500
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.39	340669	340033	340427	340786	340216	340426	0.10
2	10.41	340421	340812				340616	0.09

单位质量响应值		RSD%	判断
32764.77	32720.08	0.10	数据可信



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



影响因素30天-包装高温-供试品溶液-X024017批-pH4.5(内含%SDS)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	179527	-	179527	54.830	49.87	9.96	54.83	49.86	9.96
	2	157594	-	157594	48.131			48.13		
	3	165094	-	165094	50.422			50.42		
	4	172628	-	172628	52.723			52.72		
	5	133716	-	133716	40.839			40.84		
	6	171090	-	171090	52.253			52.25		
10min	1	268675	-	268675	82.057	78.19	5.21	82.22	78.34	5.22
	2	248121	-	248121	75.780			75.92		
	3	248869	-	248869	76.008			76.16		
	4	274307	-	274307	83.777			83.94		
	5	239307	-	239307	73.088			73.21		
	6	256825	-	256825	78.438			78.59		
15min	1	290394	-	290394	88.690	85.14	3.18	89.10	85.52	3.19
	2	273587	-	273587	83.557			83.93		
	3	277569	-	277569	84.774			85.15		
	4	286788	-	286788	87.589			88.00		
	5	265984	-	265984	81.235			81.58		
	6	278281	-	278281	84.991			85.38		
20min	1	296271	-	296271	90.485	87.63	2.38	91.16	88.26	2.39
	2	282206	-	282206	86.190			86.81		
	3	290326	-	290326	88.670			89.30		
	4	290139	-	290139	88.613			89.28		
	5	277004	-	277004	84.601			85.19		
	6	285505	-	285505	87.197			87.84		
30min	1	302805	-	302805	92.481	90.32	1.84	93.43	91.22	1.85
	2	291067	-	291067	88.896			89.78		
	3	302052	-	302052	92.251			93.15		
	4	292656	-	292656	89.381			90.32		
	5	290611	-	290611	88.757			89.60		
	6	295120	-	295120	90.134			91.04		
45min	1	307642	-	307642	93.958	91.81	1.93	95.18	92.98	1.92
	2	294155	-	294155	89.839			90.99		
	3	306797	-	306797	93.700			94.88		
	4	294902	-	294902	90.067			91.27		
	5	298544	-	298544	91.180			92.29		
	6	301632	-	301632	92.123			93.30		
60min	1	308127	-	308127	94.106	92.22	2.12	95.61	93.67	2.10
	2	294424	-	294424	89.921			91.34		
	3	309132	-	309132	94.413			95.87		
	4	294514	-	294514	89.949			91.43		
	5	303653	-	303653	92.740			94.12		
	6	301915	-	301915	92.209			93.66		
极限	1	317979	-	317979	97.115	97.57	0.76	98.91	99.30	0.74
	2	318161	-	318161	97.171			98.86		
	3	317723	-	317723	97.037			98.78		
	4	318241	-	318241	97.195			98.94		
	5	320964	-	320964	98.027			99.68		
	6	323787	-	323787	98.889			100.62		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



依折麦布片项目信息

介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	ZT-705-231101-1-D	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	500
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.39	340367	340608	340425	341133	340918	340690	0.10
2	10.41	341347	340875				341111	0.10
单位质量响应值			RSD%		判断			
32790.18			32767.63		0.05 数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



影响因素30天-包装高湿-供试品溶液-X024017批-pH4.5(内含%SDS)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	166428	-	166428	50.773	42.87	20.01	50.77	42.87	20.01
	2	174975	-	174975	53.380			53.38		
	3	153249	-	153249	46.752			46.75		
	4	126002	-	126002	38.440			38.44		
	5	109032	-	109032	33.263			33.26		
	6	113520	-	113520	34.632			34.63		
10min	1	285136	-	285136	86.988	79.56	15.65	87.14	79.69	15.64
	2	248996	-	248996	75.962			76.12		
	3	279874	-	279874	85.382			85.52		
	4	280700	-	280700	85.634			85.75		
	5	182547	-	182547	55.690			55.79		
	6	287444	-	287444	87.692			87.80		
15min	1	295412	-	295412	90.123	86.14	12.67	90.54	86.51	12.67
	2	262868	-	262868	80.194			80.58		
	3	300246	-	300246	91.597			91.99		
	4	299319	-	299319	91.315			91.69		
	5	219002	-	219002	66.812			67.08		
	6	317361	-	317361	96.819			97.19		
20min	1	297677	-	297677	90.814	88.22	9.00	91.50	88.85	9.01
	2	269539	-	269539	82.229			82.86		
	3	301551	-	301551	91.995			92.67		
	4	300774	-	300774	91.758			92.40		
	5	247020	-	247020	75.359			75.83		
	6	318514	-	318514	97.170			97.83		
30min	1	298999	-	298999	91.217	90.29	5.48	92.17	91.18	5.51
	2	275706	-	275706	84.111			84.99		
	3	302648	-	302648	92.330			93.28		
	4	302136	-	302136	92.174			93.10		
	5	278130	-	278130	84.850			85.54		
	6	318145	-	318145	97.058			98.01		
45min	1	299090	-	299090	91.245	91.58	4.06	92.47	92.74	4.05
	2	278737	-	278737	85.035			86.16		
	3	302114	-	302114	92.167			93.39		
	4	302602	-	302602	92.316			93.51		
	5	302021	-	302021	92.139			93.09		
	6	316568	-	316568	96.577			97.82		
60min	1	298727	-	298727	91.134	91.84	4.04	92.64	93.28	4.01
	2	279664	-	279664	85.318			86.70		
	3	302420	-	302420	92.261			93.76		
	4	302790	-	302790	92.373			93.85		
	5	305854	-	305854	93.308			94.53		
	6	316771	-	316771	96.639			98.17		
极限	1	314794	-	314794	96.036	97.32	1.70	97.81	99.03	1.71
	2	319066	-	319066	97.339			98.98		
	3	315264	-	315264	96.179			97.96		
	4	318480	-	318480	97.160			98.91		
	5	316896	-	316896	96.677			98.18		
	6	329460	-	329460	100.510			102.33		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



依折麦布片项目信息

介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	ZT-705-231101-1-D	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	500
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.39	341041	341800	341550	341927	341508	341565	0.10
2	10.41	341724	342297				342010	0.12
单位质量响应值			RSD%		判断			
32874.40			32853.99		0.05 数据可信			



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本



影响因素30天-包装光照-供试品溶液-X024017批-pH4.5(内含%SDS)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	143630	-	143630	43.704	38.31	13.38	43.70	38.31	13.38
	2	124310	-	124310	37.825			37.83		
	3	135424	-	135424	41.207			41.21		
	4	136484	-	136484	41.530			41.53		
	5	96767	-	96767	29.445			29.44		
	6	118853	-	118853	36.165			36.16		
10min	1	303859	-	303859	92.459	83.45	6.78	92.59	83.57	6.79
	2	267347	-	267347	81.349			81.46		
	3	278385	-	278385	84.708			84.83		
	4	284324	-	284324	86.515			86.64		
	5	254347	-	254347	77.393			77.48		
	6	257339	-	257339	78.304			78.41		
15min	1	316763	-	316763	96.385	93.03	2.22	96.79	93.40	2.23
	2	307734	-	307734	93.638			94.00		
	3	303093	-	303093	92.226			92.60		
	4	306160	-	306160	93.159			93.54		
	5	304706	-	304706	92.717			93.04		
	6	296010	-	296010	90.071			90.41		
20min	1	316207	-	316207	96.216	95.10	2.51	96.91	95.74	2.48
	2	316628	-	316628	96.344			96.98		
	3	304781	-	304781	92.740			93.39		
	4	305418	-	305418	92.933			93.60		
	5	324464	-	324464	98.729			99.33		
	6	307655	-	307655	93.614			94.23		
30min	1	316234	-	316234	96.224	95.91	2.99	97.21	96.84	2.95
	2	319358	-	319358	97.175			98.10		
	3	306467	-	306467	93.253			94.19		
	4	305705	-	305705	93.021			93.96		
	5	331022	-	331022	100.724			101.62		
	6	312473	-	312473	95.080			95.97		
45min	1	315185	-	315185	95.905	95.97	2.90	97.18	97.19	2.86
	2	319462	-	319462	97.207			98.43		
	3	307990	-	307990	93.716			94.93		
	4	305861	-	305861	93.068			94.29		
	5	331146	-	331146	100.762			101.96		
	6	312725	-	312725	95.157			96.34		
60min	1	314019	-	314019	95.551	95.86	2.89	97.11	97.37	2.85
	2	319662	-	319662	97.268			98.78		
	3	307917	-	307917	93.694			95.19		
	4	304788	-	304788	92.742			94.24		
	5	330316	-	330316	100.509			102.01		
	6	313590	-	313590	95.420			96.89		
极限	1	319323	-	319323	97.164	98.16	1.86	99.01	99.96	1.83
	2	326268	-	326268	99.278			101.08		
	3	316805	-	316805	96.398			98.17		
	4	317008	-	317008	96.460			98.24		
	5	331915	-	331915	100.996			102.80		
	6	324327	-	324327	98.687			100.44		



操作者:

日期: 2026-07-30

复核者:

未审阅版本




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-438-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-9 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 11:50:56 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:54:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
溶剂




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-439-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 11:57:20 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:54:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.960	340669	100.000	54195	14787	0.947	--
总计		340669	100.000	54195			

图2 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-440-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 12:03:42 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:54:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.955	340033	100.000	54256	14761	0.947	--
总计		340033	100.000	54256			

图3 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-2




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-441-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 12:10:06 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:54:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.960	340427	100.000	54084	14763	0.947	--
总计		340427	100.000	54084			

图4 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-3




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-442-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 12:16:28 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:55:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.968	340786	100.000	54049	14775	0.948	--
总计		340786	100.000	54049			

图5 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-4




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-443-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/25 12:22:51
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:55:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.961	340216	100.000	54034	14715	0.946	--
总计		340216	100.000	54034			

图6 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-444-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb

样品瓶号: 1-1

版本号:6.115

进样体积: 10μl

实验者: xiexinhui

进样时间: 2024/03/25 12:29:13


处理者: xiexinhui

处理时间 (V2): 2024/03/26 08:55:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.965	179527	100.000	28489	14673	0.947	--
总计		179527	100.000	28489			

图7 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-445-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb

样品瓶号: 1-10

版本号:6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: xiexinhui

进样时间: 2024/03/25 12:35:34


处理者: xiexinhui

处理时间 (V2): 2024/03/26 08:55:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.958	157594	100.000	24991	14673	0.948	--
总计		157594	100.000	24991			

图8 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-446-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-19 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 12:41:56 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:55:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.958	165094	100.000	26122	14615	0.949	--
总计		165094	100.000	26122			

图9 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-447-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb

样品瓶号: 1-28

版本号:6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: xiexinhui

进样时间: 2024/03/25 12:48:18


处理者: xiexinhui

处理时间 (V2): 2024/03/26 08:55:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.966	172628	100.000	27384	14682	0.949	--
总计		172628	100.000	27384			

图10 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-448-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb

样品瓶号: 1-37

版本号:6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: xiexinhui

进样时间: 2024/03/25 12:54:40


处理者: xiexinhui

处理时间 (V2): 2024/03/26 08:55:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.961	133716	100.000	21286	14720	0.951	--
总计		133716	100.000	21286			

图11 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-449-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 13:01:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:55:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.959	171090	100.000	27146	14696	0.950	--
总计		171090	100.000	27146			

图12 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-450-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 13:07:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:55:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.957	268675	100.000	42739	14706	0.951	--
总计		268675	100.000	42739			

图13 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-451-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-11 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 13:13:46 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:55:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.957	248121	100.000	39565	14750	0.952	--
总计		248121	100.000	39565			

图14 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-452-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-20 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 13:20:08 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:55:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.957	248869	100.000	39625	14703	0.952	--
总计		248869	100.000	39625			

图15 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-453-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-29 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 13:26:30 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:55:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.955	274307	100.000	43688	14672	0.952	--
总计		274307	100.000	43688			

图16 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-454-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-38 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 13:32:51 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:55:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.955	239307	100.000	38131	14703	0.952	--
总计		239307	100.000	38131			

图17 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-455-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 13:39:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:55:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.954	256825	100.000	40878	14653	0.952	--
总计		256825	100.000	40878			

图18 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-456-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-3 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 13:45:33 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:55:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.953	290394	100.000	46160	14633	0.952	--
总计		290394	100.000	46160			

图19 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-457-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-12 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 13:51:55 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:55:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.954	273587	100.000	43459	14598	0.953	--
总计		273587	100.000	43459			

图20 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-458-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-21 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 13:58:17 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:55:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.952	277569	100.000	44174	14686	0.952	--
总计		277569	100.000	44174			

图21 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-459-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-30 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 14:04:38 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:55:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.953	286788	100.000	45650	14662	0.952	--
总计		286788	100.000	45650			

图22 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-460-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-39 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 14:11:00 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:55:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.953	265984	100.000	42301	14632	0.953	--
总计		265984	100.000	42301			

图23 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-461-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-48 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 14:17:22 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:55:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.953	278281	100.000	44266	14636	0.954	--
总计		278281	100.000	44266			

图24 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-462-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 14:23:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:55:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.954	296271	100.000	47239	14680	0.955	--
总计		296271	100.000	47239			

图25 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-463-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-13 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 14:30:06 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:55:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.955	282206	100.000	44967	14680	0.955	--
总计		282206	100.000	44967			

图26 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-464-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-22 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 14:36:28 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:55:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.955	290326	100.000	46369	14720	0.954	--
总计		290326	100.000	46369			

图27 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-465-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-31 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 14:42:50 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:55:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.956	290139	100.000	46340	14743	0.956	--
总计		290139	100.000	46340			

图28 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-466-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-40 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 14:49:12 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:55:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.956	277004	100.000	44364	14822	0.958	--
总计		277004	100.000	44364			

图29 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-467-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-49 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 14:55:33 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:56:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.955	285505	100.000	45803	14845	0.959	--
总计		285505	100.000	45803			

图30 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-468-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-5 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 15:01:55 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:56:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.955	302805	100.000	48605	14865	0.959	--
总计		302805	100.000	48605			

图31 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-469-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-14 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 15:08:17 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:56:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.956	291067	100.000	46532	14768	0.956	--
总计		291067	100.000	46532			

图32 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-470-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-23 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 15:14:39 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:56:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.955	302052	100.000	48331	14795	0.959	--
总计		302052	100.000	48331			

图33 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-471-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-32 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 15:21:01 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:56:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.956	292656	100.000	46711	14710	0.957	--
总计		292656	100.000	46711			

图34 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-472-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 15:27:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:56:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.957	290611	100.000	46288	14687	0.958	--
总计		290611	100.000	46288			

图35 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-473-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-50 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 15:33:47 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:56:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.959	295120	100.000	47018	14834	0.959	--
总计		295120	100.000	47018			

图36 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-474-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-6 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 15:40:09 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:56:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.961	307642	100.000	48939	14716	0.957	--
总计		307642	100.000	48939			

图37 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-475-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-15 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 15:46:32 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:56:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.955	294155	100.000	46981	14705	0.957	--
总计		294155	100.000	46981			

图38 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-476-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-24 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 15:52:54 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:56:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.962	306797	100.000	49012	14791	0.958	--
总计		306797	100.000	49012			

图39 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-477-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-33 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 15:59:15 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:56:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.967	294902	100.000	46637	14649	0.957	--
总计		294902	100.000	46637			

图40 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-478-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 16:05:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:56:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.968	298544	100.000	47507	14827	0.957	--
总计		298544	100.000	47507			

图41 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-479-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 16:11:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:56:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.957	301632	100.000	47964	14636	0.958	--
总计		301632	100.000	47964			

图42 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-480-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 16:18:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:56:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.962	308127	100.000	49104	14701	0.959	--
总计		308127	100.000	49104			

图43 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-481-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-16 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 16:24:43 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:56:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.963	294424	100.000	46852	14667	0.956	--
总计		294424	100.000	46852			

图44 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-482-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-25 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 16:31:05 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:56:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.957	309132	100.000	48948	14495	0.956	--
总计		309132	100.000	48948			

图45 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-483-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-34 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 16:37:27 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:56:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.967	294514	100.000	46637	14646	0.955	--
总计		294514	100.000	46637			

图46 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-484-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-43 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 16:43:49 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:56:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.968	303653	100.000	47927	14580	0.956	--
总计		303653	100.000	47927			

图47 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-485-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-52 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 16:50:11 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:56:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.964	301915	100.000	47982	14629	0.957	--
总计		301915	100.000	47982			

图48 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-486-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 16:56:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:56:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.964	317979	100.000	50628	14673	0.957	--
总计		317979	100.000	50628			

图49 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-487-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-17 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 17:02:55 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:56:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.958	318161	100.000	50470	14644	0.957	--
总计		318161	100.000	50470			

图50 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-488-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/25 17:09:17
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:56:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.959	317723	100.000	50386	14667	0.956	--
总计		317723	100.000	50386			

图51 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-489-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-35 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 17:15:40 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:56:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.958	318241	100.000	50581	14652	0.957	--
总计		318241	100.000	50581			

图52 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-490-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/25 17:22:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:56:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.962	320964	100.000	51053	14645	0.957	--
总计		320964	100.000	51053			

图53 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-491-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/25 17:28:24
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:56:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.964	323787	100.000	51469	14622	0.957	--
总计		323787	100.000	51469			

图54 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-492-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 17:34:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:56:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.966	340421	100.000	54034	14666	0.955	--
总计		340421	100.000	54034			

图55 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-2-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-493-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgw-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 1-27 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 17:41:10 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:57:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.965	340812	100.000	54237	14684	0.957	--
总计		340812	100.000	54237			

图56 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-2-2




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-494-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-9 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 17:47:35 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:57:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
溶剂




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-495-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 17:53:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:57:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.963	340367	100.000	54315	14720	0.957	--
总计		340367	100.000	54315			

图58 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-496-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 18:00:22 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:57:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.964	340608	100.000	54385	14746	0.957	--
总计		340608	100.000	54385			

图59 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-2




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-497-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 18:06:47 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:57:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.964	340425	100.000	54330	14748	0.958	--
总计		340425	100.000	54330			

图60 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-3




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-498-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 18:13:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:57:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.964	341133	100.000	54350	14690	0.957	--
总计		341133	100.000	54350			

图61 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-4




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-499-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 18:19:34 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:57:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.969	340918	100.000	54218	14736	0.958	--
总计		340918	100.000	54218			

图62 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-5




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-500-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 18:25:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:57:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.964	166428	100.000	26573	14748	0.959	--
总计		166428	100.000	26573			

图63 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-501-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-10 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 18:32:21 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:57:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.962	174975	100.000	27932	14721	0.960	--
总计		174975	100.000	27932			

图64 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-502-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-19 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 18:38:45 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:57:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.963	153249	100.000	24467	14717	0.960	--
总计		153249	100.000	24467			

图65 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-503-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-28 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 18:45:07 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:57:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.961	126002	100.000	20155	14797	0.961	--
总计		126002	100.000	20155			

图66 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-504-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-37 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 18:51:32 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:57:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.961	109032	100.000	17492	14889	0.963	--
总计		109032	100.000	17492			

图67 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-505-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 18:57:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:57:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.962	113520	100.000	18256	14934	0.963	--
总计		113520	100.000	18256			

图68 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-506-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 19:04:18

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:57:30

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.962	285136	100.000	45908	14979	0.965	--
总计		285136	100.000	45908			

图69 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-507-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 19:10:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:57:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.962	248996	100.000	40131	14990	0.965	--
总计		248996	100.000	40131			

图70 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-508-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2024/03/25 19:17:04

版本号:6.115

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:57:35

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.961	279874	100.000	45117	15057	0.967	--
总计		279874	100.000	45117			

图71 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-509-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-29 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 19:23:27 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:57:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.957	280700	100.000	45326	15065	0.967	--
总计		280700	100.000	45326			

图72 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-510-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 19:29:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:57:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.958	182547	100.000	29456	15043	0.967	--
总计		182547	100.000	29456			

图73 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-511-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/25 19:36:13

版本号:6.115

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:57:42

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.960	287444	100.000	46336	15072	0.968	--
总计		287444	100.000	46336			

图74 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-512-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 19:42:36

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:57:44

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.961	295412	100.000	47818	15152	0.969	--
总计		295412	100.000	47818			

图75 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40 $^{\circ}$ C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-513-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb

样品瓶号: 2-12

版本号:6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: xiexinhui

进样时间: 2024/03/25 19:49:00


处理者: xiexinhui

处理时间 (V2): 2024/03/26 08:57:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.965	262868	100.000	42514	15134	0.971	--
总计		262868	100.000	42514			

图76 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-514-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 19:55:23

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:57:48

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.961	300246	100.000	48476	15104	0.968	--
总计		300246	100.000	48476			

图77 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-515-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb

样品瓶号: 2-30

版本号:6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: xiexinhui

进样时间: 2024/03/25 20:01:46


处理者: xiexinhui

处理时间 (V2): 2024/03/26 08:57:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.965	299319	100.000	48492	15154	0.970	--
总计		299319	100.000	48492			

图78 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-516-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-39 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 20:08:09 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:57:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.963	219002	100.000	35468	15087	0.969	--
总计		219002	100.000	35468			

图79 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-517-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb

样品瓶号: 2-48

版本号:6.115

进样体积: 10μl

实验者: xiexinhui

进样时间: 2024/03/25 20:14:32


处理者: xiexinhui

处理时间 (V2): 2024/03/26 08:57:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.964	317361	100.000	51379	15114	0.970	--
总计		317361	100.000	51379			

图80 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-518-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/25 20:20:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:57:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.965	297677	100.000	48252	15189	0.970	--
总计		297677	100.000	48252			

图81 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-519-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-13 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 20:27:19 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:58:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.966	269539	100.000	43688	15204	0.970	--
总计		269539	100.000	43688			

图82 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-520-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 20:33:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:58:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.966	301551	100.000	48893	15223	0.972	--
总计		301551	100.000	48893			

图83 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-521-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 20:40:05 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:58:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.967	300774	100.000	48664	15244	0.971	--
总计		300774	100.000	48664			

图84 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-522-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 20:46:29 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:58:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.962	247020	100.000	40205	15270	0.972	--
总计		247020	100.000	40205			

图85 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-523-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb

样品瓶号: 2-49

版本号:6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: xiexinhui

进样时间: 2024/03/25 20:52:52


处理者: xiexinhui

处理时间 (V2): 2024/03/26 08:58:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.962	318514	100.000	51780	15235	0.973	--
总计		318514	100.000	51780			

图86 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-524-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-5 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 20:59:15 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:58:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.963	298999	100.000	48742	15309	0.973	--
总计		298999	100.000	48742			

图87 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-525-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 21:05:39 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:58:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.963	275706	100.000	44985	15309	0.974	--
总计		275706	100.000	44985			

图88 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-526-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 21:12:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:58:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.963	302648	100.000	49287	15269	0.973	--
总计		302648	100.000	49287			

图89 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-527-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 21:18:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:58:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.965	302136	100.000	49330	15385	0.976	--
总计		302136	100.000	49330			

图90 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-528-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 21:24:50

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:58:21

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.964	278130	100.000	45422	15369	0.975	--
总计		278130	100.000	45422			

图91 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-529-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-50 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 21:31:13 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:58:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.966	318145	100.000	51846	15375	0.976	--
总计		318145	100.000	51846			

图92 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-530-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 10 μ l

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 21:37:37

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:58:26

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.961	299090	100.000	48765	15348	0.975	--
总计		299090	100.000	48765			

图93 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-531-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-15 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 21:44:01 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:58:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.963	278737	100.000	45520	15358	0.976	--
总计		278737	100.000	45520			

图94 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-532-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-24 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 21:50:24 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:58:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.964	302114	100.000	49344	15365	0.976	--
总计		302114	100.000	49344			

图95 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-533-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-33 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 21:56:48 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:58:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.966	302602	100.000	49359	15377	0.977	--
总计		302602	100.000	49359			

图96 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-534-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 22:03:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:58:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.966	302021	100.000	49322	15440	0.978	--
总计		302021	100.000	49322			

图97 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-535-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb

样品瓶号: 2-51

版本号:6.115

进样体积: 10μl

实验者: xiexinhui

进样时间: 2024/03/25 22:09:36


处理者: xiexinhui

处理时间 (V2): 2024/03/26 08:58:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.965	316568	100.000	51821	15448	0.978	--
总计		316568	100.000	51821			

图98 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-536-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/25 22:16:00

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 08:58:40

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.964	298727	100.000	48971	15453	0.978	--
总计		298727	100.000	48971			

图99 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-537-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb

样品瓶号: 2-16

版本号:6.115

进样体积: 10μl

实验者: xiexinhui

进样时间: 2024/03/25 22:22:24


处理者: xiexinhui

处理时间 (V2): 2024/03/26 08:58:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.966	279664	100.000	45732	15449	0.979	--
总计		279664	100.000	45732			

图100 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:40°C

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-538-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb

样品瓶号: 2-25

版本号:6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: xiexinhui

进样时间: 2024/03/25 22:28:48


处理者: xiexinhui

处理时间 (V2): 2024/03/26 08:58:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.966	302420	100.000	49493	15465	0.979	--
总计		302420	100.000	49493			

图101 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-539-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 22:35:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:58:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.966	302790	100.000	49580	15528	0.980	--
总计		302790	100.000	49580			

图102 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-540-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 22:41:35 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:58:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.968	305854	100.000	49899	15487	0.980	--
总计		305854	100.000	49899			

图103 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-541-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 22:47:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:58:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.966	316771	100.000	52004	15570	0.981	--
总计		316771	100.000	52004			

图104 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-542-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 22:54:22 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:58:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.968	314794	100.000	51620	15627	0.982	--
总计		314794	100.000	51620			

图105 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-543-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-17 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 23:00:47 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:58:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.965	319066	100.000	52541	15620	0.983	--
总计		319066	100.000	52541			

图106 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-544-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-26 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 23:07:11 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:58:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.967	315264	100.000	51734	15655	0.983	--
总计		315264	100.000	51734			

图107 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-545-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/25 23:13:33
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:59:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.967	318480	100.000	52310	15621	0.984	--
总计		318480	100.000	52310			

图108 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-546-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 23:19:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:59:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.967	316896	100.000	52090	15673	0.985	--
总计		316896	100.000	52090			

图109 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-547-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/25 23:26:22
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:59:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.967	329460	100.000	54123	15659	0.984	--
总计		329460	100.000	54123			

图110 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-548-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 23:32:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:59:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.969	341347	100.000	56157	15654	0.983	--
总计		341347	100.000	56157			

图111 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-2-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-549-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgs-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 2-27 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 23:39:11 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:59:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.967	340875	100.000	56165	15713	0.983	--
总计		340875	100.000	56165			

图112 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-2-2




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-550-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/25 23:45:33
处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:59:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转
溶剂




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-551-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/25 23:51:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:59:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.967	341041	100.000	56205	15709	0.982	--
总计		341041	100.000	56205			

图114 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-552-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/25 23:58:18 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:59:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.964	341800	100.000	56395	15654	0.984	--
总计		341800	100.000	56395			

图115 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-2




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-553-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/26 00:04:40 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:59:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.965	341550	100.000	56326	15680	0.984	--
总计		341550	100.000	56326			

图116 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-3




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-554-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/26 00:11:03 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:59:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.969	341927	100.000	56376	15701	0.984	--
总计		341927	100.000	56376			

图117 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-4




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-555-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/26 00:17:25 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:59:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.964	341508	100.000	56465	15694	0.985	--
总计		341508	100.000	56465			

图118 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-1-5




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-556-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 00:23:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:59:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.966	143630	100.000	23663	15653	0.985	--
总计		143630	100.000	23663			

图119 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-557-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-10 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/26 00:30:09 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:59:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.969	124310	100.000	20476	15675	0.985	--
总计		124310	100.000	20476			

图120 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-558-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-19 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/26 00:36:31 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:59:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.969	135424	100.000	22326	15720	0.986	--
总计		135424	100.000	22326			

图121 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-559-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-28 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/26 00:42:53 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:59:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.968	136484	100.000	22480	15694	0.986	--
总计		136484	100.000	22480			

图122 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-560-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-37 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/26 00:49:15 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:59:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.969	96767	100.000	15943	15696	0.988	--
总计		96767	100.000	15943			

图123 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-561-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 00:55:37 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:59:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.970	118853	100.000	19600	15673	0.987	--
总计		118853	100.000	19600			

图124 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-562-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 01:01:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:59:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.972	303859	100.000	50234	15750	0.988	--
总计		303859	100.000	50234			

图125 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-563-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 01:08:20 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:59:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.965	267347	100.000	44213	15718	0.988	--
总计		267347	100.000	44213			

图126 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-564-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb

样品瓶号: 3-20

版本号:6.115

进样体积: 10μl

实验者: xiexinhui

进样时间: 2024/03/26 01:14:42


处理者: xiexinhui

处理时间 (V2): 2024/03/26 08:59:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.966	278385	100.000	45968	15743	0.989	--
总计		278385	100.000	45968			

图127 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-565-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-29 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/26 01:21:03 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:59:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.967	284324	100.000	46805	15734	0.989	--
总计		284324	100.000	46805			

图128 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-566-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-38 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/26 01:27:24 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:59:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.966	254347	100.000	41974	15748	0.989	--
总计		254347	100.000	41974			

图129 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

柱温 :40℃

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-567-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 10μl

进样时间: 2024/03/26 01:33:45

处理时间 (V2) : 2024/03/26 08:59:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min


波长:230nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.967	257339	100.000	42358	15742	0.989	--
总计		257339	100.000	42358			

图130 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-568-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 01:40:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:59:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.968	316763	100.000	52180	15747	0.989	--
总计		316763	100.000	52180			

图131 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-569-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 01:46:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:59:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.965	307734	100.000	50922	15720	0.990	--
总计		307734	100.000	50922			

图132 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-570-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 01:52:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 08:59:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.966	303093	100.000	50106	15740	0.990	--
总计		303093	100.000	50106			

图133 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-571-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-30 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/26 01:59:12 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 08:59:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.968	306160	100.000	50327	15699	0.990	--
总计		306160	100.000	50327			

图134 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-572-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-39 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/26 02:05:33 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 09:00:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.968	304706	100.000	50193	15746	0.990	--
总计		304706	100.000	50193			

图135 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:40℃ 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-573-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 02:11:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 09:00:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.967	296010	100.000	48794	15720	0.989	--
总计		296010	100.000	48794			

图136 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-574-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 02:18:16 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 09:00:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.969	316207	100.000	52295	15774	0.989	--
总计		316207	100.000	52295			

图137 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-575-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 02:24:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 09:00:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.968	316628	100.000	52229	15759	0.989	--
总计		316628	100.000	52229			

图138 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-576-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 02:30:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 09:00:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.968	304781	100.000	50229	15761	0.989	--
总计		304781	100.000	50229			

图139 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-577-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 02:37:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 09:00:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.969	305418	100.000	50468	15789	0.990	--
总计		305418	100.000	50468			

图140 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-578-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 02:43:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 09:00:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.966	324464	100.000	53642	15774	0.991	--
总计		324464	100.000	53642			

图141 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-579-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-49 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/26 02:50:02 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 09:00:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.970	307655	100.000	50987	15813	0.992	--
总计		307655	100.000	50987			

图142 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-580-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 02:56:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 09:00:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.969	316234	100.000	52331	15799	0.991	--
总计		316234	100.000	52331			

图143 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-581-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 03:02:44 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 09:00:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.971	319358	100.000	52961	15812	0.992	--
总计		319358	100.000	52961			

图144 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-582-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 03:09:05 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 09:00:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.971	306467	100.000	50905	15850	0.993	--
总计		306467	100.000	50905			

图145 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-583-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 03:15:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 09:00:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.971	305705	100.000	50746	15840	0.995	--
总计		305705	100.000	50746			

图146 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-584-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 03:21:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 09:00:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.972	331022	100.000	54955	15848	0.993	--
总计		331022	100.000	54955			

图147 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-585-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-50 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/26 03:28:09 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 09:00:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.973	312473	100.000	51879	15868	0.993	--
总计		312473	100.000	51879			

图148 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-586-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 03:34:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 09:00:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.968	315185	100.000	52152	15868	0.993	--
总计		315185	100.000	52152			

图149 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-587-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-15 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/26 03:40:52 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 09:00:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.968	319462	100.000	52891	15865	0.994	--
总计		319462	100.000	52891			

图150 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-588-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 03:47:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 09:00:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.973	307990	100.000	51131	15877	0.994	--
总计		307990	100.000	51131			

图151 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-589-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 03:53:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 09:00:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.974	305861	100.000	50724	15864	0.994	--
总计		305861	100.000	50724			

图152 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-590-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 03:59:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 09:00:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.973	331146	100.000	54980	15884	0.995	--
总计		331146	100.000	54980			

图153 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-591-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 04:06:16 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 09:00:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.971	312725	100.000	51975	15876	0.994	--
总计		312725	100.000	51975			

图154 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-592-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 04:12:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 09:00:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.972	314019	100.000	52139	15835	0.994	--
总计		314019	100.000	52139			

图155 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-593-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-16 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/26 04:18:58 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 09:00:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.973	319662	100.000	52987	15827	0.994	--
总计		319662	100.000	52987			

图156 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-594-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-25 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/26 04:25:19 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 09:00:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.973	307917	100.000	51125	15846	0.995	--
总计		307917	100.000	51125			

图157 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:40℃

波长:230nm

数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-595-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 10μl

版本号:6.115

进样时间: 2024/03/26 04:31:40

实验者: xiexinhui


处理时间 (V2): 2024/03/26 09:00:54

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.972	304788	100.000	50480	15782	0.995	--
总计		304788	100.000	50480			

图158 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-596-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 04:38:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 09:00:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	330316	100.000	54693	15913	0.994	--
总计		330316	100.000	54693			

图159 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-597-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 04:44:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 09:00:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.971	313590	100.000	52037	15824	0.994	--
总计		313590	100.000	52037			

图160 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-598-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 04:50:43 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 09:01:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.972	319323	100.000	53055	15864	0.995	--
总计		319323	100.000	53055			

图161 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-599-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 04:57:05 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 09:01:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.972	326268	100.000	54128	15825	0.996	--
总计		326268	100.000	54128			

图162 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-600-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-26 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/26 05:03:27 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 09:01:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.975	316805	100.000	52329	15839	0.996	--
总计		316805	100.000	52329			

图163 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-601-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-35 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/26 05:09:49 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 09:01:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.976	317008	100.000	52398	15849	0.996	--
总计		317008	100.000	52398			

图164 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,3μm)
柱 温 :40℃
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-602-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 10μl
进样时间: 2024/03/26 05:16:10
处理时间 (V2) : 2024/03/26 09:01:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min
波长:230nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.977	331915	100.000	54976	15886	0.997	--
总计		331915	100.000	54976			

图165 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-603-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 05:22:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 09:01:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.975	324327	100.000	53720	15912	0.996	--
总计		324327	100.000	53720			

图166 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40 $^{\circ}$ C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-604-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
进样时间: 2024/03/26 05:28:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/26 09:01:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.971	341724	100.000	56920	15926	0.994	--
总计		341724	100.000	56920			

图167 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-2-1




SMF-4037

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,3 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温:40°C 波长:230nm
数据文件名: RC\$SMF-4037 - 7-11/31-605-2 - cb-X024017p-rcqx-yxys30t-bzgz-pH4.5-sdsjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4037 - rcqx-6min-20240325-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4037 - 20240325-FX280.lcb
样品瓶号: 3-27 版本号:6.115
进样体积: 10 μ l 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/03/26 05:35:16 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/03/26 09:01:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.972	342297	100.000	56929	15888	0.994	--
总计		342297	100.000	56929			

图168 依折麦布片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
参比制剂-X024017批-pH4.5(内含%SDS)介质-浆法-50转
对照品溶液-2-2