



培哚普利氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	DJ468-220103	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	94.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.02	42965	43059	43055	43077	42996	43030	0.12
2	10.02	43159	43036				43098	0.21

单位质量响应值		RSD%	判断
4294.41	4301.20	0.12	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-13

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022081302-1批-10mg/5mg规格-培哌普利-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	49860	-	49860	98.982	98.80	1.10	98.98	98.80	1.10
	2	50605	-	50605	100.461			100.46		
	3	49948	-	49948	99.157			99.16		
	4	49730	-	49730	98.724			98.72		
	5	48935	-	48935	97.146			97.15		
	6	49543	-	49543	98.353			98.35		
10min	1	50063	-	50063	99.385	99.04	0.84	100.48	100.13	0.84
	2	50215	-	50215	99.687			100.80		
	3	49810	-	49810	98.883			99.98		
	4	50114	-	50114	99.486			100.58		
	5	49085	-	49085	97.444			98.52		
	6	50040	-	50040	99.339			100.43		
15min	1	49551	-	49551	98.369	98.07	0.82	100.57	100.26	0.81
	2	49832	-	49832	98.927			101.15		
	3	49628	-	49628	98.522			100.72		
	4	48900	-	48900	97.076			99.28		
	5	48890	-	48890	97.056			99.22		
	6	49591	-	49591	98.448			100.64		
20min	1	49109	-	49109	97.491	96.98	1.14	100.79	100.27	1.12
	2	49526	-	49526	98.319			101.64		
	3	48210	-	48210	95.707			99.00		
	4	49058	-	49058	97.390			100.67		
	5	48134	-	48134	95.556			98.80		
	6	49081	-	49081	97.436			100.73		
30min	1	48151	-	48151	95.589	95.59	0.56	99.97	99.96	0.57
	2	48411	-	48411	96.106			100.52		
	3	47972	-	47972	95.234			99.59		
	4	48169	-	48169	95.625			99.99		
	5	47748	-	47748	94.789			99.09		
	6	48458	-	48458	96.199			100.57		
45min	1	48829	-	48829	96.935	95.17	1.43	102.38	100.59	1.38
	2	48486	-	48486	96.254			101.74		
	3	48153	-	48153	95.593			101.01		
	4	47632	-	47632	94.559			99.98		
	5	46961	-	46961	93.227			98.58		
	6	47568	-	47568	94.432			99.87		
极限	1	47170	-	47170	93.642	93.80	0.87	100.16	100.29	0.86
	2	47889	-	47889	95.069			101.62		
	3	47366	-	47366	94.031			100.51		
	4	47068	-	47068	93.439			99.92		
	5	46652	-	46652	92.614			99.00		
	6	47359	-	47359	94.017			100.51		



操作者:

日期: 2026-08-13

复核者:

未审阅版本



培哚普利氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.721

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.87	82004	82180	82096	82133	81964	82075	0.11
2	13.90	82134	82339				82236	0.18

单位质量响应值		RSD%	判断
5917.45	5916.26	0.02	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-13

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022081302-1批-10mg/5mg规格-氨氯地平-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	34452	-	34452	37.746	37.43	9.27	37.75	37.43	9.27
	2	35782	-	35782	39.203			39.20		
	3	35613	-	35613	39.018			39.02		
	4	35586	-	35586	38.988			38.99		
	5	35763	-	35763	39.182			39.18		
	6	27781	-	27781	30.437			30.44		
10min	1	67932	-	67932	74.426	73.12	3.06	74.85	73.54	3.08
	2	65053	-	65053	71.272			71.71		
	3	68282	-	68282	74.810			75.24		
	4	68527	-	68527	75.078			75.51		
	5	67196	-	67196	73.620			74.06		
	6	63454	-	63454	69.520			69.86		
15min	1	72883	-	72883	79.851	80.21	3.05	81.10	81.44	3.04
	2	69539	-	69539	76.187			77.41		
	3	74996	-	74996	82.166			83.43		
	4	74529	-	74529	81.654			82.92		
	5	75385	-	75385	82.592			83.85		
	6	71957	-	71957	78.836			79.95		
20min	1	73841	-	73841	80.900	82.71	3.07	83.03	84.83	3.05
	2	71920	-	71920	78.796			80.87		
	3	76534	-	76534	83.851			86.03		
	4	78242	-	78242	85.722			87.90		
	5	77120	-	77120	84.493			86.66		
	6	75287	-	75287	82.485			84.47		
30min	1	75486	-	75486	82.703	84.38	3.70	85.74	87.42	3.64
	2	72089	-	72089	78.981			81.93		
	3	78366	-	78366	85.858			88.97		
	4	79574	-	79574	87.181			90.31		
	5	79333	-	79333	86.917			90.03		
	6	77281	-	77281	84.669			87.57		
45min	1	78255	-	78255	85.736	85.71	3.11	89.69	89.68	3.10
	2	73867	-	73867	80.929			84.76		
	3	80141	-	80141	87.803			91.87		
	4	80166	-	80166	87.830			91.93		
	5	79695	-	79695	87.314			91.39		
	6	77239	-	77239	84.623			88.47		
极限	1	79955	-	79955	87.599	89.67	1.64	92.50	94.60	1.68
	2	80472	-	80472	88.165			92.89		
	3	82945	-	82945	90.875			95.91		
	4	82863	-	82863	90.785			95.86		
	5	82981	-	82981	90.914			95.96		
	6	81838	-	81838	89.662			94.45		



操作者:

日期: 2026-08-13

复核者:

未审阅版本



培哚普利氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	DJ468-220103	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	94.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.02	43006	43018	42959	42871	43075	42986	0.18
2	10.02	42886	42924				42905	0.07
单位质量响应值				RSD%	判断			
4290.02				0.14	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-13

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022081302-1批-10mg/5mg规格-培哚普利-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	50569	-	50569	100.667	99.55	0.67	100.67	99.55	0.68
	2	49920	-	49920	99.375			99.37		
	3	49697	-	49697	98.931			98.93		
	4	49726	-	49726	98.989			98.99		
	5	49906	-	49906	99.347			99.35		
	6	50234	-	50234	100.000			100.00		
10min	1	50150	-	50150	99.833	99.26	0.88	100.95	100.36	0.88
	2	49562	-	49562	98.662			99.77		
	3	49411	-	49411	98.361			99.46		
	4	49937	-	49937	99.409			100.51		
	5	49555	-	49555	98.648			99.75		
	6	50555	-	50555	100.639			101.75		
15min	1	49395	-	49395	98.330	98.58	0.78	100.56	100.78	0.77
	2	49148	-	49148	97.838			100.04		
	3	49133	-	49133	97.808			100.00		
	4	49651	-	49651	98.839			101.04		
	5	49627	-	49627	98.791			100.99		
	6	50156	-	50156	99.845			102.07		
20min	1	49507	-	49507	98.553	97.27	0.87	101.87	100.58	0.86
	2	48471	-	48471	96.490			99.78		
	3	48374	-	48374	96.297			99.58		
	4	48809	-	48809	97.163			100.47		
	5	48878	-	48878	97.300			100.60		
	6	49148	-	49148	97.838			101.18		
30min	1	48870	-	48870	97.284	96.24	0.60	101.70	100.63	0.59
	2	48309	-	48309	96.168			100.53		
	3	48330	-	48330	96.210			100.56		
	4	48154	-	48154	95.859			100.24		
	5	48024	-	48024	95.600			99.98		
	6	48390	-	48390	96.329			100.75		
45min	1	48538	-	48538	96.624	95.36	0.91	102.12	100.82	0.89
	2	47360	-	47360	94.279			99.71		
	3	47706	-	47706	94.967			100.39		
	4	48000	-	48000	95.553			101.00		
	5	47591	-	47591	94.738			100.18		
	6	48226	-	48226	96.002			101.50		
极限	1	47830	-	47830	95.214	94.09	1.04	101.78	100.60	1.00
	2	46522	-	46522	92.610			99.09		
	3	47394	-	47394	94.346			100.82		
	4	47449	-	47449	94.456			100.96		
	5	46835	-	46835	93.233			99.73		
	6	47565	-	47565	94.687			101.25		



操作者:

日期: 2026-08-13

复核者:

未审阅版本



培哚普利氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.721

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.87	82171	82018	81929	82082	81907	82021	0.14
2	13.90	81906	81967				81936	0.06
单位质量响应值			RSD%	判断				
5913.55			0.23	数据可信				



操作者:

日期: 2026-08-13

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2022081302-1批-10mg/5mg规格-氨氯地平-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	33348	-	33348	36.615	38.80	5.33	36.62	38.80	5.33
	2	34362	-	34362	37.728			37.73		
	3	36852	-	36852	40.462			40.46		
	4	37688	-	37688	41.380			41.38		
	5	36389	-	36389	39.954			39.95		
	6	33366	-	33366	36.635			36.63		
10min	1	62902	-	62902	69.064	73.70	4.29	69.47	74.13	4.29
	2	64592	-	64592	70.920			71.34		
	3	70665	-	70665	77.588			78.04		
	4	68923	-	68923	75.675			76.14		
	5	67434	-	67434	74.040			74.48		
	6	68221	-	68221	74.904			75.31		
15min	1	68250	-	68250	74.936	81.14	5.51	76.11	82.39	5.49
	2	69237	-	69237	76.020			77.23		
	3	77819	-	77819	85.443			86.75		
	4	76221	-	76221	83.688			84.99		
	5	75746	-	75746	83.167			84.43		
	6	76142	-	76142	83.601			84.84		
20min	1	71667	-	71667	78.688	83.83	5.16	80.69	85.98	5.15
	2	71152	-	71152	78.123			80.17		
	3	80332	-	80332	88.202			90.46		
	4	77714	-	77714	85.327			87.56		
	5	78009	-	78009	85.651			87.84		
	6	79207	-	79207	86.967			89.13		
30min	1	73606	-	73606	80.817	85.88	4.73	83.70	88.97	4.73
	2	73579	-	73579	80.787			83.71		
	3	82158	-	82158	90.207			93.45		
	4	79723	-	79723	87.533			90.71		
	5	79599	-	79599	87.397			90.54		
	6	80657	-	80657	88.559			91.69		
45min	1	75773	-	75773	83.196	87.29	5.48	86.98	91.32	5.43
	2	72801	-	72801	79.933			83.75		
	3	83880	-	83880	92.098			96.34		
	4	81152	-	81152	89.102			93.25		
	5	80210	-	80210	88.068			92.18		
	6	83173	-	83173	91.321			95.44		
极限	1	79820	-	79820	87.640	90.11	3.39	92.34	95.11	3.44
	2	78426	-	78426	86.109			90.81		
	3	85575	-	85575	93.959			99.23		
	4	82928	-	82928	91.052			96.19		
	5	81096	-	81096	89.041			94.13		
	6	84560	-	84560	92.844			97.98		



操作者:

日期: 2026-08-13

复核者:

未审阅版本




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-627-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 19:12:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:46:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-628-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 19:17:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:46:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.506	42965	34.381	6666	1236	0.998	--
2	3.385	82004	65.619	9897	3861	1.007	9.658
总计		124969	100.000	16562			

图2 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-629-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 19:21:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:46:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.505	43059	34.382	6680	1233	0.998	--
2	3.384	82180	65.618	9901	3853	1.005	9.651
总计		125239	100.000	16581			

图3 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-630-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 19:26:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:46:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.505	43055	34.403	6679	1235	0.995	--
2	3.384	82096	65.597	9905	3857	1.006	9.653
总计		125151	100.000	16584			

图4 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-631-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 19:30:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:46:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.505	43077	34.404	6686	1235	0.998	--
2	3.383	82133	65.596	9907	3855	1.003	9.652
总计		125210	100.000	16593			

图5 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-632-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 19:34:46 实验者 : xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:46:30 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.505	42996	34.408	6671	1233	0.999	--
2	3.382	81964	65.592	9911	3855	1.004	9.644
总计		124960	100.000	16582			

图6 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-633-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 19:39:09 实验者 : xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/03/27 09:46:32 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.515	49860	59.138	7594	1210	0.953	--
2	3.398	34452	40.862	4214	4066	1.015	9.722
总计		84312	100.000	11808			

图7 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-634-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 19:43:32 实验者 : xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/03/27 09:46:35 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.515	50605	58.579	7715	1212	0.956	--
2	3.398	35782	41.421	4378	4040	1.005	9.708
总计		86387	100.000	12094			

图8 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-635-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 19:47:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:46:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.515	49948	58.377	7625	1214	0.955	--
2	3.397	35613	41.623	4348	4040	1.016	9.710
总计		85561	100.000	11973			

图9 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-636-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 19:52:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:46:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.515	49730	58.289	7576	1212	0.954	--
2	3.397	35586	41.711	4422	4101	0.997	9.745
总计		85316	100.000	11998			

图10 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-637-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 19:56:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:46:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	48935	57.776	7461	1211	0.955	--
2	3.395	35763	42.224	4436	4071	0.996	9.721
总计		84698	100.000	11897			

图11 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-638-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 20:01:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:46:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.515	49543	64.072	7561	1214	0.957	--
2	3.396	27781	35.928	3463	4095	0.995	9.742
总计		77324	100.000	11024			

图12 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-639-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 20:05:23 实验者 : xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:46:49 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.515	50063	42.428	7619	1209	0.959	--
2	3.396	67932	57.572	8386	4062	1.001	9.708
总计		117995	100.000	16005			

图13 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-640-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 20:09:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:46:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	50215	43.564	7656	1209	0.956	--
2	3.395	65053	56.436	7998	4046	1.003	9.706
总计		115268	100.000	15654			

图14 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-641-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 20:14:07 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:46:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	49810	42.179	7587	1207	0.954	--
2	3.395	68282	57.821	8417	4049	1.000	9.706
总计		118092	100.000	16004			

图15 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-642-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 20:18:29 实验者 : xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:46:57 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.515	50114	42.240	7632	1213	0.956	--
2	3.395	68527	57.760	8462	4059	1.002	9.712
总计		118640	100.000	16094			

图16 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-643-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 20:22:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:47:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.515	49085	42.213	7478	1210	0.955	--
2	3.396	67196	57.787	8278	4056	1.000	9.709
总计		116281	100.000	15755			

图17 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-644-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 20:27:14 实验者 : xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/03/27 09:47:03 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.515	50040	44.091	7598	1208	0.954	--
2	3.397	63454	55.909	7834	4044	1.000	9.699
总计		113494	100.000	15433			

图18 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-645-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 20:31:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:47:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	49551	40.472	7565	1210	0.957	--
2	3.394	72883	59.528	8983	4044	1.000	9.706
总计		122433	100.000	16548			

图19 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-646-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 20:35:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:47:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	49832	41.745	7599	1209	0.954	--
2	3.396	69539	58.255	8600	4054	1.002	9.712
总计		119371	100.000	16198			

图20 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-647-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 20:40:22 实验者 : xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:47:11 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	49628	39.822	7572	1209	0.956	--
2	3.395	74996	60.178	9253	4046	1.000	9.703
总计		124625	100.000	16825			

图21 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-648-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 20:44:43 实验者 : xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:47:14 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	48900	39.618	7466	1213	0.955	--
2	3.395	74529	60.382	9194	4047	1.001	9.714
总计		123429	100.000	16660			

图22 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-649-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 20:49:06 实验者 : xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/03/27 09:47:17 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	48890	39.340	7459	1210	0.952	--
2	3.395	75385	60.660	9279	4038	1.001	9.697
总计		124275	100.000	16738			

图23 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-650-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 20:53:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:47:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	49591	40.799	7569	1210	0.954	--
2	3.395	71957	59.201	8874	4051	1.003	9.711
总计		121548	100.000	16443			

图24 培哌普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-651-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 20:57:50 实验者 : xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/03/27 09:47:22 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	49109	39.942	7490	1210	0.956	--
2	3.395	73841	60.058	9104	4042	1.003	9.703
总计		122950	100.000	16594			

图25 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-652-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 21:02:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:47:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	49526	40.780	7553	1211	0.955	--
2	3.394	71920	59.220	8843	4046	1.000	9.703
总计		121446	100.000	16396			

图26 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-653-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 21:06:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:47:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.515	48210	38.647	7387	1221	0.960	--
2	3.394	76534	61.353	9435	4053	1.002	9.717
总计		124744	100.000	16821			

图27 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-654-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 21:10:56 实验者 : xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/03/27 09:47:30 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	49058	38.537	7480	1211	0.957	--
2	3.395	78242	61.463	9636	4044	1.002	9.705
总计		127300	100.000	17116			

图28 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-655-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 21:15:18 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:47:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	48134	38.429	7351	1212	0.953	--
2	3.394	77120	61.571	9497	4043	0.999	9.707
总计		125255	100.000	16849			

图29 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-656-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 21:19:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:47:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	49081	39.464	7484	1212	0.955	--
2	3.395	75287	60.536	9254	4032	1.002	9.698
总计		124368	100.000	16738			

图30 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-657-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 21:24:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:47:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	48151	38.945	7362	1214	0.954	--
2	3.395	75486	61.055	9322	4049	0.998	9.716
总计		123637	100.000	16684			

图31 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-658-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 21:28:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:47:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	48411	40.175	7387	1214	0.955	--
2	3.395	72089	59.825	8879	4043	1.000	9.712
总计		120500	100.000	16266			

图32 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-659-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 21:32:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:47:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	47972	37.971	7325	1211	0.953	--
2	3.395	78366	62.029	9646	4032	0.998	9.702
总计		126339	100.000	16971			

图33 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-660-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 21:37:08 实验者 : xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/03/27 09:47:46 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	48169	37.708	7356	1211	0.955	--
2	3.393	79574	62.292	9807	4052	1.000	9.712
总计		127743	100.000	17163			

图34 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-661-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 21:41:29 实验者 : xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:47:49 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	47748	37.573	7291	1212	0.955	--
2	3.394	79333	62.427	9752	4031	1.001	9.696
总计		127081	100.000	17043			

图35 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-662-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 21:45:51 实验者 : xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/03/27 09:47:53 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	48458	38.538	7390	1211	0.956	--
2	3.395	77281	61.462	9517	4039	0.998	9.704
总计		125738	100.000	16907			

图36 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-663-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 21:50:13 实验者 : xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/03/27 09:47:55 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	48829	38.422	7433	1204	0.954	--
2	3.393	78255	61.578	9623	4030	1.001	9.688
总计		127084	100.000	17056			

图37 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-664-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 21:54:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:47:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	48486	39.628	7378	1207	0.954	--
2	3.395	73867	60.372	9103	4045	0.999	9.703
总计		122353	100.000	16481			

图38 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-665-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 21:58:57 实验者 : xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/03/27 09:48:01 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.514	48153	37.533	7349	1210	0.955	--
2	3.394	80141	62.467	9883	4055	1.001	9.708
总计		128295	100.000	17233			

图39 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-666-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 22:03:19 实验者 : xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/03/27 09:48:04 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	47632	37.271	7260	1208	0.956	--
2	3.394	80166	62.729	9878	4051	1.001	9.707
总计		127798	100.000	17138			

图40 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-667-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 22:07:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:48:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	46961	37.077	7180	1214	0.954	--
2	3.394	79695	62.923	9816	4052	1.002	9.719
总计		126656	100.000	16997			

图41 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-668-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 22:12:02 实验者 : xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/03/27 09:48:09 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	47568	38.113	7265	1211	0.956	--
2	3.392	77239	61.887	9519	4049	1.003	9.707
总计		124806	100.000	16784			

图42 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-669-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 22:16:27 实验者 : xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/03/27 09:48:12 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	47170	37.105	7189	1208	0.955	--
2	3.394	79955	62.895	9864	4058	1.001	9.713
总计		127126	100.000	17053			

图43 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-670-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 22:20:48 实验者 : xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/03/27 09:48:15 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	47889	37.308	7303	1207	0.954	--
2	3.392	80472	62.692	9903	4052	1.002	9.707
总计		128361	100.000	17206			

图44 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-671-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 22:25:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:48:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	47366	36.348	7217	1205	0.956	--
2	3.393	82945	63.652	10197	4044	1.005	9.702
总计		130311	100.000	17414			

图45 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-672-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 22:29:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:48:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	47068	36.226	7172	1209	0.953	--
2	3.395	82863	63.774	10209	4050	1.002	9.711
总计		129931	100.000	17381			

图46 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-
片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-673-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 22:33:53 实验者 : xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/03/27 09:48:25 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	46652	35.988	7096	1204	0.954	--
2	3.393	82981	64.012	10239	4059	1.005	9.716
总计		129633	100.000	17336			

图47 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-674-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 22:38:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/03/27 09:48:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	47359	36.656	7220	1207	0.955	--
2	3.392	81838	63.344	10079	4041	1.002	9.701
总计		129197	100.000	17300			

图48 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-675-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 22:42:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:48:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.503	43159	34.447	6688	1234	1.000	--
2	3.380	82134	65.553	9937	3852	1.006	9.654
总计		125293	100.000	16625			

图49 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-676-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-1-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 22:47:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:48:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.502	43036	34.325	6676	1234	1.000	--
2	3.378	82339	65.675	9934	3834	1.003	9.643
总计		125375	100.000	16609			

图50 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-677-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 22:51:25 实验者 : xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:48:37 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图51 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-678-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 22:55:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:48:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.502	43006	34.356	6669	1234	0.999	--
2	3.378	82171	65.644	9941	3858	1.008	9.657
总计		125176	100.000	16610			

图52 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-679-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 23:00:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:48:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.502	43018	34.405	6668	1231	1.000	--
2	3.377	82018	65.595	9925	3851	1.008	9.647
总计		125036	100.000	16592			

图53 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-680-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 23:04:38 实验者 : xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:48:46 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.501	42959	34.398	6658	1233	1.001	--
2	3.377	81929	65.602	9912	3854	1.007	9.654
总计		124888	100.000	16570			

图54 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-681-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 23:09:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:48:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.503	42871	34.310	6684	1244	1.001	--
2	3.380	82082	65.690	9943	3863	1.008	9.676
总计		124953	100.000	16627			

图55 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-682-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 23:13:25 实验者 : xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:48:51 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.502	43075	34.465	6682	1233	0.999	--
2	3.378	81907	65.535	9938	3866	1.008	9.660
总计		124982	100.000	16620			

图56 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-683-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 23:17:48 实验者 : xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:48:54 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	50569	60.261	7729	1213	0.956	--
2	3.394	33348	39.739	4156	4115	0.996	9.766
总计		83916	100.000	11885			

图57 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-684-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 23:22:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:48:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	49920	59.230	7632	1214	0.955	--
2	3.392	34362	40.770	4172	4034	1.014	9.713
总计		84282	100.000	11804			

图58 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-685-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 23:26:34 实验者 : xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/03/27 09:49:00 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	49697	57.420	7587	1209	0.959	--
2	3.394	36852	42.580	4527	4073	1.012	9.729
总计		86549	100.000	12113			

图59 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-686-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 23:30:58 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:49:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	49726	56.885	7596	1212	0.954	--
2	3.393	37688	43.115	4674	4091	0.997	9.751
总计		87415	100.000	12271			

图60 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-687-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 23:35:19 实验者 : xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:49:05 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	49906	57.832	7615	1212	0.955	--
2	3.393	36389	42.168	4470	4072	1.015	9.735
总计		86294	100.000	12085			

图61 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-688-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 23:39:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:49:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	50234	60.089	7671	1213	0.956	--
2	3.396	33366	39.911	4163	4092	0.992	9.753
总计		83600	100.000	11834			

图62 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-689-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 23:44:04 实验者 : xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/03/27 09:49:11 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	50150	44.360	7662	1209	0.956	--
2	3.392	62902	55.640	7761	4056	1.003	9.722
总计		113052	100.000	15423			

图63 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-690-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 23:48:27 实验者 : xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:49:14 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	49562	43.417	7559	1209	0.956	--
2	3.392	64592	56.583	7942	4062	1.006	9.728
总计		114154	100.000	15501			

图64 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-691-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 23:52:50 实验者 : xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:49:16 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	49411	41.150	7549	1213	0.956	--
2	3.392	70665	58.850	8688	4045	1.005	9.725
总计		120076	100.000	16237			

图65 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-692-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/26 23:57:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:49:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	49937	42.013	7629	1211	0.954	--
2	3.394	68923	57.987	8478	4055	1.003	9.725
总计		118860	100.000	16107			

图66 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-693-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 00:01:36 实验者 : xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/03/27 09:49:22 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	49555	42.359	7560	1210	0.955	--
2	3.392	67434	57.641	8301	4046	1.005	9.715
总计		116989	100.000	15861			

图67 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-694-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 00:05:59 实验者 : xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:49:24 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	50555	42.563	7718	1212	0.954	--
2	3.394	68221	57.437	8426	4062	1.001	9.732
总计		118776	100.000	16144			

图68 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-695-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 00:10:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:49:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	49395	41.986	7542	1210	0.953	--
2	3.394	68250	58.014	8440	4063	1.002	9.734
总计		117645	100.000	15982			

图69 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-696-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 00:14:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:49:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	49148	41.515	7481	1203	0.953	--
2	3.394	69237	58.485	8558	4062	1.002	9.719
总计		118385	100.000	16039			

图70 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-697-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 00:19:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:49:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	49133	38.702	7494	1209	0.956	--
2	3.394	77819	61.298	9602	4055	1.001	9.724
总计		126952	100.000	17095			

图71 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-698-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 00:23:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:49:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	49651	39.446	7568	1208	0.952	--
2	3.395	76221	60.554	9442	4077	1.003	9.739
总计		125871	100.000	17010			

图72 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-699-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 00:27:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:49:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	49627	39.584	7591	1213	0.953	--
2	3.394	75746	60.416	9349	4061	1.001	9.728
总计		125374	100.000	16940			

图73 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-700-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 00:32:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:49:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.510	50156	39.712	7640	1209	0.957	--
2	3.392	76142	60.288	9386	4059	1.002	9.732
总计		126298	100.000	17026			

图74 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-701-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 00:36:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:49:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	49507	40.856	7540	1204	0.955	--
2	3.393	71667	59.144	8827	4048	1.001	9.716
总计		121173	100.000	16367			

图75 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-702-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 00:41:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:49:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	48471	40.519	7388	1203	0.954	--
2	3.394	71152	59.481	8771	4041	1.002	9.709
总计		119623	100.000	16159			

图76 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-703-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 00:45:27 实验者 : xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:49:49 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	48374	37.585	7379	1208	0.955	--
2	3.393	80332	62.415	9881	4038	1.001	9.716
总计		128706	100.000	17260			

图77 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-704-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 00:49:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:49:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	48809	38.577	7443	1208	0.954	--
2	3.396	77714	61.423	9637	4073	1.001	9.739
总计		126523	100.000	17079			

图78 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-705-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 00:54:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:49:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	48878	38.521	7449	1207	0.955	--
2	3.396	78009	61.479	9618	4051	1.002	9.720
总计		126886	100.000	17067			

图79 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-706-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 00:58:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:49:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.512	49148	38.290	7516	1212	0.956	--
2	3.395	79207	61.710	9787	4071	1.002	9.740
总计		128355	100.000	17302			

图80 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-707-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 01:03:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:50:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	48870	39.902	7445	1204	0.955	--
2	3.393	73606	60.098	9083	4057	1.001	9.721
总计		122476	100.000	16528			

图81 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-708-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 01:07:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:50:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	48309	39.634	7367	1208	0.955	--
2	3.394	73579	60.366	9075	4059	1.002	9.729
总计		121888	100.000	16442			

图82 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-709-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 01:11:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:50:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	48330	37.038	7364	1206	0.957	--
2	3.393	82158	62.962	10138	4058	1.003	9.722
总计		130489	100.000	17502			

图83 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-710-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 01:16:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:50:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.510	48154	37.656	7331	1206	0.954	--
2	3.393	79723	62.344	9839	4060	1.002	9.730
总计		127877	100.000	17170			

图84 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-711-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 01:20:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:50:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	48024	37.630	7323	1205	0.956	--
2	3.393	79599	62.370	9817	4047	1.000	9.717
总计		127624	100.000	17140			

图85 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-712-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 01:25:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:50:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	48390	37.498	7398	1210	0.957	--
2	3.393	80657	62.502	9949	4062	1.004	9.735
总计		129047	100.000	17347			

图86 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-713-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 01:29:25 实验者 : xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:50:18 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	48538	39.046	7397	1208	0.955	--
2	3.393	75773	60.954	9347	4056	1.004	9.730
总计		124311	100.000	16744			

图87 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-714-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 01:33:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:50:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	47360	39.414	7207	1203	0.955	--
2	3.394	72801	60.586	9006	4060	1.001	9.729
总计		120161	100.000	16212			

图88 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-715-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 01:38:13 实验者 : xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:50:24 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	47706	36.255	7286	1211	0.954	--
2	3.394	83880	63.745	10358	4063	1.004	9.736
总计		131586	100.000	17644			

图89 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-716-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 01:42:37 实验者 : xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/03/27 09:50:26 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	48000	37.166	7322	1207	0.954	--
2	3.394	81152	62.834	10018	4070	1.002	9.741
总计		129152	100.000	17339			

图90 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-717-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 01:47:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:50:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	47591	37.238	7258	1208	0.955	--
2	3.394	80210	62.762	9890	4057	1.003	9.730
总计		127801	100.000	17148			

图91 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-718-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 01:51:24 实验者 : xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:50:32 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	48226	36.702	7353	1207	0.955	--
2	3.395	83173	63.298	10245	4047	1.001	9.723
总计		131399	100.000	17598			

图92 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-719-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 01:55:48 实验者 : xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:50:34 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.513	47830	37.470	7287	1207	0.955	--
2	3.397	79820	62.530	9868	4071	1.003	9.732
总计		127650	100.000	17156			

图93 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-
片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-720-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 02:00:12 实验者 : xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/03/27 09:50:37 处理者 : xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	46522	37.233	7112	1209	0.955	--
2	3.395	78426	62.767	9693	4055	1.001	9.733
总计		124948	100.000	16804			

图94 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-
片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-721-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 02:04:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:50:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	47394	35.643	7229	1208	0.956	--
2	3.394	85575	64.357	10550	4057	1.002	9.731
总计		132969	100.000	17779			

图95 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-722-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μ L 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 02:08:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:50:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	47449	36.394	7224	1205	0.954	--
2	3.395	82928	63.606	10234	4057	1.002	9.728
总计		130377	100.000	17457			

图96 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-723-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 02:13:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:50:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	46835	36.610	7134	1206	0.954	--
2	3.394	81096	63.390	9994	4041	1.002	9.719
总计		127932	100.000	17128			

图97 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-724-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 02:17:45 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:50:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.511	47565	36.000	7263	1209	0.956	--
2	3.395	84560	64.000	10422	4054	1.001	9.738
总计		132125	100.000	17685			

图98 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-725-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 02:22:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:50:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.502	42886	34.366	6651	1234	0.999	--
2	3.382	81906	65.634	9912	3857	1.007	9.672
总计		124792	100.000	16564			

图99 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 0-437/24-726-2 - zzp-2022081302p-10mg5mg-pH6.8jz-2-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-20240326-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - J468-20240326-rcqx-FX273.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20μL 版本号: 6.115
进样时间: 2024/03/27 02:26:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/03/27 09:50:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.500	42924	34.369	6653	1230	1.001	--
2	3.380	81967	65.631	9925	3853	1.007	9.669
总计		124891	100.000	16577			

图100 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2022081302-1批(10mg/5mg规格)-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2