



磷酸西格列汀片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101546-202101	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	96.5	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	200
标示量(mg)	50	供试品稀释倍数	1	系数	0.8061


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.71	172204	171556	171872	171454	172630	171943	0.29
2	12.64	173553	174041				173797	0.20

单位质量响应值		RSD%	判断
13528.17	13749.76	1.15	数据可信

溶出曲线测定

磷酸西格列汀片



操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-03-29

复核者:

未审阅版本



长期24月-供试品溶液-2022030401批-水

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	161069	-	161069	82.683	80.80	3.25	82.68	80.80	3.25
	2	153643	-	153643	78.871			78.87		
	3	156728	-	156728	80.455			80.45		
	4	162967	-	162967	83.658			83.66		
	5	149519	-	149519	76.754			76.75		
	6	160447	-	160447	82.364			82.36		
10min	1	171077	-	171077	87.821	88.09	1.06	87.96	88.22	1.06
	2	174347	-	174347	89.499			89.63		
	3	170009	-	170009	87.273			87.41		
	4	173263	-	173263	88.943			89.08		
	5	171080	-	171080	87.822			87.95		
	6	169828	-	169828	87.180			87.32		
15min	1	176560	-	176560	90.635	90.64	2.20	90.92	90.92	2.20
	2	182994	-	182994	93.938			94.22		
	3	174176	-	174176	89.412			89.69		
	4	178092	-	178092	91.422			91.71		
	5	176078	-	176078	90.388			90.66		
	6	171505	-	171505	88.041			88.32		
20min	1	177512	-	177512	91.124	91.89	2.11	91.56	92.32	2.10
	2	185369	-	185369	95.158			95.59		
	3	175844	-	175844	90.268			90.70		
	4	180347	-	180347	92.580			93.02		
	5	179894	-	179894	92.347			92.77		
	6	175077	-	175077	89.874			90.30		
30min	1	178630	-	178630	91.698	93.70	2.09	92.29	94.29	2.08
	2	189081	-	189081	97.063			97.66		
	3	180064	-	180064	92.434			93.01		
	4	183686	-	183686	94.294			94.89		
	5	183641	-	183641	94.270			94.85		
	6	180118	-	180118	92.462			93.04		
45min	1	184643	-	184643	94.785	96.00	2.18	95.52	96.74	2.18
	2	194188	-	194188	99.685			100.44		
	3	184563	-	184563	94.744			95.48		
	4	188641	-	188641	96.837			97.59		
	5	187201	-	187201	96.098			96.83		
	6	182863	-	182863	93.871			94.60		
极限	1	186404	-	186404	95.689	96.75	1.83	96.59	97.65	1.83
	2	193988	-	193988	99.582			100.51		
	3	185776	-	185776	95.366			96.26		
	4	189601	-	189601	97.330			98.24		
	5	190198	-	190198	97.636			98.53		
	6	184856	-	184856	94.894			95.78		



操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-03-29

复核者:

未审阅版本



磷酸西格列汀片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101546-202101	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	96.5	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	200
标示量(mg)	50	供试品稀释倍数	1	系数	0.8061

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.71	173853	173655	173783	173406	173848	173709	0.11
2	12.64	173798	173679				173738	0.05
单位质量响应值			RSD%		判断			
13667.11		13745.09		0.41		数据可信		

溶出曲线测定

磷酸西格列汀片



操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-03-29

复核者:

未审阅版本



长期24月-供试品溶液-2022030501批-水

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	156971	-	156971	80.180	77.31	7.26	80.18	77.31	7.26
	2	160957	-	160957	82.216			82.22		
	3	142403	-	142403	72.739			72.74		
	4	164667	-	164667	84.111			84.11		
	5	145343	-	145343	74.241			74.24		
	6	137752	-	137752	70.363			70.36		
10min	1	169967	-	169967	86.819	86.21	2.57	86.95	86.34	2.58
	2	173666	-	173666	88.708			88.85		
	3	166075	-	166075	84.831			84.95		
	4	172314	-	172314	88.017			88.16		
	5	168825	-	168825	86.235			86.36		
	6	161784	-	161784	82.639			82.76		
15min	1	173912	-	173912	88.834	89.00	1.40	89.11	89.27	1.40
	2	177063	-	177063	90.443			90.73		
	3	175311	-	175311	89.548			89.81		
	4	175148	-	175148	89.465			89.75		
	5	174089	-	174089	88.924			89.19		
	6	169844	-	169844	86.756			87.01		
20min	1	176299	-	176299	90.053	90.33	1.37	90.48	90.75	1.37
	2	179776	-	179776	91.829			92.26		
	3	178140	-	178140	90.993			91.41		
	4	177369	-	177369	90.600			91.04		
	5	176813	-	176813	90.316			90.73		
	6	172593	-	172593	88.160			88.56		
30min	1	180231	-	180231	92.061	92.38	1.30	92.64	92.95	1.31
	2	183866	-	183866	93.918			94.51		
	3	181944	-	181944	92.936			93.50		
	4	181533	-	181533	92.726			93.31		
	5	180720	-	180720	92.311			92.88		
	6	176813	-	176813	90.316			90.86		
45min	1	183077	-	183077	93.515	93.73	1.13	94.25	94.46	1.14
	2	186225	-	186225	95.123			95.87		
	3	184930	-	184930	94.462			95.18		
	4	183089	-	183089	93.521			94.26		
	5	183600	-	183600	93.782			94.50		
	6	180092	-	180092	91.990			92.69		
极限	1	185917	-	185917	94.966	94.98	1.07	95.85	95.86	1.07
	2	187450	-	187450	95.749			96.65		
	3	186887	-	186887	95.461			96.34		
	4	185127	-	185127	94.562			95.46		
	5	187800	-	187800	95.928			96.80		
	6	182458	-	182458	93.199			94.05		



操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-03-29

复核者:

未审阅版本



磷酸西格列汀片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101546-202101	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	96.5	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	200
标示量(mg)	50	供试品稀释倍数	1	系数	0.8061

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.71	173211	173563	173519	173537	173699	173506	0.11
2	12.64	173878	174111				173994	0.10
单位质量响应值			RSD%		判断			
13651.14		13765.35		0.59		数据可信		

溶出曲线测定

磷酸西格列汀片



操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-03-29

复核者:

未审阅版本



长期24月-供试品溶液-2022030601批-水

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	166511	-	166511	85.041	78.84	5.65	85.04	78.84	5.66
	2	157199	-	157199	80.285			80.28		
	3	144301	-	144301	73.698			73.70		
	4	144900	-	144900	74.004			74.00		
	5	153229	-	153229	78.257			78.26		
	6	160079	-	160079	81.756			81.76		
10min	1	177088	-	177088	90.443	87.61	1.89	90.58	87.74	1.89
	2	170769	-	170769	87.215			87.35		
	3	169001	-	169001	86.313			86.44		
	4	167946	-	167946	85.774			85.90		
	5	172726	-	172726	88.215			88.35		
	6	171705	-	171705	87.693			87.83		
15min	1	181496	-	181496	92.694	90.58	1.30	92.99	90.86	1.31
	2	175820	-	175820	89.795			90.07		
	3	176549	-	176549	90.167			90.43		
	4	175950	-	175950	89.862			90.13		
	5	178626	-	178626	91.228			91.51		
	6	175686	-	175686	89.727			90.01		
20min	1	183274	-	183274	93.602	91.93	1.10	94.05	92.36	1.10
	2	178311	-	178311	91.067			91.50		
	3	179821	-	179821	91.839			92.26		
	4	178759	-	178759	91.296			91.71		
	5	181387	-	181387	92.638			93.07		
	6	178446	-	178446	91.136			91.57		
30min	1	184691	-	184691	94.326	93.42	0.75	94.93	94.00	0.75
	2	181833	-	181833	92.866			93.45		
	3	183359	-	183359	93.645			94.22		
	4	182143	-	182143	93.024			93.59		
	5	184178	-	184178	94.064			94.65		
	6	181327	-	181327	92.608			93.19		
45min	1	187419	-	187419	95.719	94.95	0.85	96.48	95.69	0.85
	2	184787	-	184787	94.375			95.11		
	3	186052	-	186052	95.021			95.75		
	4	184832	-	184832	94.398			95.12		
	5	188122	-	188122	96.078			96.82		
	6	184292	-	184292	94.122			94.86		
极限	1	190903	-	190903	97.498	96.33	1.00	98.42	97.23	1.00
	2	187230	-	187230	95.622			96.52		
	3	189082	-	189082	96.568			97.45		
	4	188010	-	188010	96.021			96.90		
	5	190447	-	190447	97.265			98.17		
	6	186074	-	186074	95.032			95.93		



操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-03-29

复核者:

未审阅版本



磷酸西格列汀片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101546-202101	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	96.5	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	200
标示量(mg)	50	供试品稀释倍数	1	系数	0.8061

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.71	174374	174445	174198	174020	174180	174243	0.10
2	12.64	174755	174667				174711	0.04
单位质量响应值				RSD%	判断			
13709.13		13822.07		0.59	数据可信			

溶出曲线测定

磷酸西格列汀片



操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-03-29

复核者:

未审阅版本



长期24月-供试品溶液-U028516批-水

时间(分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	122219	-	122219	62.160	66.92	10.03	62.16	66.92	10.02
	2	129748	-	129748	65.989			65.99		
	3	136493	-	136493	69.419			69.42		
	4	153038	-	153038	77.834			77.83		
	5	133406	-	133406	67.849			67.85		
	6	114543	-	114543	58.256			58.26		
10min	1	151251	-	151251	76.925	81.58	5.83	77.03	81.70	5.84
	2	157934	-	157934	80.324			80.43		
	3	170261	-	170261	86.594			86.71		
	4	170752	-	170752	86.843			86.97		
	5	163438	-	163438	83.124			83.24		
	6	148838	-	148838	75.698			75.80		
15min	1	165530	-	165530	84.188	87.73	3.65	84.42	87.97	3.65
	2	172781	-	172781	87.875			88.12		
	3	180855	-	180855	91.982			92.24		
	4	174777	-	174777	88.890			89.16		
	5	176218	-	176218	89.623			89.87		
	6	164755	-	164755	83.793			84.02		
20min	1	171589	-	171589	87.269	90.77	2.70	87.64	91.17	2.71
	2	180588	-	180588	91.846			92.24		
	3	184300	-	184300	93.734			94.15		
	4	178947	-	178947	91.011			91.43		
	5	181525	-	181525	92.322			92.72		
	6	173935	-	173935	88.462			88.83		
30min	1	178484	-	178484	90.776	93.72	2.21	91.29	94.26	2.22
	2	186962	-	186962	95.088			95.63		
	3	189168	-	189168	96.210			96.78		
	4	182546	-	182546	92.842			93.42		
	5	187001	-	187001	95.108			95.66		
	6	181488	-	181488	92.304			92.81		
45min	1	182553	-	182553	92.845	95.66	2.26	93.51	96.36	2.26
	2	191389	-	191389	97.339			98.04		
	3	193106	-	193106	98.212			98.94		
	4	184747	-	184747	93.961			94.69		
	5	190763	-	190763	97.021			97.73		
	6	185919	-	185919	94.557			95.22		
极限	1	185288	-	185288	94.236	97.24	2.30	95.06	98.10	2.30
	2	194012	-	194012	98.673			99.54		
	3	196225	-	196225	99.799			100.69		
	4	186914	-	186914	95.063			95.95		
	5	194259	-	194259	98.799			99.67		
	6	190419	-	190419	96.846			97.67		



操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-03-29

复核者:


未审阅版本

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-1-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-rj.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-9
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 11:19:29 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:25:17 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-2-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 11:23:52 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:25:19 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.236	172204	100.000	16069	2454	1.537	--
总计		172204	100.000	16069			


图2 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-3-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 11:28:16 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:25:21 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.232	171556	100.000	16074	2452	1.536	--
总计		171556	100.000	16074			


图3 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-4-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 11:32:39 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:25:24 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.228	171872	100.000	16111	2452	1.546	--
总计		171872	100.000	16111			


图4 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-5-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 11:37:02 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:25:27 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.226	171454	100.000	16084	2444	1.542	--
总计		171454	100.000	16084			


图5 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-6-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 11:46:45 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:25:29 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.227	172630	100.000	16350	2462	1.465	--
总计		172630	100.000	16350			


图6 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-7-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-1
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 11:51:07 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:25:32 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.232	161069	100.000	15585	2580	1.464	--
总计		161069	100.000	15585			


图7 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-8-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-10
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 11:55:29 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:25:35 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.231	153643	100.000	14788	2601	1.479	--
总计		153643	100.000	14788			


图8 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-9-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-19
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 11:59:51 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:25:37 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.228	156728	100.000	15125	2587	1.469	--
总计		156728	100.000	15125			


图9 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-10-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-28
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 12:04:13 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:25:39 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.225	162967	100.000	15734	2580	1.452	--
总计		162967	100.000	15734			


图10 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-11-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-37
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 12:08:35 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:25:41 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.225	149519	100.000	14551	2612	1.428	--
总计		149519	100.000	14551			


图11 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-12-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-46
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 12:12:57 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:25:44 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.223	160447	100.000	15291	2581	1.517	--
总计		160447	100.000	15291			


图12 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm)	流速:1.0ml/min
波长 : 220nm	柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-13-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P1.lcd	
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb	
样品瓶号 : 1-2	版本号:6.115
进样体积 : 10 μl	分析者: xiexinhui
进样时间 : 2024/03/28 12:17:19	处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:25:46	
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.219	171077	100.000	16373	2570	1.501	--
总计		171077	100.000	16373			


图13 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-14-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-11
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 12:21:42 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:25:48 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.217	174347	100.000	16848	2569	1.476	--
总计		174347	100.000	16848			


图14 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5µm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-15-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-20
 进样体积 : 10 µl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 12:26:04 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:25:51 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.216	170009	100.000	16487	2565	1.464	--
总计		170009	100.000	16487			


图15 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-16-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-29
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 12:30:26 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:25:53 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.214	173263	100.000	16876	2574	1.462	--
总计		173263	100.000	16876			


图16 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-17-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-1f75z-10min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-38
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 12:34:48 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:25:55 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.213	171080	100.000	16598	2565	1.474	--
总计		171080	100.000	16598			


图17 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-18-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-47
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 12:39:10 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:25:57 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.212	169828	100.000	16442	2579	1.480	--
总计		169828	100.000	16442			


图18 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-19-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-3
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 12:43:32 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:00 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.210	176560	100.000	16877	2559	1.521	--
总计		176560	100.000	16877			


图19 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-20-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-12
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 12:47:55 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:02 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.207	182994	100.000	17745	2553	1.481	--
总计		182994	100.000	17745			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-21-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-21
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 12:52:17 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:04 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.207	174176	100.000	16888	2572	1.479	--
总计		174176	100.000	16888			


图21 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-22-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-30
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 12:56:40 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:06 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.205	178092	100.000	17295	2564	1.484	--
总计		178092	100.000	17295			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-23-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-39
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 13:01:02 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:09 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.204	176078	100.000	17156	2570	1.469	--
总计		176078	100.000	17156			


图23 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-24-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-48
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 13:05:24 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:11 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.204	171505	100.000	16753	2582	1.454	--
总计		171505	100.000	16753			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-25-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-4
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 13:09:47 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:13 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.202	177512	100.000	17161	2556	1.487	--
总计		177512	100.000	17161			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-26-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-13
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 13:14:09 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:16 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.199	185369	100.000	18026	2552	1.474	--
总计		185369	100.000	18026			


图26 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-27-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-22
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 13:18:31 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:18 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.199	175844	100.000	17163	2562	1.457	--
总计		175844	100.000	17163			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-28-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-31
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 13:22:54 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:20 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.198	180347	100.000	17572	2553	1.476	--
总计		180347	100.000	17572			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-29-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-40
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 13:27:17 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:23 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.197	179894	100.000	17499	2557	1.475	--
总计		179894	100.000	17499			


图29 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-30-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-49
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 13:31:39 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:25 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.196	175077	100.000	17075	2561	1.460	--
总计		175077	100.000	17075			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-31-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-5
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 13:36:02 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:28 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.194	178630	100.000	17414	2561	1.469	--
总计		178630	100.000	17414			


图31 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-32-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-14
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 13:40:24 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:30 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.192	189081	100.000	18396	2545	1.475	--
总计		189081	100.000	18396			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm)	流速:1.0ml/min
波长 : 220nm	柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-33-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P3.lcd	
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb	
样品瓶号 : 1-23	版本号:6.115
进样体积 : 10 μl	分析者: xiexinhui
进样时间 : 2024/03/28 13:44:46	处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:33	
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.192	180064	100.000	17537	2554	1.470	--
总计		180064	100.000	17537			


图33 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-34-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-32
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 13:57:04 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:35 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.191	183686	100.000	17673	2560	1.512	--
总计		183686	100.000	17673			


图34 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-35-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-41
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 14:58:30 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:37 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.882	183641	100.000	22445	2870	1.174	--
总计		183641	100.000	22445			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-36-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-50
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 15:29:02 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:39 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	180118	100.000	22411	2839	1.181	--
总计		180118	100.000	22411			


图36 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-37-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-6
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 15:33:23 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:41 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.802	184643	100.000	22946	2826	1.180	--
总计		184643	100.000	22946			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-38-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-15
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 15:37:45 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:44 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.796	194188	100.000	24130	2809	1.198	--
总计		194188	100.000	24130			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-39-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-24
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 15:42:07 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:46 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.793	184563	100.000	22952	2818	1.195	--
总计		184563	100.000	22952			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-40-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-33
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 15:46:30 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:48 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.789	188641	100.000	23477	2806	1.201	--
总计		188641	100.000	23477			


图40 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm)	流速:1.0ml/min
波长 : 220nm	柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-41-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P5.lcd	
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb	
样品瓶号 : 1-42	版本号:6.115
进样体积 : 10 μl	分析者: xiexinhui
进样时间 : 2024/03/28 15:50:51	处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:50	
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.784	187201	100.000	23294	2811	1.202	--
总计		187201	100.000	23294			


图41 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-42-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-51
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 15:55:13 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:53 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.781	182863	100.000	22817	2801	1.200	--
总计		182863	100.000	22817			


图42 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-43-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-7
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 15:59:36 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:55 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.778	186404	100.000	23226	2801	1.200	--
总计		186404	100.000	23226			


图43 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-44-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-16
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 16:03:58 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:26:57 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.774	193988	100.000	24134	2785	1.213	--
总计		193988	100.000	24134			


图44 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-45-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-25
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 16:08:19 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:00 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.772	185776	100.000	23183	2794	1.207	--
总计		185776	100.000	23183			


图45 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-46-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-34
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 16:12:41 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:02 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.769	189601	100.000	23608	2792	1.212	--
总计		189601	100.000	23608			


图46 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-47-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-43
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 16:17:03 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:04 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.765	190198	100.000	23755	2786	1.216	--
总计		190198	100.000	23755			


图47 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-48-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-52
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 16:21:25 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:06 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.763	184856	100.000	23160	2794	1.209	--
总计		184856	100.000	23160			


图48 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-49-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-2-1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-27
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 16:25:48 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:09 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	173553	100.000	21239	2661	1.202	--
总计		173553	100.000	21239			


图49 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-50-2 - zzp-2022030401p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-2-2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 1-27
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 16:30:12 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:11 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	174041	100.000	21337	2657	1.210	--
总计		174041	100.000	21337			


图50 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030401批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm)	流速:1.0ml/min
波长 : 220nm	柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-51-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-rj.lcd	
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb	
样品瓶号 : 2-9	版本号:6.115
进样体积 : 10 μl	分析者: xiexinhui
进样时间 : 2024/03/28 16:34:35	处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:13	
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图51 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-52-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 16:39:00 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:15 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	173853	100.000	21297	2657	1.209	--
总计		173853	100.000	21297			


图52 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-53-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 16:43:23 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:18 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.749	173655	100.000	21317	2652	1.212	--
总计		173655	100.000	21317			


图53 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-54-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 16:47:47 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:20 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.747	173783	100.000	21342	2650	1.214	--
总计		173783	100.000	21342			


图54 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-55-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 16:52:11 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:22 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.745	173406	100.000	21323	2652	1.213	--
总计		173406	100.000	21323			


图55 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-56-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 16:56:36 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:25 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.743	173848	100.000	21319	2649	1.214	--
总计		173848	100.000	21319			


图56 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-57-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-1
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 17:00:59 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:27 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.749	156971	100.000	19831	2824	1.200	--
总计		156971	100.000	19831			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm)	流速:1.0ml/min
波长 : 220nm	柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-58-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P2.lcd	
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb	
样品瓶号 : 2-10	版本号:6.115
进样体积 : 10 μl	分析者: xiexinhui
进样时间 : 2024/03/28 17:05:22	处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:29	
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.746	160957	100.000	20400	2828	1.204	--
总计		160957	100.000	20400			


图58 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-59-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-1f75z-5min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-19
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 17:09:46 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:31 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.747	142403	100.000	18132	2849	1.190	--
总计		142403	100.000	18132			


图59 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-60-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-28
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 17:14:08 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:34 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.742	164667	100.000	20810	2821	1.209	--
总计		164667	100.000	20810			


图60 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-61-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-37
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 17:18:31 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:36 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.743	145343	100.000	18427	2837	1.193	--
总计		145343	100.000	18427			


图61 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-62-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-1f75z-5min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-46
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 17:22:54 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:38 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.743	137752	100.000	17469	2847	1.189	--
总计		137752	100.000	17469			


图62 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-63-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-2
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 17:27:18 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:41 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.737	169967	100.000	21448	2795	1.213	--
总计		169967	100.000	21448			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-64-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-11
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 17:31:42 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:43 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.735	173666	100.000	21904	2797	1.220	--
总计		173666	100.000	21904			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-65-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-20
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 17:36:06 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:45 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.734	166075	100.000	20984	2802	1.213	--
总计		166075	100.000	20984			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-66-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-29
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 17:40:29 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:48 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.732	172314	100.000	21776	2787	1.218	--
总计		172314	100.000	21776			


图66 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-67-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-38
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 17:44:51 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:50 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.732	168825	100.000	21358	2801	1.211	--
总计		168825	100.000	21358			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5µm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-68-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-47
 进样体积 : 10 µl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 17:49:16 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:52 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.731	161784	100.000	20507	2808	1.208	--
总计		161784	100.000	20507			


图68 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-69-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-3
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 17:53:38 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:55 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.727	173912	100.000	21971	2788	1.221	--
总计		173912	100.000	21971			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-70-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-12
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 17:58:01 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:57 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.726	177063	100.000	22315	2780	1.223	--
总计		177063	100.000	22315			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-71-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-21
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 18:02:24 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:27:59 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.725	175311	100.000	22143	2776	1.223	--
总计		175311	100.000	22143			


图71 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-72-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-30
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 18:06:47 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:02 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.723	175148	100.000	22189	2783	1.219	--
总计		175148	100.000	22189			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-73-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-39
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 18:11:11 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:05 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.722	174089	100.000	22041	2781	1.217	--
总计		174089	100.000	22041			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-74-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-48
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 18:15:35 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:07 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	169844	100.000	21555	2795	1.217	--
总计		169844	100.000	21555			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-75-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-4
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 18:19:59 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:10 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.719	176299	100.000	22282	2778	1.221	--
总计		176299	100.000	22282			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-76-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-13
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 18:24:21 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:12 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.718	179776	100.000	22694	2770	1.225	--
总计		179776	100.000	22694			


图76 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-77-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-22
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 18:28:45 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:14 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.717	178140	100.000	22479	2775	1.225	--
总计		178140	100.000	22479			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm)	流速:1.0ml/min
波长 : 220nm	柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-78-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P4.lcd	
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb	
样品瓶号 : 2-31	
进样体积 : 10 μl	版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 18:33:09	分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:17	处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.716	177369	100.000	22457	2776	1.222	--
总计		177369	100.000	22457			


图78 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-79-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-40
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 18:37:33 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:19 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.715	176813	100.000	22419	2776	1.223	--
总计		176813	100.000	22419			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-80-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-49
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 18:41:56 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:21 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.715	172593	100.000	21918	2789	1.216	--
总计		172593	100.000	21918			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-81-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-5
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 18:46:21 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:23 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.712	180231	100.000	22889	2773	1.226	--
总计		180231	100.000	22889			


图81 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-82-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-14
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 18:50:45 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:26 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.711	183866	100.000	23258	2761	1.227	--
总计		183866	100.000	23258			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-83-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-23
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 18:55:07 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:28 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.710	181944	100.000	23023	2763	1.229	--
总计		181944	100.000	23023			


图83 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-84-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-32
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 18:59:31 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:30 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.709	181533	100.000	22941	2769	1.228	--
总计		181533	100.000	22941			


图84 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm)	流速:1.0ml/min
波长 : 220nm	柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-85-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P5.lcd	
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb	
样品瓶号 : 2-41	版本号:6.115
进样体积 : 10 μl	分析者: xiexinhui
进样时间 : 2024/03/28 19:03:55	处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:33	
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.709	180720	100.000	22899	2772	1.227	--
总计		180720	100.000	22899			


图85 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-86-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-50
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 19:08:19 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:35 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.708	176813	100.000	22392	2768	1.225	--
总计		176813	100.000	22392			


图86 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-87-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-6
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 19:12:43 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:37 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.706	183077	100.000	23198	2757	1.227	--
总计		183077	100.000	23198			


图87 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-88-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-15
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 19:17:06 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:39 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.704	186225	100.000	23593	2758	1.230	--
总计		186225	100.000	23593			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-89-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-24
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 19:21:29 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:42 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.703	184930	100.000	23446	2759	1.230	--
总计		184930	100.000	23446			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm)	流速:1.0ml/min
波长 : 220nm	柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-90-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P4.lcd	
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb	
样品瓶号 : 2-33	
进样体积 : 10 μl	版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 19:25:52	分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:44	处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.702	183089	100.000	23252	2759	1.227	--
总计		183089	100.000	23252			


图90 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-91-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-42
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 19:30:17 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:46 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.701	183600	100.000	23255	2762	1.231	--
总计		183600	100.000	23255			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-92-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-51
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 19:34:40 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:48 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.701	180092	100.000	22807	2764	1.232	--
总计		180092	100.000	22807			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-93-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-7
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 19:39:05 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:51 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.700	185917	100.000	23552	2756	1.232	--
总计		185917	100.000	23552			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-94-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-16
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 19:43:30 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:53 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.698	187450	100.000	23798	2758	1.239	--
总计		187450	100.000	23798			


图94 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-95-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-25
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 19:47:55 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:55 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.697	186887	100.000	23711	2747	1.235	--
总计		186887	100.000	23711			


图95 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-96-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-34
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 19:52:19 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:28:58 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.696	185127	100.000	23559	2760	1.234	--
总计		185127	100.000	23559			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-97-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-43
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 19:56:43 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:00 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.694	187800	100.000	23856	2751	1.235	--
总计		187800	100.000	23856			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-98-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-52
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 20:01:07 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:02 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.694	182458	100.000	23186	2764	1.232	--
总计		182458	100.000	23186			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-99-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-2-1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 2-27
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 20:05:31 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:05 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.689	173798	100.000	21657	2619	1.225	--
总计		173798	100.000	21657			


图99 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm)	流速:1.0ml/min
波长 : 220nm	柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-100-2 - zzp-2022030501p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-2-2.lcd	
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb	
样品瓶号 : 2-27	版本号:6.115
进样体积 : 10 μl	分析者: xiexinhui
进样时间 : 2024/03/28 20:09:55	处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:07	
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.688	173679	100.000	21634	2619	1.225	--
总计		173679	100.000	21634			


图100 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030501批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-101-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-rj.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-9
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 20:14:17 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:10 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-102-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 20:18:39 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:12 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.687	173211	100.000	21613	2628	1.226	--
总计		173211	100.000	21613			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-103-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 20:23:02 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:14 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.686	173563	100.000	21605	2618	1.225	--
总计		173563	100.000	21605			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-104-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 20:27:24 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:16 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.686	173519	100.000	21599	2614	1.227	--
总计		173519	100.000	21599			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-105-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 20:31:46 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:19 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.684	173537	100.000	21571	2615	1.228	--
总计		173537	100.000	21571			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-106-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 20:36:09 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:21 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.684	173699	100.000	21604	2623	1.228	--
总计		173699	100.000	21604			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-107-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-1
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 20:40:31 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:23 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.689	166511	100.000	21314	2786	1.221	--
总计		166511	100.000	21314			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-108-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-10
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 20:44:53 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:26 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.690	157199	100.000	20146	2799	1.215	--
总计		157199	100.000	20146			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-109-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-19
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 20:49:14 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:28 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.691	144301	100.000	18529	2810	1.203	--
总计		144301	100.000	18529			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm)	流速:1.0ml/min
波长 : 220nm	柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-110-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-1f75z-5min-P4.lcd	
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb	
样品瓶号 : 3-28	
进样体积 : 10 μl	版本号:6.115
进样时间 : 2024/03/28 20:53:37	分析者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:30	处理者: xiexinhui
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.690	144900	100.000	18646	2813	1.203	--
总计		144900	100.000	18646			


图110 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-111-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-1f75z-5min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-37
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 20:57:59 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:32 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.688	153229	100.000	19690	2803	1.210	--
总计		153229	100.000	19690			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-112-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-1f75z-5min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-46
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 21:02:20 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:35 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.686	160079	100.000	20509	2792	1.214	--
总计		160079	100.000	20509			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-113-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-1f75z-10min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-2
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 21:06:42 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:37 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	177088	100.000	22592	2763	1.229	--
总计		177088	100.000	22592			


图113 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm)	流速:1.0ml/min
波长 : 220nm	柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-114-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-1f75z-10min-P2.lcd	
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb	
样品瓶号 : 3-11	版本号:6.115
进样体积 : 10 μl	分析者: xiexinhui
进样时间 : 2024/03/28 21:11:03	处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:39	
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.683	170769	100.000	21860	2778	1.227	--
总计		170769	100.000	21860			


图114 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-115-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-1f75z-10min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-20
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 21:15:24 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:42 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	169001	100.000	21657	2780	1.223	--
总计		169001	100.000	21657			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-116-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-1f75z-10min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-29
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 21:19:46 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:46 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.682	167946	100.000	21505	2778	1.222	--
总计		167946	100.000	21505			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-117-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-1f75z-10min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-38
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 21:24:08 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:48 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.681	172726	100.000	22163	2774	1.228	--
总计		172726	100.000	22163			


图117 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-118-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-1f75z-10min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-47
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 21:28:30 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:51 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.680	171705	100.000	22040	2781	1.225	--
总计		171705	100.000	22040			


图118 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-119-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-1f75z-15min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-3
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 21:32:52 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:53 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	181496	100.000	23196	2760	1.231	--
总计		181496	100.000	23196			


图119 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm)	流速:1.0ml/min
波长 : 220nm	柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-120-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P2.lcd	
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb	
样品瓶号 : 3-12	版本号:6.115
进样体积 : 10 μl	分析者: xiexinhui
进样时间 : 2024/03/28 21:37:14	处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:55	
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	175820	100.000	22660	2807	1.227	--
总计		175820	100.000	22660			


图120 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-121-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-21
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 21:41:36 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:29:58 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	176549	100.000	22577	2768	1.231	--
总计		176549	100.000	22577			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-122-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-30
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 21:45:58 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:00 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.677	175950	100.000	22452	2762	1.230	--
总计		175950	100.000	22452			


图122 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-123-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-39
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 21:50:20 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:02 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.675	178626	100.000	22825	2759	1.233	--
总计		178626	100.000	22825			


图123 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-124-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-48
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 21:54:42 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:05 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.675	175686	100.000	22474	2764	1.231	--
总计		175686	100.000	22474			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-125-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-4
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 21:59:03 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:07 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.674	183274	100.000	23445	2754	1.237	--
总计		183274	100.000	23445			


图125 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-126-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-13
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 22:03:26 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:09 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.673	178311	100.000	22849	2761	1.233	--
总计		178311	100.000	22849			


图126 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm)	流速:1.0ml/min
波长 : 220nm	柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-127-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P3.lcd	
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb	
样品瓶号 : 3-22	版本号:6.115
进样体积 : 10 μl	分析者: xiexinhui
进样时间 : 2024/03/28 22:07:48	处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:12	
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.672	179821	100.000	23015	2757	1.231	--
总计		179821	100.000	23015			


图127 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-128-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-31
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 22:12:09 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:14 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.672	178759	100.000	22908	2759	1.231	--
总计		178759	100.000	22908			


图128 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-129-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-40
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 22:16:31 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:16 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.671	181387	100.000	23221	2753	1.235	--
总计		181387	100.000	23221			


图129 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm)	流速:1.0ml/min
波长 : 220nm	柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-130-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P6.lcd	
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb	
样品瓶号 : 3-49	版本号:6.115
进样体积 : 10 μl	分析者: xiexinhui
进样时间 : 2024/03/28 22:20:51	处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:18	
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.671	178446	100.000	22871	2755	1.232	--
总计		178446	100.000	22871			


图130 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-131-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-5
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 22:25:13 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:21 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.668	184691	100.000	23607	2750	1.237	--
总计		184691	100.000	23607			


图131 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-132-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-14
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 22:29:35 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:23 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.669	181833	100.000	23268	2753	1.235	--
总计		181833	100.000	23268			


图132 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-133-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-23
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 22:33:56 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:25 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.668	183359	100.000	23447	2756	1.236	--
总计		183359	100.000	23447			


图133 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-134-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-32
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 22:38:17 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:27 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.667	182143	100.000	23340	2756	1.234	--
总计		182143	100.000	23340			


图134 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm)	流速:1.0ml/min
波长 : 220nm	柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-135-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P5.lcd	
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb	
样品瓶号 : 3-41	版本号:6.115
进样体积 : 10 μl	分析者: xiexinhui
进样时间 : 2024/03/28 22:42:38	处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:30	
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.666	184178	100.000	23611	2750	1.237	--
总计		184178	100.000	23611			


图135 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm)	流速:1.0ml/min
波长 : 220nm	柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-136-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P6.lcd	
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb	
样品瓶号 : 3-50	版本号:6.115
进样体积 : 10 μl	分析者: xiexinhui
进样时间 : 2024/03/28 22:46:59	处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:32	
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.666	181327	100.000	23279	2756	1.233	--
总计		181327	100.000	23279			


图136 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-137-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-6
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 22:51:19 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:34 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.664	187419	100.000	24046	2749	1.237	--
总计		187419	100.000	24046			


图137 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-138-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-15
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 22:55:41 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:37 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.663	184787	100.000	23748	2752	1.236	--
总计		184787	100.000	23748			


图138 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-139-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-24
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 23:00:02 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:39 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.663	186052	100.000	23921	2753	1.237	--
总计		186052	100.000	23921			


图139 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-140-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-33
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 23:04:24 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:41 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.663	184832	100.000	23742	2754	1.238	--
总计		184832	100.000	23742			


图140 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-141-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-42
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 23:08:45 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:44 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.661	188122	100.000	24136	2749	1.240	--
总计		188122	100.000	24136			


图141 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-142-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-51
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 23:13:06 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:46 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.660	184292	100.000	23640	2746	1.236	--
总计		184292	100.000	23640			


图142 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-143-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-7
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 23:17:27 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:48 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.660	190903	100.000	24406	2737	1.243	--
总计		190903	100.000	24406			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-144-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-16
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 23:21:48 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:51 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.660	187230	100.000	23975	2748	1.240	--
总计		187230	100.000	23975			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-145-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-25
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 23:26:09 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:53 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.658	189082	100.000	24228	2744	1.240	--
总计		189082	100.000	24228			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-146-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-34
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 23:30:30 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:55 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.658	188010	100.000	24135	2745	1.241	--
总计		188010	100.000	24135			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-147-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-43
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 23:34:51 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:30:57 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	190447	100.000	24441	2735	1.243	--
总计		190447	100.000	24441			


图147 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-148-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-52
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 23:39:12 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:00 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	186074	100.000	23921	2745	1.239	--
总计		186074	100.000	23921			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-149-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-2-1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-27
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 23:43:35 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:02 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	173878	100.000	21857	2609	1.230	--
总计		173878	100.000	21857			


图149 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-150-2 - zzp-2022030601p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-2-2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 3-27
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/28 23:47:58 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:04 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.652	174111	100.000	21855	2602	1.228	--
总计		174111	100.000	21855			


图150 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-2022030601批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-CN(4.6×50mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
波长	: 220nm	柱温	: 30°C
数据文件名	: RC\$J465 - 7-6/7-151-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	分析者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/03/28 23:52:21	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/03/29 08:31:06		
仪器类型	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图151 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
自制品-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm)	流速:1.0ml/min
波长 : 220nm	柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-152-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-1.lcd	
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm	
批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb	
样品瓶号 : 4-18	版本号:6.115
进样体积 : 10 μl	分析者: xiexinhui
进样时间 : 2024/03/28 23:56:45	处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:09	
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.651	174374	100.000	21877	2603	1.229	--
总计		174374	100.000	21877			


图152 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-153-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 00:01:09 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:11 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.650	174445	100.000	21911	2607	1.231	--
总计		174445	100.000	21911			


图153 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-154-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 00:05:32 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:13 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.650	174198	100.000	21880	2608	1.230	--
总计		174198	100.000	21880			


图154 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-155-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 00:09:56 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:15 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.649	174020	100.000	21923	2608	1.226	--
总计		174020	100.000	21923			


图155 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-156-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-1-5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 00:14:19 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:18 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.648	174180	100.000	21941	2606	1.230	--
总计		174180	100.000	21941			


图156 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-157-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-1
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 00:18:41 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:20 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.659	122219	100.000	15865	2826	1.194	--
总计		122219	100.000	15865			


图157 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-158-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-10
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 00:23:03 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:22 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.658	129748	100.000	16898	2829	1.197	--
总计		129748	100.000	16898			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-159-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-19
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 00:27:25 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:25 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.657	136493	100.000	17769	2813	1.201	--
总计		136493	100.000	17769			


图159 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-160-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-28
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 00:31:47 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:27 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	153038	100.000	19857	2790	1.214	--
总计		153038	100.000	19857			


图160 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-161-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-37
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 00:36:11 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:29 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.656	133406	100.000	17383	2821	1.196	--
总计		133406	100.000	17383			


图161 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5µm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-162-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-5min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-46
 进样体积 : 10 µl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 00:40:34 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:32 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.658	114543	100.000	14956	2845	1.188	--
总计		114543	100.000	14956			


图162 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-163-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-2
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 00:44:56 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:34 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.654	151251	100.000	19632	2796	1.214	--
总计		151251	100.000	19632			


图163 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-164-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-11
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 00:49:18 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:37 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.651	157934	100.000	20463	2790	1.217	--
总计		157934	100.000	20463			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-165-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-20
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 00:53:40 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:39 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.649	170261	100.000	21970	2761	1.225	--
总计		170261	100.000	21970			


图165 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm)	流速:1.0ml/min
波长 : 220nm	柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-166-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P4.lcd	
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb	
样品瓶号 : 4-29	版本号:6.115
进样体积 : 10 μl	分析者: xiexinhui
进样时间 : 2024/03/29 00:58:02	处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:41	
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.650	170752	100.000	22022	2764	1.227	--
总计		170752	100.000	22022			


图166 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-167-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-38
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 01:02:24 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:44 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.650	163438	100.000	21109	2774	1.222	--
总计		163438	100.000	21109			


图167 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-168-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-10min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-47
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 01:06:47 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:46 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.650	148838	100.000	19297	2794	1.207	--
总计		148838	100.000	19297			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-169-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-3
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 01:11:09 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:48 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.649	165530	100.000	21396	2773	1.223	--
总计		165530	100.000	21396			


图169 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-170-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-12
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 01:15:31 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:51 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.647	172781	100.000	22360	2759	1.227	--
总计		172781	100.000	22360			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-171-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-21
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 01:19:54 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:53 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.645	180855	100.000	23327	2744	1.234	--
总计		180855	100.000	23327			


图171 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-172-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-30
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 01:24:17 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:55 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.645	174777	100.000	22596	2752	1.231	--
总计		174777	100.000	22596			


图172 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-173-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-39
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 01:28:39 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:31:58 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.644	176218	100.000	22753	2755	1.226	--
总计		176218	100.000	22753			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-174-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-15min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-48
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 01:33:01 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:00 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.645	164755	100.000	21360	2769	1.222	--
总计		164755	100.000	21360			


图174 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-175-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-4
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 01:37:24 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:02 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.645	171589	100.000	22190	2756	1.226	--
总计		171589	100.000	22190			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5µm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-176-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-13
 进样体积 : 10 µl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 01:41:47 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:04 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	180588	100.000	23261	2746	1.237	--
总计		180588	100.000	23261			


图176 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5µm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-177-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-22
 进样体积 : 10 µl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 01:46:09 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:07 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	184300	100.000	23736	2739	1.237	--
总计		184300	100.000	23736			


图177 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-178-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-31
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 01:50:32 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:09 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.643	178947	100.000	23036	2744	1.233	--
总计		178947	100.000	23036			


图178 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-179-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-40
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 01:54:55 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:11 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.642	181525	100.000	23378	2740	1.237	--
总计		181525	100.000	23378			


图179 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-180-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-20min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-49
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 01:59:18 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:14 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.641	173935	100.000	22472	2755	1.228	--
总计		173935	100.000	22472			


图180 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-181-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-5
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 02:03:41 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:16 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.641	178484	100.000	23062	2746	1.232	--
总计		178484	100.000	23062			


图181 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-182-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-14
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 02:08:04 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:18 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	186962	100.000	24194	2745	1.237	--
总计		186962	100.000	24194			


图182 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-183-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-23
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 02:12:27 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:21 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.638	189168	100.000	24425	2731	1.238	--
总计		189168	100.000	24425			


图183 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-184-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-32
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 02:16:50 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:23 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.639	182546	100.000	23638	2743	1.237	--
总计		182546	100.000	23638			


图184 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-185-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-41
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 02:21:13 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:25 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	187001	100.000	24252	2756	1.237	--
总计		187001	100.000	24252			


图185 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-186-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-30min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-50
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 02:25:36 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:27 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.637	181488	100.000	23516	2752	1.230	--
总计		181488	100.000	23516			


图186 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-187-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-6
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 02:29:59 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:30 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	182553	100.000	23583	2737	1.234	--
总计		182553	100.000	23583			


图187 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-188-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-15
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 02:34:23 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:32 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.635	191389	100.000	24684	2729	1.241	--
总计		191389	100.000	24684			


图188 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-189-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-24
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 02:38:46 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:34 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.634	193106	100.000	24829	2723	1.244	--
总计		193106	100.000	24829			


图189 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-190-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-33
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 02:43:09 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:37 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.635	184747	100.000	23819	2730	1.236	--
总计		184747	100.000	23819			


图190 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-191-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-42
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 02:47:32 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:39 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.634	190763	100.000	24574	2726	1.241	--
总计		190763	100.000	24574			


图191 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-192-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-45min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-51
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 02:51:54 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:41 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.635	185919	100.000	23961	2733	1.239	--
总计		185919	100.000	23961			


图192 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-193-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-7
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 02:56:18 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:44 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.634	185288	100.000	23877	2735	1.238	--
总计		185288	100.000	23877			


图193 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-194-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-16
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 03:00:41 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:46 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	194012	100.000	24990	2722	1.244	--
总计		194012	100.000	24990			


图194 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm)	流速:1.0ml/min
波长 : 220nm	柱温:30°C
数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-195-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P3.lcd	
方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm	
批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb	
样品瓶号 : 4-25	版本号:6.115
进样体积 : 10 μl	分析者: xiexinhui
进样时间 : 2024/03/29 03:05:04	处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:48	
仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	196225	100.000	25305	2716	1.244	--
总计		196225	100.000	25305			


图195 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-196-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-34
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 03:09:28 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:51 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	186914	100.000	24141	2730	1.237	--
总计		186914	100.000	24141			


图196 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-197-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名: RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-43
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 03:13:52 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:53 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	194259	100.000	25039	2717	1.242	--
总计		194259	100.000	25039			


图197 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
 参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-198-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-jx-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-52
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 03:18:16 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:56 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	190419	100.000	24702	2741	1.239	--
总计		190419	100.000	24702			

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-199-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-2-1.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-27
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 03:22:39 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:32:58 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	174755	100.000	22100	2594	1.229	--
总计		174755	100.000	22100			


图199 磷酸西格列汀片溶出曲线测定长期24月HPLC图谱
参比制剂-U028516批(50mg规格)-水介质-篮法-75转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-CN(4.6×50mm,5μm) 流速:1.0ml/min
 波长 : 220nm 柱温:30°C
 数据文件名 : RC\$J465 - 7-6/7-200-2 - cb-U028516p-cq24y-rcqx-50mg-shuijz-lf75z-dz-2-2.lcd
 方法文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcm
 批处理文件名 : RC\$J465 - 20240328-FX256.lcb
 样品瓶号 : 4-27
 进样体积 : 10 μl 版本号:6.115
 进样时间 : 2024/03/29 03:27:02 分析者: xiexinhui
 处理时间(V2): 2024/03/29 08:33:00 处理者: xiexinhui
 仪器类型 : SHIMADZU LC-2050C (FX256)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	174667	100.000	22082	2605	1.228	--
总计		174667	100.000	22082			