



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3007-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μ l
进样时间: 2024/04/09 10:38:20
处理时间(V2): 2024/04/10 08:54:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3008-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 10:42:44

处理时间(V2): 2024/04/10 08:54:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.547	513557	100.000	82814	7689	0.973	--
总计		513557	100.000	82814			

SHIMADZU
LabSolutions

J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3009-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 10:47:08

处理时间(V2): 2024/04/10 08:54:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.548	513980	100.000	82848	7688	0.973	--
总计		513980	100.000	82848			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3010-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 10:51:32

处理时间(V2): 2024/04/10 08:54:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.547	514258	100.000	82946	7701	0.972	--
总计		514258	100.000	82946			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3011-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 10:55:56

处理时间 (V2): 2024/04/10 08:54:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.546	514101	100.000	82907	7694	0.973	--
总计		514101	100.000	82907			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3012-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 11:00:20

处理时间(V2): 2024/04/10 08:54:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.546	513924	100.000	82844	7684	0.972	--
总计		513924	100.000	82844			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3013-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 11:04:43

处理时间(V2): 2024/04/10 08:54:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.562	232562	100.000	40930	9299	0.960	--
总计		232562	100.000	40930			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3014-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 11:09:06

处理时间(V2): 2024/04/10 08:54:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.561	265687	100.000	46711	9298	0.961	--
总计		265687	100.000	46711			

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3015-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 11:13:28

处理时间(V2): 2024/04/10 08:54:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	281645	100.000	49432	9300	0.960	--
总计		281645	100.000	49432			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3016-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 11:17:51

处理时间(V2): 2024/04/10 08:54:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	314635	100.000	55158	9288	0.961	--
总计		314635	100.000	55158			

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3017-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 11:22:13

处理时间(V2): 2024/04/10 08:54:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.561	239028	100.000	42040	9306	0.962	--
总计		239028	100.000	42040			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3018-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 11:26:36

处理时间(V2): 2024/04/10 08:54:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	213535	100.000	37477	9314	0.960	--
总计		213535	100.000	37477			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3019-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 11:30:59

处理时间(V2): 2024/04/10 08:54:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	380865	100.000	66897	9300	0.961	--
总计		380865	100.000	66897			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3020-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 11:35:23

处理时间(V2): 2024/04/10 08:54:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.561	387734	100.000	68132	9296	0.961	--
总计		387734	100.000	68132			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3021-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 20 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/04/09 11:39:45

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/04/10 08:54:52

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	396396	100.000	69621	9300	0.961	--
总计		396396	100.000	69621			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3022-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 11:44:08

处理时间(V2): 2024/04/10 08:54:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	420395	100.000	73815	9310	0.961	--
总计		420395	100.000	73815			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3023-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 20 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/04/09 11:48:31

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/04/10 08:54:58

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	351572	100.000	61734	9303	0.961	--
总计		351572	100.000	61734			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3024-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 11:52:54

处理时间(V2): 2024/04/10 08:55:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	368084	100.000	64627	9310	0.961	--
总计		368084	100.000	64627			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3025-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 11:57:18

处理时间(V2): 2024/04/10 08:55:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	445429	100.000	78214	9305	0.961	--
总计		445429	100.000	78214			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3026-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 12:01:42

处理时间 (V2): 2024/04/10 08:55:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	431419	100.000	75641	9312	0.961	--
总计		431419	100.000	75641			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3027-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 12:06:05

处理时间(V2): 2024/04/10 08:55:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	443038	100.000	77744	9296	0.961	--
总计		443038	100.000	77744			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3028-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 12:10:28

处理时间(V2): 2024/04/10 08:55:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	462306	100.000	81078	9298	0.961	--
总计		462306	100.000	81078			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3029-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 20 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/04/09 12:14:51

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/04/10 08:55:13

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	414475	100.000	72764	9298	0.961	--
总计		414475	100.000	72764			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3030-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 20 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/04/09 12:19:14

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/04/10 08:55:15

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	423439	100.000	74217	9308	0.962	--
总计		423439	100.000	74217			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3031-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 12:23:38

处理时间(V2): 2024/04/10 08:55:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	474887	100.000	83416	9309	0.961	--
总计		474887	100.000	83416			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3032-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 12:28:01

处理时间(V2): 2024/04/10 08:55:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	457833	100.000	80465	9316	0.961	--
总计		457833	100.000	80465			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3033-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 12:32:23

处理时间(V2): 2024/04/10 08:55:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	468103	100.000	82054	9312	0.961	--
总计		468103	100.000	82054			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3034-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 12:36:46

处理时间(V2): 2024/04/10 08:55:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	484407	100.000	84955	9318	0.961	--
总计		484407	100.000	84955			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3035-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 12:41:08

处理时间(V2): 2024/04/10 08:55:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	446122	100.000	78236	9298	0.961	--
总计		446122	100.000	78236			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3036-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 12:45:31

处理时间 (V2): 2024/04/10 08:55:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	452945	100.000	79298	9299	0.962	--
总计		452945	100.000	79298			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3037-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 12:49:54

处理时间(V2): 2024/04/10 08:55:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	496418	100.000	86988	9306	0.961	--
总计		496418	100.000	86988			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3038-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 12:54:17

处理时间(V2): 2024/04/10 08:55:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	482640	100.000	84561	9303	0.961	--
总计		482640	100.000	84561			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3039-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 12:58:39

处理时间(V2): 2024/04/10 08:55:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	494245	100.000	86631	9308	0.961	--
总计		494245	100.000	86631			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3040-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 13:03:01

处理时间(V2): 2024/04/10 08:55:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	505041	100.000	88788	9325	0.961	--
总计		505041	100.000	88788			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3041-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 13:07:23

处理时间(V2): 2024/04/10 08:55:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	478368	100.000	83843	9303	0.962	--
总计		478368	100.000	83843			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3042-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 13:11:46

处理时间(V2): 2024/04/10 08:55:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	486604	100.000	85554	9314	0.961	--
总计		486604	100.000	85554			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3043-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 13:16:09

处理时间(V2): 2024/04/10 08:55:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	508625	100.000	89435	9325	0.961	--
总计		508625	100.000	89435			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3044-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 13:20:32

处理时间(V2): 2024/04/10 08:55:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	494870	100.000	86997	9323	0.962	--
总计		494870	100.000	86997			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3045-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 13:24:55

处理时间(V2): 2024/04/10 08:55:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.561	502536	100.000	88188	9277	0.961	--
总计		502536	100.000	88188			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3046-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 13:29:17

处理时间(V2): 2024/04/10 08:55:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	508483	100.000	88993	9268	0.961	--
总计		508483	100.000	88993			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3047-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 13:33:40

处理时间(V2): 2024/04/10 08:56:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	508448	100.000	89126	9274	0.961	--
总计		508448	100.000	89126			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3048-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 13:38:02

处理时间(V2): 2024/04/10 08:56:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	495080	100.000	86696	9286	0.961	--
总计		495080	100.000	86696			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3049-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-jx-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 13:42:25

处理时间(V2): 2024/04/10 08:56:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	508313	100.000	89245	9292	0.962	--
总计		508313	100.000	89245			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3050-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-jx-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 13:46:48

处理时间(V2): 2024/04/10 08:56:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	511513	100.000	89723	9278	0.961	--
总计		511513	100.000	89723			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3051-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-jx-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 20 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/04/09 13:51:11

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/04/10 08:56:11

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.561	512789	100.000	89863	9244	0.961	--
总计		512789	100.000	89863			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3052-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-jx-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 13:55:33

处理时间(V2): 2024/04/10 08:56:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	507839	100.000	89104	9289	0.961	--
总计		507839	100.000	89104			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3053-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-jx-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 13:59:55

处理时间(V2): 2024/04/10 08:56:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	514231	100.000	90143	9266	0.961	--
总计		514231	100.000	90143			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3054-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-jx-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 20 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/04/09 14:04:18

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/04/10 08:56:19

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	502938	100.000	88127	9261	0.961	--
总计		502938	100.000	88127			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3055-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 14:08:42

处理时间(V2): 2024/04/10 08:56:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.543	514903	100.000	82907	7704	0.973	--
总计		514903	100.000	82907			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3056-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx1-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 14:13:05

处理时间(V2): 2024/04/10 08:56:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.544	514804	100.000	83125	7724	0.972	--
总计		514804	100.000	83125			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)
柱温: 40°C
数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3057-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μ l
进样时间: 2024/04/09 14:17:29
处理时间(V2): 2024/04/10 08:56:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3058-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 14:21:54

处理时间(V2): 2024/04/10 08:56:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.543	515835	100.000	83119	7712	0.972	--
总计		515835	100.000	83119			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3059-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 14:26:19

处理时间(V2): 2024/04/10 08:56:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.545	515389	100.000	83307	7725	0.972	--
总计		515389	100.000	83307			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3060-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 14:30:44

处理时间(V2): 2024/04/10 08:56:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.545	514380	100.000	83085	7719	0.973	--
总计		514380	100.000	83085			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3061-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 14:35:09

处理时间(V2): 2024/04/10 08:56:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.545	514972	100.000	83264	7730	0.973	--
总计		514972	100.000	83264			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3062-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 14:39:34

处理时间(V2): 2024/04/10 08:56:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.545	515385	100.000	83285	7723	0.973	--
总计		515385	100.000	83285			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3063-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 14:43:59

处理时间(V2): 2024/04/10 08:56:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	178113	100.000	31340	9324	0.963	--
总计		178113	100.000	31340			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3064-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 20 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/04/09 14:48:23

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/04/10 08:56:45

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	224488	100.000	39439	9320	0.962	--
总计		224488	100.000	39439			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3065-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 14:52:47

处理时间(V2): 2024/04/10 08:56:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	244660	100.000	42989	9343	0.963	--
总计		244660	100.000	42989			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3066-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 14:57:11

处理时间(V2): 2024/04/10 08:56:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	302805	100.000	53181	9312	0.963	--
总计		302805	100.000	53181			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3067-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 15:01:35

处理时间(V2): 2024/04/10 08:56:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	312589	100.000	54898	9312	0.962	--
总计		312589	100.000	54898			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3068-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 15:05:59

处理时间(V2): 2024/04/10 08:56:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	294405	100.000	51677	9319	0.964	--
总计		294405	100.000	51677			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3069-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 15:10:24

处理时间(V2): 2024/04/10 08:56:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	318419	100.000	55976	9319	0.963	--
总计		318419	100.000	55976			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3070-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 20 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/04/09 15:14:49

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/04/10 08:57:00

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	358301	100.000	62905	9314	0.963	--
总计		358301	100.000	62905			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3071-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 15:19:13

处理时间(V2): 2024/04/10 08:57:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	368171	100.000	64654	9321	0.963	--
总计		368171	100.000	64654			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3072-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 15:23:37

处理时间(V2): 2024/04/10 08:57:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	419356	100.000	73632	9324	0.963	--
总计		419356	100.000	73632			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3073-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 15:28:02

处理时间(V2): 2024/04/10 08:57:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	422139	100.000	74177	9317	0.963	--
总计		422139	100.000	74177			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3074-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 15:32:25

处理时间(V2): 2024/04/10 08:57:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	446093	100.000	78325	9330	0.964	--
总计		446093	100.000	78325			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3075-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 15:36:50

处理时间(V2): 2024/04/10 08:57:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	377543	100.000	66265	9320	0.963	--
总计		377543	100.000	66265			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3076-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 15:41:14

处理时间(V2): 2024/04/10 08:57:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	428563	100.000	75299	9323	0.963	--
总计		428563	100.000	75299			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3077-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 15:45:38

处理时间(V2): 2024/04/10 08:57:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	432861	100.000	76106	9335	0.963	--
总计		432861	100.000	76106			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3078-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 15:50:02

处理时间(V2): 2024/04/10 08:57:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	470093	100.000	82614	9337	0.963	--
总计		470093	100.000	82614			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3079-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 15:54:26

处理时间(V2): 2024/04/10 08:57:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	463504	100.000	81479	9330	0.963	--
总计		463504	100.000	81479			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3080-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 15:58:50

处理时间 (V2): 2024/04/10 08:57:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	494802	100.000	86877	9321	0.963	--
总计		494802	100.000	86877			

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3081-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 16:03:14

处理时间(V2): 2024/04/10 08:57:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	420453	100.000	73941	9325	0.963	--
总计		420453	100.000	73941			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3082-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 16:07:38

处理时间 (V2): 2024/04/10 08:57:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	460948	100.000	81017	9323	0.963	--
总计		460948	100.000	81017			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3083-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 16:12:03

处理时间(V2): 2024/04/10 08:57:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	464092	100.000	81653	9333	0.963	--
总计		464092	100.000	81653			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3084-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 16:16:27

处理时间(V2): 2024/04/10 08:57:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	495133	100.000	86998	9330	0.963	--
总计		495133	100.000	86998			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3085-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 16:20:51

处理时间(V2): 2024/04/10 08:57:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	483701	100.000	85034	9323	0.963	--
总计		483701	100.000	85034			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3086-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 16:25:15

处理时间(V2): 2024/04/10 08:57:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	511493	100.000	89871	9330	0.963	--
总计		511493	100.000	89871			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3087-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 16:29:40

处理时间(V2): 2024/04/10 08:57:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	464259	100.000	81628	9324	0.963	--
总计		464259	100.000	81628			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3088-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 16:34:04

处理时间(V2): 2024/04/10 08:57:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	485969	100.000	85415	9330	0.964	--
总计		485969	100.000	85415			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3089-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 16:38:28

处理时间(V2): 2024/04/10 08:57:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	503750	100.000	88510	9338	0.964	--
总计		503750	100.000	88510			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3090-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 16:42:53

处理时间(V2): 2024/04/10 08:57:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	507377	100.000	89219	9328	0.964	--
总计		507377	100.000	89219			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3091-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 16:47:17

处理时间(V2): 2024/04/10 08:57:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	513556	100.000	90108	9327	0.964	--
总计		513556	100.000	90108			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3092-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 16:51:42

处理时间(V2): 2024/04/10 08:57:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	521378	100.000	91678	9332	0.963	--
总计		521378	100.000	91678			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3093-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 16:56:06

处理时间(V2): 2024/04/10 08:58:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	486115	100.000	85304	9313	0.963	--
总计		486115	100.000	85304			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3094-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 17:00:30

处理时间(V2): 2024/04/10 08:58:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	492625	100.000	86430	9324	0.963	--
总计		492625	100.000	86430			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3095-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 17:04:54

处理时间(V2): 2024/04/10 08:58:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	513596	100.000	90156	9322	0.964	--
总计		513596	100.000	90156			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3096-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 17:09:19

处理时间(V2): 2024/04/10 08:58:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	514031	100.000	90190	9323	0.963	--
总计		514031	100.000	90190			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3097-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 17:13:43

处理时间(V2): 2024/04/10 08:58:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	516596	100.000	90680	9328	0.963	--
总计		516596	100.000	90680			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3098-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 17:18:07

处理时间(V2): 2024/04/10 08:58:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	520848	100.000	91466	9326	0.964	--
总计		520848	100.000	91466			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3099-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-jx-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 17:22:31

处理时间(V2): 2024/04/10 08:58:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	515492	100.000	90682	9327	0.963	--
总计		515492	100.000	90682			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3100-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-jx-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 17:26:56

处理时间(V2): 2024/04/10 08:58:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	491340	100.000	86324	9343	0.963	--
总计		491340	100.000	86324			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3101-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-jx-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 17:31:20

处理时间(V2): 2024/04/10 08:58:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	512137	100.000	89920	9341	0.963	--
总计		512137	100.000	89920			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3102-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-jx-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 17:35:45

处理时间(V2): 2024/04/10 08:58:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	513961	100.000	90185	9323	0.963	--
总计		513961	100.000	90185			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3103-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-jx-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 17:40:09

处理时间(V2): 2024/04/10 08:58:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	514504	100.000	90329	9306	0.963	--
总计		514504	100.000	90329			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3104-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-jx-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 17:44:33

处理时间(V2): 2024/04/10 08:58:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	521289	100.000	91512	9314	0.963	--
总计		521289	100.000	91512			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3105-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 17:48:58

处理时间(V2): 2024/04/10 08:58:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.544	520820	100.000	84268	7752	0.972	--
总计		520820	100.000	84268			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3106-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-jyx2-pH1.0-0.5sdsjz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 17:53:23

处理时间(V2): 2024/04/10 08:58:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.546	521230	100.000	84442	7761	0.972	--
总计		521230	100.000	84442			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3107-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 17:57:46

处理时间(V2): 2024/04/10 08:58:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3108-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 18:02:09

处理时间(V2): 2024/04/10 08:58:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.545	513297	100.000	82921	7717	0.973	--
总计		513297	100.000	82921			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3109-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 18:06:32

处理时间(V2): 2024/04/10 08:58:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.546	513937	100.000	83041	7724	0.973	--
总计		513937	100.000	83041			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3110-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 18:10:55

处理时间(V2): 2024/04/10 08:58:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.545	513622	100.000	83052	7730	0.974	--
总计		513622	100.000	83052			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3111-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 18:15:18

处理时间(V2): 2024/04/10 08:58:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.545	513297	100.000	82982	7737	0.974	--
总计		513297	100.000	82982			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3112-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 18:19:41

处理时间(V2): 2024/04/10 08:58:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.545	513260	100.000	82994	7730	0.974	--
总计		513260	100.000	82994			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3113-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 18:24:04

处理时间(V2): 2024/04/10 08:58:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.561	269380	100.000	47240	9248	0.964	--
总计		269380	100.000	47240			

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3114-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 18:28:26

处理时间 (V2): 2024/04/10 08:58:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	235254	100.000	41249	9264	0.964	--
总计		235254	100.000	41249			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3115-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 18:32:48

处理时间(V2): 2024/04/10 08:58:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	224476	100.000	39418	9265	0.965	--
总计		224476	100.000	39418			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3116-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 18:37:11

处理时间(V2): 2024/04/10 08:59:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	202380	100.000	35508	9248	0.964	--
总计		202380	100.000	35508			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3117-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 18:41:33

处理时间(V2): 2024/04/10 08:59:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	301430	100.000	52968	9256	0.965	--
总计		301430	100.000	52968			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3118-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 18:45:55

处理时间(V2): 2024/04/10 08:59:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	224546	100.000	39497	9271	0.966	--
总计		224546	100.000	39497			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温: 40°C

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3119-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 20μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/04/09 18:50:17

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/04/10 08:59:08

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	386884	100.000	68031	9277	0.966	--
总计		386884	100.000	68031			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3120-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 18:54:40

处理时间(V2): 2024/04/10 08:59:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	347376	100.000	61059	9262	0.964	--
总计		347376	100.000	61059			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3121-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 18:59:03

处理时间(V2): 2024/04/10 08:59:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	370332	100.000	65083	9259	0.965	--
总计		370332	100.000	65083			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3122-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 19:03:25

处理时间(V2): 2024/04/10 08:59:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	337395	100.000	59299	9265	0.965	--
总计		337395	100.000	59299			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3123-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 19:07:48

处理时间(V2): 2024/04/10 08:59:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	406325	100.000	71403	9279	0.965	--
总计		406325	100.000	71403			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3124-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 19:12:10

处理时间(V2): 2024/04/10 08:59:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	357963	100.000	62981	9278	0.966	--
总计		357963	100.000	62981			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3125-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 19:16:33

处理时间(V2): 2024/04/10 08:59:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	444365	100.000	78126	9263	0.966	--
总计		444365	100.000	78126			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3126-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 19:20:55

处理时间(V2): 2024/04/10 08:59:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	421575	100.000	74156	9285	0.966	--
总计		421575	100.000	74156			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3127-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 19:25:18

处理时间(V2): 2024/04/10 08:59:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	448134	100.000	78774	9265	0.966	--
总计		448134	100.000	78774			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3128-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 19:29:40

处理时间(V2): 2024/04/10 08:59:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	410731	100.000	72173	9264	0.966	--
总计		410731	100.000	72173			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3129-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 19:34:02

处理时间(V2): 2024/04/10 08:59:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	455296	100.000	79960	9260	0.965	--
总计		455296	100.000	79960			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3130-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 19:38:25

处理时间(V2): 2024/04/10 08:59:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	422605	100.000	74317	9265	0.966	--
总计		422605	100.000	74317			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3131-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 19:42:47

处理时间(V2): 2024/04/10 08:59:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	479141	100.000	84282	9275	0.966	--
总计		479141	100.000	84282			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3132-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 19:47:09

处理时间(V2): 2024/04/10 08:59:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	467969	100.000	82210	9262	0.966	--
总计		467969	100.000	82210			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3133-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 19:51:31

处理时间(V2): 2024/04/10 08:59:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	482201	100.000	84767	9250	0.966	--
总计		482201	100.000	84767			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3134-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 19:55:53

处理时间(V2): 2024/04/10 08:59:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	449716	100.000	79063	9263	0.966	--
总计		449716	100.000	79063			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3135-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 20:00:16

处理时间(V2): 2024/04/10 08:59:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	498365	100.000	87582	9253	0.966	--
总计		498365	100.000	87582			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3136-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 20:04:38

处理时间(V2): 2024/04/10 08:59:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	463601	100.000	81587	9282	0.966	--
总计		463601	100.000	81587			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3137-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 20:09:00

处理时间(V2): 2024/04/10 08:59:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	500028	100.000	87922	9273	0.966	--
总计		500028	100.000	87922			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3138-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 20:13:21

处理时间(V2): 2024/04/10 08:59:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	500940	100.000	88062	9271	0.967	--
总计		500940	100.000	88062			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3139-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 20:17:43

处理时间(V2): 2024/04/10 09:00:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	509889	100.000	89826	9301	0.967	--
总计		509889	100.000	89826			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3140-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 20:22:05

处理时间(V2): 2024/04/10 09:00:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	491838	100.000	86413	9264	0.965	--
总计		491838	100.000	86413			

SHIMADZU
LabSolutions

J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3141-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 20:26:27

处理时间(V2): 2024/04/10 09:00:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	521035	100.000	91598	9279	0.966	--
总计		521035	100.000	91598			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3142-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 20:30:49

处理时间(V2): 2024/04/10 09:00:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	498994	100.000	87728	9268	0.966	--
总计		498994	100.000	87728			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3143-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 20:35:11

处理时间(V2): 2024/04/10 09:00:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	513909	100.000	90124	9278	0.966	--
总计		513909	100.000	90124			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3144-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 20:39:32

处理时间(V2): 2024/04/10 09:00:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	513743	100.000	90182	9268	0.966	--
总计		513743	100.000	90182			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3145-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 20:43:53

处理时间(V2): 2024/04/10 09:00:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	520525	100.000	91439	9257	0.966	--
总计		520525	100.000	91439			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3146-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 20:48:15

处理时间(V2): 2024/04/10 09:00:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.558	507108	100.000	89046	9265	0.966	--
总计		507108	100.000	89046			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3147-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 20:52:35

处理时间(V2): 2024/04/10 09:00:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	525924	100.000	92149	9275	0.966	--
总计		525924	100.000	92149			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3148-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 20:56:57

处理时间(V2): 2024/04/10 09:00:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	517201	100.000	90649	9254	0.966	--
总计		517201	100.000	90649			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3149-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-jx-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 21:01:19

处理时间(V2): 2024/04/10 09:00:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	519421	100.000	91051	9268	0.966	--
总计		519421	100.000	91051			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3150-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-jx-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 21:05:41

处理时间(V2): 2024/04/10 09:00:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	523446	100.000	91853	9282	0.967	--
总计		523446	100.000	91853			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3151-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-jx-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 21:10:03

处理时间(V2): 2024/04/10 09:00:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	525211	100.000	92157	9278	0.967	--
总计		525211	100.000	92157			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3152-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-jx-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 21:14:24

处理时间(V2): 2024/04/10 09:00:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	516350	100.000	90684	9292	0.967	--
总计		516350	100.000	90684			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3153-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-jx-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 21:18:46

处理时间(V2): 2024/04/10 09:00:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	525074	100.000	92299	9308	0.967	--
总计		525074	100.000	92299			

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3154-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-jx-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 21:23:08

处理时间(V2): 2024/04/10 09:00:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	522135	100.000	91621	9283	0.967	--
总计		522135	100.000	91621			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3155-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 21:27:31

处理时间(V2): 2024/04/10 09:00:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.544	520990	100.000	84683	7832	0.978	--
总计		520990	100.000	84683			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3156-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH4.5-0.5sdsjz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 21:31:54

处理时间(V2): 2024/04/10 09:00:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.545	521869	100.000	84976	7833	0.978	--
总计		521869	100.000	84976			



J532

<样品信息>


色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)
柱温:40°C
数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3157-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μ l
进样时间: 2024/04/09 21:36:19
处理时间(V2): 2024/04/10 09:00:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min
波长: 285nm

版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3158-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 21:40:43

处理时间(V2): 2024/04/10 09:00:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.543	515603	100.000	83608	7798	0.978	--
总计		515603	100.000	83608			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3159-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 21:45:08

处理时间(V2): 2024/04/10 09:00:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.545	515705	100.000	83819	7806	0.978	--
总计		515705	100.000	83819			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3160-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 21:49:32

处理时间(V2): 2024/04/10 09:00:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.545	515821	100.000	83878	7810	0.979	--
总计		515821	100.000	83878			

SHIMADZU
LabSolutions

J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3161-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 21:53:56

处理时间(V2): 2024/04/10 09:00:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.545	515956	100.000	83955	7815	0.980	--
总计		515956	100.000	83955			

SHIMADZU
LabSolutions

J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3162-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 21:58:21

处理时间(V2): 2024/04/10 09:01:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.545	515790	100.000	83964	7821	0.980	--
总计		515790	100.000	83964			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3163-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 22:02:44

处理时间(V2): 2024/04/10 09:01:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.561	224433	100.000	39591	9330	0.967	--
总计		224433	100.000	39591			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3164-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 20 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/04/09 22:07:08

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/04/10 09:01:05

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	315028	100.000	55414	9335	0.966	--
总计		315028	100.000	55414			

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3165-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 22:11:31

处理时间(V2): 2024/04/10 09:01:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	197904	100.000	34833	9346	0.968	--
总计		197904	100.000	34833			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3166-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 20 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/04/09 22:15:54

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/04/10 09:01:11

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	199105	100.000	35076	9344	0.968	--
总计		199105	100.000	35076			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3167-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 22:20:16

处理时间(V2): 2024/04/10 09:01:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	307222	100.000	54144	9348	0.968	--
总计		307222	100.000	54144			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3168-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 22:24:40

处理时间 (V2): 2024/04/10 09:01:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	238435	100.000	42006	9350	0.969	--
总计		238435	100.000	42006			

SHIMADZU
LabSolutions

J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3169-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 22:29:03

处理时间(V2): 2024/04/10 09:01:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.559	366571	100.000	64484	9343	0.969	--
总计		366571	100.000	64484			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3170-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 22:33:26

处理时间(V2): 2024/04/10 09:01:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	463619	100.000	81784	9363	0.969	--
总计		463619	100.000	81784			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3171-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 22:37:49

处理时间(V2): 2024/04/10 09:01:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	366823	100.000	64638	9347	0.969	--
总计		366823	100.000	64638			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3172-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 22:42:12

处理时间(V2): 2024/04/10 09:01:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	363028	100.000	64049	9362	0.969	--
总计		363028	100.000	64049			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3173-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 22:46:36

处理时间(V2): 2024/04/10 09:01:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	419283	100.000	74016	9362	0.969	--
总计		419283	100.000	74016			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3174-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 20 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/04/09 22:50:58

实验者: xiexinhui


处理时间(V2): 2024/04/10 09:01:31

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	382530	100.000	67572	9380	0.970	--
总计		382530	100.000	67572			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3175-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 22:55:22

处理时间(V2): 2024/04/10 09:01:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	442201	100.000	77954	9343	0.970	--
总计		442201	100.000	77954			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3176-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 22:59:45

处理时间 (V2): 2024/04/10 09:01:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.561	509887	100.000	90154	9377	0.970	--
总计		509887	100.000	90154			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3177-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 23:04:09

处理时间(V2): 2024/04/10 09:01:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.561	428865	100.000	75852	9380	0.970	--
总计		428865	100.000	75852			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3178-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 23:08:33

处理时间(V2): 2024/04/10 09:01:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.561	440991	100.000	78011	9380	0.970	--
总计		440991	100.000	78011			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3179-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 23:12:55

处理时间(V2): 2024/04/10 09:01:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.561	483277	100.000	85453	9369	0.971	--
总计		483277	100.000	85453			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3180-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 23:17:17

处理时间(V2): 2024/04/10 09:01:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.561	448239	100.000	79282	9377	0.970	--
总计		448239	100.000	79282			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3181-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 23:21:40

处理时间(V2): 2024/04/10 09:01:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	474266	100.000	83763	9372	0.971	--
总计		474266	100.000	83763			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3182-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-13

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 23:26:04

处理时间(V2): 2024/04/10 09:01:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.561	524346	100.000	92823	9378	0.971	--
总计		524346	100.000	92823			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3183-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-22

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 23:30:28

处理时间(V2): 2024/04/10 09:01:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	459286	100.000	81071	9369	0.971	--
总计		459286	100.000	81071			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3184-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 23:34:51

处理时间(V2): 2024/04/10 09:01:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	475021	100.000	83921	9384	0.971	--
总计		475021	100.000	83921			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3185-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/09 23:39:14

处理时间(V2): 2024/04/10 09:02:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	504255	100.000	88996	9375	0.971	--
总计		504255	100.000	88996			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3186-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 23:43:38

处理时间(V2): 2024/04/10 09:02:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	479379	100.000	84708	9376	0.971	--
总计		479379	100.000	84708			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3187-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-5

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 23:48:02

处理时间(V2): 2024/04/10 09:02:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	497242	100.000	87867	9373	0.971	--
总计		497242	100.000	87867			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3188-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 23:52:24

处理时间(V2): 2024/04/10 09:02:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	531311	100.000	93906	9380	0.971	--
总计		531311	100.000	93906			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3189-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/09 23:56:47

处理时间(V2): 2024/04/10 09:02:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	487916	100.000	86098	9367	0.971	--
总计		487916	100.000	86098			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3190-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/10 00:01:11

处理时间(V2): 2024/04/10 09:02:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	502987	100.000	88745	9369	0.970	--
总计		502987	100.000	88745			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5μm)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3191-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-41

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/10 00:05:34

处理时间(V2): 2024/04/10 09:02:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	515772	100.000	91090	9375	0.971	--
总计		515772	100.000	91090			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3192-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-50

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/10 00:09:57

处理时间(V2): 2024/04/10 09:02:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	500729	100.000	88400	9367	0.971	--
总计		500729	100.000	88400			



J532

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3193-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-6

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/10 00:14:21

处理时间(V2): 2024/04/10 09:02:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	508941	100.000	89871	9374	0.970	--
总计		508941	100.000	89871			

SHIMADZU
LabSolutions

J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3194-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-15

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/10 00:18:45

处理时间(V2): 2024/04/10 09:02:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.560	532019	100.000	94062	9378	0.971	--
总计		532019	100.000	94062			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3195-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-24

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/10 00:23:09

处理时间(V2): 2024/04/10 09:02:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.561	503115	100.000	88931	9372	0.971	--
总计		503115	100.000	88931			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3196-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-33

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/10 00:27:33

处理时间(V2): 2024/04/10 09:02:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.561	513270	100.000	90741	9374	0.972	--
总计		513270	100.000	90741			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3197-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-42

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/10 00:31:56

处理时间(V2): 2024/04/10 09:02:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.561	517883	100.000	91535	9376	0.971	--
总计		517883	100.000	91535			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3198-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-51

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/10 00:36:19

处理时间(V2): 2024/04/10 09:02:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.561	515866	100.000	91194	9375	0.971	--
总计		515866	100.000	91194			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3199-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-jx-P1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-7

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/10 00:40:43

处理时间(V2): 2024/04/10 09:02:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.561	521580	100.000	92241	9369	0.971	--
总计		521580	100.000	92241			

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3200-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-jx-P2.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-16

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/10 00:45:07

处理时间(V2): 2024/04/10 09:02:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.562	532170	100.000	94293	9380	0.971	--
总计		532170	100.000	94293			

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm, 5 μ m)

柱温: 40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3201-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-jx-P3.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-25

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/10 00:49:31

处理时间(V2): 2024/04/10 09:02:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.562	519156	100.000	91970	9382	0.971	--
总计		519156	100.000	91970			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3202-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-jx-P4.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-34

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/10 00:53:55

处理时间(V2): 2024/04/10 09:02:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.562	525984	100.000	93201	9386	0.971	--
总计		525984	100.000	93201			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5μm)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3203-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-jx-P5.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-43

进样体积: 20μl

进样时间: 2024/04/10 00:58:19

处理时间(V2): 2024/04/10 09:02:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.562	521097	100.000	92308	9380	0.971	--
总计		521097	100.000	92308			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3204-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-jx-P6.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-52

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/10 01:02:43

处理时间(V2): 2024/04/10 09:02:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.562	528298	100.000	93577	9375	0.972	--
总计		528298	100.000	93577			



J532

<样品信息>

色谱柱:LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m)

柱温:40°C

数据文件名: RC\$J532 - 0-142/31-3205-2 - zzp-2022032001p-cq24y-rcqx-pH6.8-0.5sdsjz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcm

批处理文件名: RC\$J532 - 20240409-FX280.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 20 μ l

进样时间: 2024/04/10 01:07:07

处理时间(V2): 2024/04/10 09:02:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速: 1.5ml/min

波长: 285nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.546	515802	100.000	84474	7912	0.984	--
总计		515802	100.000	84474			



J346

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

流速: 1.5ml/min

柱温:30℃

波长: 232nm

数据文件名: RC\$J346 - 28-2596-3 - zzp-2023122121p-rcqx-jyx2-pH6.6-0.2tw80jz-jf75z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$J346 - 20240403-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$J346 - 20240403-FX277.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 50 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/04/03 12:54:54

实验者: xiexinhui


处理时间 (V3): 2024/04/07 10:38:48

处理者: xiexinhui

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.721	182307	51.287	33524	5677	1.095	--
2	5.134	173155	48.713	19231	7395	0.982	12.591
总计		355462	100.000	52755			