



氢溴酸伏硫西汀口崩片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	0	补液体积(ml)	0
对照品批号	D382/2305001	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.83	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	0.7867

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.22	183538	183619	183700	183581	183557	183599	0.04
2	14.20	184286	184417				184352	0.06

单位质量响应值		RSD%	判断
12911.32	12982.54	0.39	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24040801批-pH1.0

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
2min	1	82454	-	82454	45.015	45.23	6.88	45.02	45.23	6.89
	2	79610	-	79610	43.463			43.46		
	3	86314	-	86314	47.123			47.12		
	4	83355	-	83355	45.507			45.51		
	5	74318	-	74318	40.574			40.57		
	6	91015	-	91015	49.689			49.69		
5min	1	147125	-	147125	80.322	81.72	2.02	80.32	81.72	2.02
	2	146187	-	146187	79.810			79.81		
	3	149388	-	149388	81.558			81.56		
	4	154502	-	154502	84.350			84.35		
	5	151506	-	151506	82.714			82.71		
	6	149432	-	149432	81.582			81.58		
10min	1	162211	-	162211	88.558	90.33	1.98	88.56	90.33	1.98
	2	165432	-	165432	90.317			90.32		
	3	163091	-	163091	89.039			89.04		
	4	170091	-	170091	92.860			92.86		
	5	168681	-	168681	92.091			92.09		
	6	163181	-	163181	89.088			89.09		
15min	1	169709	-	169709	92.652	93.44	1.50	92.65	93.44	1.49
	2	170645	-	170645	93.163			93.16		
	3	168310	-	168310	91.888			91.89		
	4	174229	-	174229	95.120			95.12		
	5	174383	-	174383	95.204			95.20		
	6	169665	-	169665	92.628			92.63		
20min	1	172651	-	172651	94.258	95.27	1.72	94.26	95.28	1.72
	2	175870	-	175870	96.015			96.02		
	3	171086	-	171086	93.404			93.40		
	4	177565	-	177565	96.941			96.94		
	5	177940	-	177940	97.146			97.15		
	6	171962	-	171962	93.882			93.88		
30min	1	175684	-	175684	95.914	97.20	1.67	95.91	97.20	1.68
	2	180883	-	180883	98.752			98.75		
	3	174305	-	174305	95.161			95.16		
	4	180118	-	180118	98.335			98.33		
	5	181020	-	181020	98.827			98.83		
	6	176192	-	176192	96.191			96.19		
45min	1	176771	-	176771	96.507	97.78	1.55	96.51	97.78	1.55
	2	181258	-	181258	98.957			98.96		
	3	175588	-	175588	95.861			95.86		
	4	180977	-	180977	98.804			98.80		
	5	182354	-	182354	99.555			99.56		
	6	177710	-	177710	97.020			97.02		
60min	1	177314	-	177314	96.804	98.21	1.78	96.80	98.21	1.79
	2	183410	-	183410	100.132			100.13		
	3	176212	-	176212	96.202			96.20		
	4	181700	-	181700	99.198			99.20		
	5	183087	-	183087	99.956			99.96		
	6	177614	-	177614	96.968			96.97		
90min	1	178533	-	178533	97.469	98.08	1.61	97.47	98.08	1.61
	2	181546	-	181546	99.114			99.11		
	3	175432	-	175432	95.776			95.78		
	4	181741	-	181741	99.221			99.22		
	5	182978	-	182978	99.896			99.90		
	6	177715	-	177715	97.023			97.02		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
120min	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		
极限	1		-		0.000	0.00	-	0.00	0.00	-
	2		-		0.000			0.00		
	3		-		0.000			0.00		
	4		-		0.000			0.00		
	5		-		0.000			0.00		
	6		-		0.000			0.00		



操作者:

日 期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



氢溴酸伏硫西汀口崩片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	0	补液体积(ml)	0
对照品批号	D382/2305001	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.83	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	0.7867

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.22	184278	183637	183508	183323	183229	183595	0.23
2	14.20	187293	186198				186746	0.42
单位质量响应值				RSD%	判断			
12911.04		13151.13		1.31	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24040802批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
2min	1	16169	-	16169	8.771	15.79	24.80	8.77	15.79	24.80
	2	35487	-	35487	19.250			19.25		
	3	26425	-	26425	14.335			14.33		
	4	34417	-	34417	18.670			18.67		
	5	33240	-	33240	18.031			18.03		
	6	28952	-	28952	15.705			15.71		
5min	1	117655	-	117655	63.823	64.87	1.47	63.82	64.88	1.47
	2	122692	-	122692	66.556			66.56		
	3	118994	-	118994	64.550			64.55		
	4	120212	-	120212	65.210			65.21		
	5	119474	-	119474	64.810			64.81		
	6	118532	-	118532	64.299			64.30		
10min	1	147031	-	147031	79.759	78.73	1.40	79.76	78.74	1.40
	2	143859	-	143859	78.038			78.04		
	3	141797	-	141797	76.919			76.92		
	4	146493	-	146493	79.467			79.47		
	5	146620	-	146620	79.536			79.54		
	6	145035	-	145035	78.676			78.68		
15min	1	154956	-	154956	84.058	83.48	0.63	84.06	83.48	0.63
	2	155243	-	155243	84.213			84.21		
	3	153061	-	153061	83.030			83.03		
	4	153500	-	153500	83.268			83.27		
	5	153485	-	153485	83.260			83.26		
	6	153067	-	153067	83.033			83.03		
20min	1	154989	-	154989	84.076	84.54	0.90	84.08	84.54	0.90
	2	157538	-	157538	85.458			85.46		
	3	153608	-	153608	83.326			83.33		
	4	156547	-	156547	84.921			84.92		
	5	156625	-	156625	84.963			84.96		
	6	155794	-	155794	84.512			84.51		
30min	1	158851	-	158851	86.171	85.83	1.64	86.17	85.83	1.64
	2	159387	-	159387	86.461			86.46		
	3	153111	-	153111	83.057			83.06		
	4	160468	-	160468	87.048			87.05		
	5	158959	-	158959	86.229			86.23		
	6	158551	-	158551	86.008			86.01		
45min	1	161920	-	161920	87.835	86.85	1.73	87.84	86.85	1.73
	2	161521	-	161521	87.619			87.62		
	3	159561	-	159561	86.556			86.56		
	4	162793	-	162793	88.309			88.31		
	5	159729	-	159729	86.647			86.65		
	6	155069	-	155069	84.119			84.12		
60min	1	160243	-	160243	86.926	88.09	1.07	86.93	88.09	1.07
	2	164379	-	164379	89.169			89.17		
	3	160433	-	160433	87.029			87.03		
	4	163650	-	163650	88.774			88.77		
	5	163324	-	163324	88.597			88.60		
	6	162308	-	162308	88.046			88.05		
90min	1	164905	-	164905	89.455	88.64	1.54	89.45	88.64	1.54
	2	162777	-	162777	88.300			88.30		
	3	158690	-	158690	86.083			86.08		
	4	165227	-	165227	89.629			89.63		
	5	165245	-	165245	89.639			89.64		
	6	163592	-	163592	88.742			88.74		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
120min	1	160115	-	160115	86.856	88.64	1.22	86.86	88.64	1.22
	2	165585	-	165585	89.824			89.82		
	3	163215	-	163215	88.538			88.54		
	4	162334	-	162334	88.060			88.06		
	5	164968	-	164968	89.489			89.49		
	6	164217	-	164217	89.081			89.08		
极限	1	158701	-	158701	86.089	87.37	2.10	86.09	87.37	2.10
	2	165050	-	165050	89.533			89.53		
	3	157141	-	157141	85.243			85.24		
	4	158481	-	158481	85.970			85.97		
	5	162577	-	162577	88.192			88.19		
	6	164408	-	164408	89.185			89.19		



操作者:

日 期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-263-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 16:41:32 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:38:56 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转
溶剂



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-264-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 16:44:55 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:39:01 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	183538	100.000	31165	2437	1.305	--
总计		183538	100.000	31165			

图2 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-265-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 16:48:18 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:39:04 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	183619	100.000	31170	2439	1.304	--
总计		183619	100.000	31170			

图3 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-266-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 16:51:41 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:39:07 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	183700	100.000	31168	2438	1.305	--
总计		183700	100.000	31168			

图4 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-267-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 16:55:04 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:39:10 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	183581	100.000	31163	2437	1.306	--
总计		183581	100.000	31163			

图5 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-268-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 16:58:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:39:13 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	183557	100.000	31153	2439	1.306	--
总计		183557	100.000	31153			

图6 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-269-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 17:01:49 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:39:16 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	82454	100.000	14934	2869	1.290	--
总计		82454	100.000	14934			

图7 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-270-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 17:05:12 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:39:19 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	79610	100.000	14418	2872	1.289	--
总计		79610	100.000	14418			

图8 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-271-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 17:08:34 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:39:22 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.885	86314	100.000	15582	2866	1.290	--
总计		86314	100.000	15582			

图9 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-272-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 17:11:56 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:39:25 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.885	83355	100.000	15072	2868	1.290	--
总计		83355	100.000	15072			

图10 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-273-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 17:15:18 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:39:28 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	74318	100.000	13459	2871	1.286	--
总计		74318	100.000	13459			

图11 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-274-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 17:18:40 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:39:31 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.885	91015	100.000	16448	2870	1.292	--
总计		91015	100.000	16448			

图12 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-275-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 17:22:02 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:39:34 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	147125	100.000	26560	2854	1.307	--
总计		147125	100.000	26560			

图13 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-276-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 17:25:24 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:39:36 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	146187	100.000	26418	2854	1.307	--
总计		146187	100.000	26418			

图14 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-277-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 17:28:46 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:39:39 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	149388	100.000	26981	2854	1.308	--
总计		149388	100.000	26981			

图15 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-278-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 17:32:08 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:39:42 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	154502	100.000	27914	2853	1.309	--
总计		154502	100.000	27914			

图16 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-279-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 17:35:30 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:39:45 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	151506	100.000	27379	2851	1.308	--
总计		151506	100.000	27379			

图17 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-280-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 17:38:52 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:39:48 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	149432	100.000	26994	2851	1.308	--
总计		149432	100.000	26994			

图18 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-281-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 17:42:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:39:51 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	162211	100.000	29333	2846	1.311	--
总计		162211	100.000	29333			

图19 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-282-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 17:45:37 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:39:54 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	165432	100.000	29890	2848	1.312	--
总计		165432	100.000	29890			

图20 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-283-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 17:48:59 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:39:57 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	163091	100.000	29477	2849	1.311	--
总计		163091	100.000	29477			

图21 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-284-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 17:52:21 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:40:00 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	170091	100.000	30750	2845	1.313	--
总计		170091	100.000	30750			

图22 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-285-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 17:55:43 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:40:03 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	168681	100.000	30491	2843	1.313	--
总计		168681	100.000	30491			

图23 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-286-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 17:59:05 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:40:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	163181	100.000	29475	2848	1.312	--
总计		163181	100.000	29475			

图24 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-287-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 18:02:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:40:09 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	169709	100.000	30663	2844	1.313	--
总计		169709	100.000	30663			

图25 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-288-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 18:05:49 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:40:12 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	170645	100.000	30844	2843	1.314	--
总计		170645	100.000	30844			

图26 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-289-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 18:09:11 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:40:15 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	168310	100.000	30401	2843	1.313	--
总计		168310	100.000	30401			

图27 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-290-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 18:12:33 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:40:18 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	174229	100.000	31509	2846	1.314	--
总计		174229	100.000	31509			

图28 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-291-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 18:15:55 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:40:21 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	174383	100.000	31533	2846	1.315	--
总计		174383	100.000	31533			

图29 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-292-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 18:19:17 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:40:24 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	169665	100.000	30666	2848	1.314	--
总计		169665	100.000	30666			

图30 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-293-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 18:22:39 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:40:27 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	172651	100.000	31218	2847	1.315	--
总计		172651	100.000	31218			

图31 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-294-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 18:26:02 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:40:30 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	175870	100.000	31803	2846	1.315	--
总计		175870	100.000	31803			

图32 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-295-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 18:29:25 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:40:33 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	171086	100.000	30935	2846	1.314	--
总计		171086	100.000	30935			

图33 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-296-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 18:32:47 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:40:36 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	177565	100.000	32114	2845	1.316	--
总计		177565	100.000	32114			

图34 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-297-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 18:36:10 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:40:39 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	177940	100.000	32181	2845	1.316	--
总计		177940	100.000	32181			

图35 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-298-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 18:39:31 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:40:42 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	171962	100.000	31103	2847	1.315	--
总计		171962	100.000	31103			

图36 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-299-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 18:42:53 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:40:46 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	175684	100.000	31789	2843	1.316	--
总计		175684	100.000	31789			

图37 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-300-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 18:46:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:40:49 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	180883	100.000	32728	2842	1.316	--
总计		180883	100.000	32728			

图38 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-301-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 18:49:37 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:40:52 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	174305	100.000	31544	2843	1.315	--
总计		174305	100.000	31544			

图39 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-302-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 18:52:59 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:40:55 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.880	180118	100.000	32591	2839	1.316	--
总计		180118	100.000	32591			

图40 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-303-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 18:56:21 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:40:58 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	181020	100.000	32741	2845	1.317	--
总计		181020	100.000	32741			

图41 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-304-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 18:59:43 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:41:01 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	176192	100.000	31850	2842	1.316	--
总计		176192	100.000	31850			

图42 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-305-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 19:03:05 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:41:04 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	176771	100.000	31956	2842	1.316	--
总计		176771	100.000	31956			

图43 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-306-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 19:06:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:41:07 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	181258	100.000	32756	2841	1.318	--
总计		181258	100.000	32756			

图44 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-307-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 19:09:48 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:41:10 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	175588	100.000	31736	2843	1.316	--
总计		175588	100.000	31736			

图45 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名: RC\$JSS-221 - 0-11/29-308-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 19:13:10 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:41:13 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	180977	100.000	32710	2841	1.318	--
总计		180977	100.000	32710			

图46 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-309-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 19:16:32 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:41:16 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	182354	100.000	32961	2842	1.318	--
总计		182354	100.000	32961			

图47 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-310-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 19:19:54 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:41:19 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	177710	100.000	32142	2843	1.316	--
总计		177710	100.000	32142			

图48 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-311-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 19:23:17 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:41:22 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	177314	100.000	32068	2843	1.317	--
总计		177314	100.000	32068			

图49 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-312-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 19:26:41 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:41:25 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	183410	100.000	33163	2840	1.318	--
总计		183410	100.000	33163			

图50 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-313-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 19:30:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:41:28 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	176212	100.000	31876	2843	1.316	--
总计		176212	100.000	31876			

图51 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-314-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 19:33:26 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:41:31 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	181700	100.000	32866	2843	1.317	--
总计		181700	100.000	32866			

图52 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名: RC\$JSS-221 - 0-11/29-315-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 19:36:49 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:41:34 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	183087	100.000	33117	2841	1.317	--
总计		183087	100.000	33117			

图53 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-316-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 19:40:12 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:41:37 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	177614	100.000	32125	2843	1.316	--
总计		177614	100.000	32125			

图54 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-317-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 19:43:34 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:41:40 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.880	178533	100.000	32307	2842	1.316	--
总计		178533	100.000	32307			

图55 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-318-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 19:46:56 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:41:43 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	181546	100.000	32836	2841	1.317	--
总计		181546	100.000	32836			

图56 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-319-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 19:50:19 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:41:46 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	175432	100.000	31725	2842	1.317	--
总计		175432	100.000	31725			

图57 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名: RC\$JSS-221 - 0-11/29-320-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 19:53:42 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:41:49 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	181741	100.000	32884	2842	1.317	--
总计		181741	100.000	32884			

图58 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名: RC\$JSS-221 - 0-11/29-321-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 19:57:04 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:41:52 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.880	182978	100.000	33090	2839	1.318	--
总计		182978	100.000	33090			

图59 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-322-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 20:00:25 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:41:55 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.880	177715	100.000	32148	2842	1.317	--
总计		177715	100.000	32148			

图60 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-323-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 20:03:48 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:41:58 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	184286	100.000	31364	2443	1.310	--
总计		184286	100.000	31364			

图61 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-11/29-324-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/11 20:07:10 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 10:42:01 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	184417	100.000	31381	2442	1.310	--
总计		184417	100.000	31381			

图62 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-459-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 03:44:26 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:12:01 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图63 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-460-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 03:47:49 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:12:05 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	184278	100.000	31673	2504	1.316	--
总计		184278	100.000	31673			

图64 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-461-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 03:51:12 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:12:08 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	183637	100.000	31404	2474	1.314	--
总计		183637	100.000	31404			

图65 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-462-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 03:54:35 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:12:11 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	183508	100.000	31318	2463	1.314	--
总计		183508	100.000	31318			

图66 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-463-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 03:57:58 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:12:14 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	183323	100.000	31297	2460	1.314	--
总计		183323	100.000	31297			

图67 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-464-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 04:01:21 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:12:17 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.863	183229	100.000	31273	2459	1.314	--
总计		183229	100.000	31273			

图68 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-465-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 04:04:43 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:12:20 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.889	16169	100.000	2937	2861	1.268	--
总计		16169	100.000	2937			

图69 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-466-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 04:08:05 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:12:23 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.888	35487	100.000	6418	2860	1.283	--
总计		35487	100.000	6418			

图70 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-467-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 04:11:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:12:26 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.888	26425	100.000	4794	2864	1.277	--
总计		26425	100.000	4794			

图71 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-468-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 04:14:49 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:12:29 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.888	34417	100.000	6241	2864	1.276	--
总计		34417	100.000	6241			

图72 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-469-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 04:18:11 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:12:32 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.888	33240	100.000	6025	2862	1.281	--
总计		33240	100.000	6025			

图73 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-470-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 04:21:32 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:12:34 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.888	28952	100.000	5250	2862	1.276	--
总计		28952	100.000	5250			

图74 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-471-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 04:24:55 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:12:37 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	117655	100.000	21142	2847	1.310	--
总计		117655	100.000	21142			

图75 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-472-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 04:28:17 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:12:40 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	122692	100.000	22078	2848	1.310	--
总计		122692	100.000	22078			

图76 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-473-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 04:31:39 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:12:43 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.884	118994	100.000	21329	2850	1.310	--
总计		118994	100.000	21329			

图77 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-474-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 04:35:01 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:12:46 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.884	120212	100.000	21567	2851	1.310	--
总计		120212	100.000	21567			

图78 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-475-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 04:38:23 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:12:49 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.884	119474	100.000	21425	2851	1.311	--
总计		119474	100.000	21425			

图79 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-476-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 04:41:45 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:12:52 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	118532	100.000	21362	2846	1.309	--
总计		118532	100.000	21362			

图80 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-477-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 04:45:08 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:12:55 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	147031	100.000	26507	2841	1.316	--
总计		147031	100.000	26507			

图81 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-478-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 04:48:30 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:12:58 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	143859	100.000	25947	2840	1.314	--
总计		143859	100.000	25947			

图82 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-479-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 04:51:53 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:13:01 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	141797	100.000	25562	2839	1.314	--
总计		141797	100.000	25562			

图83 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-480-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 04:55:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:13:03 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	146493	100.000	26410	2839	1.315	--
总计		146493	100.000	26410			

图84 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-481-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 04:58:37 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:13:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	146620	100.000	26434	2838	1.316	--
总计		146620	100.000	26434			

图85 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-482-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 05:01:59 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:13:09 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	145035	100.000	26168	2842	1.315	--
总计		145035	100.000	26168			

图86 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-483-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 05:05:21 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:13:12 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	154956	100.000	27955	2840	1.317	--
总计		154956	100.000	27955			

图87 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-484-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 05:08:43 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:13:15 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.881	155243	100.000	28007	2839	1.317	--
总计		155243	100.000	28007			

图88 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-485-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 05:12:05 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:13:18 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	153061	100.000	27596	2838	1.317	--
总计		153061	100.000	27596			

图89 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-486-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 05:15:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:13:21 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	153500	100.000	27685	2840	1.317	--
总计		153500	100.000	27685			

图90 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-487-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 05:18:49 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:13:23 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	153485	100.000	27675	2837	1.316	--
总计		153485	100.000	27675			

图91 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-488-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 05:22:11 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:13:26 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	153067	100.000	27580	2843	1.317	--
总计		153067	100.000	27580			

图92 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-489-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 05:25:34 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:13:29 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	154989	100.000	27958	2840	1.317	--
总计		154989	100.000	27958			

图93 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-490-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 05:28:56 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:13:32 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	157538	100.000	28400	2836	1.318	--
总计		157538	100.000	28400			

图94 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-491-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 05:32:18 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:13:35 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	153608	100.000	27642	2844	1.317	--
总计		153608	100.000	27642			

图95 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-492-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 05:35:41 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:13:38 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	156547	100.000	28176	2844	1.318	--
总计		156547	100.000	28176			

图96 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-493-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 05:39:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:13:41 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	156625	100.000	28246	2842	1.317	--
总计		156625	100.000	28246			

图97 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-494-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 05:42:24 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:13:43 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	155794	100.000	28091	2838	1.317	--
总计		155794	100.000	28091			

图98 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-495-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 05:45:46 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:13:46 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	158851	100.000	28606	2844	1.318	--
总计		158851	100.000	28606			

图99 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-496-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 05:49:08 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:13:49 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	159387	100.000	28699	2842	1.319	--
总计		159387	100.000	28699			

图100 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-497-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 05:52:30 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:13:52 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	153111	100.000	27591	2838	1.317	--
总计		153111	100.000	27591			

图101 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-498-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 05:55:52 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:13:55 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	160468	100.000	28938	2841	1.318	--
总计		160468	100.000	28938			

图102 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-499-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 05:59:14 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:13:58 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	158959	100.000	28654	2837	1.319	--
总计		158959	100.000	28654			

图103 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-500-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 06:02:36 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:14:01 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	158551	100.000	28593	2841	1.318	--
总计		158551	100.000	28593			

图104 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-501-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 06:05:58 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:14:04 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	161920	100.000	29191	2840	1.319	--
总计		161920	100.000	29191			

图105 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-502-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 06:09:20 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:14:07 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	161521	100.000	29131	2841	1.319	--
总计		161521	100.000	29131			

图106 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-503-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 06:12:42 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:14:10 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	159561	100.000	28766	2839	1.319	--
总计		159561	100.000	28766			

图107 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-504-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 06:16:04 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:14:13 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	162793	100.000	29361	2842	1.319	--
总计		162793	100.000	29361			

图108 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-505-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 06:19:26 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:14:16 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	159729	100.000	28803	2841	1.318	--
总计		159729	100.000	28803			

图109 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-506-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 06:22:48 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:14:19 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	155069	100.000	27962	2840	1.318	--
总计		155069	100.000	27962			

图110 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-507-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 06:26:11 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:14:22 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	160243	100.000	28896	2841	1.318	--
总计		160243	100.000	28896			

图111 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-508-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 06:29:35 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:14:24 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	164379	100.000	29645	2840	1.320	--
总计		164379	100.000	29645			

图112 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-509-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 06:32:58 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:14:27 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	160433	100.000	28931	2841	1.319	--
总计		160433	100.000	28931			

图113 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-510-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 06:36:21 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:14:30 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	163650	100.000	29495	2840	1.320	--
总计		163650	100.000	29495			

图114 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-511-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 06:39:44 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:14:33 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	163324	100.000	29447	2836	1.319	--
总计		163324	100.000	29447			

图115 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-512-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 06:43:07 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:14:36 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	162308	100.000	29224	2843	1.320	--
总计		162308	100.000	29224			

图116 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-513-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 06:46:30 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:14:39 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	164905	100.000	29675	2841	1.321	--
总计		164905	100.000	29675			

图117 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-514-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 06:49:53 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:14:42 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	162777	100.000	29299	2844	1.320	--
总计		162777	100.000	29299			

图118 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-515-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 06:53:16 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:14:45 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	158690	100.000	28548	2845	1.319	--
总计		158690	100.000	28548			

图119 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-516-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 06:56:40 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:14:47 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	165227	100.000	29740	2843	1.321	--
总计		165227	100.000	29740			

图120 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-517-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 07:00:02 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:14:50 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	165245	100.000	29728	2845	1.321	--
总计		165245	100.000	29728			

图121 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-518-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 07:03:24 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:14:53 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	163592	100.000	29451	2846	1.320	--
总计		163592	100.000	29451			

图122 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-519-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 07:06:48 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:14:56 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	160115	100.000	28818	2845	1.319	--
总计		160115	100.000	28818			

图123 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-520-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 07:10:11 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:14:59 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	165585	100.000	29815	2844	1.321	--
总计		165585	100.000	29815			

图124 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-120min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-521-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 07:13:35 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:15:02 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	163215	100.000	29367	2846	1.320	--
总计		163215	100.000	29367			

图125 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-120min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名: RC\$JSS-221 - 0-12/29-522-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 07:16:57 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:15:05 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	162334	100.000	29201	2845	1.321	--
总计		162334	100.000	29201			

图126 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-120min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-523-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 07:20:21 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:15:08 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	164968	100.000	29688	2845	1.320	--
总计		164968	100.000	29688			

图127 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-524-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 07:23:45 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:15:11 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.882	164217	100.000	29609	2839	1.320	--
总计		164217	100.000	29609			

图128 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-浆法-50转-120min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名: RC\$JSS-221 - 0-12/29-525-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 07:27:09 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:15:14 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	158701	100.000	28542	2847	1.320	--
总计		158701	100.000	28542			

图129 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-526-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 07:30:32 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:15:17 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	165050	100.000	29690	2846	1.321	--
总计		165050	100.000	29690			

图130 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名: RC\$JSS-221 - 0-12/29-527-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 07:33:55 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:15:20 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	157141	100.000	28266	2847	1.320	--
总计		157141	100.000	28266			

图131 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-528-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 07:37:18 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:15:22 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	158481	100.000	28488	2846	1.321	--
总计		158481	100.000	28488			

图132 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-529-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 07:40:41 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:15:25 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	162577	100.000	29224	2846	1.322	--
总计		162577	100.000	29224			

图133 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-530-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 07:44:04 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:15:28 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.883	164408	100.000	29575	2846	1.321	--
总计		164408	100.000	29575			

图134 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-531-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 07:47:28 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:15:31 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.865	187293	100.000	32007	2473	1.315	--
总计		187293	100.000	32007			

图135 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-12/29-532-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 07:50:50 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 11:15:34 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	186198	100.000	31830	2471	1.316	--
总计		186198	100.000	31830			

图136 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2