



氢溴酸伏硫西汀口崩片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	0	补液体积(ml)	0
对照品批号	D382/2305001	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.83	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	0.7867

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.22	187488	187876	187463	187154	187056	187407	0.18
2	14.20	186401	186481				186441	0.04

单位质量响应值		RSD%	判断
13179.11	13129.65	0.27	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24040801批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
2min	1	14613	-	14613	7.852	10.63	21.92	7.85	10.63	21.92
	2	25178	-	25178	13.529			13.53		
	3	24178	-	24178	12.992			12.99		
	4	20447	-	20447	10.987			10.99		
	5	15631	-	15631	8.399			8.40		
	6	18678	-	18678	10.036			10.04		
5min	1	93658	-	93658	50.326	50.26	4.26	50.33	50.26	4.26
	2	94318	-	94318	50.680			50.68		
	3	97617	-	97617	52.453			52.45		
	4	95685	-	95685	51.415			51.41		
	5	85987	-	85987	46.204			46.20		
	6	93977	-	93977	50.497			50.50		
10min	1	121630	-	121630	65.356	65.62	2.12	65.36	65.62	2.12
	2	122253	-	122253	65.691			65.69		
	3	126449	-	126449	67.945			67.95		
	4	121104	-	121104	65.073			65.07		
	5	118518	-	118518	63.684			63.68		
	6	122719	-	122719	65.941			65.94		
15min	1	129731	-	129731	69.709	70.59	1.57	69.71	70.59	1.57
	2	132231	-	132231	71.052			71.05		
	3	134999	-	134999	72.539			72.54		
	4	130238	-	130238	69.981			69.98		
	5	129540	-	129540	69.606			69.61		
	6	131507	-	131507	70.663			70.66		
20min	1	139120	-	139120	74.754	73.30	2.77	74.75	73.30	2.77
	2	137236	-	137236	73.741			73.74		
	3	129644	-	129644	69.662			69.66		
	4	140493	-	140493	75.492			75.49		
	5	136396	-	136396	73.290			73.29		
	6	135638	-	135638	72.883			72.88		
30min	1	141791	-	141791	76.189	74.58	2.31	76.19	74.58	2.31
	2	138501	-	138501	74.421			74.42		
	3	140672	-	140672	75.588			75.59		
	4	140458	-	140458	75.473			75.47		
	5	132815	-	132815	71.366			71.37		
	6	138537	-	138537	74.441			74.44		
45min	1	149068	-	149068	80.099	79.33	2.22	80.10	79.33	2.22
	2	146964	-	146964	78.969			78.97		
	3	150423	-	150423	80.827			80.83		
	4	151069	-	151069	81.174			81.17		
	5	146044	-	146044	78.474			78.47		
	6	142278	-	142278	76.451			76.45		
60min	1	144137	-	144137	77.450	79.15	2.07	77.45	79.15	2.08
	2	144979	-	144979	77.902			77.90		
	3	148623	-	148623	79.860			79.86		
	4	152616	-	152616	82.006			82.01		
	5	146304	-	146304	78.614			78.61		
	6	147122	-	147122	79.054			79.05		
极限	1	151772	-	151772	81.552	82.80	1.93	81.55	82.80	1.93
	2	154288	-	154288	82.904			82.90		
	3	157964	-	157964	84.879			84.88		
	4	155747	-	155747	83.688			83.69		
	5	155148	-	155148	83.366			83.37		
	6	149643	-	149643	80.408			80.41		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



操作者:

日 期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



氢溴酸伏硫西汀口崩片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	0	补液体积(ml)	0
对照品批号	D382/2305001	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.83	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	0.7867

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.22	187530	187150	187009	187065	186815	187114	0.15
2	14.20	186365	186191				186278	0.07
单位质量响应值				RSD%	判断			
13158.51		13118.17		0.22	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24040802批-pH1.0

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
2min	1	120327	-	120327	64.735	58.71	8.28	64.73	58.70	8.28
	2	94970	-	94970	51.093			51.09		
	3	108336	-	108336	58.284			58.28		
	4	107279	-	107279	57.715			57.71		
	5	106326	-	106326	57.202			57.20		
	6	117487	-	117487	63.207			63.21		
5min	1	171207	-	171207	92.107	92.19	0.70	92.11	92.19	0.70
	2	171526	-	171526	92.279			92.28		
	3	169764	-	169764	91.331			91.33		
	4	173282	-	173282	93.224			93.22		
	5	170537	-	170537	91.747			91.75		
	6	171799	-	171799	92.426			92.43		
10min	1	176638	-	176638	95.029	95.53	0.82	95.03	95.54	0.82
	2	180285	-	180285	96.991			96.99		
	3	176493	-	176493	94.951			94.95		
	4	178069	-	178069	95.799			95.80		
	5	176659	-	176659	95.041			95.04		
	6	177323	-	177323	95.398			95.40		
15min	1	177882	-	177882	95.699	96.41	1.09	95.70	96.41	1.09
	2	181508	-	181508	97.649			97.65		
	3	178231	-	178231	95.886			95.89		
	4	181712	-	181712	97.759			97.76		
	5	177115	-	177115	95.286			95.29		
	6	178728	-	178728	96.154			96.15		
20min	1	178462	-	178462	96.011	96.89	1.08	96.01	96.89	1.08
	2	182802	-	182802	98.345			98.35		
	3	178998	-	178998	96.299			96.30		
	4	182350	-	182350	98.102			98.10		
	5	178765	-	178765	96.174			96.17		
	6	179241	-	179241	96.430			96.43		
30min	1	179715	-	179715	96.685	97.06	1.49	96.68	97.06	1.49
	2	183963	-	183963	98.970			98.97		
	3	177941	-	177941	95.730			95.73		
	4	183485	-	183485	98.713			98.71		
	5	179474	-	179474	96.555			96.56		
	6	177920	-	177920	95.719			95.72		
45min	1	180134	-	180134	96.910	97.49	1.13	96.91	97.49	1.13
	2	183974	-	183974	98.976			98.98		
	3	180145	-	180145	96.916			96.92		
	4	183658	-	183658	98.806			98.81		
	5	179531	-	179531	96.586			96.59		
	6	179831	-	179831	96.747			96.75		
60min	1	179951	-	179951	96.812	97.48	1.18	96.81	97.48	1.18
	2	183883	-	183883	98.927			98.93		
	3	180171	-	180171	96.930			96.93		
	4	183936	-	183936	98.956			98.96		
	5	179309	-	179309	96.466			96.47		
	6	179861	-	179861	96.763			96.76		
极限	1	178141	-	178141	95.838	97.18	1.34	95.84	97.18	1.34
	2	183960	-	183960	98.968			98.97		
	3	179692	-	179692	96.672			96.67		
	4	183366	-	183366	98.649			98.65		
	5	179322	-	179322	96.473			96.47		
	6	179390	-	179390	96.510			96.51		



操作者:

日期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



操作者:

日 期: 2026-08-16

复核者:

未审阅版本



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-535-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 09:58:52 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:01:55 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-536-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 10:02:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:01:59 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.887	187488	100.000	31590	2475	1.330	--
总计		187488	100.000	31590			

图2 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-537-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 10:05:37 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:02:02 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	187876	100.000	31628	2470	1.329	--
总计		187876	100.000	31628			

图3 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-538-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 10:09:00 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:02:05 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.886	187463	100.000	31503	2467	1.330	--
总计		187463	100.000	31503			

图4 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-539-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 10:12:22 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:02:08 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.885	187154	100.000	31441	2470	1.330	--
总计		187154	100.000	31441			

图5 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-540-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 10:15:43 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:02:10 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.885	187056	100.000	31388	2468	1.330	--
总计		187056	100.000	31388			

图6 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-541-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 10:19:05 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:02:13 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.909	14613	100.000	2591	2831	1.279	--
总计		14613	100.000	2591			

图7 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-542-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 10:22:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:02:16 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.909	25178	100.000	4455	2845	1.293	--
总计		25178	100.000	4455			

图8 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-543-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 10:25:50 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:02:18 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.908	24178	100.000	4300	2851	1.289	--
总计		24178	100.000	4300			

图9 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-544-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 10:29:12 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:02:21 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.908	20447	100.000	3636	2849	1.280	--
总计		20447	100.000	3636			

图10 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-545-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 10:32:35 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:02:24 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.908	15631	100.000	2770	2835	1.282	--
总计		15631	100.000	2770			

图11 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-546-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 10:35:56 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:02:27 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.907	18678	100.000	3321	2845	1.282	--
总计		18678	100.000	3321			

图12 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-547-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 10:39:19 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:02:29 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.904	93658	100.000	16698	2850	1.313	--
总计		93658	100.000	16698			

图13 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-548-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 10:42:40 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:02:32 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.904	94318	100.000	16815	2846	1.312	--
总计		94318	100.000	16815			

图14 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-549-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 10:46:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:02:35 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.903	97617	100.000	17397	2847	1.314	--
总计		97617	100.000	17397			

图15 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-550-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 10:49:24 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:02:38 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.903	95685	100.000	17040	2848	1.313	--
总计		95685	100.000	17040			

图16 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-551-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 10:52:45 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:02:40 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.903	85987	100.000	15319	2847	1.311	--
总计		85987	100.000	15319			

图17 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-552-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 10:56:08 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:02:43 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.902	93977	100.000	16729	2847	1.312	--
总计		93977	100.000	16729			

图18 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-553-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 10:59:29 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:02:46 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	121630	100.000	21584	2844	1.320	--
总计		121630	100.000	21584			

图19 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-554-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 11:02:51 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:02:49 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	122253	100.000	21679	2843	1.321	--
总计		122253	100.000	21679			

图20 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-555-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 11:06:12 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:02:52 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	126449	100.000	22405	2844	1.322	--
总计		126449	100.000	22405			

图21 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-556-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 11:09:32 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:02:55 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	121104	100.000	21479	2841	1.320	--
总计		121104	100.000	21479			

图22 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-557-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 11:12:53 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:02:57 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	118518	100.000	21012	2845	1.321	--
总计		118518	100.000	21012			

图23 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-558-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 11:16:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:03:00 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	122719	100.000	21765	2839	1.322	--
总计		122719	100.000	21765			

图24 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-559-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 11:19:35 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:03:03 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	129731	100.000	23056	2842	1.323	--
总计		129731	100.000	23056			

图25 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-560-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 11:22:56 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:03:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	132231	100.000	23525	2843	1.322	--
总计		132231	100.000	23525			

图26 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-561-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 11:26:18 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:03:08 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	134999	100.000	23997	2842	1.324	--
总计		134999	100.000	23997			

图27 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-562-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 11:29:40 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:03:11 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	130238	100.000	23134	2835	1.321	--
总计		130238	100.000	23134			

图28 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-563-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 11:33:01 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:03:14 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	129540	100.000	23001	2835	1.322	--
总计		129540	100.000	23001			

图29 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-564-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 11:36:23 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:03:17 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	131507	100.000	23347	2834	1.322	--
总计		131507	100.000	23347			

图30 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-565-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 11:39:44 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:03:19 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	139120	100.000	24725	2832	1.324	--
总计		139120	100.000	24725			

图31 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-566-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 11:43:06 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:03:22 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	137236	100.000	24397	2834	1.324	--
总计		137236	100.000	24397			

图32 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-567-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 11:46:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:03:25 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	129644	100.000	23046	2836	1.322	--
总计		129644	100.000	23046			

图33 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-568-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 11:49:47 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:03:28 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	140493	100.000	24924	2832	1.325	--
总计		140493	100.000	24924			

图34 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-569-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 11:53:08 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:03:30 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	136396	100.000	24182	2833	1.324	--
总计		136396	100.000	24182			

图35 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-570-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 11:56:30 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:03:33 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	135638	100.000	24083	2834	1.323	--
总计		135638	100.000	24083			

图36 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-571-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 11:59:50 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:03:36 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	141791	100.000	25233	2829	1.324	--
总计		141791	100.000	25233			

图37 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-572-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 12:03:12 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:03:39 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	138501	100.000	24650	2832	1.324	--
总计		138501	100.000	24650			

图38 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-573-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 12:06:33 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:03:42 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	140672	100.000	25034	2829	1.324	--
总计		140672	100.000	25034			

图39 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-574-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 12:09:53 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:03:45 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	140458	100.000	24990	2830	1.324	--
总计		140458	100.000	24990			

图40 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-575-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 12:13:15 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:03:48 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	132815	100.000	23566	2833	1.323	--
总计		132815	100.000	23566			

图41 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-576-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 12:16:36 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:03:51 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	138537	100.000	24568	2828	1.318	--
总计		138537	100.000	24568			

图42 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-577-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 12:19:57 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:03:54 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	149068	100.000	26495	2832	1.326	--
总计		149068	100.000	26495			

图43 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-578-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 12:23:19 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:03:56 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.900	146964	100.000	26129	2834	1.325	--
总计		146964	100.000	26129			

图44 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-579-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 12:26:40 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:03:59 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	150423	100.000	26769	2834	1.327	--
总计		150423	100.000	26769			

图45 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-580-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 12:30:02 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:04:02 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	151069	100.000	26862	2833	1.327	--
总计		151069	100.000	26862			

图46 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-581-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 12:33:23 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:04:05 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.898	146044	100.000	26012	2829	1.325	--
总计		146044	100.000	26012			

图47 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-582-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 12:36:43 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:04:08 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	142278	100.000	25348	2831	1.324	--
总计		142278	100.000	25348			

图48 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-583-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 12:40:05 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:04:11 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	144137	100.000	25672	2831	1.324	--
总计		144137	100.000	25672			

图49 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-584-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 12:43:28 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:04:14 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	144979	100.000	25823	2831	1.325	--
总计		144979	100.000	25823			

图50 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-585-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 12:46:50 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:04:16 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	148623	100.000	26440	2834	1.326	--
总计		148623	100.000	26440			

图51 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-586-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 12:50:12 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:04:19 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	152616	100.000	27148	2834	1.327	--
总计		152616	100.000	27148			

图52 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-587-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 12:53:33 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:04:22 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	146304	100.000	26037	2835	1.326	--
总计		146304	100.000	26037			

图53 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-588-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 12:56:55 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:04:24 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	147122	100.000	26173	2834	1.326	--
总计		147122	100.000	26173			

图54 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-589-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 13:00:17 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:04:27 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	151772	100.000	26985	2829	1.327	--
总计		151772	100.000	26985			

图55 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-590-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 13:03:40 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:04:30 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	154288	100.000	27461	2831	1.327	--
总计		154288	100.000	27461			

图56 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-591-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 13:07:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:04:33 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	157964	100.000	28126	2830	1.328	--
总计		157964	100.000	28126			

图57 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-592-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 13:10:25 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:04:36 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	155747	100.000	27718	2830	1.327	--
总计		155747	100.000	27718			

图58 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-593-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 13:13:47 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:04:38 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.898	155148	100.000	27636	2830	1.327	--
总计		155148	100.000	27636			

图59 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-594-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 13:17:10 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:04:41 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.898	149643	100.000	26668	2830	1.326	--
总计		149643	100.000	26668			

图60 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-595-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 13:20:33 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:04:44 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	159087	100.000	28313	2831	1.329	--
总计		159087	100.000	28313			

图61 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-120min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-596-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 13:23:54 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:04:47 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.898	156079	100.000	27806	2829	1.327	--
总计		156079	100.000	27806			

图62 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-120min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-597-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 13:27:18 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:04:49 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.898	159902	100.000	28498	2828	1.328	--
总计		159902	100.000	28498			

图63 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-598-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 13:30:40 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:04:52 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.898	161394	100.000	28764	2831	1.327	--
总计		161394	100.000	28764			

图64 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-120min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-599-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 13:34:03 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:04:55 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	156216	100.000	27804	2832	1.327	--
总计		156216	100.000	27804			

图65 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-600-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 13:37:25 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:04:58 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	157254	100.000	27997	2831	1.328	--
总计		157254	100.000	27997			

图66 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-浆法-50转-120min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-601-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 13:40:48 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:05:00 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	160341	100.000	28531	2828	1.329	--
总计		160341	100.000	28531			

图67 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名: RC\$JSS-221 - 0-14/29-602-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 13:44:12 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:05:03 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	147020	100.000	26143	2835	1.326	--
总计		147020	100.000	26143			

图68 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-603-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 13:47:35 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:05:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	159152	100.000	28342	2831	1.328	--
总计		159152	100.000	28342			

图69 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-604-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 13:50:57 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:05:09 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.898	160366	100.000	28581	2831	1.328	--
总计		160366	100.000	28581			

图70 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名: RC\$JSS-221 - 0-14/29-605-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 13:54:19 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:05:12 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	157472	100.000	28026	2831	1.329	--
总计		157472	100.000	28026			

图71 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-606-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 13:57:43 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:05:14 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.899	157929	100.000	28102	2832	1.328	--
总计		157929	100.000	28102			

图72 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-607-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 14:01:05 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:05:17 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.880	186401	100.000	31560	2473	1.324	--
总计		186401	100.000	31560			

图73 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-14/29-608-2 - 24040801p-zzp-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 14:04:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:05:20 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.880	186481	100.000	31547	2469	1.324	--
总计		186481	100.000	31547			

图74 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040801批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-609-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 14:24:53 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:08:22 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图75 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转
溶剂



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-610-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 14:28:17 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:08:26 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.804	187530	100.000	32642	2407	1.329	--
总计		187530	100.000	32642			

图76 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-611-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 14:31:40 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:08:29 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.803	187150	100.000	32521	2403	1.330	--
总计		187150	100.000	32521			

图77 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-612-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 14:35:02 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:08:31 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.802	187009	100.000	32464	2401	1.330	--
总计		187009	100.000	32464			

图78 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-613-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 14:38:24 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:08:34 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.802	187065	100.000	32469	2401	1.331	--
总计		187065	100.000	32469			

图79 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-614-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 14:41:48 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:08:37 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.803	186815	100.000	32437	2401	1.330	--
总计		186815	100.000	32437			

图80 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名: RC\$JSS-221 - 0-15/29-615-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 14:45:09 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:08:39 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.819	120327	100.000	22228	2807	1.324	--
总计		120327	100.000	22228			

图81 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-616-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 14:48:31 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:08:42 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.820	94970	100.000	17586	2809	1.316	--
总计		94970	100.000	17586			

图82 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-617-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 14:51:54 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:08:45 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.820	108336	100.000	20039	2806	1.320	--
总计		108336	100.000	20039			

图83 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-618-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 14:55:16 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:08:47 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.820	107279	100.000	19853	2811	1.320	--
总计		107279	100.000	19853			

图84 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-619-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 14:58:38 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:08:50 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.820	106326	100.000	19671	2808	1.319	--
总计		106326	100.000	19671			

图85 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-620-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 15:02:00 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:08:53 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.819	117487	100.000	21713	2807	1.323	--
总计		117487	100.000	21713			

图86 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-621-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 15:05:22 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:08:55 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	171207	100.000	31395	2788	1.339	--
总计		171207	100.000	31395			

图87 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名: RC\$JSS-221 - 0-15/29-622-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 15:08:44 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:08:58 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	171526	100.000	31478	2790	1.338	--
总计		171526	100.000	31478			

图88 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-623-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 15:12:05 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:09:01 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	169764	100.000	31130	2789	1.338	--
总计		169764	100.000	31130			

图89 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-624-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 15:15:27 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:09:03 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	173282	100.000	31781	2787	1.339	--
总计		173282	100.000	31781			

图90 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-625-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 15:18:49 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:09:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.818	170537	100.000	31339	2791	1.338	--
总计		170537	100.000	31339			

图91 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名: RC\$JSS-221 - 0-15/29-626-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 15:22:10 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:09:09 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.818	171799	100.000	31566	2789	1.338	--
总计		171799	100.000	31566			

图92 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名: RC\$JSS-221 - 0-15/29-627-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 15:25:33 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:09:11 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	176638	100.000	32404	2785	1.340	--
总计		176638	100.000	32404			

图93 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-628-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 15:28:55 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:09:14 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	180285	100.000	33097	2785	1.340	--
总计		180285	100.000	33097			

图94 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-629-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 15:32:17 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:09:16 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	176493	100.000	32387	2786	1.340	--
总计		176493	100.000	32387			

图95 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-630-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 15:35:38 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:09:19 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.818	178069	100.000	32688	2786	1.340	--
总计		178069	100.000	32688			

图96 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-631-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 15:39:01 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:09:21 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.818	176659	100.000	32412	2783	1.340	--
总计		176659	100.000	32412			

图97 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-632-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 15:42:23 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:09:24 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.818	177323	100.000	32537	2788	1.340	--
总计		177323	100.000	32537			

图98 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-633-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 15:45:45 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:09:27 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	177882	100.000	32658	2786	1.341	--
总计		177882	100.000	32658			

图99 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-634-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 15:49:07 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:09:29 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	181508	100.000	33323	2784	1.341	--
总计		181508	100.000	33323			

图100 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-635-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 15:52:29 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:09:32 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	178231	100.000	32711	2785	1.340	--
总计		178231	100.000	32711			

图101 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-636-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 15:55:51 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:09:35 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	181712	100.000	33377	2782	1.342	--
总计		181712	100.000	33377			

图102 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-637-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 15:59:13 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:09:37 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	177115	100.000	32523	2785	1.340	--
总计		177115	100.000	32523			

图103 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-638-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 16:02:34 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:09:40 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	178728	100.000	32830	2785	1.341	--
总计		178728	100.000	32830			

图104 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名: RC\$JSS-221 - 0-15/29-639-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 16:05:57 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:09:43 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	178462	100.000	32775	2782	1.341	--
总计		178462	100.000	32775			

图105 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名: RC\$JSS-221 - 0-15/29-640-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 16:09:20 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:09:45 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	182802	100.000	33604	2784	1.342	--
总计		182802	100.000	33604			

图106 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-641-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 16:12:42 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:09:48 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	178998	100.000	32895	2784	1.341	--
总计		178998	100.000	32895			

图107 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-642-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 16:16:04 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:09:50 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.816	182350	100.000	33543	2783	1.341	--
总计		182350	100.000	33543			

图108 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-643-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 16:19:25 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:09:53 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	178765	100.000	32831	2784	1.341	--
总计		178765	100.000	32831			

图109 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-644-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 16:22:47 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:09:56 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	179241	100.000	32947	2782	1.341	--
总计		179241	100.000	32947			

图110 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-645-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 16:26:08 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:09:58 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	179715	100.000	33033	2784	1.341	--
总计		179715	100.000	33033			

图111 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-646-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 16:29:31 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:10:02 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	183963	100.000	33753	2785	1.342	--
总计		183963	100.000	33753			

图112 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名: RC\$JSS-221 - 0-15/29-647-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 16:32:53 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:10:04 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	177941	100.000	32714	2784	1.341	--
总计		177941	100.000	32714			

图113 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名: RC\$JSS-221 - 0-15/29-648-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 16:36:14 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:10:07 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.816	183485	100.000	33766	2779	1.342	--
总计		183485	100.000	33766			

图114 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-649-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 16:39:38 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:10:10 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.816	179474	100.000	33020	2783	1.340	--
总计		179474	100.000	33020			

图115 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-650-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 16:42:59 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:10:13 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.816	177920	100.000	32720	2783	1.341	--
总计		177920	100.000	32720			

图116 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-651-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 16:46:22 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:10:16 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.816	180134	100.000	33137	2782	1.342	--
总计		180134	100.000	33137			

图117 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-652-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 16:49:44 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:10:18 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	183974	100.000	33799	2786	1.342	--
总计		183974	100.000	33799			

图118 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-653-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 16:53:06 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:10:21 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	180145	100.000	33070	2787	1.342	--
总计		180145	100.000	33070			

图119 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名: RC\$JSS-221 - 0-15/29-654-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 16:56:28 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:10:24 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.816	183658	100.000	33808	2782	1.342	--
总计		183658	100.000	33808			

图120 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-655-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 16:59:50 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:10:26 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.816	179531	100.000	33034	2779	1.341	--
总计		179531	100.000	33034			

图121 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-656-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 17:03:12 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:10:29 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.816	179831	100.000	33123	2783	1.340	--
总计		179831	100.000	33123			

图122 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-657-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 17:06:35 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:10:32 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.816	179951	100.000	33126	2782	1.341	--
总计		179951	100.000	33126			

图123 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-658-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 17:09:58 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:10:34 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.816	183883	100.000	33884	2783	1.341	--
总计		183883	100.000	33884			

图124 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-659-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 17:13:21 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:10:37 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.816	180171	100.000	33187	2784	1.341	--
总计		180171	100.000	33187			

图125 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-660-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 17:16:44 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:10:40 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.816	183936	100.000	33874	2783	1.342	--
总计		183936	100.000	33874			

图126 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名: RC\$JSS-221 - 0-15/29-661-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 17:20:06 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:10:42 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.816	179309	100.000	33040	2786	1.341	--
总计		179309	100.000	33040			

图127 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-662-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 17:23:30 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:10:45 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.816	179861	100.000	33148	2787	1.340	--
总计		179861	100.000	33148			

图128 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-666-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 17:42:48 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:10:47 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	178141	100.000	34053	4312	1.305	--
总计		178141	100.000	34053			

图129 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-667-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 17:46:11 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:10:50 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.820	183960	100.000	34010	2792	1.327	--
总计		183960	100.000	34010			

图130 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-668-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 17:49:35 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:10:53 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.818	179692	100.000	33015	2786	1.332	--
总计		179692	100.000	33015			

图131 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名: RC\$JSS-221 - 0-15/29-669-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 17:52:59 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:10:56 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.817	183366	100.000	33768	2786	1.334	--
总计		183366	100.000	33768			

图132 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名: RC\$JSS-221 - 0-15/29-670-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 17:56:22 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:10:58 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.816	179322	100.000	33094	2784	1.333	--
总计		179322	100.000	33094			

图133 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30°C 波长:250nm
数据文件名: RC\$JSS-221 - 0-15/29-671-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 17:59:45 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:11:01 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.816	179390	100.000	33122	2784	1.333	--
总计		179390	100.000	33122			

图134 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-672-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 18:03:08 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:11:04 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.800	186365	100.000	32336	2395	1.328	--
总计		186365	100.000	32336			

图135 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

JSS-221

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长:250nm
数据文件名:RC\$JSS-221 - 0-15/29-673-2 - 24040802p-zzp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-221 - 20240411-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-221 - 20240412-rcqx-FX278-1.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/12 18:06:31 实验者: wangdan
处理时间(V2): 2024/04/13 13:11:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.800	186191	100.000	32320	2396	1.328	--
总计		186191	100.000	32320			

图136 氢溴酸伏硫西汀口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24040802批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2