


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-239-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-rj lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-9  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 11:22:41 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:39:14 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转  
 溶剂

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-240-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-dz1-1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-18  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 11:26:10 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:39:17 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.058	222801	100.000	46715	4331	1.244	--
总计		222801	100.000	46715			


图2 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-241-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-dz1-2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-18  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 11:29:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:39:21      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	223073	100.000	46781	4295	1.240	--
总计		223073	100.000	46781			


图3 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-2

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-242-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-dz1-3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-18  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 11:33:08 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:39:24 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.058	223409	100.000	46771	4305	1.241	--
总计		223409	100.000	46771			


图4 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-3

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-243-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-dz1-4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-18  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 11:36:37 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:39:28 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.058	222069	100.000	46745	4345	1.239	--
总计		222069	100.000	46745			


图5 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-4

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-244-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-dz1-5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-18  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 11:40:06 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:39:31 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	222857	100.000	46882	4302	1.238	--
总计		222857	100.000	46882			


图6 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-5

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-245-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-5min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-1  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 11:43:35 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:39:33 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	30817	100.000	6025	3931	1.377	--
总计		30817	100.000	6025			


图7 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-246-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-5min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-10  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 11:47:03      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:39:36      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	30119	100.000	5466	3778	1.097	--
总计		30119	100.000	5466			


图8 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-247-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-5min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-19  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 11:50:31 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:39:39 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	24845	100.000	4946	4015	1.334	--
总计		24845	100.000	4946			


图9 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-248-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-5min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-28  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 11:54:00 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:39:42 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	25973	100.000	5080	3928	1.362	--
总计		25973	100.000	5080			


图10 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-249-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-5min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-37  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 11:57:28      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:39:45      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	28005	100.000	5552	3980	1.325	--
总计		28005	100.000	5552			


图11 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-250-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-5min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-46  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 12:00:56 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:39:47 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	22295	100.000	4382	3951	1.358	--
总计		22295	100.000	4382			


图12 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-251-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-10min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-2  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 12:04:24 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:39:50 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	47307	100.000	9385	3970	1.311	--
总计		47307	100.000	9385			


图13 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-252-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-10min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-11  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 12:07:53 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:39:53 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	49404	100.000	9818	3981	1.304	--
总计		49404	100.000	9818			


图14 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-253-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-10min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-20  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 12:11:21 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:39:56 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	46606	100.000	9418	4087	1.281	--
总计		46606	100.000	9418			


图15 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-254-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-10min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-29  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 12:14:49 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:39:59 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	47776	100.000	9634	4090	1.291	--
总计		47776	100.000	9634			


图16 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-255-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-10min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-38  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 12:18:18 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:40:02 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	49249	100.000	9761	3965	1.314	--
总计		49249	100.000	9761			


图17 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-256-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-10min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-47  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 12:21:45 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:40:05 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	49424	100.000	9775	3972	1.332	--
总计		49424	100.000	9775			


图18 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-257-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-15min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-3  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 12:25:14 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:40:08 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	67656	100.000	13357	3944	1.325	--
总计		67656	100.000	13357			


图19 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-258-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-15min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-12  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 12:28:42 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:40:11 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	69527	100.000	13868	4001	1.302	--
总计		69527	100.000	13868			


图20 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-259-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-15min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-21  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 12:32:10 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:40:13 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	67234	100.000	13508	4078	1.304	--
总计		67234	100.000	13508			


图21 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-260-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-15min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-30  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 12:35:38 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:40:16 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	68924	100.000	13732	4030	1.306	--
总计		68924	100.000	13732			


图22 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-261-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-15min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-39  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 12:39:06 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:40:19 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	70539	100.000	14096	4044	1.305	--
总计		70539	100.000	14096			


图23 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-262-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-15min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-48  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 12:42:34 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:40:22 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	68684	100.000	13638	4008	1.312	--
总计		68684	100.000	13638			


图24 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-263-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-20min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-4  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 12:46:02 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:40:25 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	81164	100.000	16120	3986	1.326	--
总计		81164	100.000	16120			


图25 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-264-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-20min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-13  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 12:49:30 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:40:28 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	83494	100.000	16447	3979	1.332	--
总计		83494	100.000	16447			


图26 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-265-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-20min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-22  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 12:52:59 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:40:31 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	82090	100.000	16287	3998	1.324	--
总计		82090	100.000	16287			


图27 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-266-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-20min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-31  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 12:56:28 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:40:34 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	83319	100.000	16542	4008	1.315	--
总计		83319	100.000	16542			


图28 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-267-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-20min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-40  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 12:59:56 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:40:37 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	85640	100.000	17006	4014	1.326	--
总计		85640	100.000	17006			


图29 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-268-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-20min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-49  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 13:03:24      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:40:39      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	81994	100.000	16653	4183	1.318	--
总计		81994	100.000	16653			


图30 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-269-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-30min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-5  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 13:06:52 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:40:42 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	96827	100.000	19286	4051	1.327	--
总计		96827	100.000	19286			


图31 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-270-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-30min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-14  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 13:10:20 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:40:45 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	98487	100.000	19625	4056	1.322	--
总计		98487	100.000	19625			


图32 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-271-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-30min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-23  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 13:13:48      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:40:48      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	97683	100.000	19576	4050	1.312	--
总计		97683	100.000	19576			


图33 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-272-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-30min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-32  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 13:17:16 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:40:50 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	99176	100.000	19994	4078	1.306	--
总计		99176	100.000	19994			


图34 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-273-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-30min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-41  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 13:20:43 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:40:53 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	102610	100.000	20445	4059	1.324	--
总计		102610	100.000	20445			


图35 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-274-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-30min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-50  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 13:24:11 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:40:56 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	99899	100.000	20034	4066	1.320	--
总计		99899	100.000	20034			


图36 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-275-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-45min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-6  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 13:27:40 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:40:59 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	110174	100.000	21871	4050	1.327	--
总计		110174	100.000	21871			


图37 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-276-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-45min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-15  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 13:31:08 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:41:02 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	109358	100.000	21901	4073	1.316	--
总计		109358	100.000	21901			


图38 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-277-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-45min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-24  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 13:34:36 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:41:04 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	109716	100.000	21853	4050	1.318	--
总计		109716	100.000	21853			


图39 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-278-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-45min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-33  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 13:38:05 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:41:07 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	111796	100.000	22315	4055	1.329	--
总计		111796	100.000	22315			


图40 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-279-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-45min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-42  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 13:41:34      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:41:10      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	113406	100.000	22865	4111	1.316	--
总计		113406	100.000	22865			


图41 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-280-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-45min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-51  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 13:45:02      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:41:13      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	111917	100.000	22305	4042	1.313	--
总计		111917	100.000	22305			


图42 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-281-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-60min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-7  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 13:48:30 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:41:15 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	112482	100.000	23001	4178	1.277	--
总计		112482	100.000	23001			


图43 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-282-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-60min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-16  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 13:51:59 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:41:18 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	113475	100.000	22727	4081	1.310	--
总计		113475	100.000	22727			


图44 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-283-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-60min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-25  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 13:55:27 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:41:21 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	114494	100.000	22992	4084	1.318	--
总计		114494	100.000	22992			


图45 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-284-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-60min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-34  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 13:58:55 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:41:24 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	115057	100.000	23194	4130	1.305	--
总计		115057	100.000	23194			


图46 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-285-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-60min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-43  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 14:02:23 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:41:26 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	116589	100.000	23744	4164	1.287	--
总计		116589	100.000	23744			


图47 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-286-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-60min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-52  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 14:05:51 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:41:29 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	116177	100.000	23355	4101	1.310	--
总计		116177	100.000	23355			


图48 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-287-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-90min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-8  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 14:09:20 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:41:32 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	119983	100.000	23853	4072	1.343	--
总计		119983	100.000	23853			


图49 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-288-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-90min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-17  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 14:12:49 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:41:35 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	118948	100.000	23711	4083	1.341	--
总计		118948	100.000	23711			


图50 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-289-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-90min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-26  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 14:16:18 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:41:38 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	118467	100.000	23747	4120	1.339	--
总计		118467	100.000	23747			


图51 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-290-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-90min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-35  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 14:19:48      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:41:41      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	120858	100.000	24258	4099	1.325	--
总计		120858	100.000	24258			


图52 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-291-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-90min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-44  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 14:23:18 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:41:43 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	122196	100.000	24298	4042	1.343	--
总计		122196	100.000	24298			


图53 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-292-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-90min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-53  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 14:26:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:41:46      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	121198	100.000	24203	4067	1.331	--
总计		121198	100.000	24203			


图54 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-293-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-Jx-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 4-1  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 14:30:16 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:41:49 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	119857	100.000	23912	4089	1.347	--
总计		119857	100.000	23912			


图55 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-294-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-Jx-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 4-10  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 14:33:45      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:41:52      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	117424	100.000	23496	4076	1.328	--
总计		117424	100.000	23496			


图56 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-295-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-Jx-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 4-19  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 14:37:13      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:41:55      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	119685	100.000	23670	4067	1.344	--
总计		119685	100.000	23670			


图57 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-296-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-Jx-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 4-28  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 14:40:41      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:41:57      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	119382	100.000	24021	4086	1.315	--
总计		119382	100.000	24021			


图58 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-297-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-Jx-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 4-37  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 14:44:09 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:42:00 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	118913	100.000	23948	4100	1.313	--
总计		118913	100.000	23948			


图59 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-298-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-Jx-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 4-46  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 14:47:37 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:42:03 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	120961	100.000	24433	4123	1.309	--
总计		120961	100.000	24433			


图60 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-299-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-dz2-1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-27  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 14:51:06 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:42:06 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	222035	100.000	46385	4271	1.262	--
总计		222035	100.000	46385			


图61 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转  
 对照品溶液-2-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-300-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-1mg-lf100z-dz2-2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 1-27  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 14:54:36 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:42:08 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	222169	100.000	46496	4267	1.258	--
总计		222169	100.000	46496			


图62 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转  
 对照品溶液-2-2

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-301-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-rj lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-9  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 14:58:06 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:42:11 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图63 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转  
 溶剂

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-302-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-dz1-1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 15:01:36 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:42:14 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	221047	100.000	46098	4278	1.263	--
总计		221047	100.000	46098			


图64 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-303-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-dz1-2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 15:05:06 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:42:17 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	221389	100.000	46316	4263	1.262	--
总计		221389	100.000	46316			


图65 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-304-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-dz1-3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 15:08:36      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:42:20      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	221177	100.000	46019	4268	1.261	--
总计		221177	100.000	46019			


图66 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-3

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-305-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-dz1-4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 15:12:06 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:42:23 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	221000	100.000	46211	4265	1.261	--
总计		221000	100.000	46211			


图67 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-4

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-306-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-dz1-5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 15:15:37 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:42:26 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	221015	100.000	46332	4254	1.260	--
总计		221015	100.000	46332			


图68 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-5

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-307-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-5min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-1  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 15:19:06 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:42:29 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.043	11698	100.000	2482	4353	1.249	--
总计		11698	100.000	2482			


图69 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-308-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-5min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-10  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 15:22:37 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:42:32 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.042	11626	100.000	2503	4423	1.235	--
总计		11626	100.000	2503			


图70 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-309-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-5min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-19  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 15:26:06 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:42:35 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.044	10957	100.000	2377	4470	1.227	--
总计		10957	100.000	2377			


图71 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-310-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-5min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-28  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 15:29:35 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:42:38 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.043	10677	100.000	2291	4430	1.250	--
总计		10677	100.000	2291			


图72 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-311-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-5min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-37  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 15:33:04 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:42:40 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.042	11425	100.000	2456	4422	1.242	--
总计		11425	100.000	2456			


图73 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-312-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-5min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-46  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 15:36:33 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:42:43 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.043	10227	100.000	2272	4661	1.208	--
总计		10227	100.000	2272			


图74 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-313-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-10min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-2      版本号: 6.115  
 进样体积 : 100 μl      实验者: jiangjinwei  
 进样时间 : 2024/04/08 15:40:03      处理者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:42:46  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.044	19117	100.000	4114	4433	1.239	--
总计		19117	100.000	4114			


图75 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片1  
 供试品溶液-1

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-314-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-10min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-11  
 进样体积 : 100  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 15:43:32      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:42:48      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 210nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.043	20074	100.000	4325	4451	1.230	--
总计		20074	100.000	4325			

图76 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-315-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-10min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-20  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 15:47:02      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:42:51      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.044	20026	100.000	4340	4485	1.224	--
总计		20026	100.000	4340			


图77 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-316-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-10min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-29  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 15:50:32 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:42:54 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.044	18985	100.000	4149	4532	1.214	--
总计		18985	100.000	4149			


图78 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-317-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-10min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-38  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 15:54:00 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:42:57 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.044	20218	100.000	4330	4396	1.242	--
总计		20218	100.000	4330			


图79 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-318-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-10min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-47  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 15:57:29      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:42:59      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.044	18163	100.000	3912	4426	1.236	--
总计		18163	100.000	3912			


图80 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-319-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-15min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-3  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 16:00:59 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:43:02 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	27059	100.000	5824	4422	1.234	--
总计		27059	100.000	5824			


图81 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-320-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-15min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-12  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 16:04:29 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:43:05 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	28388	100.000	6094	4400	1.240	--
总计		28388	100.000	6094			


图82 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-321-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-15min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-21      版本号: 6.115  
 进样体积 : 100 μl      实验者: jiangjinwei  
 进样时间 : 2024/04/08 16:07:59      处理者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:43:08  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.045	28587	100.000	6153	4426	1.246	--
总计		28587	100.000	6153			


图83 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-322-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-15min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-30  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 16:11:28 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:43:11 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	28634	100.000	6135	4381	1.244	--
总计		28634	100.000	6135			


图84 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-323-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-15min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-39  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 16:14:57 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:43:13 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.045	29091	100.000	6264	4413	1.229	--
总计		29091	100.000	6264			


图85 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-324-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-15min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-48  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 16:18:26 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:43:16 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	26542	100.000	5737	4447	1.239	--
总计		26542	100.000	5737			


图86 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-325-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-20min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-4  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 16:21:55 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:43:19 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.044	33639	100.000	7212	4412	1.247	--
总计		33639	100.000	7212			

图87 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-326-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-20min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-13  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 16:25:25      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:43:22      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	35792	100.000	7687	4401	1.239	--
总计		35792	100.000	7687			


图88 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-327-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-20min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-22  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 16:28:55 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:43:24 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.047	35579	100.000	7647	4415	1.244	--
总计		35579	100.000	7647			


图89 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-328-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-20min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-31  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 16:32:25 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:43:27 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.045	35731	100.000	7678	4410	1.247	--
总计		35731	100.000	7678			


图90 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-329-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-20min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-40  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 16:35:54 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:43:30 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.045	36579	100.000	7817	4383	1.237	--
总计		36579	100.000	7817			


图91 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-330-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-20min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-49  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 16:39:23      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:43:33      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.045	33549	100.000	7206	4414	1.242	--
总计		33549	100.000	7206			


图92 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-331-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-30min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-5  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 16:42:53 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:43:36 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	43241	100.000	9267	4400	1.241	--
总计		43241	100.000	9267			


图93 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-332-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-30min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-14  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 16:46:23 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:43:38 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	45930	100.000	9827	4401	1.249	--
总计		45930	100.000	9827			


图94 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-333-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-30min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-23  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 16:49:53 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:43:41 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.047	46455	100.000	9934	4373	1.248	--
总计		46455	100.000	9934			


图95 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-334-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-30min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-32  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 16:53:23 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:43:44 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	46347	100.000	9950	4422	1.246	--
总计		46347	100.000	9950			


图96 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-335-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-30min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-41  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 16:56:52 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:43:46 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	47365	100.000	10152	4397	1.242	--
总计		47365	100.000	10152			


图97 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-336-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-30min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-50  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 17:00:22 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:43:49 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	43934	100.000	9435	4430	1.246	--
总计		43934	100.000	9435			


图98 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-337-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-45min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-6  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 17:03:52 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:43:52 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.047	54166	100.000	11606	4403	1.246	--
总计		54166	100.000	11606			


图99 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-338-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-45min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-15  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 17:07:22 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:43:55 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	56538	100.000	12086	4380	1.245	--
总计		56538	100.000	12086			


图100 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-339-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-45min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-24  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 17:10:51 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:43:58 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	56371	100.000	12111	4418	1.239	--
总计		56371	100.000	12111			


图101 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-340-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-45min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-33  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 17:14:21 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:44:01 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	57882	100.000	12428	4416	1.244	--
总计		57882	100.000	12428			


图102 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-341-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-45min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-42  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 17:17:50 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:44:03 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	59579	100.000	12771	4394	1.247	--
总计		59579	100.000	12771			


图103 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-342-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-45min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-51  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 17:21:19 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:44:06 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	55018	100.000	11768	4375	1.247	--
总计		55018	100.000	11768			


图104 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-343-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-60min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-7  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 17:24:50 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:44:09 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	61699	100.000	13262	4439	1.246	--
总计		61699	100.000	13262			


图105 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-60min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-344-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-60min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-16  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 17:28:20 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:44:12 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.047	64577	100.000	13841	4401	1.250	--
总计		64577	100.000	13841			


图106 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-60min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-345-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-60min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-25  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 17:31:50      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:44:15      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.045	65413	100.000	13976	4378	1.251	--
总计		65413	100.000	13976			


图107 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-60min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-346-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-60min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-34  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 17:35:20 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:44:17 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.047	65319	100.000	13963	4369	1.248	--
总计		65319	100.000	13963			


图108 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-60min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-347-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-60min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-43  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 17:38:50 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:44:20 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.045	66978	100.000	14306	4377	1.249	--
总计		66978	100.000	14306			


图109 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-60min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-348-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-60min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-52  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 17:42:20 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:44:23 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	63297	100.000	13485	4378	1.248	--
总计		63297	100.000	13485			


图110 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-60min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-349-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-90min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-8  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 17:45:50      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:44:26      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	71560	100.000	15346	4412	1.244	--
总计		71560	100.000	15346			


图111 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-90min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-350-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-90min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-17  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 17:49:20 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:44:29 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	74772	100.000	15995	4388	1.246	--
总计		74772	100.000	15995			


图112 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-90min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-351-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-90min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-26  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 17:52:51      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:44:32      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	76342	100.000	16350	4402	1.246	--
总计		76342	100.000	16350			


图113 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-90min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-352-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-90min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-35  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 17:56:21 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:44:35 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.047	76068	100.000	16251	4370	1.251	--
总计		76068	100.000	16251			


图114 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-90min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-353-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-90min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-44  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 17:59:51 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:44:38 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.047	77873	100.000	16670	4397	1.246	--
总计		77873	100.000	16670			


图115 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-90min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-354-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-90min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-53  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 18:03:21 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:44:41 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	72937	100.000	15580	4371	1.251	--
总计		72937	100.000	15580			


图116 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-90min-片6  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-355-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-Jx-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 4-2  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 18:06:49      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:44:44      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

### <色谱图>

mV



### <峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.047	75398	100.000	16135	4394	1.251	--
总计		75398	100.000	16135			


图117 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-356-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-Jx-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 4-11  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 18:10:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:44:46      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	76381	100.000	16333	4393	1.250	--
总计		76381	100.000	16333			


图118 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片2  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-357-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-Jx-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 4-20  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 18:13:46      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:44:49      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	79002	100.000	16866	4376	1.253	--
总计		79002	100.000	16866			


图119 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-358-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-Jx-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 4-29  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 18:17:14      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:44:52      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	78274	100.000	16739	4392	1.254	--
总计		78274	100.000	16739			


图120 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-359-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-Jx-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 4-38  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 18:20:42      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:44:54      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.047	80236	100.000	17216	4420	1.249	--
总计		80236	100.000	17216			

图121 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-360-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-Jx-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 4-47  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 18:24:11      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:44:57      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	77119	100.000	16417	4347	1.255	--
总计		77119	100.000	16417			


图122 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-361-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-dz2-1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-27  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 18:27:41 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:45:00 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	219882	100.000	45868	4250	1.264	--
总计		219882	100.000	45868			


图123 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转  
 对照品溶液-2-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-362-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH2.0jz-jyx2-1mg-lf100z-dz2-2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 2-27  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 18:31:11 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:45:03 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	220295	100.000	45979	4244	1.261	--
总计		220295	100.000	45979			


图124 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转  
 对照品溶液-2-2

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-363-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-rj lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-9  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 18:34:39 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:45:05 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图125 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转  
 溶剂

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-364-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-dz1-1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-18  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 18:38:08      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:45:08      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	219734	100.000	45947	4259	1.264	--
总计		219734	100.000	45947			


图126 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-365-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-dz1-2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-18  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 18:41:36 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:45:11 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	219762	100.000	45915	4257	1.266	--
总计		219762	100.000	45915			


图127 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-2

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-366-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-dz1-3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-18  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 18:45:05 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:45:14 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	219772	100.000	45900	4241	1.262	--
总计		219772	100.000	45900			


图128 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-3

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-367-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-dz1-4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-18  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 18:48:33 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:45:16 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	220069	100.000	45994	4246	1.260	--
总计		220069	100.000	45994			


图129 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-4

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-368-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-dz1-5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-18  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 18:52:02 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:45:19 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	219636	100.000	45988	4269	1.262	--
总计		219636	100.000	45988			


图130 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转  
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-369-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-5min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-1  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 18:55:30      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:45:22      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	33797	100.000	7084	4329	1.249	--
总计		33797	100.000	7084			


图131 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-370-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-5min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-10  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 18:58:58 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:45:24 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	33830	100.000	7114	4371	1.253	--
总计		33830	100.000	7114			


图132 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-371-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-5min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-19  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 19:02:27      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:45:27      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	35285	100.000	7370	4427	1.259	--
总计		35285	100.000	7370			


图133 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-372-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-5min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-28  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 19:05:55      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:45:30      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	33220	100.000	7031	4413	1.247	--
总计		33220	100.000	7031			


图134 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-373-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-5min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-37  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 19:09:23      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:45:33      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	34059	100.000	7168	4376	1.248	--
总计		34059	100.000	7168			


图135 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-374-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-5min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-46  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 19:12:52      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:45:36      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	40904	100.000	8648	4413	1.246	--
总计		40904	100.000	8648			


图136 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-375-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-10min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-2  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 19:16:20      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:45:39      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	58144	100.000	12226	4403	1.257	--
总计		58144	100.000	12226			


图137 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-376-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-10min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-11  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 19:19:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:45:41      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	55414	100.000	11660	4414	1.253	--
总计		55414	100.000	11660			


图138 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-377-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-10min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-20  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 19:23:16 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:45:44 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	60435	100.000	12695	4404	1.254	--
总计		60435	100.000	12695			


图139 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-378-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-10min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-29  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 19:26:43 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:45:47 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	57824	100.000	12153	4402	1.253	--
总计		57824	100.000	12153			

图140 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-379-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-10min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-38  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 19:30:10      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:45:50      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	57039	100.000	11973	4421	1.255	--
总计		57039	100.000	11973			


图141 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-380-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-10min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-47  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 19:33:38      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:45:52      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	60338	100.000	12691	4424	1.255	--
总计		60338	100.000	12691			


图142 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-381-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-15min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-3  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 19:37:06 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:45:55 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	79061	100.000	16569	4406	1.257	--
总计		79061	100.000	16569			


图143 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-382-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-15min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-12  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 19:40:34 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:45:58 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	76901	100.000	16149	4417	1.256	--
总计		76901	100.000	16149			


图144 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-383-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-15min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-21  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 19:44:01      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:46:01      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	83023	100.000	17434	4422	1.258	--
总计		83023	100.000	17434			


图145 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-384-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-15min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-30  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 19:47:29 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:46:03 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	81219	100.000	17046	4425	1.255	--
总计		81219	100.000	17046			


图146 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-385-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-15min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-39  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 19:50:57 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:46:06 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	79858	100.000	16771	4420	1.258	--
总计		79858	100.000	16771			


图147 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-386-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-15min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-48  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 19:54:26 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:46:09 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	80526	100.000	16888	4414	1.256	--
总计		80526	100.000	16888			


图148 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-387-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-20min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-4  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 19:57:53 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:46:12 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	93416	100.000	19526	4394	1.258	--
总计		93416	100.000	19526			


图149 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-388-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-20min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-13  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 20:01:21 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:46:15 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	92255	100.000	19280	4384	1.260	--
总计		92255	100.000	19280			


图150 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-389-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-20min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-22  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 20:04:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:46:18      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	95838	100.000	20028	4398	1.258	--
总计		95838	100.000	20028			


图151 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-390-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-20min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-31  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 20:08:15      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:46:21      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	96981	100.000	20339	4413	1.263	--
总计		96981	100.000	20339			


图152 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-391-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-20min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-40  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 20:11:42      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:46:24      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	95424	100.000	19977	4414	1.263	--
总计		95424	100.000	19977			


图153 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-392-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-20min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-49  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 20:15:10 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:46:26 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	95560	100.000	20003	4414	1.267	--
总计		95560	100.000	20003			


图154 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-393-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-30min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-5  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 20:18:38 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:46:29 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	108647	100.000	22776	4418	1.263	--
总计		108647	100.000	22776			


图155 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-394-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-30min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-14  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 20:22:05 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:46:32 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	106853	100.000	22414	4415	1.257	--
总计		106853	100.000	22414			


图156 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-395-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-30min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-23  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 20:25:33 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:46:35 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	110750	100.000	23195	4416	1.260	--
总计		110750	100.000	23195			


图157 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-396-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-30min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-32  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 20:29:00 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:46:37 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	110841	100.000	23247	4432	1.262	--
总计		110841	100.000	23247			


图158 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-397-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-30min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-41  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 20:32:27 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:46:40 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	110274	100.000	23074	4422	1.262	--
总计		110274	100.000	23074			


图159 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-398-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-30min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-50  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 20:35:54 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:46:43 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	110650	100.000	23238	4441	1.262	--
总计		110650	100.000	23238			


图160 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-399-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-45min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-6  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 20:39:22 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:46:46 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	115328	100.000	24178	4427	1.260	--
总计		115328	100.000	24178			


图161 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-400-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-45min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-15  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 20:42:50 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:46:49 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	116634	100.000	24445	4422	1.263	--
总计		116634	100.000	24445			


图162 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-401-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-45min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-24  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 20:46:17 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:46:52 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	119607	100.000	25081	4439	1.262	--
总计		119607	100.000	25081			


图163 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-402-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-45min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-33  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 20:49:44 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:46:54 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	119083	100.000	24977	4427	1.260	--
总计		119083	100.000	24977			


图164 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-403-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-45min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-42  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 20:53:12      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:46:57      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	120011	100.000	25140	4422	1.260	--
总计		120011	100.000	25140			


图165 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-404-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-45min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-51  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 20:56:38 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:47:00 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	118906	100.000	24942	4435	1.262	--
总计		118906	100.000	24942			


图166 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-405-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-60min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-7  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 21:00:06 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:47:02 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	118428	100.000	24809	4432	1.261	--
总计		118428	100.000	24809			


图167 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-406-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-60min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-16  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 21:03:33 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:47:05 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	121089	100.000	25387	4431	1.264	--
总计		121089	100.000	25387			


图168 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-407-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-60min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-25  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 21:07:00 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:47:08 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	121300	100.000	25432	4429	1.262	--
总计		121300	100.000	25432			


图169 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-408-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-60min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-34  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 21:10:28 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:47:11 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	122160	100.000	25618	4428	1.262	--
总计		122160	100.000	25618			


图170 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-409-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-60min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-43  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 21:13:56      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:47:13      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	121975	100.000	25554	4430	1.264	--
总计		121975	100.000	25554			


图171 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-410-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-60min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-52  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 21:17:22 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:47:16 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	122641	100.000	25662	4411	1.266	--
总计		122641	100.000	25662			


图172 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-411-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-90min-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-8  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 21:20:50      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:47:19      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	121003	100.000	25363	4452	1.269	--
总计		121003	100.000	25363			


图173 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-412-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-90min-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-17  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 21:24:19      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:47:22      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	121946	100.000	25530	4429	1.264	--
总计		121946	100.000	25530			


图174 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片2  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-413-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-90min-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-26  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 21:27:46 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:47:24 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	125122	100.000	26226	4421	1.262	--
总计		125122	100.000	26226			


图175 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-414-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-90min-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-35  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 21:31:14 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:47:27 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	124391	100.000	26025	4408	1.265	--
总计		124391	100.000	26025			


图176 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-415-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-90min-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-44  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 21:34:42 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:47:30 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	123605	100.000	25845	4419	1.267	--
总计		123605	100.000	25845			


图177 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-416-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-90min-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-53  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 21:38:10 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:47:33 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.094	124085	100.000	25839	4407	1.269	--
总计		124085	100.000	25839			


图178 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-417-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-Jx-P1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 4-3  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 21:41:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:47:35      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	120350	100.000	25198	4421	1.263	--
总计		120350	100.000	25198			


图179 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-418-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-Jx-P2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 4-12  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 21:45:07      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:47:38      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.093	121148	100.000	25168	4387	1.269	--
总计		121148	100.000	25168			


图180 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-419-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-Jx-P3.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 4-21  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 21:48:36      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:47:41      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	122987	100.000	25701	4408	1.262	--
总计		122987	100.000	25701			


图181 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-420-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-Jx-P4.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 4-30  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 21:52:04      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:47:44      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.093	123216	100.000	25695	4438	1.267	--
总计		123216	100.000	25695			


图182 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-421-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-Jx-P5.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 4-39  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 21:55:33      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:47:47      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.092	122578	100.000	25423	4401	1.271	--
总计		122578	100.000	25423			


图183 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30°C      波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-422-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-Jx-P6.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 4-48  
 进样体积 : 100 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 21:59:01      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:47:49      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.093	122663	100.000	25538	4417	1.267	--
总计		122663	100.000	25538			


图184 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-423-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-dz2-1.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-27  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 22:02:30 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:47:52 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	218936	100.000	45688	4274	1.271	--
总计		218936	100.000	45688			


图185 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转  
 对照品溶液-2-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 :XB-C18(4.6mm\*150mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长: 210nm  
 数据文件名 :RC\$QTL-348 - 0-23/30-424-2 - cbzj-AM221354p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-1mg-lf100z-dz2-2.lcd  
 方法文件名 :RC\$QTL-348 - QTL-348-20240408-FX279.lcm  
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240408-rcqx-fx279.lcb  
 样品瓶号 : 3-27  
 进样体积 : 100  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/04/08 22:05:57 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2024/04/09 08:47:55 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	218773	100.000	45409	4265	1.274	--
总计		218773	100.000	45409			

图186 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-AM221354批(1mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转  
 对照品溶液-2-2