

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-80-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-rj.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-9

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 10:03:19

处理时间(V2)：2024/04/17 14:31:28

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-81-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 10:07:42

处理时间(V2)：2024/04/17 14:31:33

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.202	27936	100.000	5198	1181	1.169	--
总计		27936	100.000	5198			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-82-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 10:12:06

处理时间(V2)：2024/04/17 14:31:35

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.202	27851	100.000	5193	1180	1.168	--
总计		27851	100.000	5193			

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-83-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 10:16:30

处理时间(V2)：2024/04/17 14:31:38

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.202	27985	100.000	5220	1185	1.170	--
总计		27985	100.000	5220			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-84-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 10:20:54

处理时间(V2)：2024/04/17 14:31:40

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.202	27865	100.000	5203	1184	1.169	--
总计		27865	100.000	5203			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-85-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：20 μl
进样时间：2024/04/17 10:25:17
处理时间(V2)：2024/04/17 14:31:43
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.202	27981	100.000	5208	1183	1.174	--
总计		27981	100.000	5208			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-86-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-1

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 10:29:40

处理时间(V2)：2024/04/17 14:31:45

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.209	12111	100.000	2266	1262	1.181	--
总计		12111	100.000	2266			

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-87-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-10

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 10:34:03

处理时间(V2)：2024/04/17 14:31:48

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.208	12385	100.000	2395	1285	1.163	--
总计		12385	100.000	2395			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-88-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-19

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 10:38:25

处理时间(V2)：2024/04/17 14:31:50

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.209	12357	100.000	2393	1287	1.166	--
总计		12357	100.000	2393			

<样品信息>


色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-89-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb
样品瓶号：1-28
进样体积：20 μl
进样时间：2024/04/17 10:42:48
处理时间(V2)：2024/04/17 14:31:53
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min
波长：237nm

版本号：6.115
实验者：xiexinhui
处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.209	11500	100.000	2229	1284	1.165	--
总计		11500	100.000	2229			

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-90-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-37

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 10:47:11

处理时间(V2)：2024/04/17 14:31:55

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.209	12767	100.000	2468	1284	1.169	--
总计		12767	100.000	2468			

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-91-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-5min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-46

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 10:51:34

处理时间(V2)：2024/04/17 14:31:58

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.209	12323	100.000	2378	1280	1.169	--
总计		12323	100.000	2378			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-92-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-2

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 10:55:57

处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:00

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.209	18912	100.000	3647	1275	1.168	--
总计		18912	100.000	3647			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-93-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-11

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 11:00:20

处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:03

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.209	19756	100.000	3797	1271	1.172	--
总计		19756	100.000	3797			

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-94-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-20

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 11:04:42

处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:05

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.210	19574	100.000	3794	1290	1.167	--
总计		19574	100.000	3794			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-95-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-29

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 11:09:04

处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:07

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.209	19334	100.000	3731	1279	1.169	--
总计		19334	100.000	3731			

<样品信息>


色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-96-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb
样品瓶号：1-38
进样体积：20 μl
进样时间：2024/04/17 11:13:27
处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:10
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min
波长：237nm

版本号：6.115
实验者：xiexinhui
处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.208	19969	100.000	3878	1290	1.169	--
总计		19969	100.000	3878			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-97-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-10min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-47

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 11:17:50

处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:13

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.208	19727	100.000	3817	1281	1.166	--
总计		19727	100.000	3817			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-98-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-3

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 11:22:13

处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:15

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.209	20645	100.000	3984	1283	1.169	--
总计		20645	100.000	3984			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-99-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-12

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 11:26:36

处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:18

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.208	21429	100.000	4146	1287	1.172	--
总计		21429	100.000	4146			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-100-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-21

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 11:30:59

处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:20

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.209	22181	100.000	4292	1287	1.169	--
总计		22181	100.000	4292			

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-101-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-30

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 11:35:22

处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:23

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.208	21706	100.000	4190	1279	1.169	--
总计		21706	100.000	4190			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-102-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb
样品瓶号：1-39
进样体积：20 μl
进样时间：2024/04/17 11:39:45
处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:25
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.208	22629	100.000	4377	1286	1.171	--
总计		22629	100.000	4377			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-103-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-15min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-48

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 11:44:08

处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:27

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.208	21539	100.000	4158	1282	1.170	--
总计		21539	100.000	4158			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-104-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-4

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 11:48:31

处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:30

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.209	21400	100.000	4137	1283	1.170	--
总计		21400	100.000	4137			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-105-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-13

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 11:52:54

处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:32

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.209	22131	100.000	4289	1291	1.171	--
总计		22131	100.000	4289			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-106-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-22

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 11:57:17

处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:34

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.209	22814	100.000	4409	1288	1.173	--
总计		22814	100.000	4409			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-107-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-31

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 12:01:40

处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:37

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.207	21941	100.000	4254	1291	1.175	--
总计		21941	100.000	4254			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-108-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb
样品瓶号：1-40
进样体积：20 μl
进样时间：2024/04/17 12:06:02
处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:39
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.207	22647	100.000	4387	1290	1.173	--
总计		22647	100.000	4387			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-109-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-20min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-49

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 12:10:25

处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:41

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.207	22590	100.000	4380	1287	1.175	--
总计		22590	100.000	4380			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-110-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb
样品瓶号：1-5
进样体积：20 μl
进样时间：2024/04/17 12:14:48
处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:44
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.208	20462	100.000	3946	1278	1.175	--
总计		20462	100.000	3946			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-111-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-14

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 12:19:11

处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:46

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.208	21408	100.000	4127	1278	1.176	--
总计		21408	100.000	4127			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-112-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-23

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 12:23:35

处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:48

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.208	21519	100.000	4164	1286	1.170	--
总计		21519	100.000	4164			

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-113-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-32

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 12:27:57

处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:51

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.208	21062	100.000	4075	1286	1.174	--
总计		21062	100.000	4075			

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-114-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-41

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 12:32:20

处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:53

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.207	21181	100.000	4082	1274	1.175	--
总计		21181	100.000	4082			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-115-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-30min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb
样品瓶号：1-50
进样体积：20 μl
进样时间：2024/04/17 12:36:43
处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:55
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.207	20605	100.000	3984	1278	1.172	--
总计		20605	100.000	3984			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-116-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-6

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 12:41:06

处理时间(V2)：2024/04/17 14:32:58

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.208	20764	100.000	4011	1282	1.172	--
总计		20764	100.000	4011			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-117-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-15

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 12:45:29

处理时间(V2)：2024/04/17 14:33:00

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.208	20990	100.000	4051	1280	1.174	--
总计		20990	100.000	4051			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-118-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-24

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 12:49:50

处理时间(V2)：2024/04/17 14:33:03

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.207	20791	100.000	3998	1273	1.176	--
总计		20791	100.000	3998			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-119-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-33

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 12:54:13

处理时间(V2)：2024/04/17 14:33:05

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.207	20430	100.000	3937	1275	1.175	--
总计		20430	100.000	3937			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-120-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb
样品瓶号：1-42
进样体积：20 μl
进样时间：2024/04/17 12:58:36
处理时间(V2)：2024/04/17 14:33:08
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.208	20809	100.000	4018	1281	1.177	--
总计		20809	100.000	4018			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-121-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-45min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb
样品瓶号：1-51
进样体积：20 μl
进样时间：2024/04/17 13:02:59
处理时间(V2)：2024/04/17 14:33:10
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.208	21110	100.000	4069	1276	1.175	--
总计		21110	100.000	4069			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-122-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb
样品瓶号：1-7
进样体积：20 μl
进样时间：2024/04/17 13:07:20
处理时间(V2)：2024/04/17 14:33:13
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.207	20153	100.000	3888	1280	1.176	--
总计		20153	100.000	3888			

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-123-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-16

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 13:11:43

处理时间(V2)：2024/04/17 14:33:16

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.206	20818	100.000	4009	1281	1.171	--
总计		20818	100.000	4009			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-124-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-25

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 13:16:06

处理时间(V2)：2024/04/17 14:33:18

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.206	21315	100.000	4103	1274	1.171	--
总计		21315	100.000	4103			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-125-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb
样品瓶号：1-34
进样体积：20 μl
进样时间：2024/04/17 13:20:29
处理时间(V2)：2024/04/17 14:33:20
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.206	21974	100.000	4230	1279	1.175	--
总计		21974	100.000	4230			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-126-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb
样品瓶号：1-43
进样体积：20 μl
进样时间：2024/04/17 13:24:52
处理时间(V2)：2024/04/17 14:33:23
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.206	21721	100.000	4188	1279	1.177	--
总计		21721	100.000	4188			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-127-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-60min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-52

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 13:29:15

处理时间(V2)：2024/04/17 14:33:25

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.207	21351	100.000	4117	1278	1.178	--
总计		21351	100.000	4117			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-128-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb
样品瓶号：1-8
进样体积：20 μl
进样时间：2024/04/17 13:33:39
处理时间(V2)：2024/04/17 14:33:28
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.206	19717	100.000	3800	1280	1.175	--
总计		19717	100.000	3800			

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-2092

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-129-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-17

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 13:38:03

处理时间(V2)：2024/04/17 14:33:30

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.206	20952	100.000	4031	1275	1.174	--
总计		20952	100.000	4031			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-130-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-26

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 13:42:28

处理时间(V2)：2024/04/17 14:33:32

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.206	21296	100.000	4100	1277	1.176	--
总计		21296	100.000	4100			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-131-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-35

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 13:46:52

处理时间(V2)：2024/04/17 14:33:34

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.207	21417	100.000	4134	1278	1.175	--
总计		21417	100.000	4134			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-132-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-44

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 13:51:17

处理时间(V2)：2024/04/17 14:33:37

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.206	22017	100.000	4248	1280	1.177	--
总计		22017	100.000	4248			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-133-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-jxzs-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-53

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 13:55:41

处理时间(V2)：2024/04/17 14:33:39

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.206	21588	100.000	4145	1273	1.176	--
总计		21588	100.000	4145			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-134-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-dz2-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-27

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 14:00:06

处理时间(V2)：2024/04/17 14:33:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.199	28022	100.000	5244	1178	1.182	--
总计		28022	100.000	5244			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-2092 - 28-7/28-135-2 - zzp-24041001p-rcqx-shuijz-jf75z-dz2-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-2092 - 20240417-aldp-FX277.lcb

样品瓶号：1-27

进样体积：20 μl

进样时间：2024/04/17 14:04:31

处理时间(V2)：2024/04/17 14:33:44

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：2.0ml/min

波长：237nm


版本号：6.115

实验者：xiexinhui

处理者：xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.199	27948	100.000	5253	1186	1.181	--
总计		27948	100.000	5253			