



SMF-356


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 30°C
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-1-4 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/04/03 11:23:46
处理时间(V4) : 2024/04/28 14:06:25
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流速: 1.0ml/min
波长: 247nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质
溶剂




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 30°C
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-2-4 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/04/03 11:26:40
处理时间(V4) : 2024/04/28 14:06:29
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流速: 1.0ml/min
波长: 247nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.448	682169	100.000	127677	1854	1.345	--
总计		682169	100.000	127677			

图2 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 30°C
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-3-4 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/04/03 11:29:33
处理时间(V4) : 2024/04/28 14:06:31
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流速: 1.0ml/min
波长: 247nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.448	680553	100.000	127572	1856	1.345	--
总计		680553	100.000	127572			

图3 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-2



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温: 30°C
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-4-4 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/04/03 11:32:26
处理时间(V4) : 2024/04/28 14:06:35
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 247nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.447	681710	100.000	127807	1854	1.345	--
总计		681710	100.000	127807			

图4 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 30°C
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-5-4 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/04/03 11:35:19
处理时间(V4) : 2024/04/28 14:06:37
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流速: 1.0ml/min
波长: 247nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.446	681513	100.000	127691	1847	1.347	--
总计		681513	100.000	127691			

图5 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-4



SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30°C

数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-6-4 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μl

进样时间: 2024/04/03 11:38:14

处理时间(V4) : 2024/04/28 14:06:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流速: 1.0ml/min

波长: 247nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.446	681830	100.000	127679	1846	1.348	--
总计		681830	100.000	127679			

图6 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-5



SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30°C

数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-7-4 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 10 μl

进样时间: 2024/04/03 11:41:06

处理时间(V4): 2024/04/28 14:06:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流速: 1.0ml/min

波长: 247nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.452	258579	100.000	48597	1895	1.337	--
总计		258579	100.000	48597			

图7 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30°C

数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-8-4 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 10 μl

进样时间: 2024/04/03 11:43:58

处理时间(V4): 2024/04/28 14:06:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流速: 1.0ml/min

波长: 247nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.452	277977	100.000	52035	1887	1.339	--
总计		277977	100.000	52035			

图8 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温: 30°C
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-9-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/04/03 11:46:50
处理时间(V3) : 2024/04/28 14:06:48
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 247nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.453	259749	100.000	48889	1898	1.336	--
总计		259749	100.000	48889			

图9 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-10-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 11:49:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:06:50 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.452	270502	100.000	51022	1903	1.337	--
总计		270502	100.000	51022			

图10 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-11-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 11:52:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:06:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.452	273558	100.000	51344	1894	1.336	--
总计		273558	100.000	51344			

图11 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-12-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 11:55:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:06:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.451	271557	100.000	50873	1892	1.338	--
总计		271557	100.000	50873			

图12 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-13-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 11:58:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:06:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.449	546690	100.000	102933	1884	1.347	--
总计		546690	100.000	102933			

图13 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-14-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 12:01:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:07:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.448	563570	100.000	106312	1881	1.348	--
总计		563570	100.000	106312			

图14 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-15-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 12:04:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:07:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.448	567808	100.000	107108	1880	1.346	--
总计		567808	100.000	107108			

图15 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-16-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 12:06:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:07:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.447	583689	100.000	110118	1880	1.348	--
总计		583689	100.000	110118			

图16 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-17-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 12:09:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:07:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.447	573857	100.000	108330	1882	1.348	--
总计		573857	100.000	108330			

图17 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-18-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 12:12:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:07:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.447	565598	100.000	106806	1882	1.349	--
总计		565598	100.000	106806			

图18 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-19-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 12:15:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:07:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.446	715334	100.000	134942	1876	1.358	--
总计		715334	100.000	134942			

图19 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-20-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 12:18:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:07:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.446	728251	100.000	137435	1876	1.357	--
总计		728251	100.000	137435			

图20 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-21-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 12:21:18 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:07:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.445	743286	100.000	140223	1877	1.357	--
总计		743286	100.000	140223			

图21 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-22-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 12:24:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:07:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.445	753636	100.000	142114	1874	1.358	--
总计		753636	100.000	142114			

图22 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-23-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 12:27:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:07:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.445	739484	100.000	139472	1876	1.356	--
总计		739484	100.000	139472			

图23 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-24-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 12:29:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:07:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.445	733631	100.000	138348	1877	1.356	--
总计		733631	100.000	138348			

图24 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-25-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 12:32:46 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:07:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.443	762212	100.000	143216	1872	1.359	--
总计		762212	100.000	143216			

图25 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-26-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 12:35:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:07:32 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.444	766849	100.000	144432	1875	1.357	--
总计		766849	100.000	144432			

图26 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-27-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 12:38:30 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:07:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.444	788449	100.000	148359	1874	1.359	--
总计		788449	100.000	148359			

图27 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-28-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 12:41:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:07:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.444	794519	100.000	149414	1871	1.360	--
总计		794519	100.000	149414			

图28 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-29-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 12:44:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:07:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.444	769961	100.000	144854	1874	1.359	--
总计		769961	100.000	144854			

图29 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-30-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 12:47:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:07:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.443	766706	100.000	144132	1872	1.360	--
总计		766706	100.000	144132			

图30 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温: 30°C
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-31-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/04/03 12:50:01
处理时间(V3) : 2024/04/28 14:07:44
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 247nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.442	764268	100.000	143245	1868	1.362	--
总计		764268	100.000	143245			

图31 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-32-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 12:52:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:07:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.442	768670	100.000	144119	1867	1.361	--
总计		768670	100.000	144119			

图32 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-33-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 12:55:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:07:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.443	787712	100.000	147502	1861	1.361	--
总计		787712	100.000	147502			

图33 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-34-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 12:58:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:07:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.442	795191	100.000	149009	1865	1.362	--
总计		795191	100.000	149009			

图34 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-35-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 13:01:29 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:07:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.443	767679	100.000	144000	1865	1.360	--
总计		767679	100.000	144000			

图35 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-36-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 13:04:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:07:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.443	764413	100.000	143417	1867	1.360	--
总计		764413	100.000	143417			

图36 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-37-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 13:07:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:07:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.444	762968	100.000	143151	1864	1.360	--
总计		762968	100.000	143151			

图37 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-38-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 13:10:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:08:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.442	765925	100.000	143310	1861	1.361	--
总计		765925	100.000	143310			

图38 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-39-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 13:12:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:08:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.442	787469	100.000	147302	1859	1.363	--
总计		787469	100.000	147302			

图39 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-40-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 13:15:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:08:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.443	793397	100.000	148567	1861	1.364	--
总计		793397	100.000	148567			

图40 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-41-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 13:18:43 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:08:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.442	767583	100.000	143962	1864	1.363	--
总计		767583	100.000	143962			

图41 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温: 30°C
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-42-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/04/03 13:21:36
处理时间(V3) : 2024/04/28 14:08:13
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 247nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.443	764307	100.000	143165	1865	1.363	--
总计		764307	100.000	143165			

图42 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-43-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 13:24:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:08:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.442	761650	100.000	142866	1863	1.363	--
总计		761650	100.000	142866			

图43 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-44-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 13:27:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:08:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.441	765330	100.000	143863	1860	1.363	--
总计		765330	100.000	143863			

图44 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-45-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 13:30:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:08:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.441	786024	100.000	147696	1858	1.364	--
总计		786024	100.000	147696			

图45 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-46-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 13:33:05 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:08:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.442	792753	100.000	148651	1855	1.364	--
总计		792753	100.000	148651			

图46 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-47-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 13:35:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:08:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.442	765898	100.000	143719	1865	1.363	--
总计		765898	100.000	143719			

图47 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-48-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 13:38:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:08:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.442	763969	100.000	143068	1864	1.364	--
总计		763969	100.000	143068			

图48 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30°C

数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-49-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-jx-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 10 μl

进样时间: 2024/04/03 13:41:43

处理时间(V3): 2024/04/28 14:08:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流速: 1.0ml/min

波长: 247nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.441	759605	100.000	142784	1863	1.363	--
总计		759605	100.000	142784			

图49 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温: 30°C
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-50-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/04/03 13:44:36
处理时间(V3) : 2024/04/28 14:08:34
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 247nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.441	763498	100.000	143774	1861	1.363	--
总计		763498	100.000	143774			

图50 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30°C

数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-51-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-jx-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 10 μl

进样时间: 2024/04/03 13:47:30

处理时间(V3): 2024/04/28 14:08:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流速: 1.0ml/min

波长: 247nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.441	783815	100.000	147630	1863	1.363	--
总计		783815	100.000	147630			

图51 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30°C

数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-52-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-jx-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 10 μl

进样时间: 2024/04/03 13:50:22

处理时间(V3): 2024/04/28 14:08:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流速: 1.0ml/min

波长: 247nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.441	791365	100.000	149064	1863	1.364	--
总计		791365	100.000	149064			

图52 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30°C

数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-53-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-jx-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 10 μl

进样时间: 2024/04/03 13:53:15

处理时间(V3): 2024/04/28 14:08:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流速: 1.0ml/min

波长: 247nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.441	764492	100.000	143932	1863	1.363	--
总计		764492	100.000	143932			

图53 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温: 30°C

数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-54-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-jx-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 10 μl

进样时间: 2024/04/03 13:56:08

处理时间(V3): 2024/04/28 14:08:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流速: 1.0ml/min

波长: 247nm


版本号: 6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.442	761297	100.000	143036	1865	1.363	--
总计		761297	100.000	143036			

图54 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 247nm
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-55-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/04/03 13:59:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V3): 2024/04/28 14:08:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX251)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.438	681359	100.000	128391	1845	1.354	--
总计		681359	100.000	128391			

图55 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




SMF-356

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温: 30°C
数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-31/1-56-3 - zzp-24032601p-40mg-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-FX251.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-356 - 20240403-Fx251.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/04/03 14:01:55
处理时间(V3) : 2024/04/28 14:08:49
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX251)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 247nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A 247nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.438	681743	100.000	128436	1846	1.354	--
总计		681743	100.000	128436			

图56 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24032601批(40mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-2-2