




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-15-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-rj.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-9  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 15:41:56                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:44:51              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-16-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-18  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 15:47:20                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:44:58              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.107	469408	112885	75.594	1674	1.286	--
2	2.647	151549	37176	24.406	10313	1.278	14.497
总计		620957	150061	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-17-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-18  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 15:52:44                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:45:01              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.107	469515	112538	75.619	1669	1.286	--
2	2.649	151382	36974	24.381	10296	1.278	14.485
总计		620898	149512	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-18-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-18  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 15:58:08                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:45:04              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	469715	112185	75.613	1658	1.286	--
2	2.655	151496	37092	24.387	10298	1.273	14.502
总计		621210	149278	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-19-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-18  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 16:03:32                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:45:07              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	469690	111909	75.597	1662	1.287	--
2	2.653	151620	36887	24.403	10234	1.274	14.460
总计		621310	148796	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-20-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-18  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 16:08:55                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:45:10              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	469876	111855	75.612	1658	1.287	--
2	2.657	151552	36933	24.388	10223	1.274	14.474
总计		621427	148788	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-21-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-5min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-1  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 16:14:18                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:45:12              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.113	313461	78428	81.285	1827	1.289	--
2	2.654	72169	17529	18.715	10216	1.275	14.734
总计		385630	95958	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-22-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-5min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-10  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 16:19:41                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:45:15              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.113	357920	89532	81.945	1827	1.288	--
2	2.651	78858	18936	18.055	10160	1.277	14.696
总计		436778	108467	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-23-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-5min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-19  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 16:25:03                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:45:18              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.113	337461	84285	82.153	1822	1.290	--
2	2.657	73310	17746	17.847	10163	1.274	14.720
总计		410771	102030	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-24-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-5min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-28  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 16:30:25                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:45:21              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.113	312712	78205	82.361	1826	1.290	--
2	2.657	66974	16191	17.639	10129	1.272	14.717
总计		379686	94396	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-25-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-5min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-37  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 16:35:48                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:45:23              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.114	305701	76391	81.876	1827	1.289	--
2	2.656	67671	16383	18.124	10103	1.270	14.682
总计		373372	92774	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-26-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-5min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-46  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 16:41:10                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:45:26              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	281826	70292	82.053	1822	1.289	--
2	2.659	61641	14731	17.947	10119	1.274	14.701
总计		343467	85023	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-27-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-10min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-2  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 16:46:32                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:45:29              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	399791	99762	78.548	1825	1.290	--
2	2.652	109185	26349	21.452	10078	1.267	14.644
总计		508976	126111	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-28-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-10min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-11  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 16:51:54                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:45:31              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	425593	105488	78.566	1826	1.294	--
2	2.657	116112	28042	21.434	10081	1.268	14.654
总计		541705	133530	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-29-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-10min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-20  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 16:57:16                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:45:34              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	424644	106026	78.820	1830	1.293	--
2	2.654	114105	27647	21.180	10036	1.264	14.647
总计		538749	133673	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-30-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-10min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-29  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 17:02:39                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:45:37              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.113	423096	105471	79.058	1818	1.291	--
2	2.655	112078	27185	20.942	10064	1.264	14.657
总计		535174	132656	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-31-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-10min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-38  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 17:08:02                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:45:39              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	410901	101918	78.532	1827	1.293	--
2	2.657	112325	27108	21.468	10019	1.264	14.630
总计		523226	129026	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-32-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-10min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-47  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 17:13:24                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:45:42              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	403416	99649	79.092	1825	1.294	--
2	2.661	106642	25672	20.908	10058	1.264	14.661
总计		510057	125321	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-33-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-15min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-3  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 17:18:47                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:45:45              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	428530	105717	77.107	1834	1.293	--
2	2.658	127233	30501	22.893	9990	1.264	14.614
总计		555762	136218	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-34-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-15min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-12  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 17:24:10                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:45:47              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	440977	108950	76.990	1831	1.292	--
2	2.665	131798	31847	23.010	10071	1.263	14.672
总计		572775	140797	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-35-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-15min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-21  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 17:29:33                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:45:50              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	443694	109479	77.087	1828	1.293	--
2	2.666	131880	31688	22.913	10029	1.263	14.657
总计		575574	141167	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-36-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-15min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-30  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 17:34:56                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:45:53              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	446426	110777	77.127	1835	1.290	--
2	2.668	132392	31782	22.873	10095	1.263	14.694
总计		578818	142559	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-37-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-15min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-39  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 17:40:20                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:45:56              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	439013	109298	76.978	1844	1.289	--
2	2.662	131298	31573	23.022	9936	1.259	14.601
总计		570311	140871	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-38-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-15min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-48  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 17:45:42                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:45:59              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	440691	109696	77.393	1838	1.290	--
2	2.666	128727	30905	22.607	9971	1.262	14.617
总计		569418	140601	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-39-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-20min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-4  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 17:51:05                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:46:02              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	444876	111051	76.292	1847	1.289	--
2	2.664	138244	33354	23.708	10006	1.261	14.630
总计		583120	144405	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-40-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-20min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-13  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 17:56:28                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:46:05              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	447657	111562	76.203	1843	1.291	--
2	2.667	139797	33302	23.797	9947	1.260	14.619
总计		587454	144865	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-41-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-20min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-22  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 18:01:50                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:46:10              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	451168	112489	76.203	1850	1.291	--
2	2.668	140896	33675	23.797	10009	1.259	14.646
总计		592064	146164	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-42-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-20min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-31  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 18:07:13                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:46:13              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	454739	113257	76.109	1846	1.290	--
2	2.670	142743	34356	23.891	10035	1.258	14.665
总计		597482	147613	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-43-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-20min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-40  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 18:12:36                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:46:16              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	450059	111863	76.140	1842	1.291	--
2	2.670	141036	33914	23.860	9992	1.256	14.631
总计		591095	145777	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-44-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-20min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-49  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 18:17:58                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:46:19              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	453006	112340	76.553	1847	1.292	--
2	2.674	138749	33204	23.447	9992	1.258	14.654
总计		591755	145544	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-45-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-30min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-5  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 18:23:21                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:46:22              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	462248	114762	75.741	1842	1.291	--
2	2.672	148056	35614	24.259	9968	1.254	14.626
总计		610304	150376	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-46-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-30min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-14  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 18:28:44                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:46:24              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	458398	113395	75.616	1859	1.292	--
2	2.668	147824	35228	24.384	9954	1.257	14.604
总计		606222	148623	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-47-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-30min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-23  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 18:34:06                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:46:27              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	463535	114631	75.570	1836	1.293	--
2	2.675	149849	35782	24.430	9990	1.258	14.634
总计		613384	150413	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-48-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-30min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-32  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 18:39:29                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:46:29              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	466618	115291	75.440	1848	1.293	--
2	2.676	151908	36169	24.560	10004	1.257	14.660
总计		618527	151460	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-49-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-30min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-41  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 18:44:52                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:46:32              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.127	463976	114814	75.537	1864	1.291	--
2	2.676	150258	35752	24.463	9980	1.257	14.642
总计		614234	150566	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-50-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-30min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-50  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 18:50:14                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:46:35              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.127	466351	115593	75.900	1871	1.290	--
2	2.668	148075	35304	24.100	9916	1.256	14.582
总计		614426	150897	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-51-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-45min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-6  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 18:55:37                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:46:37              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.128	482356	120155	75.774	1878	1.289	--
2	2.668	154214	36656	24.226	9944	1.258	14.583
总计		636571	156811	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-52-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-45min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-15  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 19:01:00                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:46:40              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.128	467929	116378	75.512	1872	1.289	--
2	2.679	151748	36427	24.488	9991	1.252	14.662
总计		619678	152805	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-53-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-45min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-24  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 19:06:23                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:46:43              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.130	474132	118225	75.527	1879	1.286	--
2	2.679	153630	36877	24.473	9992	1.252	14.645
总计		627762	155102	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-54-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-45min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-33  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 19:11:46                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:46:45              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.131	482477	120332	75.449	1881	1.287	--
2	2.678	156996	37637	24.551	9985	1.253	14.635
总计		639473	157968	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-55-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-45min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-42  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 19:17:09                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:46:48              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.131	479559	119343	75.595	1872	1.288	--
2	2.679	154821	37108	24.405	9957	1.252	14.608
总计		634380	156451	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-56-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-45min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-51  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 19:22:31                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:46:50              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.132	478999	119664	75.803	1897	1.288	--
2	2.674	152903	36673	24.197	9949	1.255	14.603
总计		631901	156337	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-57-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-60min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-7  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 19:27:54                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:46:53              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	494288	121856	76.069	1887	1.292	--
2	2.680	155503	37318	23.931	9947	1.250	14.597
总计		649791	159174	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-58-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-60min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-16  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 19:33:17                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:46:55              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.134	474110	116877	75.618	1894	1.291	--
2	2.676	152873	36327	24.382	9945	1.255	14.580
总计		626982	153204	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-59-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-60min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-25  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 19:38:40                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:46:58              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	484421	120029	75.640	1897	1.288	--
2	2.677	156005	37028	24.360	9891	1.253	14.541
总计		640426	157058	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-60-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-60min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-34  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 19:44:03                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:47:01              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.135	492898	121610	75.691	1890	1.290	--
2	2.677	158304	37575	24.309	9863	1.252	14.534
总计		651202	159185	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-61-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-60min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-43  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 19:49:26                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:47:04              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	489010	121835	75.791	1906	1.285	--
2	2.676	156201	37003	24.209	9886	1.253	14.544
总计		645211	158838	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-62-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-60min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-52  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 19:54:48                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:47:06              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	485627	120518	75.946	1893	1.286	--
2	2.681	153814	36763	24.054	9885	1.250	14.548
总计		639440	157282	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-63-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-JX.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-8  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 20:00:11                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:47:09              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	534848	133875	76.747	1919	1.284	--
2	2.673	162053	38758	23.253	9834	1.251	14.504
总计		696901	172633	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-64-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-JX.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-17  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 20:05:35                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:47:13              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.138	524295	130830	76.788	1905	1.286	--
2	2.676	158490	37495	23.212	9835	1.252	14.504
总计		682784	168326	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-65-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-JX.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-26  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 20:10:57                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:47:16              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	531448	133239	76.790	1928	1.285	--
2	2.673	160628	38294	23.210	9786	1.250	14.484
总计		692076	171533	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-66-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-JX.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-35  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 20:16:21                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:47:19              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.139	539307	134409	76.838	1906	1.286	--
2	2.680	162571	38773	23.162	9831	1.248	14.504
总计		701878	173182	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-67-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-JX.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-44  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 20:21:44                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:47:23              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.140	533309	132816	76.703	1916	1.287	--
2	2.682	161979	38567	23.297	9851	1.250	14.525
总计		695288	171382	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-68-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-JX.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-53  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 20:27:08                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:47:26              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.141	525903	130595	76.753	1917	1.289	--
2	2.683	159282	37785	23.247	9886	1.252	14.536
总计		685184	168380	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-69-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-27  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 20:32:30                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:47:29              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	468842	112251	75.565	1753	1.273	--
2	2.676	151606	35543	24.435	9696	1.256	14.176
总计		620448	147794	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-70-2 - zzp-24042901p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 1-27  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/04 20:37:54                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:47:32              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.136	468703	112119	75.575	1756	1.274	--
2	2.680	151476	35888	24.425	9698	1.251	14.216
总计		620179	148007	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-82-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-rj.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-9  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 09:40:46                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:47:35              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-83-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 09:46:10                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:47:38                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	466106	106807	75.565	1500	1.282	--
2	2.630	150718	34983	24.435	8857	1.264	13.492
总计		616823	141790	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-84-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 09:51:36                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:47:41              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	466032	105766	75.549	1465	1.285	--
2	2.620	150826	34756	24.451	8690	1.275	13.289
总计		616858	140522	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-85-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 09:57:01                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:47:44              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.109	466176	104913	75.427	1466	1.296	--
2	2.625	151870	34248	24.573	8518	1.295	13.213
总计		618047	139161	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-86-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 10:02:26                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:47:47              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.104	466374	104099	75.520	1409	1.301	--
2	2.620	151175	34488	24.480	8494	1.290	13.113
总计		617549	138587	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-87-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 10:07:50                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:47:50              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.104	466153	103289	75.523	1386	1.302	--
2	2.624	151084	34311	24.477	8468	1.295	13.064
总计		617237	137600	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-88-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-5min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-1  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 10:13:13                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:47:53              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.110	269192	61600	81.262	1520	1.323	--
2	2.625	62070	14067	18.738	8576	1.301	13.339
总计		331263	75667	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-89-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-5min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-10  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 10:19:07                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:47:55              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	304634	69728	81.786	1514	1.331	--
2	2.624	67842	15448	18.214	8550	1.300	13.327
总计		372475	85176	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-90-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-5min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-19  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 10:24:31                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:47:58              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.109	314710	71566	82.178	1507	1.337	--
2	2.625	68252	15484	17.822	8553	1.302	13.312
总计		382963	87051	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-91-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-5min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-28  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 10:29:55                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:48:01              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.109	386420	87761	81.496	1504	1.339	--
2	2.627	87739	19979	18.504	8577	1.299	13.320
总计		474160	107740	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-92-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-5min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-37  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 10:35:18                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:48:04              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.110	327931	74526	82.604	1505	1.342	--
2	2.630	69062	15782	17.396	8601	1.302	13.343
总计		396993	90308	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-93-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-5min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-46  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 10:40:43                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:48:06              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	325353	74066	82.634	1493	1.342	--
2	2.624	68376	15543	17.366	8518	1.304	13.275
总计		393728	89609	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-94-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-10min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-2  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 10:46:07                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:48:09              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.109	411584	93454	78.673	1505	1.346	--
2	2.617	111571	25368	21.327	8549	1.302	13.257
总计		523155	118822	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-95-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-10min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-11  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 10:51:31                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:48:11              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.109	435489	98400	78.986	1496	1.350	--
2	2.627	115864	26312	21.014	8552	1.300	13.299
总计		551353	124712	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-96-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-10min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-20  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 10:56:54                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:48:14              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.109	429764	97415	78.642	1502	1.352	--
2	2.629	116719	26652	21.358	8581	1.300	13.336
总计		546483	124068	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-97-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-10min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-29  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 11:02:19                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:48:17              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.110	445373	100759	78.285	1499	1.351	--
2	2.629	123536	28264	21.715	8601	1.300	13.322
总计		568909	129023	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-98-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-10min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-38  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 11:07:42                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:48:20              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.107	426116	96702	78.866	1484	1.349	--
2	2.626	114190	25833	21.134	8545	1.305	13.288
总计		540306	122535	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-99-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-10min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-47  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 11:13:05                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:48:23              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.110	414207	93996	78.831	1505	1.349	--
2	2.625	111228	25325	21.169	8553	1.303	13.288
总计		525435	119321	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-100-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-15min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-3  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 11:18:29                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:48:26              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.109	437090	99033	76.581	1505	1.351	--
2	2.623	133668	30565	23.419	8526	1.302	13.281
总计		570758	129598	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-101-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-15min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-12  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 11:23:53                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:48:29              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	452057	102418	76.906	1488	1.352	--
2	2.626	135744	30794	23.094	8555	1.303	13.294
总计		587801	133212	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-102-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-15min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-21  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 11:29:18                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:48:32              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	448961	102071	76.604	1495	1.355	--
2	2.620	137117	31300	23.396	8519	1.302	13.258
总计		586078	133371	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-103-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-15min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-30  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 11:34:42                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:48:35              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	456362	102742	76.681	1476	1.352	--
2	2.618	138782	31469	23.319	8497	1.303	13.187
总计		595144	134211	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-104-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-15min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-39  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 11:40:06                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:48:37              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	441972	100291	76.683	1491	1.353	--
2	2.619	134393	30490	23.317	8482	1.305	13.228
总计		576366	130781	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-105-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-15min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-48  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 11:45:30                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:48:40              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.109	435513	98175	76.843	1488	1.355	--
2	2.620	131246	29886	23.157	8461	1.299	13.209
总计		566759	128061	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-106-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-20min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-4  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 11:50:54                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:48:43              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.109	449736	100978	75.703	1487	1.357	--
2	2.624	144344	32836	24.297	8475	1.302	13.222
总计		594079	133814	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-107-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-20min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-13  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 11:56:18                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:48:45              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	456558	103170	75.859	1484	1.349	--
2	2.616	145292	32980	24.141	8429	1.304	13.116
总计		601850	136150	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-108-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-20min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-22  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 12:01:43                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:48:48              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.113	458197	103546	75.692	1484	1.350	--
2	2.622	147149	33618	24.308	8494	1.302	13.159
总计		605346	137163	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-109-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-20min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-31  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 12:07:07                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:48:50              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.109	459583	103330	75.882	1491	1.356	--
2	2.624	146075	33187	24.118	8452	1.303	13.224
总计		605657	136517	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-110-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-20min.lcb  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-40  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 12:12:31                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:48:53              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.111	445159	100931	75.685	1503	1.351	--
2	2.622	143011	32565	24.315	8447	1.300	13.218
总计		588170	133496	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-111-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-20min.lcb  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-49  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 12:17:54                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:48:55              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.110	445998	100830	75.829	1501	1.354	--
2	2.624	142165	32360	24.171	8496	1.300	13.251
总计		588163	133190	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-112-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-30min.lcb  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-5  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 12:23:19                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:48:58              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.111	456815	103638	75.069	1503	1.351	--
2	2.622	151708	34511	24.931	8422	1.298	13.208
总计		608523	138149	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-113-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-30min.lcb  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-14  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 12:28:43                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:49:01              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.111	463285	104674	75.136	1488	1.351	--
2	2.625	153314	34656	24.864	8459	1.301	13.196
总计		616598	139330	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-114-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-30min.lcb  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-23  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 12:34:08                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:49:03              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.110	469101	105694	75.168	1489	1.353	--
2	2.614	154967	35391	24.832	8442	1.300	13.142
总计		624068	141084	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
柱温 :35°C    波长: 264nm  
数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-115-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-30min.lcb  
方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
样品瓶号 : 2-32  
进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/05/05 12:39:32                      实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:49:06              处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.105	468878	106190	75.477	1471	1.354	--
2	2.620	152338	34552	24.523	8398	1.299	13.193
总计		621217	140742	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-116-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-30min.lcb  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-41  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 12:44:57                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:49:09              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.107	453505	102652	75.118	1480	1.351	--
2	2.621	150216	34074	24.882	8373	1.299	13.182
总计		603721	136727	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-117-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-30min.lcb  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-50  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 12:50:21                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:49:11              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	460774	104308	75.350	1485	1.353	--
2	2.622	150735	34258	24.650	8393	1.297	13.200
总计		611508	138566	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-118-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-45min.lcb  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-6  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 12:55:45                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:49:14              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.107	472061	106879	75.126	1478	1.353	--
2	2.622	156296	35491	24.874	8389	1.298	13.194
总计		628358	142370	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-119-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-45min.lcb  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-15  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 13:01:10                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:49:17              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.109	472953	105784	75.084	1478	1.358	--
2	2.624	156947	35426	24.916	8363	1.301	13.166
总计		629900	141209	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-120-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-45min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-24  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 13:06:34                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:49:19              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	482729	108649	75.258	1483	1.356	--
2	2.628	158701	35877	24.742	8388	1.298	13.222
总计		641431	144527	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-121-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-45min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-33  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 13:11:59                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:49:22              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	478628	107993	75.591	1482	1.356	--
2	2.633	154556	34810	24.409	8421	1.301	13.270
总计		633185	142803	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-122-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-45min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-42  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 13:17:23                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:49:25              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.107	462082	104910	75.225	1487	1.353	--
2	2.626	152187	34256	24.775	8426	1.302	13.256
总计		614269	139166	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-123-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-45min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-51  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 13:22:47                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:49:27              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.111	477192	107792	75.527	1492	1.352	--
2	2.637	154623	34805	24.473	8366	1.295	13.247
总计		631815	142597	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-124-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-60min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-7  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 13:28:12                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:49:30              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.110	477096	106905	75.292	1476	1.353	--
2	2.636	156567	35244	24.708	8411	1.296	13.242
总计		633663	142149	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-125-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-60min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-16  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 13:33:37                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:49:33              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.109	476334	107109	75.240	1486	1.355	--
2	2.627	156748	35403	24.760	8436	1.300	13.235
总计		633082	142513	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-126-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-60min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-25  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 13:39:01                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:49:36              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.110	494798	111106	75.467	1488	1.354	--
2	2.626	160851	36066	24.533	8396	1.302	13.204
总计		655649	147172	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-127-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-60min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-34  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 13:44:26                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:49:38              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	483208	109554	75.673	1483	1.355	--
2	2.627	155336	34984	24.327	8414	1.303	13.251
总计		638544	144538	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-128-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-60min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-43  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 13:49:50                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:49:41              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.109	467800	104883	75.333	1486	1.353	--
2	2.618	153179	34561	24.667	8410	1.304	13.163
总计		620980	139444	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-129-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-60min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-52  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 13:55:14                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:49:43              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	487903	110612	75.817	1480	1.352	--
2	2.622	155623	35300	24.183	8384	1.299	13.204
总计		643526	145912	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-130-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-JX.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-8  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 14:00:39                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:49:46              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.107	520694	118148	76.463	1480	1.350	--
2	2.620	160279	36325	23.537	8379	1.297	13.190
总计		680974	154472	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-131-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-JX.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-17  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 14:06:04                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:49:49              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.109	525936	118286	76.580	1485	1.354	--
2	2.633	160843	36264	23.420	8422	1.299	13.265
总计		686779	154550	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-132-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-JX.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-26  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 14:11:29                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:49:51              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.107	527548	119165	76.463	1475	1.351	--
2	2.632	162393	36587	23.537	8345	1.298	13.229
总计		689941	155752	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-133-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-JX.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-35  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 14:16:53                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:49:54              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.109	528633	118471	76.516	1484	1.355	--
2	2.634	162242	36331	23.484	8392	1.301	13.249
总计		690875	154802	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-134-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-JX.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-44  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 14:22:17                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:49:57              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	520343	117336	76.681	1484	1.350	--
2	2.630	158235	35711	23.319	8344	1.299	13.219
总计		678578	153047	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-135-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-JX.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-53  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 14:27:41                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:49:59              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.110	510002	114254	76.459	1476	1.351	--
2	2.636	157023	35281	23.541	8374	1.293	13.228
总计		667026	149535	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
柱温 :35°C    波长: 264nm  
数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-136-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-dz2-1.lcd  
方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
样品瓶号 : 2-27  
进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
进样时间 : 2024/05/05 14:33:05                      实验者: xiechaojun  
处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:50:02              处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	468623	102098	75.556	1350	1.327	--
2	2.633	151614	33790	24.444	8224	1.303	12.908
总计		620237	135887	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-137-2 - zzp-24043001p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 2-27  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 14:38:30                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:50:05              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.105	468145	102003	75.519	1343	1.321	--
2	2.630	151759	33911	24.481	8164	1.298	12.869
总计		619904	135914	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-138-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-rj.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-9  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 14:43:52                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:50:08              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-139-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-18  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 14:49:15                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:50:10              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	464923	101178	75.451	1344	1.321	--
2	2.631	151265	33764	24.549	8151	1.297	12.851
总计		616188	134943	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-140-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-18  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 14:54:37                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:50:13              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.105	466573	101465	75.497	1339	1.319	--
2	2.634	151431	33411	24.503	8106	1.300	12.856
总计		618004	134876	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-141-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-18  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 15:00:00                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:50:15              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.106	468471	101732	75.468	1339	1.320	--
2	2.637	152282	33700	24.532	8082	1.292	12.852
总计		620753	135432	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-142-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-18  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 15:05:23                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:50:18              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.107	470430	101642	75.479	1332	1.318	--
2	2.642	152833	33530	24.521	8098	1.297	12.859
总计		623263	135173	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-143-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-18  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 15:10:46                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:50:21              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.107	471120	101647	75.485	1331	1.317	--
2	2.640	153004	33845	24.515	8065	1.291	12.823
总计		624124	135492	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-144-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-5min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-1  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 15:16:08                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:50:24              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	219477	49399	81.084	1469	1.330	--
2	2.642	51202	11307	18.916	8222	1.289	13.148
总计		270679	60706	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-145-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-5min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-10  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 15:21:30                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:50:27              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	220060	49391	81.866	1460	1.328	--
2	2.641	48745	10760	18.134	8171	1.287	13.111
总计		268805	60151	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-146-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-5min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-19  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 15:26:53                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:50:30              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.114	195837	44088	81.134	1466	1.324	--
2	2.638	45538	10107	18.866	8175	1.285	13.078
总计		241375	54194	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-147-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-5min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-28  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 15:32:15                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:50:32              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.113	208333	47038	81.532	1471	1.324	--
2	2.642	47189	10298	18.468	8075	1.286	13.086
总计		255521	57336	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-148-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-5min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-37  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 15:37:37                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:50:35              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	227718	51519	81.559	1481	1.326	--
2	2.639	51488	11497	18.441	8247	1.287	13.168
总计		279206	63016	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-149-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-5min.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-46  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 15:42:58                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:50:37              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.114	249119	56274	82.237	1476	1.322	--
2	2.641	53809	11870	17.763	8144	1.282	13.106
总计		302927	68144	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-150-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-10min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-2  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 15:48:20                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:50:40              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	340547	76679	78.303	1470	1.326	--
2	2.642	94360	20967	21.697	8287	1.283	13.183
总计		434907	97647	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-151-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-10min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-11  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 15:53:42                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:50:43              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.111	366494	82334	79.217	1469	1.327	--
2	2.640	96152	21470	20.783	8237	1.281	13.160
总计		462646	103804	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-152-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-10min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-20  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 15:59:05                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:50:46              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.113	325754	73170	78.792	1459	1.323	--
2	2.637	87682	19419	21.208	8107	1.274	13.041
总计		413436	92589	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-153-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-10min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-29  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 16:04:27                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:50:48              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	373973	83653	79.709	1450	1.323	--
2	2.643	95198	21036	20.291	8201	1.284	13.110
总计		469171	104688	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-154-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-10min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-38  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 16:09:48                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:50:51              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.113	351495	79313	78.378	1472	1.324	--
2	2.639	96964	21604	21.622	8176	1.280	13.102
总计		448459	100917	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-155-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-10min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-47  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 16:15:11                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:50:53              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.112	389270	87671	79.068	1468	1.323	--
2	2.646	103053	23015	20.932	8267	1.276	13.194
总计		492323	110686	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-156-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-15min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-3  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 16:20:33                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:50:56              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.114	398755	90048	76.753	1480	1.325	--
2	2.640	120776	26924	23.247	8214	1.279	13.132
总计		519531	116972	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-157-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-15min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-12  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 16:25:56                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:50:59              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.113	425113	95845	77.323	1470	1.322	--
2	2.639	124675	27831	22.677	8215	1.277	13.120
总计		549788	123676	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-158-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-15min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-21  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 16:31:18                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:51:01              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	390874	87967	77.007	1471	1.326	--
2	2.649	116707	25997	22.993	8258	1.280	13.177
总计		507580	113964	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-159-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-15min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-30  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 16:36:40                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:51:04              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.113	434795	97997	77.719	1469	1.322	--
2	2.643	124650	27550	22.281	8246	1.282	13.155
总计		559444	125548	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-160-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-15min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-39  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 16:42:02                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:51:07              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.113	408831	92074	76.669	1468	1.322	--
2	2.649	124412	27726	23.331	8315	1.282	13.217
总计		533243	119800	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-161-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-15min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-48  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 16:47:24                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:51:09              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	446693	100455	77.067	1468	1.323	--
2	2.645	132922	29604	22.933	8245	1.280	13.143
总计		579615	130059	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-162-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-20min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-4  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 16:52:46                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:51:12              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	421860	94550	75.731	1472	1.324	--
2	2.647	135188	30092	24.269	8190	1.275	13.119
总计		557048	124642	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-163-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-20min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-13  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 16:58:08                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:51:14              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.115	449463	100847	76.288	1463	1.321	--
2	2.641	139706	31002	23.712	8198	1.279	13.087
总计		589169	131848	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-164-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-20min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-22  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 17:03:30                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:51:17              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.116	424785	94777	76.160	1458	1.321	--
2	2.645	132966	29454	23.840	8132	1.274	13.056
总计		557751	124231	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-165-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-20min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-31  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 17:08:52                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:51:20              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.114	455777	102197	76.343	1454	1.320	--
2	2.642	141233	31205	23.657	8195	1.286	13.087
总计		597010	133401	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-166-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-20min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-40  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 17:14:14                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:51:22              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	437837	97144	75.959	1460	1.325	--
2	2.643	138574	30471	24.041	8147	1.284	13.035
总计		576412	127615	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-167-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-20min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-49  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 17:19:36                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:51:25              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.117	463230	102822	75.975	1465	1.324	--
2	2.645	146485	32396	24.025	8133	1.283	13.050
总计		609715	135218	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-168-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-30min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-5  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 17:24:59                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:51:28              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.114	449988	100730	75.140	1451	1.316	--
2	2.645	148874	32849	24.860	8095	1.278	13.046
总计		598862	133579	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-169-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-30min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-14  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 17:30:21                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:51:30              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	474724	105283	75.442	1446	1.312	--
2	2.646	154534	34248	24.558	8129	1.275	12.987
总计		629258	139531	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-170-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-30min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-23  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 17:36:11                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:51:33              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.119	460208	102363	75.414	1459	1.319	--
2	2.648	150037	33079	24.586	8069	1.283	13.008
总计		610245	135441	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-171-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-30min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-32  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 17:41:31                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:51:36              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	479470	106272	75.468	1453	1.318	--
2	2.646	155862	34466	24.532	8086	1.280	13.001
总计		635332	140738	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-172-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-30min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-41  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 17:46:53                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:51:38              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	469760	104447	75.351	1450	1.317	--
2	2.651	153673	33666	24.649	8114	1.286	12.997
总计		623432	138113	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-173-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-30min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-50  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 17:52:15                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:51:41              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.118	481801	106302	75.346	1440	1.314	--
2	2.647	157649	34909	24.654	8116	1.279	12.990
总计		639450	141211	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-174-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-45min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-6  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 17:57:37                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:51:44              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	480600	106802	75.185	1446	1.310	--
2	2.648	158621	34991	24.815	8074	1.277	12.951
总计		639221	141793	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-175-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-45min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-15  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 18:02:59                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:51:46              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	501629	111011	75.455	1439	1.309	--
2	2.649	163175	35913	24.545	8059	1.273	12.958
总计		664804	146924	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-176-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-45min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-24  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 18:08:20                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:51:49              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	489354	108849	75.300	1446	1.306	--
2	2.649	160518	35181	24.700	7974	1.269	12.897
总计		649872	144030	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-177-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-45min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-33  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 18:13:41                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:51:52              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	500413	110610	75.406	1429	1.304	--
2	2.648	163209	35710	24.594	7929	1.269	12.849
总计		663622	146320	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-178-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-45min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-42  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 18:19:03                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:51:54              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	496789	109732	75.354	1427	1.309	--
2	2.657	162485	35660	24.646	8037	1.273	12.955
总计		659273	145392	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-179-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-45min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-51  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 18:24:25                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:51:57              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	499205	109901	75.512	1417	1.305	--
2	2.657	161888	35383	24.488	7989	1.269	12.916
总计		661093	145284	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-180-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-60min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-7  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 18:29:47                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:52:00              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	500016	110180	75.499	1432	1.307	--
2	2.658	162268	35491	24.501	8039	1.273	12.925
总计		662284	145671	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-181-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-60min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-16  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 18:35:09                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:52:02              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	518322	113905	75.771	1415	1.307	--
2	2.657	165744	36299	24.229	8008	1.274	12.924
总计		684066	150203	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-182-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-60min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-25  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 18:40:31                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:52:05              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	507618	112073	75.659	1430	1.304	--
2	2.651	163315	35344	24.341	7901	1.278	12.835
总计		670932	147417	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-183-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-60min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-34  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 18:45:53                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:52:08              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	513640	112994	75.674	1415	1.301	--
2	2.658	165115	35795	24.326	7905	1.272	12.867
总计		678756	148789	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-184-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-60min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-43  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 18:51:14                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:52:10              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	511864	112928	75.677	1420	1.301	--
2	2.656	164514	35941	24.323	7928	1.271	12.882
总计		676377	148868	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-185-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-60min.lc  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-52  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 18:56:36                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:52:13              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.122	511190	112394	75.936	1414	1.303	--
2	2.658	161997	35231	24.064	7978	1.273	12.895
总计		673187	147625	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-2/26-186-3 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p1-JX.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-8  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 19:01:59                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V3) : 2024/05/06 10:40:18              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	525653	116067	76.122	1430	1.304	--
2	2.658	164889	35883	23.878	7970	1.277	12.908
总计		690542	151951	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-2/26-187-3 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p2-JX.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-17  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 19:07:22                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V3) : 2024/05/06 10:40:21              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.123	539531	118854	76.336	1424	1.304	--
2	2.656	167256	36438	23.664	7902	1.274	12.855
总计		706787	155292	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-2/26-188-3 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p3-JX.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-26  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 19:12:44                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V3) : 2024/05/06 10:40:24              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	532383	117525	76.419	1434	1.299	--
2	2.648	164278	35847	23.581	7877	1.273	12.805
总计		696661	153372	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-2/26-189-3 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p4-JX.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-35  
 进样体积 : 20 µl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 19:18:06                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V3) : 2024/05/06 10:40:26              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.124	535254	117574	76.295	1421	1.300	--
2	2.650	166301	35869	23.705	7822	1.275	12.765
总计		701555	153443	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-2/26-190-3 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p5-JX.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-44  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 19:23:28                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V3) : 2024/05/06 10:40:29              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.125	534793	116465	76.472	1408	1.300	--
2	2.658	164537	35566	23.528	7850	1.273	12.782
总计		699330	152031	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-2/26-191-3 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-p6-JX.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-53  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 19:28:50                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V3) : 2024/05/06 10:40:31              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.126	525300	114232	76.332	1412	1.298	--
2	2.655	162878	35231	23.668	7757	1.269	12.713
总计		688178	149463	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-192-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-27  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 19:34:12                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:52:32              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.120	465197	97890	75.516	1277	1.269	--
2	2.651	150828	32126	24.484	7604	1.276	12.400
总计		616025	130016	100.000			




# CXM-3382

## <样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)                      流速: 1.5ml/min  
 柱温 :35°C    波长: 264nm  
 数据文件名: RC\CXM-3382 - 0-1/26-193-2 - zzp-24043002p-rcqx-jf50z-8mg12.5mg-pH6.8+0.35tw20jz-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-RCQX-FX275.lcm  
 批处理文件名: RC\CXM-3382 - 20240504-rcqx-fx275.lcb  
 样品瓶号 : 3-27  
 进样体积 : 20 μl    版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/05/05 19:39:35                      实验者: xiechaojun  
 处理时间 (V2) : 2024/05/06 08:52:35              处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 264nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.121	464596	98178	75.475	1286	1.266	--
2	2.654	150969	32379	24.525	7623	1.271	12.438
总计		615565	130557	100.000			