



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-731-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 11:27:07

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:09:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
溶剂




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-732-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 11:30:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:09:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	1234649	100.000	292186	5744	1.152	--
总计		1234649	100.000	292186			

图2 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-733-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 11:34:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:09:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	1235858	100.000	292061	5733	1.153	--
总计		1235858	100.000	292061			

图3 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-734-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 11:37:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:09:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	1233905	100.000	291013	5733	1.154	--
总计		1233905	100.000	291013			

图4 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-735-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 11:41:02

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:09:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.087	1235652	100.000	291393	5729	1.156	--
总计		1235652	100.000	291393			

图5 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-736-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 11:44:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:09:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	1234535	100.000	291493	5726	1.157	--
总计		1234535	100.000	291493			

图6 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-737-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 11:48:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:09:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	9581	100.000	2137	5331	--	--
总计		9581	100.000	2137			

图7 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-738-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 11:51:28

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:09:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	12376	100.000	2881	5679	1.171	--
总计		12376	100.000	2881			

图8 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-739-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 11:54:56

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:09:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	10484	100.000	2411	5598	1.171	--
总计		10484	100.000	2411			

图9 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-740-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 11:58:24

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:09:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	10026	100.000	2268	5503	1.220	--
总计		10026	100.000	2268			

图10 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-741-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 12:01:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:09:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	20747	100.000	4742	5601	1.136	--
总计		20747	100.000	4742			

图11 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-742-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 12:05:21

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:09:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	8072	100.000	1859	5602	1.168	--
总计		8072	100.000	1859			

图12 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-743-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 12:08:48

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:09:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	35872	100.000	8331	5677	1.165	--
总计		35872	100.000	8331			

图13 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-744-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 12:12:17

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:09:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	43155	100.000	10060	5687	1.166	--
总计		43155	100.000	10060			

图14 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-745-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 12:15:45

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:09:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	30748	100.000	7124	5638	1.167	--
总计		30748	100.000	7124			

图15 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-746-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 12:19:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:09:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	31635	100.000	7326	5664	1.169	--
总计		31635	100.000	7326			

图16 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-747-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 12:22:40

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:09:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	65575	100.000	15205	5686	1.165	--
总计		65575	100.000	15205			

图17 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-748-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 12:26:07

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:10:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	26101	100.000	6073	5658	1.167	--
总计		26101	100.000	6073			

图18 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-749-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 12:29:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:10:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	66027	100.000	15375	5685	1.166	--
总计		66027	100.000	15375			

图19 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-750-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 12:33:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:10:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	75742	100.000	17627	5694	1.164	--
总计		75742	100.000	17627			

图20 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)
柱温 :30℃
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-751-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 100 μl
进样时间 : 2024/05/27 12:36:31
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:10:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min
波长:283nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	75216	100.000	17478	5682	1.164	--
总计		75216	100.000	17478			

图21 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-752-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 12:40:00

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:10:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	62001	100.000	14651	5758	1.147	--
总计		62001	100.000	14651			

图22 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-753-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 12:43:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:10:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	105901	100.000	24760	5711	1.162	--
总计		105901	100.000	24760			

图23 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-754-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 12:46:54

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:10:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	49773	100.000	11557	5681	1.166	--
总计		49773	100.000	11557			

图24 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-755-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 12:50:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:10:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	95252	100.000	22190	5698	1.164	--
总计		95252	100.000	22190			

图25 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-756-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 12:53:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:10:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	105584	100.000	24598	5706	1.162	--
总计		105584	100.000	24598			

图26 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-757-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 12:57:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:10:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	112901	100.000	26258	5697	1.163	--
总计		112901	100.000	26258			

图27 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-758-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 1-31

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 13:00:45

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:10:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	89056	100.000	20730	5690	1.162	--
总计		89056	100.000	20730			

图28 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-759-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 1-40

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 13:04:13

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:10:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	138188	100.000	32195	5708	1.161	--
总计		138188	100.000	32195			

图29 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-760-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 13:07:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:10:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.107	76070	100.000	17821	5691	1.164	--
总计		76070	100.000	17821			

图30 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-761-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 13:11:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:10:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	142697	100.000	33222	5716	1.162	--
总计		142697	100.000	33222			

图31 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-762-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 13:14:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:10:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	157834	100.000	36741	5710	1.161	--
总计		157834	100.000	36741			

图32 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-763-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 13:18:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:10:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.107	162544	100.000	38092	5705	1.160	--
总计		162544	100.000	38092			

图33 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-764-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 13:21:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:10:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.107	135007	100.000	31664	5708	1.162	--
总计		135007	100.000	31664			

图34 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-765-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 13:25:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:10:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	193719	100.000	45154	5722	1.160	--
总计		193719	100.000	45154			

图35 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-766-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 13:28:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:10:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	128764	100.000	30062	5698	1.163	--
总计		128764	100.000	30062			

图36 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-767-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 13:31:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:10:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	196756	100.000	45906	5721	1.160	--
总计		196756	100.000	45906			

图37 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-768-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 13:35:24

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:10:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	215588	100.000	50378	5723	1.159	--
总计		215588	100.000	50378			

图38 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-769-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 1-24

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 13:38:51

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:10:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	248536	100.000	58240	5720	1.159	--
总计		248536	100.000	58240			

图39 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-770-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 13:42:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:11:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.107	194374	100.000	45621	5707	1.159	--
总计		194374	100.000	45621			

图40 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-771-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 13:45:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:11:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	266524	100.000	62042	5711	1.162	--
总计		266524	100.000	62042			

图41 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-772-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 13:49:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:11:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	194333	100.000	45414	5704	1.159	--
总计		194333	100.000	45414			

图42 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-773-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 13:52:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:11:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	233372	100.000	54766	5731	1.159	--
总计		233372	100.000	54766			

图43 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-774-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 13:56:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:11:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	256235	100.000	59846	5727	1.158	--
总计		256235	100.000	59846			

图44 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-775-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 13:59:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:11:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	304056	100.000	71220	5728	1.158	--
总计		304056	100.000	71220			

图45 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-776-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 1-34

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 14:03:06

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:11:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.107	240066	100.000	56385	5721	1.157	--
总计		240066	100.000	56385			

图46 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-777-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 14:06:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:11:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	313687	100.000	72933	5717	1.160	--
总计		313687	100.000	72933			

图47 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-778-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 14:10:03

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:11:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	247305	100.000	57876	5719	1.158	--
总计		247305	100.000	57876			

图48 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-779-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 14:13:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:11:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	288838	100.000	67837	5739	1.157	--
总计		288838	100.000	67837			

图49 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片1
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-780-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-90min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 1-17

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 14:16:58

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:11:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.107	309640	100.000	72752	5732	1.156	--
总计		309640	100.000	72752			

图50 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片2
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-781-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-90min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 1-26

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 14:20:28

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:11:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	379825	100.000	88189	5738	1.157	--
总计		379825	100.000	88189			

图51 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-782-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 14:23:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:11:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	304827	100.000	71368	5745	1.154	--
总计		304827	100.000	71368			

图52 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片4
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-783-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-90min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 1-44

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 14:27:24

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:11:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	374103	100.000	87067	5737	1.156	--
总计		374103	100.000	87067			

图53 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-784-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 14:30:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:11:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	323773	100.000	75419	5737	1.156	--
总计		323773	100.000	75419			

图54 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片6
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-785-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-Jx-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 4-1

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 14:34:22

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:11:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	334210	100.000	77943	5741	1.155	--
总计		334210	100.000	77943			

图55 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-786-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-Jx-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 4-10

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 14:37:50

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:11:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.109	351976	100.000	82155	5738	1.156	--
总计		351976	100.000	82155			

图56 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-787-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-Jx-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 4-19

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 14:41:18

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:11:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	408610	100.000	95539	5752	1.153	--
总计		408610	100.000	95539			

图57 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-788-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 4-28
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 14:44:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:11:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	348352	100.000	81209	5734	1.156	--
总计		348352	100.000	81209			

图58 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-789-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-Jx-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 4-37

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 14:48:15

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:11:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	416546	100.000	97288	5751	1.155	--
总计		416546	100.000	97288			

图59 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-790-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 4-46
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 14:51:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:11:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	357388	100.000	83164	5739	1.157	--
总计		357388	100.000	83164			

图60 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-791-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 14:55:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:11:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.087	1223633	100.000	288298	5715	1.159	--
总计		1223633	100.000	288298			

图61 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-792-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH1.2jz-5mg-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 14:58:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:12:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.087	1222319	100.000	288462	5718	1.159	--
总计		1222319	100.000	288462			

图62 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-793-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 15:02:10

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:12:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图63 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
溶剂




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-794-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 15:05:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:12:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	1222873	100.000	288350	5712	1.158	--
总计		1222873	100.000	288350			

图64 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-795-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 15:09:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:12:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	1222267	100.000	287936	5711	1.158	--
总计		1222267	100.000	287936			

图65 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-796-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 15:12:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:12:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	1222440	100.000	288158	5711	1.158	--
总计		1222440	100.000	288158			

图66 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-797-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 15:16:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:12:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.087	1222159	100.000	288598	5730	1.158	--
总计		1222159	100.000	288598			

图67 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-798-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 15:19:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:12:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	1221930	100.000	288291	5721	1.157	--
总计		1221930	100.000	288291			

图68 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-799-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 15:23:08

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:12:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	3161	100.000	765	5777	1.155	--
总计		3161	100.000	765			

图69 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-800-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 15:26:37 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:12:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	4481	100.000	1072	5730	1.163	--
总计		4481	100.000	1072			

图70 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-801-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 15:30:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:12:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	3115	100.000	750	5757	1.121	--
总计		3115	100.000	750			

图71 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-802-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 15:33:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:12:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	3217	100.000	775	5734	1.139	--
总计		3217	100.000	775			

图72 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-803-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 15:37:05

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:12:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	3772	100.000	908	5798	1.138	--
总计		3772	100.000	908			

图73 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-804-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 15:40:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:12:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	5091	100.000	1210	5721	1.172	--
总计		5091	100.000	1210			

图74 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-805-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 15:44:03

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:12:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图75 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-806-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 15:47:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:12:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	7845	100.000	1878	5754	1.155	--
总计		7845	100.000	1878			

图76 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-807-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 15:51:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:12:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	6093	100.000	1461	5763	1.144	--
总计		6093	100.000	1461			

图77 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-808-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 15:54:31

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:12:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	5543	100.000	1330	5762	1.150	--
总计		5543	100.000	1330			

图78 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-809-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 15:58:00

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:12:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	6795	100.000	1629	5782	1.157	--
总计		6795	100.000	1629			

图79 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-810-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 16:01:29

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:12:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	6441	100.000	1541	5744	1.151	--
总计		6441	100.000	1541			

图80 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-811-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 16:04:58

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:12:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	4051	100.000	982	5800	1.139	--
总计		4051	100.000	982			

图81 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-812-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 16:08:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:12:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	12992	100.000	3111	5769	1.161	--
总计		12992	100.000	3111			

图82 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-813-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 16:11:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:12:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	10534	100.000	2534	5791	1.156	--
总计		10534	100.000	2534			

图83 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-814-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 16:15:26

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:13:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	8221	100.000	1980	5773	1.148	--
总计		8221	100.000	1980			

图84 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-815-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 16:18:55

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:13:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	10185	100.000	2446	5783	1.156	--
总计		10185	100.000	2446			

图85 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-816-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 16:22:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:13:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	9285	100.000	2239	5767	1.151	--
总计		9285	100.000	2239			

图86 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-817-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 16:25:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:13:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	5767	100.000	1399	5830	1.143	--
总计		5767	100.000	1399			

图87 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-818-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 2-13

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 16:29:22

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:13:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	20607	100.000	4900	5739	1.172	--
总计		20607	100.000	4900			

图88 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-819-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 16:32:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:13:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	16377	100.000	3923	5770	1.161	--
总计		16377	100.000	3923			

图89 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-820-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 16:36:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:13:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	12733	100.000	3054	5770	1.154	--
总计		12733	100.000	3054			

图90 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-821-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 16:39:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:13:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	13930	100.000	3336	5771	1.161	--
总计		13930	100.000	3336			

图91 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-822-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 16:43:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:13:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	13223	100.000	3178	5797	1.156	--
总计		13223	100.000	3178			

图92 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-823-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 16:46:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:13:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	9379	100.000	2257	5789	1.152	--
总计		9379	100.000	2257			

图93 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-824-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 16:50:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:13:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	35598	100.000	8468	5743	1.174	--
总计		35598	100.000	8468			

图94 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-825-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 16:53:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:13:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	27132	100.000	6455	5736	1.173	--
总计		27132	100.000	6455			

图95 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-826-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 16:57:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:13:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	22882	100.000	5419	5734	1.171	--
总计		22882	100.000	5419			

图96 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-827-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 17:00:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:13:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	22429	100.000	5325	5747	1.170	--
总计		22429	100.000	5325			

图97 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-828-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 2-50

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 17:04:16

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:13:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	23504	100.000	5615	5747	1.167	--
总计		23504	100.000	5615			

图98 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-829-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 17:07:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:13:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	18054	100.000	4336	5776	1.158	--
总计		18054	100.000	4336			

图99 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-830-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 17:11:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:13:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	57804	100.000	13756	5746	1.176	--
总计		57804	100.000	13756			

图100 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-831-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 2-24

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 17:14:46

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:13:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	46373	100.000	11022	5760	1.175	--
总计		46373	100.000	11022			

图101 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-832-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 17:18:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:13:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	38768	100.000	9241	5760	1.173	--
总计		38768	100.000	9241			

图102 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-833-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 2-42

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 17:21:46

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:13:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	39840	100.000	9496	5750	1.173	--
总计		39840	100.000	9496			

图103 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-834-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 17:25:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:13:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	39733	100.000	9474	5757	1.173	--
总计		39733	100.000	9474			

图104 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-835-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 17:28:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:13:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	28379	100.000	6780	5765	1.171	--
总计		28379	100.000	6780			

图105 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-836-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 2-16

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 17:32:16

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:14:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	76490	100.000	18238	5764	1.175	--
总计		76490	100.000	18238			

图106 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-837-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 2-25

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 17:35:46

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:14:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	64876	100.000	15500	5772	1.176	--
总计		64876	100.000	15500			

图107 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-838-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 17:39:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:14:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	53778	100.000	12803	5767	1.176	--
总计		53778	100.000	12803			

图108 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-839-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 2-43

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 17:42:45

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:14:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	57507	100.000	13684	5769	1.176	--
总计		57507	100.000	13684			

图109 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-840-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 17:46:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:14:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	58182	100.000	13824	5771	1.176	--
总计		58182	100.000	13824			

图110 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-841-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-90min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 2-8

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 17:49:44

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:14:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	48249	100.000	11491	5782	1.174	--
总计		48249	100.000	11491			

图111 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-842-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 17:53:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:14:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	103710	100.000	24617	5776	1.176	--
总计		103710	100.000	24617			

图112 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-843-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 17:56:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:14:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	93000	100.000	22072	5774	1.177	--
总计		93000	100.000	22072			

图113 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-90min-片3
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-844-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-90min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 2-35

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 18:00:14

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:14:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	81433	100.000	19300	5773	1.177	--
总计		81433	100.000	19300			

图114 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-845-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 18:03:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:14:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	81271	100.000	19255	5771	1.178	--
总计		81271	100.000	19255			

图115 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-846-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 18:07:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:14:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	96414	100.000	22867	5785	1.178	--
总计		96414	100.000	22867			

图116 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-90min-片6
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-847-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-Jx-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 4-2

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 18:10:42

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:14:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	65752	100.000	15589	5771	1.177	--
总计		65752	100.000	15589			

图117 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱

参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片1

供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-848-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 4-11
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 18:14:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:14:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	118503	100.000	27927	5744	1.176	--
总计		118503	100.000	27927			

图118 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-849-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-Jx-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 4-20

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 18:17:39

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:14:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	111834	100.000	26368	5756	1.175	--
总计		111834	100.000	26368			

图119 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-850-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-Jx-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 4-29

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 18:21:07

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:14:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	99732	100.000	23549	5756	1.176	--
总计		99732	100.000	23549			

图120 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-851-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 4-38
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 18:24:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:14:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	108258	100.000	25520	5760	1.176	--
总计		108258	100.000	25520			

图121 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-852-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-Jx-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 4-47

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 18:28:02

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:14:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	103188	100.000	24350	5758	1.174	--
总计		103188	100.000	24350			

图122 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-853-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 18:31:32

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:14:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	1207946	100.000	287183	5821	1.150	--
总计		1207946	100.000	287183			

图123 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-854-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH2.0jz-5mg-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 18:35:02

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:14:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.086	1205268	100.000	286703	5826	1.150	--
总计		1205268	100.000	286703			

图124 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-855-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 3-9

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 18:38:30

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:14:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图125 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
溶剂




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-856-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 18:41:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:14:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.087	1209850	100.000	287996	5822	1.153	--
总计		1209850	100.000	287996			

图126 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-857-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 18:45:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:14:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.087	1207997	100.000	287690	5825	1.153	--
总计		1207997	100.000	287690			

图127 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-858-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 18:48:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:15:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.087	1209419	100.000	287748	5823	1.153	--
总计		1209419	100.000	287748			

图128 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-859-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 18:52:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:15:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.087	1207614	100.000	287674	5825	1.152	--
总计		1207614	100.000	287674			

图129 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-860-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 18:55:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:15:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.087	1206895	100.000	287583	5827	1.152	--
总计		1206895	100.000	287583			

图130 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-861-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-1
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 18:59:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:15:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	7314	100.000	1711	5831	1.214	--
总计		7314	100.000	1711			

图131 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-862-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-10
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 19:02:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:15:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	7453	100.000	1779	5969	1.183	--
总计		7453	100.000	1779			

图132 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-863-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 19:06:13

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:15:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	7332	100.000	1748	5969	1.190	--
总计		7332	100.000	1748			

图133 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-864-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 19:09:41

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:15:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	5405	100.000	1271	5861	1.226	--
总计		5405	100.000	1271			

图134 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-865-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-37
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 19:13:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:15:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	7799	100.000	1851	5926	1.209	--
总计		7799	100.000	1851			

图135 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-866-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 19:16:37 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:15:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.120	8832	100.000	2098	5922	1.189	--
总计		8832	100.000	2098			

图136 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-867-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-2
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 19:20:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:15:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	9678	100.000	2328	5997	1.151	--
总计		9678	100.000	2328			

图137 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-868-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-11
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 19:23:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:15:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	13182	100.000	3176	6003	1.152	--
总计		13182	100.000	3176			

图138 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-869-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-20
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 19:27:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:15:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.122	9341	100.000	2255	6058	1.148	--
总计		9341	100.000	2255			

图139 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-870-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-29
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 19:30:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:15:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.122	7379	100.000	1776	6025	1.149	--
总计		7379	100.000	1776			

图140 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-871-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 19:33:56

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:15:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	10649	100.000	2563	5994	1.149	--
总计		10649	100.000	2563			

图141 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-872-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 19:37:23

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:15:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.122	17501	100.000	4214	6022	1.150	--
总计		17501	100.000	4214			

图142 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-873-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-3
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 19:40:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:15:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.120	14805	100.000	3554	5993	1.152	--
总计		14805	100.000	3554			

图143 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-874-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-12
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 19:44:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:15:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	23706	100.000	5705	6005	1.148	--
总计		23706	100.000	5705			

图144 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-875-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 3-21

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 19:47:44

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:15:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	13925	100.000	3356	6006	1.148	--
总计		13925	100.000	3356			

图145 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-876-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-30
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 19:51:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:15:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.122	10400	100.000	2507	6012	1.143	--
总计		10400	100.000	2507			

图146 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-877-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 19:54:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:15:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.120	16170	100.000	3891	5996	1.149	--
总计		16170	100.000	3891			

图147 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-878-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 3-48

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 19:58:06

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:15:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	29603	100.000	7114	6001	1.147	--
总计		29603	100.000	7114			

图148 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-879-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-4
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 20:01:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:15:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	21033	100.000	5050	5980	1.147	--
总计		21033	100.000	5050			

图149 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-880-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-13
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 20:04:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:16:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.120	30266	100.000	7272	6005	1.145	--
总计		30266	100.000	7272			

图150 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-881-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-22
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 20:08:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:16:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.122	22259	100.000	5357	6015	1.148	--
总计		22259	100.000	5357			

图151 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-882-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 3-31

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 20:11:54

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:16:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.120	13744	100.000	3308	6003	1.146	--
总计		13744	100.000	3308			

图152 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-883-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-40
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 20:15:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:16:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	21771	100.000	5247	6012	1.146	--
总计		21771	100.000	5247			

图153 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-884-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 20:18:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:16:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	46417	100.000	11163	6011	1.145	--
总计		46417	100.000	11163			

图154 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-885-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 20:22:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:16:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.120	41476	100.000	9944	5990	1.147	--
总计		41476	100.000	9944			

图155 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-886-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-14
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 20:25:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:16:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	57609	100.000	13855	6002	1.145	--
总计		57609	100.000	13855			

图156 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30°C

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-887-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 3-23

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 20:29:08

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:16:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.120	40521	100.000	9720	6002	1.145	--
总计		40521	100.000	9720			

图157 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-888-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-32
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 20:32:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:16:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	22058	100.000	5310	6001	1.147	--
总计		22058	100.000	5310			

图158 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-889-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 3-41

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 20:36:02

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:16:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.122	39179	100.000	9428	6016	1.145	--
总计		39179	100.000	9428			

图159 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-890-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-50
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 20:39:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:16:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.122	102682	100.000	24727	6031	1.143	--
总计		102682	100.000	24727			

图160 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-891-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-6
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 20:42:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:16:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	84333	100.000	20284	6005	1.145	--
总计		84333	100.000	20284			

图161 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-892-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-15
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 20:46:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:16:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	98874	100.000	23766	6013	1.143	--
总计		98874	100.000	23766			

图162 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-893-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-24
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 20:49:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:16:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	81131	100.000	19515	6005	1.143	--
总计		81131	100.000	19515			

图163 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-894-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-33
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 20:53:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:16:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	41005	100.000	9867	6000	1.145	--
总计		41005	100.000	9867			

图164 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-895-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 3-42

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 20:56:46

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:16:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.120	74525	100.000	17920	6016	1.143	--
总计		74525	100.000	17920			

图165 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-896-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-51
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 21:00:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:16:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	187638	100.000	45156	6016	1.140	--
总计		187638	100.000	45156			

图166 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-897-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-7
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 21:03:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:16:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.120	135057	100.000	32464	6020	1.142	--
总计		135057	100.000	32464			

图167 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-898-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-16
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 21:07:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:16:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	141965	100.000	34173	6016	1.141	--
总计		141965	100.000	34173			

图168 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-899-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-25
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 21:10:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:16:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.122	128620	100.000	30985	6037	1.142	--
总计		128620	100.000	30985			

图169 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-900-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-34
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 21:14:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:16:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.120	71815	100.000	17258	6015	1.144	--
总计		71815	100.000	17258			

图170 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-901-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-43
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 21:17:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:17:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	107391	100.000	25873	6023	1.142	--
总计		107391	100.000	25873			

图171 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-902-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-52
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 21:20:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:17:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	262465	100.000	63186	6023	1.138	--
总计		262465	100.000	63186			

图172 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-903-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-90min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 3-8

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 21:24:22

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:17:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.120	228902	100.000	55075	6034	1.139	--
总计		228902	100.000	55075			

图173 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-904-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-17
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 21:27:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:17:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.119	209811	100.000	50305	6011	1.140	--
总计		209811	100.000	50305			

图174 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片2
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-905-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-90min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 3-26

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 21:31:19

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:17:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.119	211849	100.000	50804	6013	1.140	--
总计		211849	100.000	50804			

图175 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片3
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-906-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-90min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 3-35

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 21:34:47

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:17:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.120	133683	100.000	32113	6017	1.142	--
总计		133683	100.000	32113			

图176 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-907-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-44
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 21:38:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:17:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	168547	100.000	40612	6030	1.140	--
总计		168547	100.000	40612			

图177 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-908-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-53
进样体积 : 100 μ l 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 21:41:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:17:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.120	380164	100.000	91449	6043	1.135	--
总计		380164	100.000	91449			

图178 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-909-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 4-3
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 21:45:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:17:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.118	310557	100.000	74269	6027	1.138	--
总计		310557	100.000	74269			

图179 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-910-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-Jx-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 4-12

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 21:48:39

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:17:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.118	295653	100.000	70807	6038	1.137	--
总计		295653	100.000	70807			

图180 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-911-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 4-21
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 21:52:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:17:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.118	300651	100.000	71847	6028	1.138	--
总计		300651	100.000	71847			

图181 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-912-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 4-30
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 21:55:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:17:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.118	226280	100.000	53973	6018	1.141	--
总计		226280	100.000	53973			

图182 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-913-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 4-39
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 21:59:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:17:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.118	249867	100.000	59829	6037	1.139	--
总计		249867	100.000	59829			

图183 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-914-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-Jx-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb

样品瓶号 : 4-48

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2024/05/27 22:02:32

处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:17:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速:1.5ml/min


波长:283nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.117	434382	100.000	103606	6034	1.136	--
总计		434382	100.000	103606			

图184 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-915-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 22:06:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:17:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	1194778	99.733	282843	5862	1.150	--
2	2.825	3202	0.267	309	1611	1.024	3.795
总计		1197981	100.000	283152			

图185 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱温 :30°C 波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 0-53/26-916-2 - cbzj-22FA458p-rcqx-pH4.5jz-5mg-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240527-rcqx-fx275.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 100 μl 版本号:6.115
进样时间 : 2024/05/27 22:09:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/05/28 14:17:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	1193044	100.000	282725	5863	1.150	--
总计		1193044	100.000	282725			

图186 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-22FA458批(5mg规格)-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2