


<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2880-2 - zzp-js6y-rcd-pH6.8jz-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 10:23:08	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:30:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品-pH6.8介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2882-2 - zzp-js6y-rcd-pH6.8jz-dz1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 10:31:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:30:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.539	99855	100.000	10864	1876	1.288	--
总计		99855	100.000	10864			

图3 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品-pH6.8介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2883-2 - zzp-js6y-rcd-pH6.8jz-dz1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 10:36:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:30:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	100545	100.000	10885	1876	1.291	--
总计		100545	100.000	10885			

图4 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品-pH6.8介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2885-2 - zzp-js6y-rcd-pH6.8jz-dz1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 10:45:05	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:30:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	99973	100.000	10875	1883	1.289	--
总计		99973	100.000	10875			

图6 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2887-2 - zzp-2023111721p-js6y-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 10:53:51	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.538	107601	100.000	11634	1864	1.285	--
总计		107601	100.000	11634			

图8 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片1
供试品溶液-2




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2888-2 - zzp-2023111721p-js6y-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 10:58:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.538	95532	100.000	10374	1867	1.276	--
总计		95532	100.000	10374			

图9 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2889-2 - zzp-2023111721p-js6y-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 11:02:37	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.538	95973	100.000	10387	1852	1.275	--
总计		95973	100.000	10387			

图10 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2890-2 - zzp-2023111721p-js6y-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 11:07:03	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:11		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.538	99287	100.000	10788	1863	1.271	--
总计		99287	100.000	10788			

图11 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2891-2 - zzp-2023111721p-js6y-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 11:11:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.539	99396	100.000	10789	1859	1.278	--
总计		99396	100.000	10789			

图12 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2892-2 - zzp-2023111721p-js6y-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 11:15:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:16		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.538	103341	100.000	11157	1853	1.279	--
总计		103341	100.000	11157			

图13 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2893-2 - zzp-2023111721p-js6y-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 11:20:11	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.538	103010	100.000	11166	1861	1.281	--
总计		103010	100.000	11166			

图14 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片4
供试品溶液-2




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2894-2 - zzp-2023111721p-js6y-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 11:24:34	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.538	104476	100.000	11325	1858	1.283	--
总计		104476	100.000	11325			

图15 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2895-2 - zzp-2023111721p-js6y-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 11:28:57	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.538	104471	100.000	11314	1856	1.286	--
总计		104471	100.000	11314			

图16 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2896-2 - zzp-2023111721p-js6y-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 11:33:20	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.539	99138	100.000	10753	1860	1.281	--
总计		99138	100.000	10753			

图17 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2897-2 - zzp-2023111721p-js6y-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 11:37:43	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	99719	100.000	10785	1856	1.272	--
总计		99719	100.000	10785			

图18 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片6
供试品溶液-2




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2898-2 - zzp-2023111821p-js6y-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 11:42:06	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	98958	100.000	10796	1883	1.282	--
总计		98958	100.000	10796			

图19 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2899-2 - zzp-2023111821p-js6y-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 11:46:29	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:32		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	99253	100.000	10797	1881	1.282	--
总计		99253	100.000	10797			

图20 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片1
供试品溶液-2




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2900-2 - zzp-2023111821p-js6y-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 11:50:52	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	104201	100.000	11335	1877	1.282	--
总计		104201	100.000	11335			

图21 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2902-2 - zzp-2023111821p-js6y-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 11:59:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	99673	100.000	10842	1885	1.283	--
总计		99673	100.000	10842			

图23 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2903-2 - zzp-2023111821p-js6y-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 12:04:00	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	99981	100.000	10860	1885	1.278	--
总计		99981	100.000	10860			

图24 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片3
供试品溶液-2




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2904-2 - zzp-2023111821p-js6y-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 12:08:24	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	104704	100.000	11393	1886	1.284	--
总计		104704	100.000	11393			

图25 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2905-2 - zzp-2023111821p-js6y-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 12:12:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	104703	100.000	11396	1889	1.282	--
总计		104703	100.000	11396			

图26 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2906-2 - zzp-2023111821p-js6y-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 12:17:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:49		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	99361	100.000	10805	1884	1.275	--
总计		99361	100.000	10805			

图27 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片5
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2907-2 - zzp-2023111821p-js6y-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 12:21:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	99522	100.000	10811	1894	1.280	--
总计		99522	100.000	10811			

图28 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片5
供试品溶液-2




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2908-2 - zzp-2023111821p-js6y-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 12:25:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	91090	100.000	9885	1877	1.279	--
总计		91090	100.000	9885			

图29 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2909-2 - zzp-2023111821p-js6y-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 12:30:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	90599	100.000	9878	1896	1.272	--
总计		90599	100.000	9878			

图30 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2910-2 - zzp-2023111921p-js6y-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 12:34:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	99994	100.000	10898	1894	1.278	--
总计		99994	100.000	10898			

图31 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2911-2 - zzp-2023111921p-js6y-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 12:39:03	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:01		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	100239	100.000	10912	1894	1.280	--
总计		100239	100.000	10912			

图32 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2912-2 - zzp-2023111921p-js6y-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 12:43:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	102946	100.000	11191	1896	1.283	--
总计		102946	100.000	11191			

图33 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2913-2 - zzp-2023111921p-js6y-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 12:47:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	102607	100.000	11183	1898	1.274	--
总计		102607	100.000	11183			

图34 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2914-2 - zzp-2023111921p-js6y-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 12:52:12	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	105742	100.000	11500	1882	1.277	--
总计		105742	100.000	11500			

图35 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2915-2 - zzp-2023111921p-js6y-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 12:56:35	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	105645	100.000	11491	1882	1.274	--
总计		105645	100.000	11491			

图36 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2916-2 - zzp-2023111921p-js6y-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 13:00:56	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	105104	100.000	11420	1888	1.279	--
总计		105104	100.000	11420			

图37 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2917-2 - zzp-2023111921p-js6y-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 13:05:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	105306	100.000	11444	1885	1.275	--
总计		105306	100.000	11444			

图38 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2918-2 - zzp-2023111921p-js6y-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 13:09:41	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	102238	100.000	11085	1876	1.284	--
总计		102238	100.000	11085			

图39 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2919-2 - zzp-2023111921p-js6y-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 13:14:04	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	102090	100.000	11100	1895	1.282	--
总计		102090	100.000	11100			

图40 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2920-2 - zzp-2023111921p-js6y-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 13:18:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	97664	100.000	10627	1881	1.283	--
总计		97664	100.000	10627			

图41 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2921-2 - zzp-2023111921p-js6y-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 13:22:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	98290	100.000	10640	1888	1.281	--
总计		98290	100.000	10640			

图42 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2922-2 - zzp-js6y-rcd-pH6.8jz-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 13:27:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	100223	100.000	10890	1890	1.284	--
总计		100223	100.000	10890			

图43 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品-pH6.8介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2923-2 - zzp-js6y-rcd-pH6.8jz-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 13:31:35	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	100491	100.000	10895	1879	1.284	--
总计		100491	100.000	10895			

图44 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2924-2 - zzp-cq6y-rcd-pH6.8jz-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 13:35:59	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:32		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图45 阿齐沙坦片溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品-pH6.8介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2925-2 - zzp-cq6y-rcd-pH6.8jz-dz1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 13:40:24	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	99908	100.000	10884	1891	1.281	--
总计		99908	100.000	10884			

图46 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品-pH6.8介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2926-2 - zzp-cq6y-rcd-pH6.8jz-dz1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 13:44:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.545	100490	100.000	10924	1891	1.280	--
总计		100490	100.000	10924			

图47 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品-pH6.8介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2927-2 - zzp-cq6y-rcd-pH6.8jz-dz1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 13:49:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.545	100155	100.000	10904	1891	1.281	--
总计		100155	100.000	10904			

图48 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2929-2 - zzp-cq6y-rcd-pH6.8jz-dz1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 13:58:04	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	100125	100.000	10886	1886	1.284	--
总计		100125	100.000	10886			

图50 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品-pH6.8介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2930-2 - zzp-2023111721p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 14:02:29	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	104632	100.000	11394	1887	1.272	--
总计		104632	100.000	11394			

图51 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片1
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2931-2 - zzp-2023111721p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 14:06:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:49		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	104809	100.000	11368	1885	1.277	--
总计		104809	100.000	11368			

图52 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2932-2 - zzp-2023111721p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 14:11:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	100529	100.000	10915	1879	1.283	--
总计		100529	100.000	10915			

图53 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2933-2 - zzp-2023111721p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 14:15:41	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	100152	100.000	10909	1885	1.282	--
总计		100152	100.000	10909			

图54 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2934-2 - zzp-2023111721p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 14:20:05	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.545	105572	100.000	11505	1900	1.281	--
总计		105572	100.000	11505			

图55 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2935-2 - zzp-2023111721p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 14:24:29	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.545	105176	100.000	11499	1906	1.278	--
总计		105176	100.000	11499			

图56 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2936-2 - zzp-2023111721p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 14:28:51	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	104380	100.000	11365	1884	1.277	--
总计		104380	100.000	11365			

图57 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片4
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2937-2 - zzp-2023111721p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 14:33:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	104758	100.000	11373	1878	1.285	--
总计		104758	100.000	11373			

图58 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片4
供试品溶液-2




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2938-2 - zzp-2023111721p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 14:37:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	94944	100.000	10343	1891	1.277	--
总计		94944	100.000	10343			

图59 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2939-2 - zzp-2023111721p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 14:42:02	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	94770	100.000	10343	1896	1.273	--
总计		94770	100.000	10343			

图60 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2940-2 - zzp-2023111721p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 14:46:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	101946	100.000	11068	1881	1.278	--
总计		101946	100.000	11068			

图61 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2941-2 - zzp-2023111721p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 14:50:48	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	101437	100.000	11080	1890	1.275	--
总计		101437	100.000	11080			

图62 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2942-2 - zzp-2023111821p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 14:55:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	102267	100.000	11128	1896	1.281	--
总计		102267	100.000	11128			

图63 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2943-2 - zzp-2023111821p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 14:59:36	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	102320	100.000	11124	1887	1.278	--
总计		102320	100.000	11124			

图64 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2944-2 - zzp-2023111821p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 15:04:00	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:19		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	108189	100.000	11734	1887	1.280	--
总计		108189	100.000	11734			

图65 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2945-2 - zzp-2023111821p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 15:08:24	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.545	108176	100.000	11777	1885	1.280	--
总计		108176	100.000	11777			

图66 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2946-2 - zzp-2023111821p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 15:12:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:24		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.545	101305	100.000	11004	1883	1.282	--
总计		101305	100.000	11004			

图67 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片3
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2947-2 - zzp-2023111821p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 15:17:12	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:26		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.545	101280	100.000	11029	1883	1.275	--
总计		101280	100.000	11029			

图68 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2948-2 - zzp-2023111821p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 15:21:37	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:29		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.545	100272	100.000	10926	1889	1.271	--
总计		100272	100.000	10926			

图69 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2949-2 - zzp-2023111821p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 15:26:01	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	100141	100.000	10903	1888	1.281	--
总计		100141	100.000	10903			

图70 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片4
供试品溶液-2




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2951-2 - zzp-2023111821p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 15:34:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	99276	100.000	10828	1887	1.279	--
总计		99276	100.000	10828			

图72 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2952-2 - zzp-2023111821p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 15:39:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	98697	100.000	10749	1888	1.276	--
总计		98697	100.000	10749			

图73 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2953-2 - zzp-2023111821p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 15:43:33	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	98656	100.000	10758	1898	1.282	--
总计		98656	100.000	10758			

图74 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片6
供试品溶液-2




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2954-2 - zzp-2023111921p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 15:47:57	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	103580	100.000	11304	1900	1.279	--
总计		103580	100.000	11304			

图75 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2955-2 - zzp-2023111921p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 15:52:22	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	103817	100.000	11318	1888	1.281	--
总计		103817	100.000	11318			

图76 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片1
供试品溶液-2




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2956-2 - zzp-2023111921p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 15:56:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	97432	100.000	10605	1875	1.280	--
总计		97432	100.000	10605			

图77 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片2
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2957-2 - zzp-2023111921p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 16:01:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	97351	100.000	10618	1884	1.276	--
总计		97351	100.000	10618			

图78 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片2
供试品溶液-2




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2958-2 - zzp-2023111921p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 16:05:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.539	99365	100.000	10861	1889	1.275	--
总计		99365	100.000	10861			

图79 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2959-2 - zzp-2023111921p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 16:09:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	99850	100.000	10859	1882	1.278	--
总计		99850	100.000	10859			

图80 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2960-2 - zzp-2023111921p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 16:14:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	102573	100.000	11147	1885	1.285	--
总计		102573	100.000	11147			

图81 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2961-2 - zzp-2023111921p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 16:18:41	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	102438	100.000	11158	1885	1.275	--
总计		102438	100.000	11158			

图82 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2962-2 - zzp-2023111921p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 16:23:03	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.539	102094	100.000	11153	1882	1.271	--
总计		102094	100.000	11153			

图83 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2963-2 - zzp-2023111921p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 16:27:28	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	101940	100.000	11150	1895	1.271	--
总计		101940	100.000	11150			

图84 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2964-2 - zzp-2023111921p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 16:31:52	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	98928	100.000	10800	1904	1.278	--
总计		98928	100.000	10800			

图85 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2965-2 - zzp-2023111921p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 16:36:15	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	98315	100.000	10775	1902	1.271	--
总计		98315	100.000	10775			

图86 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2966-2 - zzp-cq6y-rcd-pH6.8jz-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 16:40:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	100072	100.000	10866	1884	1.281	--
总计		100072	100.000	10866			

图87 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品-pH6.8介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2967-2 - zzp-cq6y-rcd-pH6.8jz-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 16:45:05	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	99435	100.000	10813	1894	1.279	--
总计		99435	100.000	10813			

图88 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2968-2 - zzp-zj6y-rcd-pH6.8jz-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 16:49:27	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图89 阿齐沙坦片溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品-pH6.8介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2970-2 - zzp-zj6y-rcd-pH6.8jz-dz1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 16:58:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	99577	100.000	10874	1885	1.272	--
总计		99577	100.000	10874			

图91 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-pH6.8介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2971-2 - zzp-zj6y-rcd-pH6.8jz-dz1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 17:02:37	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:24		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.549	99821	100.000	10878	1887	1.278	--
总计		99821	100.000	10878			

图92 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-pH6.8介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2974-2 - zzp-2023111721p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 17:15:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	106527	100.000	11614	1906	1.278	--
总计		106527	100.000	11614			

图95 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片1
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2975-2 - zzp-2023111721p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 17:20:08	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	107486	100.000	11688	1893	1.278	--
总计		107486	100.000	11688			

图96 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片1
供试品溶液-2




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2976-2 - zzp-2023111721p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 17:24:30	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.538	104327	100.000	11370	1880	1.276	--
总计		104327	100.000	11370			

图97 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片2
供试品溶液-1




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2977-2 - zzp-2023111721p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 17:28:53	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	103764	100.000	11365	1909	1.267	--
总计		103764	100.000	11365			

图98 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2979-2 - zzp-2023111721p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 17:37:37	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	96150	100.000	10483	1889	1.271	--
总计		96150	100.000	10483			

图100 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2980-2 - zzp-2023111721p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 17:42:00	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	94533	100.000	10300	1903	1.287	--
总计		94533	100.000	10300			

图101 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2981-2 - zzp-2023111721p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 17:46:21	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	93981	100.000	10261	1902	1.279	--
总计		93981	100.000	10261			

图102 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2982-2 - zzp-2023111721p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 17:50:43	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	102988	100.000	11212	1899	1.275	--
总计		102988	100.000	11212			

图103 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2983-2 - zzp-2023111721p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 17:55:05	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	102599	100.000	11216	1907	1.279	--
总计		102599	100.000	11216			

图104 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2984-2 - zzp-2023111721p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 17:59:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.539	101021	100.000	10985	1873	1.277	--
总计		101021	100.000	10985			

图105 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2985-2 - zzp-2023111721p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 18:03:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.539	100662	100.000	10990	1899	1.285	--
总计		100662	100.000	10990			

图106 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111721批)-pH6.8介质-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2986-2 - zzp-2023111821p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 18:08:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	104067	100.000	11383	1896	1.274	--
总计		104067	100.000	11383			

图107 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2987-2 - zzp-2023111821p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 18:12:33	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	104245	100.000	11411	1896	1.275	--
总计		104245	100.000	11411			

图108 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2988-2 - zzp-2023111821p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 18:16:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.539	98056	100.000	10739	1904	1.277	--
总计		98056	100.000	10739			

图109 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2989-2 - zzp-2023111821p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 18:21:16	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.539	98189	100.000	10766	1898	1.277	--
总计		98189	100.000	10766			

图110 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2990-2 - zzp-2023111821p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 18:25:39	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.539	105136	100.000	11473	1883	1.269	--
总计		105136	100.000	11473			

图111 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2991-2 - zzp-2023111821p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 18:30:01	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:11		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.539	104348	100.000	11430	1891	1.267	--
总计		104348	100.000	11430			

图112 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2992-2 - zzp-2023111821p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 18:34:23	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.546	102814	100.000	11352	1927	1.274	--
总计		102814	100.000	11352			

图113 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2993-2 - zzp-2023111821p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 18:38:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:16		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	103812	100.000	11395	1937	1.281	--
总计		103812	100.000	11395			

图114 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2994-2 - zzp-2023111821p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 18:43:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	101307	100.000	11029	1887	1.271	--
总计		101307	100.000	11029			

图115 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2995-2 - zzp-2023111821p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 18:47:30	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	101222	100.000	11023	1895	1.275	--
总计		101222	100.000	11023			

图116 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2996-2 - zzp-2023111821p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 18:51:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	96463	100.000	10529	1896	1.274	--
总计		96463	100.000	10529			

图117 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2997-2 - zzp-2023111821p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 18:56:16	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.546	96671	100.000	10558	1894	1.276	--
总计		96671	100.000	10558			

图118 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111821批)-pH6.8介质-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2998-2 - zzp-2023111921p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 19:00:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.545	99731	100.000	10936	1911	1.269	--
总计		99731	100.000	10936			

图119 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2999-2 - zzp-2023111921p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 19:04:59	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:29		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	100313	100.000	10911	1895	1.277	--
总计		100313	100.000	10911			

图120 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-3000-2 - zzp-2023111921p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 19:09:22	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:32		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	98364	100.000	10718	1889	1.283	--
总计		98364	100.000	10718			

图121 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-3001-2 - zzp-2023111921p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 19:13:44	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	98727	100.000	10731	1894	1.276	--
总计		98727	100.000	10731			

图122 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-3002-2 - zzp-2023111921p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 19:18:05	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	105040	100.000	11484	1905	1.271	--
总计		105040	100.000	11484			

图123 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-3003-2 - zzp-2023111921p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 19:22:28	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	104656	100.000	11415	1904	1.276	--
总计		104656	100.000	11415			

图124 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-3004-2 - zzp-2023111921p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 19:26:50	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:41		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	101148	100.000	11061	1891	1.273	--
总计		101148	100.000	11061			

图125 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-3005-2 - zzp-2023111921p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 19:31:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	101754	100.000	11113	1896	1.268	--
总计		101754	100.000	11113			

图126 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-3006-2 - zzp-2023111921p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 19:35:34	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	101172	100.000	11010	1875	1.273	--
总计		101172	100.000	11010			

图127 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-3007-2 - zzp-2023111921p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 19:39:56	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.545	100719	100.000	10994	1898	1.273	--
总计		100719	100.000	10994			

图128 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-3008-2 - zzp-2023111921p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 19:44:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	103897	100.000	11365	1908	1.280	--
总计		103897	100.000	11365			

图129 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-3009-2 - zzp-2023111921p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 19:48:41	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	104392	100.000	11406	1912	1.277	--
总计		104392	100.000	11406			

图130 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(2023111921批)-pH6.8介质-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-3010-2 - zzp-zj6y-rcd-pH6.8jz-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 19:53:03	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	97558	100.000	10649	1888	1.271	--
总计		97558	100.000	10649			

图131 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-pH6.8介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-3011-2 - zzp-zj6y-rcd-pH6.8jz-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 19:57:27	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.538	97393	100.000	10689	1898	1.276	--
总计		97393	100.000	10689			

图132 阿齐沙坦片溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-pH6.8介质
对照品溶液-2-2