




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 10-48/31-2880-2 - zzp-js6y-rcd-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/29 10:23:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/05/30 08:30:44 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2884-2 - zzp-js6y-rcd-pH6.8jz-dz1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 10:40:41	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:30:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	99777	100.000	10865	1874	1.285	--
总计		99777	100.000	10865			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 10-48/31-2887-2 - zzp-2023111721p-js6y-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb
 样品瓶号 : 1-1
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/05/29 10:53:51 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2024/05/30 08:31:04 处理者: xiexinhui
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.538	107601	100.000	11634	1864	1.285	--
总计		107601	100.000	11634			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2889-2 - zzp-2023111721p-js6y-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 11:02:37	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.538	95973	100.000	10387	1852	1.275	--
总计		95973	100.000	10387			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2890-2 - zzp-2023111721p-js6y-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 11:07:03	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:11		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.538	99287	100.000	10788	1863	1.271	--
总计		99287	100.000	10788			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2891-2 - zzp-2023111721p-js6y-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 11:11:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.539	99396	100.000	10789	1859	1.278	--
总计		99396	100.000	10789			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 10-48/31-2895-2 - zzp-2023111721p-js6y-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/29 11:28:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/05/30 08:31:23 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.538	104471	100.000	11314	1856	1.286	--
总计		104471	100.000	11314			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2896-2 - zzp-2023111721p-js6y-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 11:33:20	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.539	99138	100.000	10753	1860	1.281	--
总计		99138	100.000	10753			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2898-2 - zzp-2023111821p-js6y-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 11:42:06	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	98958	100.000	10796	1883	1.282	--
总计		98958	100.000	10796			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2900-2 - zzp-2023111821p-js6y-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 11:50:52	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	104201	100.000	11335	1877	1.282	--
总计		104201	100.000	11335			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2901-2 - zzp-2023111821p-js6y-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 11:55:15	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	104108	100.000	11347	1880	1.276	--
总计		104108	100.000	11347			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2902-2 - zzp-2023111821p-js6y-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 11:59:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	99673	100.000	10842	1885	1.283	--
总计		99673	100.000	10842			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2903-2 - zzp-2023111821p-js6y-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 12:04:00	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	99981	100.000	10860	1885	1.278	--
总计		99981	100.000	10860			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2905-2 - zzp-2023111821p-js6y-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 12:12:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	104703	100.000	11396	1889	1.282	--
总计		104703	100.000	11396			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2907-2 - zzp-2023111821p-js6y-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 12:21:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:31:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>

mV



<峰表>


检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	99522	100.000	10811	1894	1.280	--
总计		99522	100.000	10811			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 10-48/31-2911-2 - zzp-2023111921p-js6y-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/29 12:39:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/05/30 08:32:01 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	100239	100.000	10912	1894	1.280	--
总计		100239	100.000	10912			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2912-2 - zzp-2023111921p-js6y-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 12:43:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	102946	100.000	11191	1896	1.283	--
总计		102946	100.000	11191			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 10-48/31-2914-2 - zzp-2023111921p-js6y-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb
 样品瓶号 : 1-21
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/05/29 12:52:12 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2024/05/30 08:32:08 处理者: xiexinhui
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	105742	100.000	11500	1882	1.277	--
总计		105742	100.000	11500			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 10-48/31-2915-2 - zzp-2023111921p-js6y-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb
 样品瓶号 : 1-21
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/05/29 12:56:35 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2024/05/30 08:32:10 处理者: xiexinhui
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	105645	100.000	11491	1882	1.274	--
总计		105645	100.000	11491			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2917-2 - zzp-2023111921p-js6y-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 13:05:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	105306	100.000	11444	1885	1.275	--
总计		105306	100.000	11444			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 10-48/31-2919-2 - zzp-2023111921p-js6y-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb
 样品瓶号 : 1-39
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/05/29 13:14:04 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2024/05/30 08:32:20 处理者: xiexinhui
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	102090	100.000	11100	1895	1.282	--
总计		102090	100.000	11100			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2920-2 - zzp-2023111921p-js6y-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 13:18:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	97664	100.000	10627	1881	1.283	--
总计		97664	100.000	10627			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2921-2 - zzp-2023111921p-js6y-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 13:22:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:32:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	98290	100.000	10640	1888	1.281	--
总计		98290	100.000	10640			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 10-48/31-2922-2 - zzp-js6y-rcd-pH6.8jz-dz2-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb
 样品瓶号 : 1-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/05/29 13:27:13 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2024/05/30 08:32:27 处理者: xiexinhui
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	100223	100.000	10890	1890	1.284	--
总计		100223	100.000	10890			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 10-48/31-2924-2 - zzp-cq6y-rcd-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/29 13:35:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/05/30 08:32:32 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 10-48/31-2929-2 - zzp-cq6y-rcd-pH6.8jz-dz1-5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/05/29 13:58:04 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2024/05/30 08:32:44 处理者: xiexinhui
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	100125	100.000	10886	1886	1.284	--
总计		100125	100.000	10886			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 10-48/31-2930-2 - zzp-2023111721p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb
 样品瓶号 : 2-1
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/05/29 14:02:29 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2024/05/30 08:32:46 处理者: xiexinhui
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	104632	100.000	11394	1887	1.272	--
总计		104632	100.000	11394			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 10-48/31-2932-2 - zzp-2023111721p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb
 样品瓶号 : 2-10
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/05/29 14:11:17 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2024/05/30 08:32:51 处理者: xiexinhui
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	100529	100.000	10915	1879	1.283	--
总计		100529	100.000	10915			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2937-2 - zzp-2023111721p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 14:33:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	104758	100.000	11373	1878	1.285	--
总计		104758	100.000	11373			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2941-2 - zzp-2023111721p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 14:50:48	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	101437	100.000	11080	1890	1.275	--
总计		101437	100.000	11080			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2942-2 - zzp-2023111821p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 14:55:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	102267	100.000	11128	1896	1.281	--
总计		102267	100.000	11128			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2943-2 - zzp-2023111821p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 14:59:36	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	102320	100.000	11124	1887	1.278	--
总计		102320	100.000	11124			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2946-2 - zzp-2023111821p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 15:12:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:24		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.545	101305	100.000	11004	1883	1.282	--
总计		101305	100.000	11004			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2947-2 - zzp-2023111821p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 15:17:12	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:26		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.545	101280	100.000	11029	1883	1.275	--
总计		101280	100.000	11029			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 10-48/31-2948-2 - zzp-2023111821p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb
 样品瓶号 : 2-29
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/05/29 15:21:37 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2024/05/30 08:33:29 处理者: xiexinhui
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.545	100272	100.000	10926	1889	1.271	--
总计		100272	100.000	10926			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2949-2 - zzp-2023111821p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 15:26:01	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	100141	100.000	10903	1888	1.281	--
总计		100141	100.000	10903			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2952-2 - zzp-2023111821p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 15:39:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	98697	100.000	10749	1888	1.276	--
总计		98697	100.000	10749			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2953-2 - zzp-2023111821p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 15:43:33	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	98656	100.000	10758	1898	1.282	--
总计		98656	100.000	10758			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2954-2 - zzp-2023111921p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 15:47:57	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	103580	100.000	11304	1900	1.279	--
总计		103580	100.000	11304			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 10-48/31-2955-2 - zzp-2023111921p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/29 15:52:22 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/05/30 08:33:45 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	103817	100.000	11318	1888	1.281	--
总计		103817	100.000	11318			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2957-2 - zzp-2023111921p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 16:01:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	97351	100.000	10618	1884	1.276	--
总计		97351	100.000	10618			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2959-2 - zzp-2023111921p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 16:09:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	99850	100.000	10859	1882	1.278	--
总计		99850	100.000	10859			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2960-2 - zzp-2023111921p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 16:14:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:33:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	102573	100.000	11147	1885	1.285	--
总计		102573	100.000	11147			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 10-48/31-2962-2 - zzp-2023111921p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb
 样品瓶号 : 2-39
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/05/29 16:23:03 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2024/05/30 08:34:02 处理者: xiexinhui
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.539	102094	100.000	11153	1882	1.271	--
总计		102094	100.000	11153			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2963-2 - zzp-2023111921p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P5-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 16:27:28	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	101940	100.000	11150	1895	1.271	--
总计		101940	100.000	11150			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2964-2 - zzp-2023111921p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P6-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 16:31:52	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	98928	100.000	10800	1904	1.278	--
总计		98928	100.000	10800			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2965-2 - zzp-2023111921p-cq6y-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 16:36:15	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	98315	100.000	10775	1902	1.271	--
总计		98315	100.000	10775			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2966-2 - zzp-cq6y-rcd-pH6.8jz-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 16:40:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	100072	100.000	10866	1884	1.281	--
总计		100072	100.000	10866			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2970-2 - zzp-zj6y-rcd-pH6.8jz-dz1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 16:58:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	99577	100.000	10874	1885	1.272	--
总计		99577	100.000	10874			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2974-2 - zzp-2023111721p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 17:15:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.548	106527	100.000	11614	1906	1.278	--
总计		106527	100.000	11614			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2978-2 - zzp-2023111721p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 17:33:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:41		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	95867	100.000	10478	1903	1.275	--
总计		95867	100.000	10478			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2979-2 - zzp-2023111721p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 17:37:37	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	96150	100.000	10483	1889	1.271	--
总计		96150	100.000	10483			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2980-2 - zzp-2023111721p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 17:42:00	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	94533	100.000	10300	1903	1.287	--
总计		94533	100.000	10300			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2982-2 - zzp-2023111721p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 17:50:43	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	102988	100.000	11212	1899	1.275	--
总计		102988	100.000	11212			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2985-2 - zzp-2023111721p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P6-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 18:03:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:34:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.539	100662	100.000	10990	1899	1.285	--
总计		100662	100.000	10990			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温 : 30°C 波长: 251nm
数据文件名 : RC\$SMF-364 - 10-48/31-2987-2 - zzp-2023111821p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb
样品瓶号 : 3-2
进样体积 : 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/05/29 18:12:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V2) : 2024/05/30 08:35:02 处理者: xiexinhui
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	104245	100.000	11411	1896	1.275	--
总计		104245	100.000	11411			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 10-48/31-2988-2 - zzp-2023111821p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb
 样品瓶号 : 3-11
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/05/29 18:16:55 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2024/05/30 08:35:04 处理者: xiexinhui
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.539	98056	100.000	10739	1904	1.277	--
总计		98056	100.000	10739			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2989-2 - zzp-2023111821p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 18:21:16	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.539	98189	100.000	10766	1898	1.277	--
总计		98189	100.000	10766			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2992-2 - zzp-2023111821p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 18:34:23	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.546	102814	100.000	11352	1927	1.274	--
总计		102814	100.000	11352			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2998-2 - zzp-2023111921p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 19:00:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.545	99731	100.000	10936	1911	1.269	--
总计		99731	100.000	10936			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-2999-2 - zzp-2023111921p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 19:04:59	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:29		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.543	100313	100.000	10911	1895	1.277	--
总计		100313	100.000	10911			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-3000-2 - zzp-2023111921p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 19:09:22	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:32		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	98364	100.000	10718	1889	1.283	--
总计		98364	100.000	10718			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-3001-2 - zzp-2023111921p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 19:13:44	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	98727	100.000	10731	1894	1.276	--
总计		98727	100.000	10731			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-3002-2 - zzp-2023111921p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P3-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 19:18:05	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.542	105040	100.000	11484	1905	1.271	--
总计		105040	100.000	11484			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-3003-2 - zzp-2023111921p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P3-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 19:22:28	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	104656	100.000	11415	1904	1.276	--
总计		104656	100.000	11415			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 251nm
 数据文件名 : RC\$SMF-364 - 10-48/31-3004-2 - zzp-2023111921p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P4-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb
 样品瓶号 : 3-30
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/05/29 19:26:50 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2024/05/30 08:35:41 处理者: xiexinhui
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.540	101148	100.000	11061	1891	1.273	--
总计		101148	100.000	11061			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-3005-2 - zzp-2023111921p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P4-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 19:31:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.544	101754	100.000	11113	1896	1.268	--
总计		101754	100.000	11113			




SMF-364

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 251nm
数据文件名	: RC\$SMF-364 - 10-48/31-3006-2 - zzp-2023111921p-zj6y-rcd-pH6.8jz-P5-1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-rcd-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-364 - SMF-364-20240529-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2024/05/29 19:35:34	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2024/05/30 08:35:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.541	101172	100.000	11010	1875	1.273	--
总计		101172	100.000	11010			

