




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-514-2 - zzp-100mg-rcd-pH2.0jz-lf100z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-9
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/18 20:24:49 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:09:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-515-2 - zzp-100mg-rcd-pH2.0jz-lf100z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/18 20:28:41 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:10:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	939506	100.000	98901	2200	1.145	--
总计		939506	100.000	98901			

图2 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-516-2 - zzp-100mg-rcd-pH2.0jz-lf100z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/18 20:32:33 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:10:04
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	939661	100.000	98884	2199	1.144	--
总计		939661	100.000	98884			

图3 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-517-2 - zzp-100mg-rcd-pH2.0jz-lf100z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/18 20:36:26 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:10:08
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	939102	100.000	98833	2198	1.146	--
总计		939102	100.000	98833			

图4 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-518-2 - zzp-100mg-rcd-pH2.0jz-lf100z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/18 20:40:19 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:10:11
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	939088	100.000	98650	2193	1.146	--
总计		939088	100.000	98650			

图5 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-4




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-519-2 - zzp-100mg-rcd-pH2.0jz-lf100z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/18 20:44:11 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:10:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	938758	100.000	98549	2188	1.146	--
总计		938758	100.000	98549			

图6 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-5




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-520-2 - zzp-100mg-2024051911p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-1 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/18 20:48:03 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:10:16
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1072241	100.000	113800	2249	1.154	--
总计		1072241	100.000	113800			

图7 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024051911批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-521-2 - zzp-100mg-2024051911p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-1 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/18 20:51:55 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:10:19
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1073113	100.000	113789	2244	1.154	--
总计		1073113	100.000	113789			

图8 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024051911批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片1
 供试品溶液-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-522-2 - zzp-100mg-2024051911p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-10 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/18 20:55:48 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:10:22
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1082044	100.000	114890	2250	1.155	--
总计		1082044	100.000	114890			

图9 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024051911批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-523-2 - zzp-100mg-2024051911p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-10 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/18 20:59:40 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:10:25
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1082559	100.000	114797	2244	1.155	--
总计		1082559	100.000	114797			

图10 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024051911批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片2
 供试品溶液-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-524-2 - zzp-100mg-2024051911p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/18 21:03:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:10:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1085648	100.000	115307	2254	1.157	--
总计		1085648	100.000	115307			

图11 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024051911批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-525-2 - zzp-100mg-2024051911p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-19 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/18 21:07:24 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:10:30
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1085602	100.000	115326	2256	1.157	--
总计		1085602	100.000	115326			

图12 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024051911批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片3
 供试品溶液-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-526-2 - zzp-100mg-2024051911p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-28 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/18 21:11:16 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:10:33
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.940	1052718	100.000	111937	2264	1.155	--
总计		1052718	100.000	111937			

图13 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024051911批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.8ml/min

柱温:30°C

波长: 290nm

数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-527-2 - zzp-100mg-2024051911p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P4-2.lcd

方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/06/18 21:15:08

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/06/19 09:10:36

处理者: xiechaojun

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	1052604	100.000	111715	2255	1.154	--
总计		1052604	100.000	111715			

图14 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2024051911批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片4
供试品溶液-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-528-2 - zzp-100mg-2024051911p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-37 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/18 21:19:00 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:10:39
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	1035208	100.000	109590	2247	1.152	--
总计		1035208	100.000	109590			

图15 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024051911批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-529-2 - zzp-100mg-2024051911p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/18 21:22:52 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:10:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	1033633	100.000	109195	2240	1.153	--
总计		1033633	100.000	109195			

图16 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024051911批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片5
 供试品溶液-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-530-2 - zzp-100mg-2024051911p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-46 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/18 21:26:45 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:10:45
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	1082238	100.000	114219	2231	1.156	--
总计		1082238	100.000	114219			

图17 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024051911批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.8ml/min

柱温:30°C

波长: 290nm

数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-531-2 - zzp-100mg-2024051911p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb

样品瓶号: 3-46

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间: 2024/06/18 21:30:38


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2024/06/19 09:10:47

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	1082129	100.000	114035	2227	1.156	--
总计		1082129	100.000	114035			

图18 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2024051911批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片6
供试品溶液-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-532-2 - zzp-100mg-2024052011p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-2 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/18 21:34:29 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:10:50
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	1071387	100.000	113034	2233	1.154	--
总计		1071387	100.000	113034			

图19 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024052011批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-533-2 - zzp-100mg-2024052011p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-2 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/18 21:38:21 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:10:53
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	1071700	100.000	112889	2230	1.154	--
总计		1071700	100.000	112889			

图20 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024052011批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片1
 供试品溶液-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-534-2 - zzp-100mg-2024052011p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/18 21:42:13 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:10:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	1088525	100.000	114722	2233	1.156	--
总计		1088525	100.000	114722			

图21 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024052011批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-535-2 - zzp-100mg-2024052011p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/18 21:46:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:10:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	1088781	100.000	114648	2230	1.157	--
总计		1088781	100.000	114648			

图22 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024052011批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片2
 供试品溶液-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-536-2 - zzp-100mg-2024052011p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/18 21:49:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:11:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	1078156	100.000	113373	2223	1.156	--
总计		1078156	100.000	113373			

图23 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024052011批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-537-2 - zzp-100mg-2024052011p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/18 21:53:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:11:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	1078154	100.000	113343	2221	1.157	--
总计		1078154	100.000	113343			

图24 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024052011批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片3
 供试品溶液-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-538-2 - zzp-100mg-2024052011p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/18 21:57:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:11:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	1090018	100.000	114357	2214	1.159	--
总计		1090018	100.000	114357			

图25 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024052011批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-539-2 - zzp-100mg-2024052011p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/18 22:01:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:11:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	1090696	100.000	114267	2208	1.158	--
总计		1090696	100.000	114267			

图26 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024052011批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片4
 供试品溶液-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-540-2 - zzp-100mg-2024052011p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-38 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/18 22:05:24 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:11:12
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	1066280	100.000	112070	2220	1.156	--
总计		1066280	100.000	112070			

图27 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024052011批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.8ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 290nm

数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-541-2 - zzp-100mg-2024052011p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/06/18 22:09:16

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/06/19 09:11:15

处理者: xiechaojun

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	1067027	100.000	112308	2224	1.156	--
总计		1067027	100.000	112308			

图28 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2024052011批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片5
供试品溶液-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-542-2 - zzp-100mg-2024052011p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/18 22:13:08 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:11:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	1068162	100.000	112251	2217	1.156	--
总计		1068162	100.000	112251			

图29 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024052011批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-543-2 - zzp-100mg-2024052011p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-47 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/18 22:17:00 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:11:21
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.945	1067019	100.000	112168	2219	1.156	--
总计		1067019	100.000	112168			

图30 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024052011批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片6
 供试品溶液-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-544-2 - zzp-100mg-2024052111p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-3 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/18 22:20:52 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:11:24
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	1075323	100.000	113033	2219	1.157	--
总计		1075323	100.000	113033			

图31 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024052111批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-545-2 - zzp-100mg-2024052111p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-3 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/18 22:24:44 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:11:26
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.946	1074738	100.000	113025	2220	1.157	--
总计		1074738	100.000	113025			

图32 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024052111批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片1
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.8ml/min

柱温:30°C

波长: 290nm

数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-546-2 - zzp-100mg-2024052111p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/06/18 22:28:36

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/06/19 09:11:29

处理者: xiechaojun

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.945	1070716	100.000	112412	2213	1.158	--
总计		1070716	100.000	112412			

图33 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(2024052111批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片2
供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-547-2 - zzp-100mg-2024052111p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-12 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/18 22:32:28 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:11:31
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.945	1070218	100.000	112437	2215	1.157	--
总计		1070218	100.000	112437			

图34 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024052111批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片2
 供试品溶液-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-548-2 - zzp-100mg-2024052111p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-21 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/18 22:36:20 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:11:34
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.946	1076461	100.000	113287	2223	1.157	--
总计		1076461	100.000	113287			

图35 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024052111批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-549-2 - zzp-100mg-2024052111p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P3-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-21 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/18 22:40:11 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:11:37
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.946	1076852	100.000	113433	2228	1.156	--
总计		1076852	100.000	113433			

图36 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024052111批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片3
 供试品溶液-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-550-2 - zzp-100mg-2024052111p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/18 22:44:03 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:11:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.946	1081559	100.000	113953	2229	1.157	--
总计		1081559	100.000	113953			

图37 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024052111批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-551-2 - zzp-100mg-2024052111p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P4-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-30 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/18 22:47:55 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:11:42
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.947	1080872	100.000	113704	2223	1.158	--
总计		1080872	100.000	113704			

图38 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024052111批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片4
 供试品溶液-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-552-2 - zzp-100mg-2024052111p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/18 22:51:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:11:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.947	1057024	100.000	111282	2227	1.156	--
总计		1057024	100.000	111282			

图39 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024052111批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-553-2 - zzp-100mg-2024052111p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/18 22:55:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:11:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	1056482	100.000	111195	2228	1.156	--
总计		1056482	100.000	111195			

图40 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024052111批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片5
 供试品溶液-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-554-2 - zzp-100mg-2024052111p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/18 22:59:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:11:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.947	1080520	100.000	113546	2218	1.157	--
总计		1080520	100.000	113546			

图41 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024052111批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-555-2 - zzp-100mg-2024052111p-rcd-pH2.0jz-lf100z-P6-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/18 23:03:25 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:11:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.948	1079569	100.000	113379	2217	1.157	--
总计		1079569	100.000	113379			

图42 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(2024052111批)(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-片6
 供试品溶液-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-556-2 - zzp-100mg-rcd-pH2.0jz-lf100z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/18 23:07:18 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/19 09:11:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	940555	100.000	97499	2160	1.150	--
总计		940555	100.000	97499			

图43 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
 自制品(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.8ml/min

柱温:30°C

波长: 290nm

数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-28/24-557-2 - zzp-100mg-rcd-pH2.0jz-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240618-rcd-FX273.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/06/18 23:11:11

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/06/19 09:11:59

处理者: xiechaojun

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	940117	100.000	97491	2161	1.150	--
总计		940117	100.000	97491			

图44 枸橼酸西地那非片溶出度测定HPLC图谱
自制品(100mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2