




SMF-356

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-684-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-9
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 14:24:55 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:16:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转
 溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-685-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 14:27:48 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:17:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.570	656857	100.000	125631	2162	1.283	--
总计		656857	100.000	125631			


图2 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-686-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 14:30:42 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:17:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.570	658601	100.000	125830	2165	1.281	--
总计		658601	100.000	125830			


图3 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-687-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 14:33:35 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:17:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.570	658379	100.000	125923	2168	1.278	--
总计		658379	100.000	125923			


图4 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-688-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 14:36:28 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:17:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.570	658892	100.000	126081	2174	1.276	--
总计		658892	100.000	126081			


图5 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-689-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 14:39:21 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:17:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.570	658180	100.000	126117	2172	1.275	--
总计		658180	100.000	126117			

图6 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-690-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-1
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 14:42:13 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:17:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	119374	100.000	22615	2178	1.288	--
总计		119374	100.000	22615			


图7 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-691-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-10
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 14:45:05 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:17:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	303455	100.000	58158	2204	1.279	--
总计		303455	100.000	58158			


图8 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-692-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-19
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 14:47:58 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:17:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	315691	100.000	60509	2202	1.278	--
总计		315691	100.000	60509			

图9 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-693-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-28
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 14:50:50 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:17:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	170564	100.000	32449	2194	1.282	--
总计		170564	100.000	32449			


图10 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-694-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-37
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 14:53:42 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:17:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	299725	100.000	57296	2199	1.276	--
总计		299725	100.000	57296			


图11 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-695-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-46
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 14:56:33 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:17:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	298362	100.000	57002	2202	1.275	--
总计		298362	100.000	57002			


图12 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-696-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-2
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 14:59:25 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:17:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	317608	100.000	60749	2207	1.275	--
总计		317608	100.000	60749			


图13 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-697-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-11
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 15:02:17 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:17:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	561323	100.000	108031	2216	1.270	--
总计		561323	100.000	108031			


图14 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-698-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-20
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 15:05:09 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:17:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	591731	100.000	113202	2213	1.270	--
总计		591731	100.000	113202			


图15 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-699-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-29
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 15:08:01 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:17:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	435655	100.000	83301	2207	1.268	--
总计		435655	100.000	83301			


图16 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-700-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-38
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 15:10:53 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:17:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.575	575116	100.000	110340	2211	1.269	--
总计		575116	100.000	110340			


图17 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-701-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-47
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 15:13:44 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:17:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	569331	100.000	109030	2214	1.267	--
总计		569331	100.000	109030			


图18 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-702-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-3
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 15:16:36 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:17:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	478908	100.000	91998	2214	1.265	--
总计		478908	100.000	91998			


图19 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-703-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-12
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 15:19:29 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:17:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	709004	100.000	135912	2217	1.267	--
总计		709004	100.000	135912			


图20 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-704-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-21
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 15:22:21 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:17:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.576	742651	100.000	142488	2218	1.265	--
总计		742651	100.000	142488			


图21 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-705-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-30
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 15:25:14 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:17:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	619907	100.000	119208	2216	1.263	--
总计		619907	100.000	119208			


图22 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-706-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-39
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 15:28:06 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:17:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	729789	100.000	140472	2217	1.263	--
总计		729789	100.000	140472			


图23 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-707-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-48
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 15:30:58 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:17:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.577	726326	100.000	139918	2223	1.262	--
总计		726326	100.000	139918			


图24 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-708-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-4
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 15:33:50 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:18:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.578	598896	100.000	115630	2224	1.260	--
总计		598896	100.000	115630			


图25 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-709-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-13
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 15:36:42 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:18:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.578	756321	100.000	145985	2227	1.261	--
总计		756321	100.000	145985			


图26 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-710-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-22
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 15:39:34 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:18:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.578	763687	100.000	147639	2227	1.260	--
总计		763687	100.000	147639			


图27 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-711-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-31
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 15:42:26 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:18:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.579	731631	100.000	141195	2221	1.260	--
总计		731631	100.000	141195			


图28 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-712-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-40
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 15:45:18 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:18:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.579	765080	100.000	147736	2225	1.260	--
总计		765080	100.000	147736			


图29 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-713-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-49
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 15:48:10 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:18:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.579	750670	100.000	144998	2226	1.259	--
总计		750670	100.000	144998			


图30 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-714-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-5
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 15:51:02 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:18:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	743953	100.000	143776	2226	1.259	--
总计		743953	100.000	143776			


图31 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-715-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-14
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 15:53:54 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:18:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	755275	100.000	145888	2228	1.259	--
总计		755275	100.000	145888			


图32 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-716-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-23
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 15:56:46 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:18:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	764540	100.000	147694	2225	1.259	--
总计		764540	100.000	147694			


图33 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-717-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-32
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 15:59:38 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:18:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	764367	100.000	147774	2230	1.258	--
总计		764367	100.000	147774			


图34 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-718-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-41
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 16:02:30 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:18:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	763725	100.000	147370	2226	1.258	--
总计		763725	100.000	147370			


图35 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-719-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-50
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 16:05:22 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:18:31 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	750088	100.000	144739	2227	1.258	--
总计		750088	100.000	144739			


图36 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-720-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-6
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 16:08:15 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:18:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	773563	100.000	148806	2227	1.259	--
总计		773563	100.000	148806			


图37 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-721-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-15
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 16:11:10 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:18:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	752022	100.000	144860	2230	1.259	--
总计		752022	100.000	144860			


图38 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-722-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-24
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 16:14:02 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:18:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.583	759769	100.000	146114	2226	1.259	--
总计		759769	100.000	146114			


图39 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-723-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-33
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 16:16:54 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:18:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.583	759660	100.000	145839	2228	1.259	--
总计		759660	100.000	145839			


图40 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-724-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-42
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 16:19:47 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:18:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.584	759838	100.000	145725	2233	1.259	--
总计		759838	100.000	145725			


图41 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-725-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-51
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 16:22:38 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:18:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.584	748579	100.000	143362	2230	1.259	--
总计		748579	100.000	143362			


图42 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-726-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-7
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 16:25:31 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:18:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.583	772509	100.000	148635	2229	1.257	--
总计		772509	100.000	148635			


图43 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-浆法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-727-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-16
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 16:28:24 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:18:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.583	753890	100.000	144814	2232	1.257	--
总计		753890	100.000	144814			


图44 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-728-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-25
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 16:31:17 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:18:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.583	762430	100.000	146404	2230	1.257	--
总计		762430	100.000	146404			


图45 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-729-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-34
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 16:34:09 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:18:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.583	762003	100.000	146536	2231	1.257	--
总计		762003	100.000	146536			

图46 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-730-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-43
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 16:37:01 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:19:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.583	759600	100.000	145663	2222	1.258	--
总计		759600	100.000	145663			

图47 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-731-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-52
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 16:39:53 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:19:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.584	746670	100.000	142735	2227	1.258	--
总计		746670	100.000	142735			

图48 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-732-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-27
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 16:42:46 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:19:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	658302	100.000	126154	2194	1.252	--
总计		658302	100.000	126154			


图49 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-733-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-shuijz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 1-27
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 16:45:40 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:19:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	658435	100.000	126064	2192	1.252	--
总计		658435	100.000	126064			


图50 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-734-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-9
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 16:48:34 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:19:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图51 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-735-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 16:51:28 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:19:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.583	656290	100.000	125773	2205	1.251	--
总计		656290	100.000	125773			


图52 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-736-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 16:54:22 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:19:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.583	657881	100.000	125718	2205	1.250	--
总计		657881	100.000	125718			


图53 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-737-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 16:57:16 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:19:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.584	658232	100.000	125866	2211	1.250	--
总计		658232	100.000	125866			


图54 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-738-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 17:00:10 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:19:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.585	655991	100.000	125419	2212	1.250	--
总计		655991	100.000	125419			


图55 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-739-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 17:03:04 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:19:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.585	657604	100.000	125911	2218	1.249	--
总计		657604	100.000	125911			


图56 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-740-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-1
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 17:05:57 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:19:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.561	283989	100.000	48228	1652	1.262	--
总计		283989	100.000	48228			


图57 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-741-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-10
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 17:08:50 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:19:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.562	293487	100.000	50013	1653	1.259	--
总计		293487	100.000	50013			


图58 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-742-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-19
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 17:11:43 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:19:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	267399	100.000	46135	1702	1.257	--
总计		267399	100.000	46135			


图59 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-743-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-28
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 17:14:36 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:19:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.563	276514	100.000	47372	1677	1.257	--
总计		276514	100.000	47372			

图60 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-744-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-37
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 17:17:29 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:19:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.562	286300	100.000	48707	1648	1.258	--
总计		286300	100.000	48707			

图61 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-745-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-46
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 17:20:21 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:19:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.562	285048	100.000	48513	1647	1.256	--
总计		285048	100.000	48513			


图62 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-746-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-2
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 17:23:14 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:19:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.563	519550	100.000	88664	1653	1.257	--
总计		519550	100.000	88664			


图63 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-747-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-11
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 17:26:07 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:19:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.563	539241	100.000	91848	1651	1.258	--
总计		539241	100.000	91848			

图64 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-748-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-20
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 17:29:00 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:19:49 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	502929	100.000	86903	1701	1.254	--
总计		502929	100.000	86903			


图65 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-749-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-29
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 17:31:53 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:19:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.563	515442	100.000	88283	1667	1.257	--
总计		515442	100.000	88283			


图66 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-750-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-38
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 17:34:46 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:19:54 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.563	529923	100.000	90482	1660	1.258	--
总计		529923	100.000	90482			

图67 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-751-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-47
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 17:37:38 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:19:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	533510	100.000	90846	1649	1.257	--
总计		533510	100.000	90846			


图68 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-752-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-3
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 17:40:31 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:20:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.563	673204	100.000	114872	1656	1.257	--
总计		673204	100.000	114872			


图69 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-753-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-12
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 17:43:24 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:20:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.563	693918	100.000	118252	1652	1.259	--
总计		693918	100.000	118252			

图70 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-754-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-21
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 17:46:18 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:20:05 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	660811	100.000	113958	1701	1.256	--
总计		660811	100.000	113958			


图71 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-755-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-30
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 17:49:11 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:20:08 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	668944	100.000	114624	1677	1.257	--
总计		668944	100.000	114624			


图72 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-756-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-39
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 17:52:04 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:20:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.563	685521	100.000	116475	1640	1.259	--
总计		685521	100.000	116475			


图73 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-757-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-48
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 17:54:56 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:20:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	695017	100.000	118165	1647	1.259	--
总计		695017	100.000	118165			


图74 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-758-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-4
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 17:57:50 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:20:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.563	737870	100.000	125747	1649	1.259	--
总计		737870	100.000	125747			

图75 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-759-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-13
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 18:00:44 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:20:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	756128	100.000	128596	1652	1.259	--
总计		756128	100.000	128596			


图76 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-760-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-22
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 18:03:37 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:20:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	731290	100.000	125719	1706	1.258	--
总计		731290	100.000	125719			


图77 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-761-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-31
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 18:06:31 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:20:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	737471	100.000	126095	1675	1.259	--
总计		737471	100.000	126095			


图78 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-762-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-40
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 18:09:24 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:20:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	743977	100.000	126219	1649	1.260	--
总计		743977	100.000	126219			


图79 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-763-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-49
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 18:12:18 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:20:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	763654	100.000	129886	1651	1.259	--
总计		763654	100.000	129886			


图80 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-764-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-5
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 18:15:11 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:20:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	739405	100.000	125639	1654	1.259	--
总计		739405	100.000	125639			


图81 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-765-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-14
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 18:18:04 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:20:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	757104	100.000	128389	1653	1.259	--
总计		757104	100.000	128389			


图82 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-766-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-23
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 18:20:58 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:20:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.569	735040	100.000	126358	1706	1.255	--
总计		735040	100.000	126358			


图83 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-767-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-32
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 18:23:51 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:20:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	738637	100.000	125785	1678	1.259	--
总计		738637	100.000	125785			

图84 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-768-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-41
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 18:26:45 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:20:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	744262	100.000	125982	1650	1.260	--
总计		744262	100.000	125982			

图85 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-769-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-50
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 18:29:38 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:20:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	767159	100.000	129526	1641	1.260	--
总计		767159	100.000	129526			


图86 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-770-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-6
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 18:32:32 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:20:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	736614	100.000	124905	1659	1.259	--
总计		736614	100.000	124905			

图87 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-771-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-15
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 18:35:25 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:20:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.568	757267	100.000	128141	1656	1.259	--
总计		757267	100.000	128141			


图88 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-772-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-24
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 18:38:19 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:20:54 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.570	732794	100.000	126097	1706	1.254	--
总计		732794	100.000	126097			


图89 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-773-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-33
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 18:41:12 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:20:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.569	736446	100.000	125618	1679	1.256	--
总计		736446	100.000	125618			


图90 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-774-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-42
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 18:44:06 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:21:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.569	740757	100.000	125658	1659	1.259	--
总计		740757	100.000	125658			


图91 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-775-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-51
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 18:46:59 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:21:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.569	766170	100.000	129547	1646	1.259	--
总计		766170	100.000	129547			


图92 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-776-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-7
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 18:49:53 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:21:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.568	739814	100.000	125412	1656	1.258	--
总计		739814	100.000	125412			


图93 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-777-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-16
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 18:52:47 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:21:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.570	756116	100.000	128428	1657	1.257	--
总计		756116	100.000	128428			


图94 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-778-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-25
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 18:55:40 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:21:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.572	730700	100.000	125872	1708	1.255	--
总计		730700	100.000	125872			


图95 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-779-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-34
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 18:58:34 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:21:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.571	736007	100.000	125787	1681	1.255	--
总计		736007	100.000	125787			


图96 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-780-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-43
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 19:01:28 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:21:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.571	742495	100.000	125860	1652	1.260	--
总计		742495	100.000	125860			


图97 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-781-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-52
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 19:04:23 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:21:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.570	764481	100.000	129590	1649	1.258	--
总计		764481	100.000	129590			


图98 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-782-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-27
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 19:07:17 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:21:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.596	654878	100.000	125769	2235	1.238	--
总计		654878	100.000	125769			


图99 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-783-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 2-27
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 19:10:11 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:21:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.597	655725	100.000	125937	2234	1.238	--
总计		655725	100.000	125937			


图100 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-784-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-9
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 19:13:03 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:21:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图101 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-785-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 19:15:55 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:21:31 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.601	659250	100.000	126663	2285	1.240	--
总计		659250	100.000	126663			


图102 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-786-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 19:18:48 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:21:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.602	660327	100.000	127379	2286	1.237	--
总计		660327	100.000	127379			


图103 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-787-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 19:21:40 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:21:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.602	661261	100.000	127460	2287	1.236	--
总计		661261	100.000	127460			


图104 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-788-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 19:24:32 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:21:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.602	661056	100.000	127530	2291	1.236	--
总计		661056	100.000	127530			


图105 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-789-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 19:27:25 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:21:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.602	661064	100.000	127609	2293	1.235	--
总计		661064	100.000	127609			


图106 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-790-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-1
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 19:30:17 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:21:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.602	296643	100.000	57488	2297	1.231	--
总计		296643	100.000	57488			


图107 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-791-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-10
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 19:33:09 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:21:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.602	301400	100.000	58145	2295	1.234	--
总计		301400	100.000	58145			


图108 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-792-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-19
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 19:36:01 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:21:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.602	274481	100.000	53102	2299	1.232	--
总计		274481	100.000	53102			


图109 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-793-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-28
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 19:38:52 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:21:54 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.602	298596	100.000	57884	2319	1.231	--
总计		298596	100.000	57884			

图110 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-794-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-37
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 19:41:44 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:21:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.603	282043	100.000	54651	2299	1.233	--
总计		282043	100.000	54651			

图111 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-795-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-46
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 19:44:36 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:21:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.603	306151	100.000	59265	2298	1.233	--
总计		306151	100.000	59265			

图112 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-796-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-2
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 19:47:28 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:22:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.603	567537	100.000	109780	2300	1.235	--
总计		567537	100.000	109780			


图113 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-797-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-11
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 19:50:20 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:22:05 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.601	580883	100.000	111790	2294	1.237	--
总计		580883	100.000	111790			


图114 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-798-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-20
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 19:53:11 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:22:08 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.603	534057	100.000	103253	2297	1.235	--
总计		534057	100.000	103253			

图115 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-799-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-29
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 19:56:03 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:22:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.603	565840	100.000	109392	2296	1.236	--
总计		565840	100.000	109392			


图116 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-800-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-38
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 19:58:55 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:22:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.604	536415	100.000	103901	2296	1.235	--
总计		536415	100.000	103901			

图117 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-801-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-47
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 20:01:46 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:22:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.603	581207	100.000	112390	2299	1.235	--
总计		581207	100.000	112390			

图118 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-802-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-3
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 20:04:37 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:22:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.603	716093	100.000	138348	2296	1.237	--
总计		716093	100.000	138348			


图119 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-803-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-12
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 20:07:29 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:22:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.603	737015	100.000	142248	2291	1.237	--
总计		737015	100.000	142248			


图120 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-804-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-21
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 20:10:20 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:22:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.604	686921	100.000	133043	2298	1.236	--
总计		686921	100.000	133043			

图121 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-805-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-30
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 20:13:12 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:22:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.604	723122	100.000	140010	2295	1.237	--
总计		723122	100.000	140010			

图122 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-806-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-39
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 20:16:03 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:22:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.604	697987	100.000	135279	2298	1.236	--
总计		697987	100.000	135279			


图123 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-807-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-48
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 20:18:54 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:22:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.604	732000	100.000	141600	2293	1.236	--
总计		732000	100.000	141600			


图124 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-808-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-4
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 20:21:46 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:22:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	752055	100.000	145555	2295	1.237	--
总计		752055	100.000	145555			


图125 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-809-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-13
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 20:24:37 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:22:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	763576	100.000	147844	2294	1.237	--
总计		763576	100.000	147844			


图126 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-810-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-22
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 20:27:29 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:22:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.604	742135	100.000	143679	2295	1.237	--
总计		742135	100.000	143679			


图127 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-811-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-31
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 20:30:20 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:22:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	766127	100.000	148275	2295	1.237	--
总计		766127	100.000	148275			


图128 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-812-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-40
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 20:33:12 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:22:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	750710	100.000	145188	2292	1.237	--
总计		750710	100.000	145188			


图129 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-813-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-49
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 20:36:03 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:22:49 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	765158	100.000	148363	2301	1.237	--
总计		765158	100.000	148363			

图130 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-814-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-5
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 20:38:54 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:22:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	747331	100.000	144715	2298	1.237	--
总计		747331	100.000	144715			


图131 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-815-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-14
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 20:41:45 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:22:54 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	767076	100.000	148450	2298	1.238	--
总计		767076	100.000	148450			


图132 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-816-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-23
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 20:44:36 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:22:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	746970	100.000	144437	2298	1.238	--
总计		746970	100.000	144437			


图133 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-817-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-32
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 20:47:27 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:23:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.605	765966	100.000	148210	2299	1.238	--
总计		765966	100.000	148210			

图134 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-818-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-41
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 20:50:19 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:23:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	745893	100.000	144292	2299	1.237	--
总计		745893	100.000	144292			


图135 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-819-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-50
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 20:53:10 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:23:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	763102	100.000	147607	2299	1.238	--
总计		763102	100.000	147607			


图136 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-820-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-6
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 20:56:01 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:23:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	745031	100.000	144153	2301	1.238	--
总计		745031	100.000	144153			


图137 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-821-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-15
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 20:58:53 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:23:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	767419	100.000	148544	2297	1.238	--
总计		767419	100.000	148544			

图138 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-822-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-24
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 21:01:44 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:23:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	745052	100.000	143888	2301	1.238	--
总计		745052	100.000	143888			

图139 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-823-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-33
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 21:04:36 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:23:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	763912	100.000	147288	2301	1.239	--
总计		763912	100.000	147288			

图140 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-824-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-42
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 21:07:27 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:23:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.608	744904	100.000	143970	2311	1.237	--
总计		744904	100.000	143970			


图141 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-825-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-51
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 21:10:18 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:23:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.606	762843	100.000	147713	2302	1.238	--
总计		762843	100.000	147713			


图142 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-826-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-7
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 21:13:09 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:23:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	750441	100.000	144930	2296	1.238	--
总计		750441	100.000	144930			


图143 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-827-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-16
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 21:16:01 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:23:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.608	769452	100.000	148408	2303	1.239	--
总计		769452	100.000	148408			


图144 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-828-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-25
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 21:18:52 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:23:31 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	748394	100.000	144839	2304	1.238	--
总计		748394	100.000	144839			


图145 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-829-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-34
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 21:21:43 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:23:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.607	758897	100.000	146607	2303	1.238	--
总计		758897	100.000	146607			


图146 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-830-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-43
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 21:24:34 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:23:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.608	743315	100.000	143347	2304	1.239	--
总计		743315	100.000	143347			


图147 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-831-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-52
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 21:27:24 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:23:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.608	765236	100.000	147366	2303	1.239	--
总计		765236	100.000	147366			


图148 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-832-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-27
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 21:30:17 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:23:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.611	653782	100.000	125951	2307	1.236	--
总计		653782	100.000	125951			

图149 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-833-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 3-27
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 21:33:09 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:23:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.611	652699	100.000	126209	2309	1.233	--
总计		652699	100.000	126209			


图150 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-834-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-9
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 21:36:02 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:23:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图151 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-835-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 21:38:56 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:23:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	658607	100.000	111554	1668	1.252	--
总计		658607	100.000	111554			


图152 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-836-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 21:41:49 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:23:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	658881	100.000	111381	1669	1.251	--
总计		658881	100.000	111381			


图153 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-837-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 21:44:43 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:23:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	658076	100.000	111226	1668	1.252	--
总计		658076	100.000	111226			


图154 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-838-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 21:47:37 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:23:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	657559	100.000	111284	1668	1.252	--
总计		657559	100.000	111284			


图155 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-839-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 21:50:30 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:24:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	658102	100.000	111277	1669	1.252	--
总计		658102	100.000	111277			


图156 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-840-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-1
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 21:53:22 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:24:05 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.617	260845	100.000	50526	2352	1.230	--
总计		260845	100.000	50526			


图157 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-841-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-10
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 21:56:14 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:24:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	236863	100.000	45942	2353	1.230	--
总计		236863	100.000	45942			

图158 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-842-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-19
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 21:59:06 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:24:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.616	272440	100.000	52961	2355	1.232	--
总计		272440	100.000	52961			


图159 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-843-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-28
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 22:01:58 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:24:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.617	288837	100.000	55754	2353	1.233	--
总计		288837	100.000	55754			


图160 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-844-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-37
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 22:04:50 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:24:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.619	269475	100.000	52283	2357	1.229	--
总计		269475	100.000	52283			


图161 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-845-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-46
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 22:07:42 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:24:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.619	272261	100.000	52645	2357	1.232	--
总计		272261	100.000	52645			

图162 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-846-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-2
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 22:10:34 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:24:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.618	518987	100.000	100243	2354	1.234	--
总计		518987	100.000	100243			


图163 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-847-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-11
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 22:13:27 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:24:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.619	485016	100.000	93929	2356	1.233	--
总计		485016	100.000	93929			


图164 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-848-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-20
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 22:16:19 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:24:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.619	525536	100.000	101524	2352	1.234	--
总计		525536	100.000	101524			


图165 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-849-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-29
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 22:19:11 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:24:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.619	560927	100.000	108344	2349	1.234	--
总计		560927	100.000	108344			


图166 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-850-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-38
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 22:22:03 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:24:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.619	520737	100.000	100711	2354	1.233	--
总计		520737	100.000	100711			


图167 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-851-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-47
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 22:24:56 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:24:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.620	528692	100.000	102306	2351	1.234	--
总计		528692	100.000	102306			


图168 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-852-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-3
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 22:27:48 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:24:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.618	686148	100.000	131967	2342	1.238	--
总计		686148	100.000	131967			


图169 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-853-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-12
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 22:30:41 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:24:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.617	647226	100.000	124675	2347	1.238	--
总计		647226	100.000	124675			

图170 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-854-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-21
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 22:33:33 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:24:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.619	687344	100.000	132632	2345	1.236	--
总计		687344	100.000	132632			


图171 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-855-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-30
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 22:36:26 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:24:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.620	715337	100.000	138260	2349	1.236	--
总计		715337	100.000	138260			


图172 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-856-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-39
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 22:39:18 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:24:49 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.621	678437	100.000	131310	2354	1.235	--
总计		678437	100.000	131310			

图173 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-857-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-48
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 22:42:11 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:24:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.621	695647	100.000	134813	2353	1.235	--
总计		695647	100.000	134813			


图174 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-858-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-4
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 22:45:04 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:24:54 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.619	753921	100.000	145759	2350	1.237	--
总计		753921	100.000	145759			

图175 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-859-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-13
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 22:47:57 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:24:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.621	739810	100.000	143326	2352	1.237	--
总计		739810	100.000	143326			

图176 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-860-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-22
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 22:50:50 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:25:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.621	751921	100.000	145455	2351	1.237	--
总计		751921	100.000	145455			


图177 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-861-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-31
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 22:53:43 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:25:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.621	753973	100.000	145891	2351	1.237	--
总计		753973	100.000	145891			


图178 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-862-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-40
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 22:56:36 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:25:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.621	752151	100.000	145676	2354	1.238	--
总计		752151	100.000	145676			


图179 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-863-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-49
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 22:59:30 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:25:08 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.621	780752	100.000	151214	2350	1.237	--
总计		780752	100.000	151214			


图180 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-864-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-5
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 23:02:24 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:25:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.621	754493	100.000	146197	2353	1.237	--
总计		754493	100.000	146197			


图181 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-865-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-14
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 23:05:17 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:25:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.622	752838	100.000	145744	2353	1.236	--
总计		752838	100.000	145744			

图182 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-866-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-23
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 23:08:10 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:25:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.622	752446	100.000	145633	2351	1.237	--
总计		752446	100.000	145633			


图183 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-867-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-32
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 23:11:03 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:25:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.622	749623	100.000	145120	2351	1.236	--
总计		749623	100.000	145120			

图184 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-868-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-41
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 23:13:56 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:25:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.622	757837	100.000	146708	2347	1.237	--
总计		757837	100.000	146708			

图185 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-869-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-50
 进样体积 : 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 23:16:49 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:25:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.622	785888	100.000	152237	2350	1.236	--
总计		785888	100.000	152237			


图186 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-870-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-6
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 23:19:43 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:25:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.624	753890	100.000	145445	2351	1.238	--
总计		753890	100.000	145445			


图187 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-871-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-15
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 23:22:36 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:25:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.623	752584	100.000	145417	2349	1.238	--
总计		752584	100.000	145417			


图188 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-872-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-24
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 23:25:29 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:25:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.625	749013	100.000	144431	2355	1.239	--
总计		749013	100.000	144431			


图189 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-873-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-33
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 23:28:24 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:25:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.625	750834	100.000	144525	2355	1.239	--
总计		750834	100.000	144525			


图190 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-874-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-42
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 23:31:18 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:25:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.625	754648	100.000	145118	2352	1.239	--
总计		754648	100.000	145118			


图191 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-875-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-51
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 23:34:11 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2) : 2024/06/25 09:25:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.625	784515	100.000	150787	2350	1.240	--
总计		784515	100.000	150787			


图192 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-876-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-7
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 23:37:05 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:25:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.624	752114	100.000	145208	2354	1.239	--
总计		752114	100.000	145208			


图193 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-877-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-16
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 23:39:59 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:25:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.625	749287	100.000	144068	2349	1.240	--
总计		749287	100.000	144068			


图194 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-878-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-25
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 23:42:53 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:25:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.625	749472	100.000	143907	2351	1.240	--
总计		749472	100.000	143907			


图195 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-879-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-34
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 23:45:46 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:25:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.627	746197	100.000	143183	2350	1.240	--
总计		746197	100.000	143183			


图196 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-880-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-43
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 23:48:39 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:25:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.625	749842	100.000	144193	2353	1.241	--
总计		749842	100.000	144193			


图197 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-881-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-52
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 23:51:32 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:25:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.625	782887	100.000	150217	2346	1.241	--
总计		782887	100.000	150217			


图198 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30 $^{\circ}$ C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-882-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-27
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 23:54:26 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:26:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.593	659564	100.000	110653	1676	1.255	--
总计		659564	100.000	110653			


图199 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
 柱 温 : 30°C 波 长: 247nm
 数据文件名: RC\$SMF-356 - 0-52/3-883-2 - zzp-24061701-2p-40mg-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-356 - SMF-356-20240624-FX253.lcb
 样品瓶号 : 4-27
 进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/24 23:57:20 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/06/25 09:26:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 247nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.593	658759	100.000	110754	1678	1.252	--
总计		658759	100.000	110754			

图200 氨溴酸替格列汀片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品24061701-2批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2