




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-663-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-rj.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-9
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 13:26:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:38:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-F56971批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-664-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 13:31:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:38:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.732	563827	100.000	89907	4413	1.007	--
总计		563827	100.000	89907			

图2 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-F56971批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-665-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 13:35:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:38:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.732	563886	100.000	89966	4416	1.008	--
总计		563886	100.000	89966			

图3 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-F56971批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-666-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 13:40:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:38:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.732	563898	100.000	89834	4400	1.008	--
总计		563898	100.000	89834			

图4 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-667-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 13:44:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:38:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.733	564061	100.000	89769	4402	1.008	--
总计		564061	100.000	89769			

图5 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-F56971批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-668-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 13:48:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:38:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.732	564130	100.000	89908	4409	1.009	--
总计		564130	100.000	89908			

图6 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-669-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-1
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 13:53:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:39:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	322472	100.000	55055	5162	0.984	--
总计		322472	100.000	55055			

图7 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-670-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-10
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 13:57:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:39:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	420803	100.000	71904	5172	0.985	--
总计		420803	100.000	71904			

图8 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-671-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-19
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 14:02:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:39:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	400959	100.000	68653	5182	0.986	--
总计		400959	100.000	68653			

图9 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-672-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-28
 进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 14:06:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:39:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	415292	100.000	71174	5193	0.987	--
总计		415292	100.000	71174			

图10 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-673-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-37
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 14:11:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:39:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	424242	100.000	72783	5205	0.987	--
总计		424242	100.000	72783			

图11 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-674-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-46
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 14:15:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:39:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	424196	100.000	72768	5204	0.988	--
总计		424196	100.000	72768			

图12 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-675-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-2
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 14:19:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:39:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	463484	100.000	79674	5229	0.989	--
总计		463484	100.000	79674			

图13 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-676-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-11
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 14:24:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:39:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	525915	100.000	90513	5242	0.988	--
总计		525915	100.000	90513			

图14 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-677-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-20
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 14:28:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:39:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	537335	100.000	92509	5246	0.989	--
总计		537335	100.000	92509			

图15 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-678-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-29
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 14:33:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:39:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	516914	100.000	89009	5249	0.989	--
总计		516914	100.000	89009			

图16 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-679-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-38
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 14:37:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:39:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	525073	100.000	90451	5249	0.990	--
总计		525073	100.000	90451			

图17 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-680-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-47
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 14:41:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:39:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	528040	100.000	90983	5253	0.990	--
总计		528040	100.000	90983			

图18 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-681-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-3
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 14:46:24 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:39:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	513057	100.000	88411	5252	0.991	--
总计		513057	100.000	88411			

图19 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-682-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-12
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 14:50:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:39:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.754	558098	100.000	96193	5248	0.990	--
总计		558098	100.000	96193			

图20 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-683-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-21
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 14:55:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:39:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	576795	100.000	99535	5258	0.991	--
总计		576795	100.000	99535			

图21 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-684-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-30
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 14:59:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:39:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	540371	100.000	93186	5257	0.991	--
总计		540371	100.000	93186			

图22 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-685-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-39
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 15:04:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:39:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	554778	100.000	95943	5283	0.990	--
总计		554778	100.000	95943			

图23 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-686-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-48
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 15:08:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:39:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	554145	100.000	95843	5288	0.991	--
总计		554145	100.000	95843			

图24 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-687-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-4
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 15:12:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:39:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.754	540090	100.000	93459	5296	0.992	--
总计		540090	100.000	93459			

图25 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-688-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-13
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 15:17:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:39:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	576224	100.000	99735	5297	0.991	--
总计		576224	100.000	99735			

图26 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-689-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-22
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 15:21:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:39:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	590490	100.000	102139	5290	0.992	--
总计		590490	100.000	102139			

图27 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-690-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-31
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 15:26:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:40:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	552286	100.000	95666	5306	0.993	--
总计		552286	100.000	95666			

图28 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-691-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-40
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 15:30:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:40:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	566458	100.000	98160	5312	0.992	--
总计		566458	100.000	98160			

图29 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-692-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-49
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 15:35:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:40:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	567082	100.000	98391	5324	0.994	--
总计		567082	100.000	98391			

图30 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-693-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-5
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 15:39:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:40:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	568418	100.000	98599	5319	0.994	--
总计		568418	100.000	98599			

图31 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-694-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-14
 进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 15:43:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:40:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	592738	100.000	102841	5323	0.995	--
总计		592738	100.000	102841			

图32 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-695-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-23
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 15:48:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:40:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	598896	100.000	104078	5338	0.994	--
总计		598896	100.000	104078			

图33 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-696-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-32
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 15:52:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:40:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	567329	100.000	98469	5319	0.995	--
总计		567329	100.000	98469			

图34 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-697-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-41
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 15:57:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:40:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	579237	100.000	100586	5324	0.995	--
总计		579237	100.000	100586			

图35 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-698-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-50
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 16:01:38 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:40:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	577507	100.000	100323	5330	0.996	--
总计		577507	100.000	100323			

图36 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-699-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-6
 进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 16:06:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:40:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	595712	100.000	103371	5314	0.994	--
总计		595712	100.000	103371			

图37 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-700-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-15
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 16:10:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:40:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	601394	100.000	104303	5307	0.994	--
总计		601394	100.000	104303			

图38 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-701-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-24
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 16:14:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:40:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	604386	100.000	104879	5314	0.993	--
总计		604386	100.000	104879			

图39 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-702-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-33
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 16:19:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:40:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	576761	100.000	100181	5322	0.994	--
总计		576761	100.000	100181			

图40 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-703-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-42
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 16:23:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:40:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.753	587048	100.000	101952	5328	0.993	--
总计		587048	100.000	101952			

图41 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-704-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-51
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 16:28:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:40:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	584300	100.000	101414	5321	0.993	--
总计		584300	100.000	101414			

图42 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-705-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-7
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 16:32:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:40:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	599500	100.000	104094	5344	0.995	--
总计		599500	100.000	104094			

图43 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-706-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-16
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 16:37:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:40:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	604802	100.000	105172	5333	0.995	--
总计		604802	100.000	105172			

图44 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-707-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-25
 进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 16:41:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:40:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.754	605710	100.000	105208	5317	0.994	--
总计		605710	100.000	105208			

图45 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-708-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-34
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 16:45:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:40:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.754	581295	100.000	101038	5334	0.995	--
总计		581295	100.000	101038			

图46 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-709-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-43
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 16:50:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:40:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.753	593627	100.000	103066	5325	0.994	--
总计		593627	100.000	103066			

图47 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-710-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-52
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 16:54:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:40:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.754	588167	100.000	102219	5328	0.994	--
总计		588167	100.000	102219			

图48 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-711-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-8
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 16:59:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:41:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.754	603017	100.000	104877	5344	0.993	--
总计		603017	100.000	104877			

图49 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-712-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-17
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 17:03:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:41:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.754	620033	100.000	107918	5351	0.994	--
总计		620033	100.000	107918			

图50 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-F56971批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-713-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-26
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 17:08:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:41:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	614706	100.000	107188	5376	0.993	--
总计		614706	100.000	107188			

图51 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-714-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-35
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 17:12:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:41:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	608631	100.000	105911	5342	0.994	--
总计		608631	100.000	105911			

图52 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-715-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-44
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 17:16:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:41:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	601600	100.000	104715	5349	0.995	--
总计		601600	100.000	104715			

图53 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-716-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-53
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 17:21:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:41:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	613690	100.000	106839	5354	0.996	--
总计		613690	100.000	106839			

图54 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-F56971批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-717-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 2-27
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 17:25:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:41:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.733	563586	100.000	91503	4576	1.017	--
总计		563586	100.000	91503			

图55 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-F56971批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱	: LP-C8(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 224nm
数据文件名	: RC\$SMF-4033 - 0-46/30-718-2 - cbzj-F56971p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb		
样品瓶号	: 2-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 40 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/18 17:30:11	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/20 09:41:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX279)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.733	563257	100.000	91434	4576	1.018	--
总计		563257	100.000	91434			

图56 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-F56971批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-719-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-rj.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-9
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 17:34:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:41:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-720-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 17:38:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:41:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.733	564991	100.000	91728	4576	1.019	--
总计		564991	100.000	91728			

图58 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-721-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 17:43:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:41:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.733	564422	100.000	91639	4579	1.019	--
总计		564422	100.000	91639			

图59 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-722-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 17:47:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:41:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.732	564605	100.000	91691	4573	1.019	--
总计		564605	100.000	91691			

图60 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-723-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 17:52:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:41:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.733	564503	100.000	91597	4572	1.020	--
总计		564503	100.000	91597			

图61 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-724-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 17:56:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:41:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.733	563932	100.000	91415	4566	1.018	--
总计		563932	100.000	91415			

图62 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-725-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-1
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 18:00:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:41:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	464004	100.000	80663	5352	0.994	--
总计		464004	100.000	80663			

图63 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052811批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-726-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-10
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 18:05:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:41:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	441077	100.000	76607	5336	0.996	--
总计		441077	100.000	76607			

图64 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052811批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-727-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-19
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 18:09:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:41:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	460626	100.000	79961	5342	0.995	--
总计		460626	100.000	79961			

图65 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-728-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-28
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 18:14:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:41:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	443153	100.000	76893	5339	0.996	--
总计		443153	100.000	76893			

图66 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052811批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-729-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-37
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 18:18:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:41:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	431509	100.000	75080	5353	0.996	--
总计		431509	100.000	75080			

图67 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-730-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-46
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 18:22:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:41:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	460643	100.000	80412	5382	0.996	--
总计		460643	100.000	80412			

图68 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-731-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-2
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 18:27:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:41:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	575003	100.000	100210	5361	0.997	--
总计		575003	100.000	100210			

图69 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-732-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-11
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 18:31:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:42:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	554251	100.000	96512	5365	0.996	--
总计		554251	100.000	96512			

图70 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-733-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-20
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 18:36:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:42:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	575027	100.000	100299	5377	0.997	--
总计		575027	100.000	100299			

图71 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-734-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-29
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 18:40:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:42:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	558265	100.000	97268	5360	0.997	--
总计		558265	100.000	97268			

图72 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-735-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-38
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 18:44:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:42:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	561089	100.000	97760	5356	0.998	--
总计		561089	100.000	97760			

图73 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-736-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-47
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 18:49:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:42:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	567269	100.000	98969	5364	1.000	--
总计		567269	100.000	98969			

图74 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-737-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-3
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 18:53:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:42:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	596888	100.000	104205	5377	0.999	--
总计		596888	100.000	104205			

图75 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-738-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-12
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 18:58:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:42:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	585482	100.000	102091	5362	0.999	--
总计		585482	100.000	102091			

图76 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-739-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-21
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 19:02:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:42:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	598650	100.000	104397	5377	0.998	--
总计		598650	100.000	104397			

图77 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-740-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-30
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 19:06:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:42:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	587422	100.000	102526	5395	0.998	--
总计		587422	100.000	102526			

图78 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-741-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-39
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 19:11:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:42:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	595144	100.000	103667	5373	0.999	--
总计		595144	100.000	103667			

图79 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-742-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-48
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 19:15:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:42:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	593989	100.000	103542	5368	0.999	--
总计		593989	100.000	103542			

图80 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-743-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-4
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 19:20:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:42:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	602967	100.000	105228	5375	0.999	--
总计		602967	100.000	105228			

图81 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: LP-C8(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 224nm
数据文件名	: RC\$SMF-4033 - 0-46/30-744-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb		
样品瓶号	: 3-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 40 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/18 19:24:28	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/20 09:42:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX279)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	598104	100.000	104255	5371	0.998	--
总计		598104	100.000	104255			

图82 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-745-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-22
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 19:45:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:42:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.743	603168	100.000	104501	5289	1.049	--
总计		603168	100.000	104501			

图83 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-746-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-31
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 19:49:24 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:42:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.744	595559	100.000	103353	5287	1.053	--
总计		595559	100.000	103353			

图84 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-747-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-40
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 19:53:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:42:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.744	605569	100.000	105320	5307	1.054	--
总计		605569	100.000	105320			

图85 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-748-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-49
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 19:58:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:42:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.747	601905	100.000	104908	5309	1.056	--
总计		601905	100.000	104908			

图86 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-749-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-5
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 20:02:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:42:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.747	605792	100.000	105474	5305	1.057	--
总计		605792	100.000	105474			

图87 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-750-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-14
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 20:06:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:42:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.748	611887	100.000	106493	5302	1.059	--
总计		611887	100.000	106493			

图88 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-751-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-23
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 20:11:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:42:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.747	607811	100.000	106036	5322	1.059	--
总计		607811	100.000	106036			

图89 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-752-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-32
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 20:15:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:42:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.747	603430	100.000	105405	5333	1.059	--
总计		603430	100.000	105405			

图90 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-753-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-41
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 20:20:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:43:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.748	613429	100.000	107005	5339	1.059	--
总计		613429	100.000	107005			

图91 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-754-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-50
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 20:24:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:43:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.749	608776	100.000	105964	5318	1.060	--
总计		608776	100.000	105964			

图92 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-755-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-6
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 20:28:51 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:43:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.748	605142	100.000	105497	5324	1.060	--
总计		605142	100.000	105497			

图93 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-756-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-15
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 20:33:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:43:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.749	618128	100.000	107868	5346	1.060	--
总计		618128	100.000	107868			

图94 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-757-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-24
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 20:37:38 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:43:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.749	611712	100.000	106973	5364	1.059	--
总计		611712	100.000	106973			

图95 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052811批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-758-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-33
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 20:42:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:43:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.749	609315	100.000	106552	5376	1.060	--
总计		609315	100.000	106552			

图96 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-759-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-42
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 20:46:24 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:43:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.749	615506	100.000	107715	5377	1.060	--
总计		615506	100.000	107715			

图97 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-760-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-51
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 20:50:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:43:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.748	610163	100.000	106939	5383	1.058	--
总计		610163	100.000	106939			

图98 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-761-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-7
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 20:55:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:43:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.749	608590	100.000	106554	5391	1.059	--
总计		608590	100.000	106554			

图99 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-762-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-16
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 20:59:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:43:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.749	621074	100.000	108869	5403	1.060	--
总计		621074	100.000	108869			

图100 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-763-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-25
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 21:03:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:43:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.750	613320	100.000	107369	5411	1.060	--
总计		613320	100.000	107369			

图101 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-764-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-34
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 21:08:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:43:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.749	611019	100.000	107317	5433	1.059	--
总计		611019	100.000	107317			

图102 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-765-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-43
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 21:12:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:43:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.750	616505	100.000	108093	5429	1.058	--
总计		616505	100.000	108093			

图103 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-766-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-52
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 21:17:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:43:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.750	610667	100.000	107271	5442	1.057	--
总计		610667	100.000	107271			

图104 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-767-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-8
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 21:21:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:43:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.750	620037	100.000	108722	5446	1.057	--
总计		620037	100.000	108722			

图105 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-768-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-17
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 21:25:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:43:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	630061	100.000	110676	5456	1.057	--
总计		630061	100.000	110676			

图106 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-769-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-26
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 21:30:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:43:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.751	622041	100.000	109202	5455	1.056	--
总计		622041	100.000	109202			

图107 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-770-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-35
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 21:34:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:43:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	618903	100.000	108769	5451	1.056	--
总计		618903	100.000	108769			

图108 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-771-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-44
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 21:39:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:43:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.751	620364	100.000	108826	5459	1.056	--
总计		620364	100.000	108826			

图109 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-772-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-53
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 21:43:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:43:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.751	618714	100.000	108605	5463	1.056	--
总计		618714	100.000	108605			

图110 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-773-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-27
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 21:47:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:43:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.727	565088	100.000	92792	4653	1.069	--
总计		565088	100.000	92792			

图111 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-774-2 - zzp-2024052811p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 3-27
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 21:52:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:44:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.728	565134	100.000	92939	4661	1.068	--
总计		565134	100.000	92939			

图112 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052811批-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-775-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-rj.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-9
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 21:56:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:44:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转
 溶剂

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-776-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 22:01:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:44:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.728	562937	100.000	92641	4661	1.068	--
总计		562937	100.000	92641			

图114 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-777-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 22:05:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:44:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.728	563161	100.000	92679	4663	1.068	--
总计		563161	100.000	92679			

图115 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-778-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 22:10:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:44:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.728	563373	100.000	92636	4656	1.068	--
总计		563373	100.000	92636			

图116 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-779-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 22:14:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:44:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.728	563066	100.000	92612	4660	1.068	--
总计		563066	100.000	92612			

图117 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-780-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 22:18:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:44:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.728	562956	100.000	92637	4658	1.069	--
总计		562956	100.000	92637			

图118 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-781-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-1
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 22:23:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:44:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	400044	100.000	70450	5478	1.054	--
总计		400044	100.000	70450			

图119 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052911批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-782-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-10
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 22:27:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:44:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	449013	100.000	79088	5478	1.054	--
总计		449013	100.000	79088			

图120 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-783-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-19
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 22:32:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:44:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.751	416486	100.000	73274	5480	1.055	--
总计		416486	100.000	73274			

图121 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-784-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-28
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 22:36:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:44:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.751	425093	100.000	74881	5485	1.054	--
总计		425093	100.000	74881			

图122 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-785-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-37
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 22:40:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:44:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	402209	100.000	70990	5493	1.054	--
总计		402209	100.000	70990			

图123 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052911批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-786-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-46
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 22:45:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:44:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.753	409623	100.000	72297	5484	1.054	--
总计		409623	100.000	72297			

图124 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-787-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-2
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 22:49:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:44:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.751	536051	100.000	94298	5488	1.054	--
总计		536051	100.000	94298			

图125 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-788-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-11
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 22:54:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:44:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.751	559956	100.000	98711	5496	1.053	--
总计		559956	100.000	98711			

图126 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-789-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-20
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 22:58:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:44:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	545213	100.000	96127	5492	1.053	--
总计		545213	100.000	96127			

图127 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-790-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-29
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 23:02:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:44:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.751	558564	100.000	98516	5508	1.053	--
总计		558564	100.000	98516			

图128 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-791-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-38
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 23:07:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:44:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.751	531665	100.000	93781	5506	1.053	--
总计		531665	100.000	93781			

图129 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-792-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-47
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 23:11:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:44:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	541225	100.000	95571	5511	1.053	--
总计		541225	100.000	95571			

图130 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-793-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-3
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 23:16:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:44:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	568001	100.000	100416	5520	1.052	--
总计		568001	100.000	100416			

图131 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-794-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-12
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 23:20:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:44:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	579524	100.000	102404	5522	1.053	--
总计		579524	100.000	102404			

图132 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-795-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-21
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 23:24:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:44:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	577014	100.000	101986	5522	1.054	--
总计		577014	100.000	101986			

图133 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-796-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-30
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 23:29:24 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:45:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.751	594770	100.000	105160	5532	1.053	--
总计		594770	100.000	105160			

图134 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-797-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-39
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 23:33:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:45:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	566311	100.000	100221	5536	1.053	--
总计		566311	100.000	100221			

图135 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-798-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-48
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 23:38:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:45:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	569334	100.000	100720	5539	1.052	--
总计		569334	100.000	100720			

图136 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-799-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-4
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 23:42:38 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:45:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.751	575701	100.000	101778	5541	1.053	--
总计		575701	100.000	101778			

图137 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-800-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-13
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 23:47:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:45:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.753	584691	100.000	103726	5536	1.051	--
总计		584691	100.000	103726			

图138 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-801-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-22
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 23:51:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:45:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	588414	100.000	104270	5542	1.052	--
总计		588414	100.000	104270			

图139 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-802-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-31
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/18 23:55:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:45:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	606020	100.000	107278	5537	1.052	--
总计		606020	100.000	107278			

图140 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-803-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-40
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 00:00:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:45:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	580785	100.000	103087	5561	1.052	--
总计		580785	100.000	103087			

图141 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-804-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-49
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 00:04:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:45:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	577347	100.000	102496	5574	1.052	--
总计		577347	100.000	102496			

图142 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-805-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-5
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 00:09:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:45:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	580723	100.000	103143	5573	1.052	--
总计		580723	100.000	103143			

图143 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-806-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-14
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 00:13:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:45:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	590862	100.000	105067	5581	1.051	--
总计		590862	100.000	105067			

图144 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-807-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-23
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 00:17:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:45:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	612071	100.000	108759	5586	1.052	--
总计		612071	100.000	108759			

图145 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-808-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-32
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 00:22:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:45:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.751	610846	100.000	108415	5579	1.052	--
总计		610846	100.000	108415			

图146 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-809-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-41
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 00:26:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:45:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	594831	100.000	105683	5589	1.052	--
总计		594831	100.000	105683			

图147 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-810-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-50
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 00:31:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:45:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.752	591285	100.000	105065	5584	1.051	--
总计		591285	100.000	105065			

图148 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-811-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-6
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 00:35:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:45:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.753	584503	100.000	104162	5591	1.050	--
总计		584503	100.000	104162			

图149 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-812-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-15
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 00:40:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:45:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.753	594912	100.000	105940	5594	1.050	--
总计		594912	100.000	105940			

图150 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-813-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-24
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 00:44:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:45:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.753	605215	100.000	107791	5590	1.050	--
总计		605215	100.000	107791			

图151 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-814-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-33
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 00:48:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:45:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.753	614003	100.000	109497	5598	1.050	--
总计		614003	100.000	109497			

图152 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-815-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-42
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 00:53:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:45:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.753	601637	100.000	107291	5599	1.050	--
总计		601637	100.000	107291			

图153 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-816-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-51
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 00:57:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:45:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.754	603392	100.000	107630	5597	1.050	--
总计		603392	100.000	107630			

图154 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-817-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-7
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 01:02:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:46:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.753	586026	100.000	104510	5599	1.050	--
总计		586026	100.000	104510			

图155 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-818-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-16
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 01:06:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:46:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.753	598137	100.000	106750	5612	1.049	--
总计		598137	100.000	106750			

图156 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-819-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-25
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 01:10:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:46:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.754	607687	100.000	108570	5618	1.049	--
总计		607687	100.000	108570			

图157 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-820-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-34
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 01:15:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:46:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.754	613927	100.000	109716	5615	1.050	--
总计		613927	100.000	109716			

图158 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-821-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-43
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 01:19:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:46:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.754	604668	100.000	107968	5604	1.049	--
总计		604668	100.000	107968			

图159 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-822-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-52
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 01:24:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:46:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	609230	100.000	108842	5612	1.049	--
总计		609230	100.000	108842			

图160 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-823-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-8
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 01:28:38 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:46:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.754	623122	100.000	111307	5611	1.048	--
总计		623122	100.000	111307			

图161 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-824-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-17
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 01:33:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:46:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.754	622300	100.000	111221	5617	1.048	--
总计		622300	100.000	111221			

图162 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-825-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-26
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 01:37:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:46:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.754	620159	100.000	110774	5615	1.048	--
总计		620159	100.000	110774			

图163 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-826-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-35
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 01:41:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:46:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.754	614064	100.000	109739	5621	1.047	--
总计		614064	100.000	109739			

图164 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-827-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-44
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 01:46:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:46:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	626664	100.000	112052	5622	1.047	--
总计		626664	100.000	112052			

图165 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-828-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-53
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 01:50:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:46:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.755	624030	100.000	111549	5612	1.047	--
总计		624030	100.000	111549			

图166 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-829-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-27
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 01:55:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:46:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.732	565950	100.000	94221	4778	1.061	--
总计		565950	100.000	94221			

图167 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-830-2 - zzp-2024052911p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 4-27
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 01:59:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:46:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.732	566053	100.000	94147	4781	1.060	--
总计		566053	100.000	94147			

图168 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024052911批-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-831-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-rj.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-9
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 02:04:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:46:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转
 溶剂




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-832-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 02:08:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:46:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.733	564670	100.000	93759	4778	1.060	--
总计		564670	100.000	93759			

图170 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-833-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 02:12:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:46:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.733	564778	100.000	93787	4780	1.060	--
总计		564778	100.000	93787			

图171 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-834-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 02:17:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:46:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.732	564776	100.000	93937	4772	1.060	--
总计		564776	100.000	93937			

图172 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-835-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 02:21:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:46:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.732	564753	100.000	93830	4773	1.060	--
总计		564753	100.000	93830			

图173 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-836-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 02:26:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:46:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.733	564864	100.000	93841	4775	1.060	--
总计		564864	100.000	93841			

图174 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-837-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-1
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 02:30:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:46:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	417991	100.000	74546	5597	1.044	--
总计		417991	100.000	74546			

图175 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-838-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-10
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 02:34:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:47:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	370628	100.000	66161	5612	1.046	--
总计		370628	100.000	66161			

图176 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-839-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-19
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 02:39:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:47:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	406066	100.000	72412	5618	1.045	--
总计		406066	100.000	72412			

图177 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-840-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-28
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 02:43:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:47:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	449897	100.000	80218	5599	1.044	--
总计		449897	100.000	80218			

图178 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-841-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-37
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 02:48:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:47:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	399835	100.000	71223	5603	1.045	--
总计		399835	100.000	71223			

图179 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-842-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-46
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 02:52:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:47:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	439208	100.000	78283	5609	1.045	--
总计		439208	100.000	78283			

图180 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-843-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-2
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 02:56:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:47:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	556537	100.000	99145	5610	1.044	--
总计		556537	100.000	99145			

图181 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-844-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-11
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 03:01:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:47:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	510480	100.000	91039	5616	1.043	--
总计		510480	100.000	91039			

图182 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-845-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-20
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 03:05:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:47:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	512868	100.000	91414	5622	1.043	--
总计		512868	100.000	91414			

图183 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-846-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-29
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 03:10:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:47:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	543291	100.000	96918	5619	1.044	--
总计		543291	100.000	96918			

图184 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-847-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-38
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 03:14:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:47:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	533038	100.000	95231	5620	1.044	--
总计		533038	100.000	95231			

图185 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-848-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-47
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 03:18:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:47:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	540618	100.000	96419	5610	1.045	--
总计		540618	100.000	96419			

图186 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-849-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-3
 进样体积 : 40 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 03:23:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:47:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	595068	100.000	106168	5619	1.044	--
总计		595068	100.000	106168			

图187 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-850-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-12
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 03:27:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:47:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	542243	100.000	96627	5584	1.044	--
总计		542243	100.000	96627			

图188 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-851-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-21
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 03:32:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:47:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	542862	100.000	96807	5607	1.044	--
总计		542862	100.000	96807			

图189 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-852-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-30
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 03:36:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:47:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	562390	100.000	100197	5598	1.043	--
总计		562390	100.000	100197			

图190 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-853-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-39
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 03:40:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:47:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	561781	100.000	100057	5607	1.044	--
总计		561781	100.000	100057			

图191 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-854-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-48
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 03:45:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:47:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	573921	100.000	102240	5592	1.044	--
总计		573921	100.000	102240			

图192 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-855-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-4
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 03:49:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:47:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	603546	100.000	107293	5589	1.044	--
总计		603546	100.000	107293			

图193 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-856-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-13
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 03:54:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:47:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	555718	100.000	99016	5604	1.044	--
总计		555718	100.000	99016			

图194 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-857-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-22
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 03:58:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:47:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	556424	100.000	99098	5602	1.044	--
总计		556424	100.000	99098			

图195 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-858-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-31
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 04:02:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:47:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	568510	100.000	101264	5601	1.043	--
总计		568510	100.000	101264			

图196 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-859-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-40
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 04:07:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:48:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	581714	100.000	103786	5618	1.043	--
总计		581714	100.000	103786			

图197 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-860-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-49
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 04:11:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:48:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	581486	100.000	103463	5594	1.043	--
总计		581486	100.000	103463			

图198 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-861-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-5
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 04:16:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:48:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	608063	100.000	108101	5592	1.042	--
总计		608063	100.000	108101			

图199 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-862-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-14
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 04:20:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:48:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	572293	100.000	101792	5597	1.042	--
总计		572293	100.000	101792			

图200 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-863-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-23
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 04:24:51 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:48:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	574288	100.000	102045	5587	1.042	--
总计		574288	100.000	102045			

图201 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-864-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-32
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 04:29:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:48:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	577763	100.000	102790	5619	1.043	--
总计		577763	100.000	102790			

图202 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-865-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-41
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 04:33:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:48:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	598113	100.000	106393	5620	1.043	--
总计		598113	100.000	106393			

图203 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-866-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-50
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 04:38:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:48:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	595199	100.000	105933	5620	1.043	--
总计		595199	100.000	105933			

图204 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-867-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-6
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 04:42:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:48:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	609038	100.000	108506	5632	1.042	--
总计		609038	100.000	108506			

图205 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-868-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-15
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 04:46:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:48:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	590207	100.000	104959	5621	1.043	--
总计		590207	100.000	104959			

图206 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-869-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-24
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 04:51:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:48:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	583218	100.000	103758	5626	1.043	--
总计		583218	100.000	103758			

图207 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-870-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-33
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 04:55:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:48:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	581531	100.000	103180	5620	1.043	--
总计		581531	100.000	103180			

图208 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-871-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-42
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 05:00:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:48:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	609638	100.000	108310	5624	1.042	--
总计		609638	100.000	108310			

图209 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-872-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-51
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 05:04:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:48:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	609533	100.000	108148	5617	1.043	--
总计		609533	100.000	108148			

图210 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-873-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-7
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 05:08:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:48:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	610423	100.000	108245	5610	1.042	--
总计		610423	100.000	108245			

图211 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-874-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-16
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 05:13:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:48:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	592299	100.000	105137	5606	1.041	--
总计		592299	100.000	105137			

图212 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-875-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-25
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 05:17:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:48:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	586703	100.000	104079	5608	1.041	--
总计		586703	100.000	104079			

图213 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: LP-C8(150mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 224nm
数据文件名	: RC\$SMF-4033 - 0-46/30-876-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb		
样品瓶号	: 1-34	版本号	: 6.115
进样体积	: 40 µl	实验者	: jiangjinwei
进样时间	: 2024/06/19 05:22:04	处理者	: jiangjinwei
处理时间(V2)	: 2024/06/20 09:48:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX279)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	588671	100.000	104414	5604	1.041	--
总计		588671	100.000	104414			

图214 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-877-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-43
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 05:26:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:48:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	611946	100.000	108584	5607	1.042	--
总计		611946	100.000	108584			

图215 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-878-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-52
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 05:30:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:48:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	612914	100.000	108643	5608	1.041	--
总计		612914	100.000	108643			

图216 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-879-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-8
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 05:35:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:48:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	610723	100.000	108289	5612	1.042	--
总计		610723	100.000	108289			

图217 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-880-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-17
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 05:39:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:48:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	610066	100.000	108118	5608	1.043	--
总计		610066	100.000	108118			

图218 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-881-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P3.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-26
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 05:44:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:49:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	615496	100.000	109171	5602	1.042	--
总计		615496	100.000	109171			

图219 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-882-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P4.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-35
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 05:48:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:49:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.760	624877	100.000	111009	5614	1.043	--
总计		624877	100.000	111009			

图220 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-883-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P5.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-44
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 05:52:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:49:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	621977	100.000	110308	5611	1.043	--
总计		621977	100.000	110308			

图221 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




SMF-4033

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-884-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-JX-P6.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-53
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 05:57:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:49:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.760	625282	100.000	111018	5620	1.043	--
总计		625282	100.000	111018			

图222 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-885-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-27
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 06:01:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:49:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.737	566924	100.000	94216	4777	1.057	--
总计		566924	100.000	94216			

图223 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱温 : 40°C 波 长: 224nm
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-46/30-886-2 - zzp-2024053011p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-20240618-rcqx-FX279.lcb
 样品瓶号 : 1-27
 进样体积 : 40 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2024/06/19 06:06:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2) : 2024/06/20 09:49:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.737	566733	100.000	94185	4775	1.056	--
总计		566733	100.000	94185			

图224 恩格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024053011批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2