




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1073-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-9 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 11:09:40 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:34:37
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

图1 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 溶剂




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1074-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 11:13:32 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:34:41
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.682 | 238585 | 100.000 | 26887 | 2120 | 1.118 | -- |
| 总计 | | 238585 | 100.000 | 26887 | | | |

图2 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1075-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 11:17:26 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:34:44
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.685 | 238562 | 100.000 | 26903 | 2134 | 1.118 | -- |
| 总计 | | 238562 | 100.000 | 26903 | | | |

图3 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1076-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 11:21:19 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 09:34:47
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.688 | 238444 | 100.000 | 27221 | 2188 | 1.113 | -- |
| 总计 | | 238444 | 100.000 | 27221 | | | |

图4 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1077-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 11:25:11 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:34:50
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.689 | 238276 | 100.000 | 27172 | 2183 | 1.112 | -- |
| 总计 | | 238276 | 100.000 | 27172 | | | |

图5 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-4




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1078-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 11:29:05 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:34:53
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.691 | 238344 | 100.000 | 27104 | 2179 | 1.114 | -- |
| 总计 | | 238344 | 100.000 | 27104 | | | |

图6 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-5




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1079-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-1 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 11:32:57 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:34:55
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.703 | 283601 | 100.000 | 32577 | 2243 | 1.118 | -- |
| 总计 | | 283601 | 100.000 | 32577 | | | |

图7 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1080-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-10 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 11:36:50 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:34:58
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.704 | 275020 | 100.000 | 31533 | 2235 | 1.119 | -- |
| 总计 | | 275020 | 100.000 | 31533 | | | |

图8 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1081-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-19 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 11:40:43 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:35:01
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.705 | 281754 | 100.000 | 32194 | 2221 | 1.118 | -- |
| 总计 | | 281754 | 100.000 | 32194 | | | |

图9 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1082-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 11:44:34 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:35:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.707 | 271570 | 100.000 | 30945 | 2217 | 1.118 | -- |
| 总计 | | 271570 | 100.000 | 30945 | | | |

图10 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1083-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-37 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 11:48:26 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:35:07
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.708 | 275805 | 100.000 | 31466 | 2222 | 1.116 | -- |
| 总计 | | 275805 | 100.000 | 31466 | | | |

图11 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1084-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-46 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 11:52:19 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:35:10
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.710 | 279655 | 100.000 | 31993 | 2240 | 1.116 | -- |
| 总计 | | 279655 | 100.000 | 31993 | | | |

图12 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1085-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-2 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 11:56:11 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:35:12
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.711 | 280147 | 100.000 | 32166 | 2253 | 1.113 | -- |
| 总计 | | 280147 | 100.000 | 32166 | | | |

图13 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1086-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-11 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 12:00:03 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:35:15
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.713 | 275844 | 100.000 | 31491 | 2229 | 1.116 | -- |
| 总计 | | 275844 | 100.000 | 31491 | | | |

图14 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1087-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 12:03:55 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:35:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.714 | 284195 | 100.000 | 32438 | 2230 | 1.116 | -- |
| 总计 | | 284195 | 100.000 | 32438 | | | |

图15 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1088-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 12:07:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:35:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.716 | 273625 | 100.000 | 31323 | 2252 | 1.112 | -- |
| 总计 | | 273625 | 100.000 | 31323 | | | |

图16 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1089-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-38 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 12:11:40 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:35:23
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.718 | 277980 | 100.000 | 31782 | 2250 | 1.113 | -- |
| 总计 | | 277980 | 100.000 | 31782 | | | |

图17 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1090-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-47 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 12:15:34 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:35:26
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.720 | 280853 | 100.000 | 32134 | 2252 | 1.115 | -- |
| 总计 | | 280853 | 100.000 | 32134 | | | |

图18 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1091-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-3 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 12:19:26 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:35:29
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.722 | 278826 | 100.000 | 31841 | 2242 | 1.114 | -- |
| 总计 | | 278826 | 100.000 | 31841 | | | |

图19 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1092-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-12 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 12:23:19 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:35:31
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.723 | 274498 | 100.000 | 31281 | 2238 | 1.114 | -- |
| 总计 | | 274498 | 100.000 | 31281 | | | |

图20 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1093-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-21 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 12:27:11 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:35:34
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.725 | 283458 | 100.000 | 32257 | 2238 | 1.116 | -- |
| 总计 | | 283458 | 100.000 | 32257 | | | |

图21 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1094-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-30 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 12:31:03 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:35:37
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.727 | 273270 | 100.000 | 31111 | 2247 | 1.115 | -- |
| 总计 | | 273270 | 100.000 | 31111 | | | |

图22 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1095-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 12:34:55 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:35:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.729 | 276839 | 100.000 | 31576 | 2251 | 1.116 | -- |
| 总计 | | 276839 | 100.000 | 31576 | | | |

图23 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1096-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-48 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 12:38:48 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:35:42
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.731 | 280480 | 100.000 | 31963 | 2250 | 1.115 | -- |
| 总计 | | 280480 | 100.000 | 31963 | | | |

图24 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1097-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 12:42:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:35:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.734 | 277749 | 100.000 | 31810 | 2286 | 1.113 | -- |
| 总计 | | 277749 | 100.000 | 31810 | | | |

图25 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1098-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-13 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 12:46:34 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:35:48
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.736 | 275965 | 100.000 | 31611 | 2287 | 1.113 | -- |
| 总计 | | 275965 | 100.000 | 31611 | | | |

图26 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1099-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 12:50:26 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:35:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.738 | 282885 | 100.000 | 32405 | 2286 | 1.113 | -- |
| 总计 | | 282885 | 100.000 | 32405 | | | |

图27 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1100-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-31 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 12:54:19 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:35:53
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.739 | 274270 | 100.000 | 31486 | 2299 | 1.112 | -- |
| 总计 | | 274270 | 100.000 | 31486 | | | |

图28 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1101-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 12:58:12 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:35:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.741 | 277053 | 100.000 | 31722 | 2294 | 1.112 | -- |
| 总计 | | 277053 | 100.000 | 31722 | | | |

图29 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1103-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-5 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 13:05:58 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:36:02
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.746 | 278464 | 100.000 | 31994 | 2313 | 1.111 | -- |
| 总计 | | 278464 | 100.000 | 31994 | | | |

图31 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1104-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-14 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 13:09:50 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:36:04
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.747 | 273118 | 100.000 | 31369 | 2313 | 1.110 | -- |
| 总计 | | 273118 | 100.000 | 31369 | | | |

图32 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1105-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 13:13:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:36:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.749 | 280716 | 100.000 | 32246 | 2320 | 1.109 | -- |
| 总计 | | 280716 | 100.000 | 32246 | | | |

图33 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1106-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-32 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 13:17:36 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:36:10
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.751 | 271659 | 100.000 | 31107 | 2317 | 1.111 | -- |
| 总计 | | 271659 | 100.000 | 31107 | | | |

图34 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1107-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-41 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 13:21:31 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:36:13
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.753 | 275674 | 100.000 | 31607 | 2318 | 1.110 | -- |
| 总计 | | 275674 | 100.000 | 31607 | | | |

图35 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1108-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 13:25:24 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:36:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.755 | 279213 | 100.000 | 32051 | 2320 | 1.105 | -- |
| 总计 | | 279213 | 100.000 | 32051 | | | |

图36 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1109-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-6 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 13:29:18 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:36:18
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.758 | 277845 | 100.000 | 31771 | 2312 | 1.106 | -- |
| 总计 | | 277845 | 100.000 | 31771 | | | |

图37 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1110-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-15 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 13:33:11 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:36:21
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.760 | 273017 | 100.000 | 31415 | 2347 | 1.104 | -- |
| 总计 | | 273017 | 100.000 | 31415 | | | |

图38 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1111-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 13:37:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:36:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.762 | 280266 | 100.000 | 32267 | 2348 | 1.105 | -- |
| 总计 | | 280266 | 100.000 | 32267 | | | |

图39 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1112-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 13:40:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:36:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.763 | 271483 | 100.000 | 31232 | 2346 | 1.104 | -- |
| 总计 | | 271483 | 100.000 | 31232 | | | |

图40 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1113-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 13:44:50 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:36:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.765 | 276338 | 100.000 | 31835 | 2360 | 1.107 | -- |
| 总计 | | 276338 | 100.000 | 31835 | | | |

图41 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1114-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-51 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 13:48:42 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:36:32
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.767 | 276250 | 100.000 | 31739 | 2358 | 1.107 | -- |
| 总计 | | 276250 | 100.000 | 31739 | | | |

图42 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1115-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-7 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 13:52:34 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:36:35
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.769 | 278079 | 100.000 | 31833 | 2337 | 1.108 | -- |
| 总计 | | 278079 | 100.000 | 31833 | | | |

图43 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1116-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-16 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 13:56:27 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:36:37
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.771 | 273274 | 100.000 | 31404 | 2358 | 1.109 | -- |
| 总计 | | 273274 | 100.000 | 31404 | | | |

图44 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1117-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-25 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 14:00:20 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:36:40
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.772 | 282339 | 100.000 | 32440 | 2359 | 1.110 | -- |
| 总计 | | 282339 | 100.000 | 32440 | | | |

图45 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1118-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-34 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 14:04:12 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:36:43
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.774 | 271404 | 100.000 | 31153 | 2358 | 1.108 | -- |
| 总计 | | 271404 | 100.000 | 31153 | | | |

图46 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1119-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-43 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 14:08:04 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:36:46
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.775 | 275172 | 100.000 | 31541 | 2361 | 1.110 | -- |
| 总计 | | 275172 | 100.000 | 31541 | | | |

图47 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1120-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 14:11:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:36:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.776 | 279166 | 100.000 | 31932 | 2354 | 1.111 | -- |
| 总计 | | 279166 | 100.000 | 31932 | | | |

图48 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1121-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 14:15:49 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:36:51
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.768 | 237510 | 100.000 | 26802 | 2277 | 1.108 | -- |
| 总计 | | 237510 | 100.000 | 26802 | | | |

图49 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1122-2 - zzp-2024051611p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 14:19:43 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:36:54 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.769 | 237474 | 100.000 | 26813 | 2273 | 1.108 | -- |
| 总计 | | 237474 | 100.000 | 26813 | | | |

图50 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1123-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-9 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 14:23:38 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 09:36:57
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |


图51 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1124-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 14:27:33 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:36:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.772 | 238215 | 100.000 | 26907 | 2277 | 1.110 | -- |
| 总计 | | 238215 | 100.000 | 26907 | | | |

图52 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1125-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 14:31:28 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:37:02
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.774 | 238102 | 100.000 | 26840 | 2274 | 1.110 | -- |
| 总计 | | 238102 | 100.000 | 26840 | | | |

图53 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1126-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 14:35:22 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:37:05
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.775 | 238285 | 100.000 | 26733 | 2259 | 1.110 | -- |
| 总计 | | 238285 | 100.000 | 26733 | | | |

图54 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1127-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 14:39:18 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:37:07
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.776 | 238243 | 100.000 | 26696 | 2258 | 1.110 | -- |
| 总计 | | 238243 | 100.000 | 26696 | | | |

图55 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-4




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1128-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 14:43:13 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:37:10
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.778 | 238020 | 100.000 | 26714 | 2260 | 1.109 | -- |
| 总计 | | 238020 | 100.000 | 26714 | | | |

图56 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-5




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1129-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-1 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 14:47:08 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:37:13
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.790 | 278158 | 100.000 | 31639 | 2345 | 1.113 | -- |
| 总计 | | 278158 | 100.000 | 31639 | | | |

图57 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.8ml/min

柱温:30°C

波长: 290nm

数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1130-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/06/22 14:51:04

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/06/25 09:37:16

处理者: xiechaojun

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.792 | 273855 | 100.000 | 31077 | 2342 | 1.113 | -- |
| 总计 | | 273855 | 100.000 | 31077 | | | |

图58 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1131-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-19 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 14:54:58 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:37:18
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.794 | 287748 | 100.000 | 32752 | 2355 | 1.112 | -- |
| 总计 | | 287748 | 100.000 | 32752 | | | |

图59 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1132-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 14:58:53 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:37:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.796 | 277926 | 100.000 | 31685 | 2361 | 1.110 | -- |
| 总计 | | 277926 | 100.000 | 31685 | | | |

图60 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1133-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 15:02:47 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:37:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.798 | 273514 | 100.000 | 31177 | 2362 | 1.109 | -- |
| 总计 | | 273514 | 100.000 | 31177 | | | |

图61 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1134-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-46 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 15:06:43 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:37:27
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.799 | 275163 | 100.000 | 31339 | 2365 | 1.110 | -- |
| 总计 | | 275163 | 100.000 | 31339 | | | |

图62 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1135-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-2 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 15:10:36 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:37:29
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.800 | 281905 | 100.000 | 32060 | 2365 | 1.111 | -- |
| 总计 | | 281905 | 100.000 | 32060 | | | |

图63 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1136-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-11 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 15:14:30 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:37:32
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.802 | 276456 | 100.000 | 31440 | 2367 | 1.108 | -- |
| 总计 | | 276456 | 100.000 | 31440 | | | |

图64 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1137-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 15:18:25 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:37:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.803 | 278101 | 100.000 | 31661 | 2369 | 1.108 | -- |
| 总计 | | 278101 | 100.000 | 31661 | | | |

图65 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1138-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 15:22:18 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:37:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.805 | 280820 | 100.000 | 31992 | 2371 | 1.107 | -- |
| 总计 | | 280820 | 100.000 | 31992 | | | |

图66 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1139-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-38 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 15:26:13 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 09:37:40
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.807 | 271102 | 100.000 | 30825 | 2368 | 1.107 | -- |
| 总计 | | 271102 | 100.000 | 30825 | | | |

图67 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1140-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 15:30:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:37:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.808 | 271323 | 100.000 | 30829 | 2372 | 1.107 | -- |
| 总计 | | 271323 | 100.000 | 30829 | | | |

图68 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.8ml/min

柱温:30°C

波长: 290nm

数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1141-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/06/22 15:34:00

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/06/25 09:37:46

处理者: xiechaojun

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.809 | 280372 | 100.000 | 31783 | 2366 | 1.108 | -- |
| 总计 | | 280372 | 100.000 | 31783 | | | |

图69 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1142-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-12 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 15:37:54 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:37:48
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.811 | 276008 | 100.000 | 31297 | 2365 | 1.107 | -- |
| 总计 | | 276008 | 100.000 | 31297 | | | |

图70 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1143-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-21 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 15:41:48 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:37:51
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.811 | 278538 | 100.000 | 31626 | 2372 | 1.108 | -- |
| 总计 | | 278538 | 100.000 | 31626 | | | |

图71 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1144-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 15:45:42 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:37:54 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.813 | 281035 | 100.000 | 31919 | 2370 | 1.108 | -- |
| 总计 | | 281035 | 100.000 | 31919 | | | |

图72 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1145-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 15:49:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:37:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.814 | 269388 | 100.000 | 30604 | 2374 | 1.106 | -- |
| 总计 | | 269388 | 100.000 | 30604 | | | |

图73 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1146-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-48 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 15:53:31 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:37:59
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.815 | 271131 | 100.000 | 30809 | 2379 | 1.106 | -- |
| 总计 | | 271131 | 100.000 | 30809 | | | |

图74 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1147-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-4 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 15:57:25 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:38:02
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.817 | 279814 | 100.000 | 31737 | 2381 | 1.106 | -- |
| 总计 | | 279814 | 100.000 | 31737 | | | |

图75 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1148-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-13 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 16:01:19 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:38:05
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.818 | 274546 | 100.000 | 31124 | 2380 | 1.104 | -- |
| 总计 | | 274546 | 100.000 | 31124 | | | |

图76 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1149-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-22 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 16:05:14 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:38:08
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.818 | 276895 | 100.000 | 31398 | 2379 | 1.103 | -- |
| 总计 | | 276895 | 100.000 | 31398 | | | |

图77 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1150-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-31 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 16:09:09 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:38:10
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.819 | 278379 | 100.000 | 31565 | 2375 | 1.104 | -- |
| 总计 | | 278379 | 100.000 | 31565 | | | |

图78 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1151-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 16:13:03 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:38:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.820 | 280495 | 100.000 | 31853 | 2384 | 1.104 | -- |
| 总计 | | 280495 | 100.000 | 31853 | | | |

图79 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1152-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 16:16:58 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:38:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.822 | 270100 | 100.000 | 30698 | 2388 | 1.102 | -- |
| 总计 | | 270100 | 100.000 | 30698 | | | |

图80 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1153-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 16:20:53 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:38:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.823 | 278751 | 100.000 | 31588 | 2378 | 1.103 | -- |
| 总计 | | 278751 | 100.000 | 31588 | | | |

图81 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1154-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-14 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 16:24:48 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:38:21
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.825 | 274159 | 100.000 | 30999 | 2377 | 1.103 | -- |
| 总计 | | 274159 | 100.000 | 30999 | | | |

图82 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1155-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-23 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 16:28:42 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:38:24
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.826 | 276541 | 100.000 | 31246 | 2378 | 1.104 | -- |
| 总计 | | 276541 | 100.000 | 31246 | | | |

图83 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1156-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 16:32:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:38:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.827 | 279020 | 100.000 | 31598 | 2385 | 1.103 | -- |
| 总计 | | 279020 | 100.000 | 31598 | | | |

图84 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1157-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-41 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 16:36:31 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:38:29
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.827 | 268463 | 100.000 | 30420 | 2389 | 1.102 | -- |
| 总计 | | 268463 | 100.000 | 30420 | | | |

图85 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1158-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 16:40:25 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:38:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.829 | 268466 | 100.000 | 30448 | 2391 | 1.103 | -- |
| 总计 | | 268466 | 100.000 | 30448 | | | |

图86 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1159-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-6 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 16:44:19 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:38:35
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.830 | 279366 | 100.000 | 31579 | 2376 | 1.104 | -- |
| 总计 | | 279366 | 100.000 | 31579 | | | |

图87 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.8ml/min

柱温:30°C

波长: 290nm

数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1160-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/06/22 16:48:13

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/06/25 09:38:37

处理者: xiechaojun

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.831 | 273049 | 100.000 | 30855 | 2377 | 1.104 | -- |
| 总计 | | 273049 | 100.000 | 30855 | | | |

图88 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1161-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 16:52:08 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:38:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.832 | 280338 | 100.000 | 31658 | 2378 | 1.104 | -- |
| 总计 | | 280338 | 100.000 | 31658 | | | |

图89 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1162-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 16:56:01 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:38:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.834 | 277518 | 100.000 | 31380 | 2396 | 1.105 | -- |
| 总计 | | 277518 | 100.000 | 31380 | | | |

图90 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1163-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-42 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 16:59:55 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:38:46
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.835 | 268589 | 100.000 | 30348 | 2389 | 1.103 | -- |
| 总计 | | 268589 | 100.000 | 30348 | | | |

图91 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1164-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-51 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 17:03:49 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:38:49
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.835 | 269068 | 100.000 | 30376 | 2384 | 1.104 | -- |
| 总计 | | 269068 | 100.000 | 30376 | | | |

图92 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1165-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-7 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 17:07:44 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:38:52
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.835 | 281555 | 100.000 | 31776 | 2382 | 1.105 | -- |
| 总计 | | 281555 | 100.000 | 31776 | | | |

图93 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1166-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-16 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 17:11:40 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:38:55
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.836 | 273199 | 100.000 | 30808 | 2378 | 1.106 | -- |
| 总计 | | 273199 | 100.000 | 30808 | | | |

图94 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1167-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-25 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 17:15:35 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:38:58
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.837 | 275982 | 100.000 | 31172 | 2387 | 1.105 | -- |
| 总计 | | 275982 | 100.000 | 31172 | | | |

图95 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1168-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 17:19:29 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:39:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.839 | 277370 | 100.000 | 31336 | 2388 | 1.105 | -- |
| 总计 | | 277370 | 100.000 | 31336 | | | |


图96 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1169-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 17:23:23 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:39:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.840 | 267163 | 100.000 | 30169 | 2389 | 1.104 | -- |
| 总计 | | 267163 | 100.000 | 30169 | | | |

图97 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1170-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 17:27:17 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:39:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.840 | 268067 | 100.000 | 30231 | 2386 | 1.105 | -- |
| 总计 | | 268067 | 100.000 | 30231 | | | |

图98 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1171-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 17:31:11 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:39:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.832 | 237117 | 100.000 | 26339 | 2296 | 1.104 | -- |
| 总计 | | 237117 | 100.000 | 26339 | | | |

图99 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-43/24-1172-2 - zzp-2024051611p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 17:35:06 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 09:39:11
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.832 | 237312 | 100.000 | 26340 | 2296 | 1.104 | -- |
| 总计 | | 237312 | 100.000 | 26340 | | | |

图100 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051611批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-1-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-tj.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-9 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 12:11:20 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:00:03
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

图101 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.8ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 290nm

数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-2-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/06/24 12:15:13

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/06/25 10:00:06

处理者: xiechaojun

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.753 | 235840 | 100.000 | 23112 | 1667 | 1.017 | -- |
| 总计 | | 235840 | 100.000 | 23112 | | | |

图102 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-3-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 12:19:06 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:00:09
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.752 | 235862 | 100.000 | 23011 | 1653 | 1.017 | -- |
| 总计 | | 235862 | 100.000 | 23011 | | | |

图103 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-4-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 12:22:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:00:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.752 | 235916 | 100.000 | 22992 | 1651 | 1.017 | -- |
| 总计 | | 235916 | 100.000 | 22992 | | | |

图104 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-5-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 12:26:52 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:00:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.751 | 235669 | 100.000 | 22924 | 1645 | 1.016 | -- |
| 总计 | | 235669 | 100.000 | 22924 | | | |

图105 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-4




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-6-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 12:30:45 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:00:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.753 | 235831 | 100.000 | 22923 | 1641 | 1.016 | -- |
| 总计 | | 235831 | 100.000 | 22923 | | | |

图106 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-5




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-7-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-1 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 12:34:37 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:00:21
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.764 | 268482 | 100.000 | 26404 | 1694 | 1.015 | -- |
| 总计 | | 268482 | 100.000 | 26404 | | | |

图107 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-8-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 12:38:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:00:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.765 | 270156 | 100.000 | 26525 | 1689 | 1.015 | -- |
| 总计 | | 270156 | 100.000 | 26525 | | | |

图108 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-9-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 12:42:23 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:00:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.766 | 269001 | 100.000 | 26344 | 1684 | 1.015 | -- |
| 总计 | | 269001 | 100.000 | 26344 | | | |

图109 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-10-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 12:46:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:00:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.767 | 271384 | 100.000 | 26506 | 1679 | 1.015 | -- |
| 总计 | | 271384 | 100.000 | 26506 | | | |

图110 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-11-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-37 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 12:50:08 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:00:31
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.768 | 263836 | 100.000 | 25746 | 1676 | 1.014 | -- |
| 总计 | | 263836 | 100.000 | 25746 | | | |

图111 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-12-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-46 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 12:54:00 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:00:34
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.769 | 272380 | 100.000 | 26545 | 1671 | 1.015 | -- |
| 总计 | | 272380 | 100.000 | 26545 | | | |

图112 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-13-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-2 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 12:57:52 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:00:36
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.770 | 269593 | 100.000 | 26269 | 1669 | 1.014 | -- |
| 总计 | | 269593 | 100.000 | 26269 | | | |

图113 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-14-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-11 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 13:01:43 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:00:39
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.773 | 270302 | 100.000 | 26263 | 1664 | 1.015 | -- |
| 总计 | | 270302 | 100.000 | 26263 | | | |

图114 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-15-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 13:05:35 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:00:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.774 | 276771 | 100.000 | 26841 | 1662 | 1.014 | -- |
| 总计 | | 276771 | 100.000 | 26841 | | | |

图115 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RCSSZJ-4096 - 0-44/23-16-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RCSSZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RCSSZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 13:09:28 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:00:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.776 | 271943 | 100.000 | 26296 | 1656 | 1.014 | -- |
| 总计 | | 271943 | 100.000 | 26296 | | | |

图116 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-17-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 13:13:20 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:00:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.777 | 265758 | 100.000 | 25675 | 1652 | 1.014 | -- |
| 总计 | | 265758 | 100.000 | 25675 | | | |

图117 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-18-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 13:17:12 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:00:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.778 | 274136 | 100.000 | 26459 | 1650 | 1.014 | -- |
| 总计 | | 274136 | 100.000 | 26459 | | | |

图118 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-19-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-3 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 13:21:04 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:00:52
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.779 | 270033 | 100.000 | 26047 | 1647 | 1.014 | -- |
| 总计 | | 270033 | 100.000 | 26047 | | | |

图119 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-20-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 13:24:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:00:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.781 | 272512 | 100.000 | 26227 | 1643 | 1.014 | -- |
| 总计 | | 272512 | 100.000 | 26227 | | | |

图120 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-21-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-21 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 13:28:48 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:00:58
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.783 | 271692 | 100.000 | 26083 | 1639 | 1.014 | -- |
| 总计 | | 271692 | 100.000 | 26083 | | | |

图121 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-22-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 13:32:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:01:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.785 | 268989 | 100.000 | 25785 | 1639 | 1.014 | -- |
| 总计 | | 268989 | 100.000 | 25785 | | | |

图122 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-23-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 13:36:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:01:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.786 | 266407 | 100.000 | 25532 | 1636 | 1.014 | -- |
| 总计 | | 266407 | 100.000 | 25532 | | | |

图123 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-24-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 13:40:24 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:01:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.788 | 274155 | 100.000 | 26218 | 1630 | 1.015 | -- |
| 总计 | | 274155 | 100.000 | 26218 | | | |

图124 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-25-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 13:44:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:01:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.789 | 268469 | 100.000 | 25645 | 1627 | 1.014 | -- |
| 总计 | | 268469 | 100.000 | 25645 | | | |

图125 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-26-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-13 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 13:48:08 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:01:11
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.791 | 270650 | 100.000 | 25793 | 1624 | 1.014 | -- |
| 总计 | | 270650 | 100.000 | 25793 | | | |

图126 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-27-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 13:52:00 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:01:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.793 | 273495 | 100.000 | 26005 | 1622 | 1.015 | -- |
| 总计 | | 273495 | 100.000 | 26005 | | | |

图127 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-28-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-31 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 13:55:52 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:01:17
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.794 | 270869 | 100.000 | 25734 | 1619 | 1.014 | -- |
| 总计 | | 270869 | 100.000 | 25734 | | | |

图128 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-29-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 13:59:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:01:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.796 | 264794 | 100.000 | 25133 | 1615 | 1.015 | -- |
| 总计 | | 264794 | 100.000 | 25133 | | | |

图129 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-30-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 14:03:36 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:01:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.798 | 272268 | 100.000 | 25797 | 1611 | 1.015 | -- |
| 总计 | | 272268 | 100.000 | 25797 | | | |

图130 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-31-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 14:07:28 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:01:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.799 | 268057 | 100.000 | 25351 | 1610 | 1.015 | -- |
| 总计 | | 268057 | 100.000 | 25351 | | | |

图131 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-32-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-14 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 14:11:21 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:01:27
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.802 | 270489 | 100.000 | 25524 | 1607 | 1.014 | -- |
| 总计 | | 270489 | 100.000 | 25524 | | | |

图132 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-33-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 14:15:13 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:01:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.802 | 270919 | 100.000 | 25537 | 1602 | 1.014 | -- |
| 总计 | | 270919 | 100.000 | 25537 | | | |

图133 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-34-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 14:19:05 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:01:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.805 | 270646 | 100.000 | 25487 | 1601 | 1.015 | -- |
| 总计 | | 270646 | 100.000 | 25487 | | | |

图134 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-35-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-41 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 14:22:57 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:01:35
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.807 | 266327 | 100.000 | 25040 | 1597 | 1.014 | -- |
| 总计 | | 266327 | 100.000 | 25040 | | | |

图135 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-36-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 14:26:49 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:01:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.809 | 272797 | 100.000 | 25555 | 1593 | 1.015 | -- |
| 总计 | | 272797 | 100.000 | 25555 | | | |

图136 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-37-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-6 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 14:30:41 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:01:41
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.809 | 268826 | 100.000 | 25166 | 1593 | 1.015 | -- |
| 总计 | | 268826 | 100.000 | 25166 | | | |

图137 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$\$SZJ-4096 - 0-44/23-38-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-15 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 14:34:34 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:01:44
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.812 | 270285 | 100.000 | 25292 | 1590 | 1.016 | -- |
| 总计 | | 270285 | 100.000 | 25292 | | | |

图138 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$\$SZJ-4096 - 0-44/23-39-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-24 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 14:38:26 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:01:47
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.814 | 270676 | 100.000 | 25305 | 1588 | 1.015 | -- |
| 总计 | | 270676 | 100.000 | 25305 | | | |

图139 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-40-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-33 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 14:42:18 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:01:49
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.816 | 272195 | 100.000 | 25378 | 1584 | 1.015 | -- |
| 总计 | | 272195 | 100.000 | 25378 | | | |

图140 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-41-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 14:46:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:01:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.817 | 264469 | 100.000 | 24610 | 1582 | 1.015 | -- |
| 总计 | | 264469 | 100.000 | 24610 | | | |

图141 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-42-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-51 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 14:50:02 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:01:55
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.819 | 273332 | 100.000 | 25419 | 1581 | 1.016 | -- |
| 总计 | | 273332 | 100.000 | 25419 | | | |

图142 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-43-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-7 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 14:53:54 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:01:58
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.821 | 270525 | 100.000 | 25139 | 1578 | 1.015 | -- |
| 总计 | | 270525 | 100.000 | 25139 | | | |

图143 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$\$SZJ-4096 - 0-44/23-44-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-16 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 14:57:46 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:02:00
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.822 | 269856 | 100.000 | 25033 | 1575 | 1.015 | -- |
| 总计 | | 269856 | 100.000 | 25033 | | | |

图144 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-45-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-25 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 15:01:37 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:02:03
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.824 | 272413 | 100.000 | 25213 | 1573 | 1.016 | -- |
| 总计 | | 272413 | 100.000 | 25213 | | | |

图145 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-46-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 15:05:29 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:02:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.825 | 271796 | 100.000 | 25107 | 1569 | 1.016 | -- |
| 总计 | | 271796 | 100.000 | 25107 | | | |

图146 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-47-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-43 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 15:09:21 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:02:08
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.827 | 264406 | 100.000 | 24402 | 1567 | 1.016 | -- |
| 总计 | | 264406 | 100.000 | 24402 | | | |

图147 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-48-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 15:13:12 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:02:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.828 | 272312 | 100.000 | 25098 | 1562 | 1.016 | -- |
| 总计 | | 272312 | 100.000 | 25098 | | | |

图148 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-49-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 15:17:05 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:02:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.821 | 235734 | 100.000 | 21495 | 1517 | 1.015 | -- |
| 总计 | | 235734 | 100.000 | 21495 | | | |

图149 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-50-2 - zzp-2024051612p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 15:20:56 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:02:16
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.822 | 235768 | 100.000 | 21472 | 1516 | 1.016 | -- |
| 总计 | | 235768 | 100.000 | 21472 | | | |

图150 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-51-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 15:24:50 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:02:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

图151 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 溶剂




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-52-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 15:28:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:02:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.825 | 236653 | 100.000 | 21464 | 1510 | 1.016 | -- |
| 总计 | | 236653 | 100.000 | 21464 | | | |

图152 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-53-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 15:32:38 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:02:25
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.826 | 236016 | 100.000 | 21377 | 1508 | 1.016 | -- |
| 总计 | | 236016 | 100.000 | 21377 | | | |

图153 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-54-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 15:36:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:02:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.827 | 236261 | 100.000 | 21383 | 1506 | 1.017 | -- |
| 总计 | | 236261 | 100.000 | 21383 | | | |

图154 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-55-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 15:40:26 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:02:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.828 | 236230 | 100.000 | 21380 | 1505 | 1.017 | -- |
| 总计 | | 236230 | 100.000 | 21380 | | | |

图155 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-4




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-56-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 15:44:20 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:02:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.829 | 236748 | 100.000 | 21404 | 1501 | 1.017 | -- |
| 总计 | | 236748 | 100.000 | 21404 | | | |

图156 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-5




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-57-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-1 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 15:48:13 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:02:35
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.841 | 264278 | 100.000 | 24098 | 1543 | 1.017 | -- |
| 总计 | | 264278 | 100.000 | 24098 | | | |

图157 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-58-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-10 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 15:52:06 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:02:38
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.842 | 268506 | 100.000 | 24428 | 1543 | 1.018 | -- |
| 总计 | | 268506 | 100.000 | 24428 | | | |

图158 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$\$SZJ-4096 - 0-44/23-59-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-19 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 15:55:59 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:02:41
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.843 | 262037 | 100.000 | 23831 | 1543 | 1.018 | -- |
| 总计 | | 262037 | 100.000 | 23831 | | | |

图159 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-60-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-28 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 15:59:52 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:02:44
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.843 | 271845 | 100.000 | 24707 | 1540 | 1.018 | -- |
| 总计 | | 271845 | 100.000 | 24707 | | | |

图160 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-61-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 16:03:45 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:02:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.845 | 266477 | 100.000 | 24211 | 1540 | 1.019 | -- |
| 总计 | | 266477 | 100.000 | 24211 | | | |

图161 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-62-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-46 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 16:07:37 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:02:49
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.845 | 272493 | 100.000 | 24719 | 1536 | 1.020 | -- |
| 总计 | | 272493 | 100.000 | 24719 | | | |

图162 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-63-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-2 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 16:11:31 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:02:52
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.846 | 268500 | 100.000 | 24350 | 1536 | 1.019 | -- |
| 总计 | | 268500 | 100.000 | 24350 | | | |

图163 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-64-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-11 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 16:15:24 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:02:54
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.848 | 268312 | 100.000 | 24294 | 1532 | 1.020 | -- |
| 总计 | | 268312 | 100.000 | 24294 | | | |

图164 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-65-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 16:19:17 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:02:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.849 | 267530 | 100.000 | 24201 | 1532 | 1.019 | -- |
| 总计 | | 267530 | 100.000 | 24201 | | | |

图165 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-66-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-29 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 16:23:11 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:03:00
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.850 | 274384 | 100.000 | 24774 | 1529 | 1.020 | -- |
| 总计 | | 274384 | 100.000 | 24774 | | | |

图166 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-67-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 16:27:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:03:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.851 | 271702 | 100.000 | 24497 | 1527 | 1.021 | -- |
| 总计 | | 271702 | 100.000 | 24497 | | | |

图167 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-68-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 16:30:57 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:03:05 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.852 | 273621 | 100.000 | 24676 | 1528 | 1.021 | -- |
| 总计 | | 273621 | 100.000 | 24676 | | | |

图168 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-69-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-3 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 16:34:50 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:03:08
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.852 | 263962 | 100.000 | 23809 | 1528 | 1.021 | -- |
| 总计 | | 263962 | 100.000 | 23809 | | | |

图169 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-70-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 16:38:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:03:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.854 | 270261 | 100.000 | 24339 | 1524 | 1.022 | -- |
| 总计 | | 270261 | 100.000 | 24339 | | | |

图170 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-71-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 16:42:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:03:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.855 | 268458 | 100.000 | 24169 | 1525 | 1.022 | -- |
| 总计 | | 268458 | 100.000 | 24169 | | | |

图171 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-72-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 16:46:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:03:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.857 | 272393 | 100.000 | 24470 | 1521 | 1.022 | -- |
| 总计 | | 272393 | 100.000 | 24470 | | | |

图172 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-73-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 16:50:24 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:03:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.857 | 269730 | 100.000 | 24229 | 1521 | 1.022 | -- |
| 总计 | | 269730 | 100.000 | 24229 | | | |

图173 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-74-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 16:54:17 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:03:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.858 | 272162 | 100.000 | 24389 | 1518 | 1.023 | -- |
| 总计 | | 272162 | 100.000 | 24389 | | | |

图174 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-75-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 16:58:11 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:03:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.860 | 267218 | 100.000 | 23921 | 1517 | 1.023 | -- |
| 总计 | | 267218 | 100.000 | 23921 | | | |

图175 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-76-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 17:02:05 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:03:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.861 | 269788 | 100.000 | 24155 | 1517 | 1.023 | -- |
| 总计 | | 269788 | 100.000 | 24155 | | | |

图176 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-77-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 17:05:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:03:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.861 | 267240 | 100.000 | 23907 | 1515 | 1.024 | -- |
| 总计 | | 267240 | 100.000 | 23907 | | | |

图177 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-78-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 17:09:53 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:03:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.863 | 271997 | 100.000 | 24337 | 1517 | 1.024 | -- |
| 总计 | | 271997 | 100.000 | 24337 | | | |

图178 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-79-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 17:13:46 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:03:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.864 | 266047 | 100.000 | 23782 | 1515 | 1.025 | -- |
| 总计 | | 266047 | 100.000 | 23782 | | | |

图179 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-80-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 17:17:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:03:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.865 | 270351 | 100.000 | 24156 | 1515 | 1.024 | -- |
| 总计 | | 270351 | 100.000 | 24156 | | | |

图180 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-81-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 17:21:35 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:03:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.867 | 267290 | 100.000 | 23839 | 1515 | 1.025 | -- |
| 总计 | | 267290 | 100.000 | 23839 | | | |

图181 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-82-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 17:25:29 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:03:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.868 | 267030 | 100.000 | 23783 | 1512 | 1.025 | -- |
| 总计 | | 267030 | 100.000 | 23783 | | | |

图182 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-83-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 17:29:23 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:03:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.869 | 266635 | 100.000 | 23728 | 1511 | 1.025 | -- |
| 总计 | | 266635 | 100.000 | 23728 | | | |

图183 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-84-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 17:33:18 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:03:49 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.871 | 274791 | 100.000 | 24450 | 1509 | 1.027 | -- |
| 总计 | | 274791 | 100.000 | 24450 | | | |

图184 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-85-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-41 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 17:37:11 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:03:52
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.872 | 269908 | 100.000 | 23992 | 1509 | 1.027 | -- |
| 总计 | | 269908 | 100.000 | 23992 | | | |

图185 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-86-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 17:41:05 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:03:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.872 | 269184 | 100.000 | 23907 | 1506 | 1.027 | -- |
| 总计 | | 269184 | 100.000 | 23907 | | | |

图186 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-87-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-6 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 17:44:59 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:03:58
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.874 | 266346 | 100.000 | 23616 | 1506 | 1.027 | -- |
| 总计 | | 266346 | 100.000 | 23616 | | | |

图187 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-88-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 17:48:51 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:04:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.874 | 272567 | 100.000 | 24151 | 1503 | 1.028 | -- |
| 总计 | | 272567 | 100.000 | 24151 | | | |

图188 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-89-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 17:52:45 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:04:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.876 | 267112 | 100.000 | 23658 | 1505 | 1.027 | -- |
| 总计 | | 267112 | 100.000 | 23658 | | | |

图189 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-90-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 17:56:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:04:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.877 | 271720 | 100.000 | 24040 | 1504 | 1.028 | -- |
| 总计 | | 271720 | 100.000 | 24040 | | | |

图190 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-91-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 18:00:33 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:04:08 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.878 | 269249 | 100.000 | 23807 | 1502 | 1.028 | -- |
| 总计 | | 269249 | 100.000 | 23807 | | | |

图191 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-92-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-51 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 18:04:26 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:04:11
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.879 | 272486 | 100.000 | 24095 | 1502 | 1.028 | -- |
| 总计 | | 272486 | 100.000 | 24095 | | | |

图192 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-93-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-7 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 18:08:20 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:04:14
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.880 | 269090 | 100.000 | 23805 | 1501 | 1.028 | -- |
| 总计 | | 269090 | 100.000 | 23805 | | | |

图193 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-94-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 18:12:14 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:04:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.880 | 267276 | 100.000 | 23620 | 1502 | 1.029 | -- |
| 总计 | | 267276 | 100.000 | 23620 | | | |

图194 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-95-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-25 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 18:16:08 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:04:19
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.880 | 263517 | 100.000 | 23297 | 1502 | 1.030 | -- |
| 总计 | | 263517 | 100.000 | 23297 | | | |

图195 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-96-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 18:20:02 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:04:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.880 | 272518 | 100.000 | 24091 | 1503 | 1.031 | -- |
| 总计 | | 272518 | 100.000 | 24091 | | | |

图196 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-97-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-43 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/24 18:23:55 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:04:25
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.880 | 268500 | 100.000 | 23730 | 1503 | 1.032 | -- |
| 总计 | | 268500 | 100.000 | 23730 | | | |

图197 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-98-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 18:27:49 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:04:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.880 | 271889 | 100.000 | 24050 | 1504 | 1.032 | -- |
| 总计 | | 271889 | 100.000 | 24050 | | | |

图198 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-99-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 18:31:43 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:04:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.871 | 238943 | 100.000 | 20935 | 1465 | 1.031 | -- |
| 总计 | | 238943 | 100.000 | 20935 | | | |

图199 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-44/23-100-2 - zzp-2024051612p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240624-RCQX-FX272.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/24 18:35:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:04:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.870 | 238812 | 100.000 | 20915 | 1462 | 1.031 | -- |
| 总计 | | 238812 | 100.000 | 20915 | | | |

图200 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051612批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1273-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-9 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 00:06:33 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:18:14
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

图201 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 溶剂




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1274-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 00:10:26 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:18:17
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.864 | 237154 | 100.000 | 25721 | 2243 | 1.117 | -- |
| 总计 | | 237154 | 100.000 | 25721 | | | |

图202 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1275-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 00:14:19 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:18:20
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.864 | 237494 | 100.000 | 25756 | 2245 | 1.117 | -- |
| 总计 | | 237494 | 100.000 | 25756 | | | |

图203 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1276-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 00:18:13 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:18:23
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.865 | 237341 | 100.000 | 25725 | 2242 | 1.117 | -- |
| 总计 | | 237341 | 100.000 | 25725 | | | |

图204 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1277-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 00:22:06 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:18:26
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.865 | 237337 | 100.000 | 25720 | 2241 | 1.117 | -- |
| 总计 | | 237337 | 100.000 | 25720 | | | |

图205 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-4




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1278-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 00:25:59 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:18:29
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.865 | 237590 | 100.000 | 25733 | 2238 | 1.117 | -- |
| 总计 | | 237590 | 100.000 | 25733 | | | |

图206 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-5




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1279-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-1 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 00:29:51 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:18:32
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.875 | 276809 | 100.000 | 30323 | 2308 | 1.118 | -- |
| 总计 | | 276809 | 100.000 | 30323 | | | |

图207 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1280-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/23 00:33:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:18:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.874 | 280758 | 100.000 | 30708 | 2303 | 1.119 | -- |
| 总计 | | 280758 | 100.000 | 30708 | | | |

图208 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1281-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/23 00:37:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:18:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.875 | 280179 | 100.000 | 30656 | 2304 | 1.119 | -- |
| 总计 | | 280179 | 100.000 | 30656 | | | |

图209 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1282-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/23 00:41:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:18:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.875 | 270356 | 100.000 | 29587 | 2307 | 1.118 | -- |
| 总计 | | 270356 | 100.000 | 29587 | | | |

图210 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1283-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/23 00:45:22 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:18:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.874 | 275986 | 100.000 | 30178 | 2303 | 1.119 | -- |
| 总计 | | 275986 | 100.000 | 30178 | | | |

图211 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1284-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-46 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 00:49:14 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:18:45
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.875 | 267817 | 100.000 | 29255 | 2304 | 1.119 | -- |
| 总计 | | 267817 | 100.000 | 29255 | | | |

图212 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1285-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-2 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 00:53:06 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:18:48
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.877 | 271700 | 100.000 | 29695 | 2306 | 1.119 | -- |
| 总计 | | 271700 | 100.000 | 29695 | | | |

图213 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1286-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-11 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 00:56:59 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:18:51
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.876 | 281849 | 100.000 | 30751 | 2301 | 1.120 | -- |
| 总计 | | 281849 | 100.000 | 30751 | | | |

图214 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1287-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-20 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 01:00:51 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:18:54
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.875 | 282181 | 100.000 | 30861 | 2306 | 1.120 | -- |
| 总计 | | 282181 | 100.000 | 30861 | | | |

图215 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1288-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/23 01:04:43 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:18:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.875 | 273912 | 100.000 | 29941 | 2304 | 1.120 | -- |
| 总计 | | 273912 | 100.000 | 29941 | | | |

图216 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1289-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-38 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 01:08:35 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:18:59
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.875 | 275306 | 100.000 | 30075 | 2300 | 1.120 | -- |
| 总计 | | 275306 | 100.000 | 30075 | | | |

图217 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1290-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-47 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 01:12:27 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:19:02
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.875 | 272994 | 100.000 | 29766 | 2293 | 1.120 | -- |
| 总计 | | 272994 | 100.000 | 29766 | | | |

图218 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1291-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-3 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 01:16:20 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:19:05
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.875 | 273400 | 100.000 | 29779 | 2288 | 1.120 | -- |
| 总计 | | 273400 | 100.000 | 29779 | | | |

图219 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1292-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-12 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 01:20:12 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:19:08
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.875 | 279490 | 100.000 | 30424 | 2287 | 1.121 | -- |
| 总计 | | 279490 | 100.000 | 30424 | | | |

图220 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1293-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-21 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 01:24:04 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:19:10
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.875 | 282341 | 100.000 | 30730 | 2286 | 1.120 | -- |
| 总计 | | 282341 | 100.000 | 30730 | | | |

图221 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1294-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/23 01:27:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:19:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.876 | 274945 | 100.000 | 29878 | 2282 | 1.121 | -- |
| 总计 | | 274945 | 100.000 | 29878 | | | |

图222 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1295-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/23 01:31:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:19:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.876 | 274503 | 100.000 | 29832 | 2283 | 1.121 | -- |
| 总计 | | 274503 | 100.000 | 29832 | | | |

图223 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1296-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-48 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 01:35:40 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:19:19
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.876 | 273982 | 100.000 | 29783 | 2284 | 1.120 | -- |
| 总计 | | 273982 | 100.000 | 29783 | | | |

图224 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1297-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/23 01:39:33 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:19:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.876 | 272582 | 100.000 | 29630 | 2283 | 1.120 | -- |
| 总计 | | 272582 | 100.000 | 29630 | | | |

图225 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1298-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/23 01:43:25 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:19:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.877 | 281001 | 100.000 | 30527 | 2279 | 1.120 | -- |
| 总计 | | 281001 | 100.000 | 30527 | | | |

图226 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1299-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-22 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 01:47:17 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:19:27
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.877 | 288351 | 100.000 | 31376 | 2281 | 1.119 | -- |
| 总计 | | 288351 | 100.000 | 31376 | | | |

图227 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1300-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-31 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 01:51:09 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:19:30
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.877 | 274364 | 100.000 | 29835 | 2280 | 1.120 | -- |
| 总计 | | 274364 | 100.000 | 29835 | | | |

图228 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1301-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-40 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 01:55:00 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:19:33
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.877 | 276047 | 100.000 | 30018 | 2281 | 1.121 | -- |
| 总计 | | 276047 | 100.000 | 30018 | | | |

图229 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1302-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/23 01:58:51 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:19:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.877 | 272072 | 100.000 | 29607 | 2283 | 1.120 | -- |
| 总计 | | 272072 | 100.000 | 29607 | | | |

图230 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1303-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-5 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 02:02:43 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:19:38
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.878 | 271343 | 100.000 | 29544 | 2285 | 1.120 | -- |
| 总计 | | 271343 | 100.000 | 29544 | | | |

图231 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1304-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/23 02:06:36 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:19:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.877 | 282919 | 100.000 | 30774 | 2283 | 1.121 | -- |
| 总计 | | 282919 | 100.000 | 30774 | | | |

图232 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1305-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/23 02:10:29 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:19:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.879 | 280065 | 100.000 | 30476 | 2282 | 1.120 | -- |
| 总计 | | 280065 | 100.000 | 30476 | | | |

图233 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1306-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-32 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 02:14:22 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:19:47
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.879 | 271268 | 100.000 | 29519 | 2283 | 1.119 | -- |
| 总计 | | 271268 | 100.000 | 29519 | | | |

图234 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1307-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-41 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 02:18:14 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:19:50
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.879 | 275590 | 100.000 | 29991 | 2284 | 1.120 | -- |
| 总计 | | 275590 | 100.000 | 29991 | | | |

图235 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1308-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/23 02:22:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:19:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.879 | 272961 | 100.000 | 29672 | 2278 | 1.120 | -- |
| 总计 | | 272961 | 100.000 | 29672 | | | |

图236 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1309-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-6 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 02:26:00 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:19:55
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.878 | 271258 | 100.000 | 29515 | 2281 | 1.120 | -- |
| 总计 | | 271258 | 100.000 | 29515 | | | |

图237 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.8ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 290nm

数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1310-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/06/23 02:29:52

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/06/25 10:19:58

处理者: xiechaojun

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.878 | 280786 | 100.000 | 30599 | 2289 | 1.120 | -- |
| 总计 | | 280786 | 100.000 | 30599 | | | |

图238 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1311-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/23 02:33:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:20:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.879 | 280780 | 100.000 | 30680 | 2298 | 1.119 | -- |
| 总计 | | 280780 | 100.000 | 30680 | | | |

图239 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1312-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/23 02:37:36 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:20:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.879 | 271914 | 100.000 | 29718 | 2301 | 1.118 | -- |
| 总计 | | 271914 | 100.000 | 29718 | | | |

图240 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1313-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/23 02:41:28 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:20:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.880 | 276295 | 100.000 | 30178 | 2300 | 1.118 | -- |
| 总计 | | 276295 | 100.000 | 30178 | | | |

图241 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1314-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-51 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 02:45:20 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:20:10
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.880 | 271795 | 100.000 | 29679 | 2300 | 1.117 | -- |
| 总计 | | 271795 | 100.000 | 29679 | | | |

图242 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1315-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-7 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 02:49:13 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:20:13
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.880 | 272357 | 100.000 | 29747 | 2299 | 1.118 | -- |
| 总计 | | 272357 | 100.000 | 29747 | | | |

图243 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1316-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-ph2.0jz-lf100z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-16 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 02:53:06 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:20:16
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.880 | 279713 | 100.000 | 30538 | 2299 | 1.119 | -- |
| 总计 | | 279713 | 100.000 | 30538 | | | |

图244 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1317-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-25 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 02:56:58 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:20:19
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.879 | 278473 | 100.000 | 30402 | 2298 | 1.118 | -- |
| 总计 | | 278473 | 100.000 | 30402 | | | |

图245 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1318-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/23 03:00:51 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:20:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.880 | 271777 | 100.000 | 29686 | 2298 | 1.117 | -- |
| 总计 | | 271777 | 100.000 | 29686 | | | |

图246 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1319-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/23 03:04:43 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:20:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.881 | 275600 | 100.000 | 30086 | 2299 | 1.119 | -- |
| 总计 | | 275600 | 100.000 | 30086 | | | |

图247 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1320-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/23 03:08:35 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:20:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.880 | 269277 | 100.000 | 29372 | 2294 | 1.118 | -- |
| 总计 | | 269277 | 100.000 | 29372 | | | |

图248 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1321-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/23 03:12:28 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:20:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.871 | 237889 | 100.000 | 25635 | 2223 | 1.119 | -- |
| 总计 | | 237889 | 100.000 | 25635 | | | |

图249 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-45/24-1322-2 - zzp-2024051613p-25mg-1-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/23 03:16:21 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:20:33
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.870 | 237980 | 100.000 | 25629 | 2221 | 1.118 | -- |
| 总计 | | 237980 | 100.000 | 25629 | | | |

图250 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-505-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-9 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 20:52:03 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:22:14
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |

图251 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 溶剂




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-506-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 20:55:57 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:22:17
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.642 | 234903 | 100.000 | 27804 | 2306 | 1.119 | -- |
| 总计 | | 234903 | 100.000 | 27804 | | | |

图252 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-507-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 20:59:51 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:22:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.643 | 235226 | 100.000 | 27802 | 2302 | 1.119 | -- |
| 总计 | | 235226 | 100.000 | 27802 | | | |

图253 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-2




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-508-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 21:03:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:22:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.643 | 235228 | 100.000 | 27784 | 2302 | 1.119 | -- |
| 总计 | | 235228 | 100.000 | 27784 | | | |

图254 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.8ml/min

柱温:30°C

波长: 290nm

数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-509-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/06/22 21:07:38

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/06/25 10:22:25

处理者: xiechaojun

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.643 | 235043 | 100.000 | 27806 | 2306 | 1.119 | -- |
| 总计 | | 235043 | 100.000 | 27806 | | | |

图255 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-510-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 21:11:31 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:22:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.643 | 235223 | 100.000 | 27766 | 2299 | 1.120 | -- |
| 总计 | | 235223 | 100.000 | 27766 | | | |

图256 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-5




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-511-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-1 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 21:15:24 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:22:31
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.653 | 260573 | 100.000 | 31408 | 2414 | 1.119 | -- |
| 总计 | | 260573 | 100.000 | 31408 | | | |

图257 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-512-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-10
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 21:19:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:22:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.654 | 269661 | 100.000 | 32506 | 2412 | 1.120 | -- |
| 总计 | | 269661 | 100.000 | 32506 | | | |

图258 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-513-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-19
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 21:23:08 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:22:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.652 | 271078 | 100.000 | 32663 | 2413 | 1.121 | -- |
| 总计 | | 271078 | 100.000 | 32663 | | | |

图259 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-514-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 21:27:01 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:22:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.652 | 268205 | 100.000 | 32341 | 2417 | 1.121 | -- |
| 总计 | | 268205 | 100.000 | 32341 | | | |

图260 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-515-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-37
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 21:30:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:22:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.651 | 273293 | 100.000 | 32864 | 2407 | 1.123 | -- |
| 总计 | | 273293 | 100.000 | 32864 | | | |

图261 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-516-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-46
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 21:34:45 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:22:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.650 | 270085 | 100.000 | 32511 | 2404 | 1.123 | -- |
| 总计 | | 270085 | 100.000 | 32511 | | | |

图262 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-517-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-2 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 21:38:38 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2) : 2024/06/25 10:22:47
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.647 | 263615 | 100.000 | 31818 | 2407 | 1.122 | -- |
| 总计 | | 263615 | 100.000 | 31818 | | | |


图263 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-518-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-11
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 21:42:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:22:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.648 | 272849 | 100.000 | 32963 | 2415 | 1.123 | -- |
| 总计 | | 272849 | 100.000 | 32963 | | | |

图264 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-519-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-20
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 21:46:23 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:22:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.646 | 271877 | 100.000 | 32837 | 2408 | 1.123 | -- |
| 总计 | | 271877 | 100.000 | 32837 | | | |


图265 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-520-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-29
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 21:50:15 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:22:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.645 | 273598 | 100.000 | 33000 | 2402 | 1.124 | -- |
| 总计 | | 273598 | 100.000 | 33000 | | | |

图266 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-521-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-38
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 21:54:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:22:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.642 | 278164 | 100.000 | 33483 | 2399 | 1.126 | -- |
| 总计 | | 278164 | 100.000 | 33483 | | | |

图267 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-522-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 21:57:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:23:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.644 | 272527 | 100.000 | 32897 | 2410 | 1.125 | -- |
| 总计 | | 272527 | 100.000 | 32897 | | | |

图268 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-523-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-3
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 22:01:52 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:23:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.641 | 264054 | 100.000 | 31870 | 2403 | 1.125 | -- |
| 总计 | | 264054 | 100.000 | 31870 | | | |

图269 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-524-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-12 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 22:05:44 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:23:07
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.641 | 272597 | 100.000 | 32908 | 2403 | 1.125 | -- |
| 总计 | | 272597 | 100.000 | 32908 | | | |

图270 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-525-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-21
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 22:09:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:23:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.640 | 272040 | 100.000 | 32880 | 2403 | 1.126 | -- |
| 总计 | | 272040 | 100.000 | 32880 | | | |

图271 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-526-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-30
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 22:13:29 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:23:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.639 | 271694 | 100.000 | 32854 | 2400 | 1.126 | -- |
| 总计 | | 271694 | 100.000 | 32854 | | | |

图272 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-527-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-39
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 22:17:22 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:23:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.640 | 275470 | 100.000 | 33317 | 2404 | 1.127 | -- |
| 总计 | | 275470 | 100.000 | 33317 | | | |

图273 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-528-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 22:21:14 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:23:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.639 | 271272 | 100.000 | 32833 | 2405 | 1.127 | -- |
| 总计 | | 271272 | 100.000 | 32833 | | | |

图274 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-529-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-4 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 22:25:07 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:23:20
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.637 | 264216 | 100.000 | 31952 | 2399 | 1.127 | -- |
| 总计 | | 264216 | 100.000 | 31952 | | | |

图275 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-530-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-13
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 22:29:00 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:23:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.637 | 272530 | 100.000 | 32918 | 2396 | 1.128 | -- |
| 总计 | | 272530 | 100.000 | 32918 | | | |

图276 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-531-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-22
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 22:32:53 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:23:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.637 | 271109 | 100.000 | 32744 | 2395 | 1.128 | -- |
| 总计 | | 271109 | 100.000 | 32744 | | | |

图277 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-532-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-31
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 22:36:46 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:23:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.636 | 270885 | 100.000 | 32796 | 2408 | 1.129 | -- |
| 总计 | | 270885 | 100.000 | 32796 | | | |


图278 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-533-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-40
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 22:40:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:23:31 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.636 | 276076 | 100.000 | 33312 | 2391 | 1.128 | -- |
| 总计 | | 276076 | 100.000 | 33312 | | | |

图279 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-534-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-49
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 22:44:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:23:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.634 | 271671 | 100.000 | 32744 | 2392 | 1.130 | -- |
| 总计 | | 271671 | 100.000 | 32744 | | | |

图280 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-535-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-5 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 22:48:26 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:23:37
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.634 | 264967 | 100.000 | 31920 | 2385 | 1.130 | -- |
| 总计 | | 264967 | 100.000 | 31920 | | | |

图281 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-536-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-14
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 22:52:20 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:23:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.634 | 270137 | 100.000 | 32520 | 2387 | 1.130 | -- |
| 总计 | | 270137 | 100.000 | 32520 | | | |

图282 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-537-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-23
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 22:56:13 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:23:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.633 | 270795 | 100.000 | 32673 | 2390 | 1.131 | -- |
| 总计 | | 270795 | 100.000 | 32673 | | | |

图283 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-538-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-32
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 23:00:06 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:23:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.634 | 271894 | 100.000 | 32766 | 2390 | 1.130 | -- |
| 总计 | | 271894 | 100.000 | 32766 | | | |

图284 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-539-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-41
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 23:03:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:23:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.632 | 275008 | 100.000 | 33213 | 2390 | 1.131 | -- |
| 总计 | | 275008 | 100.000 | 33213 | | | |

图285 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-540-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-50
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 23:07:52 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:23:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.633 | 271277 | 100.000 | 32714 | 2385 | 1.131 | -- |
| 总计 | | 271277 | 100.000 | 32714 | | | |

图286 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-541-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-6 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 23:11:45 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:23:53
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.633 | 264903 | 100.000 | 31928 | 2386 | 1.131 | -- |
| 总计 | | 264903 | 100.000 | 31928 | | | |

图287 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-542-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-15 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 23:15:38 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:23:56
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm


| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.632 | 269353 | 100.000 | 32517 | 2384 | 1.131 | -- |
| 总计 | | 269353 | 100.000 | 32517 | | | |

图288 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-543-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-24
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 23:19:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:23:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.632 | 272095 | 100.000 | 32860 | 2383 | 1.131 | -- |
| 总计 | | 272095 | 100.000 | 32860 | | | |

图289 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-544-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-33
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 23:23:26 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:24:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.632 | 270124 | 100.000 | 32663 | 2395 | 1.131 | -- |
| 总计 | | 270124 | 100.000 | 32663 | | | |

图290 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-545-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-42
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 23:27:19 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:24:05 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.633 | 273164 | 100.000 | 32948 | 2388 | 1.131 | -- |
| 总计 | | 273164 | 100.000 | 32948 | | | |

图291 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-546-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-51
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 23:31:13 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:24:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.631 | 272636 | 100.000 | 32886 | 2379 | 1.132 | -- |
| 总计 | | 272636 | 100.000 | 32886 | | | |

图292 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-547-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-7 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 23:35:06 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:24:10
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.629 | 271120 | 100.000 | 32686 | 2371 | 1.132 | -- |
| 总计 | | 271120 | 100.000 | 32686 | | | |

图293 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-548-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-16 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiechaojun
 进样时间: 2024/06/22 23:38:59 处理者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:24:13
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.630 | 270180 | 100.000 | 32617 | 2379 | 1.133 | -- |
| 总计 | | 270180 | 100.000 | 32617 | | | |

图294 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-549-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-25
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 23:42:53 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:24:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.631 | 269672 | 100.000 | 32547 | 2380 | 1.132 | -- |
| 总计 | | 269672 | 100.000 | 32547 | | | |

图295 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-550-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-34
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 23:46:46 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:24:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.630 | 271164 | 100.000 | 32736 | 2377 | 1.132 | -- |
| 总计 | | 271164 | 100.000 | 32736 | | | |

图296 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-551-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-43
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 23:50:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:24:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.629 | 274459 | 100.000 | 33071 | 2372 | 1.134 | -- |
| 总计 | | 274459 | 100.000 | 33071 | | | |

图297 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-552-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-52
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 23:54:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:24:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.629 | 273128 | 100.000 | 32974 | 2379 | 1.134 | -- |
| 总计 | | 273128 | 100.000 | 32974 | | | |

图298 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-553-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/22 23:58:26 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:24:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.618 | 235303 | 100.000 | 27759 | 2260 | 1.133 | -- |
| 总计 | | 235303 | 100.000 | 27759 | | | |

图299 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-1




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 0-46/25-554-2 - zzp-2024051613p-25mg-2-rcqx-pH2.0jz-lf100z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFF-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240622-RCQX-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/06/23 00:02:20 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/06/25 10:24:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.618 | 235230 | 100.000 | 27782 | 2262 | 1.133 | -- |
| 总计 | | 235230 | 100.000 | 27782 | | | |

图300 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2024051613批(25mg规格)-pH2.0介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2