枸橼酸西地那非片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	420012-202204	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	98.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	125
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	0.7118

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	17.27	956044	955375	955214	955453	955046	955426	0.04
2	17.23	952803	953458				953130	0.05

单位质量响应值		RSD%	判断
55322.87	55318.05	0.01	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2024-07-04

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-2024051911批-pH1.2

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	1070500	-	1070500	97.982	98.34	1.31	97.98	98.34	1.31
	2	1056707	-	1056707	96.720			96.72		
	3	1087289	-	1087289	99.519			99.52		
	4	1070571	-	1070571	97.989			97.99		
	5	1066599	-	1066599	97.625			97.63		
	6	1094590	-	1094590	100.187			100.19		
10min	1	1104355	-	1104355	101.081	101.03	1.37	101.24	101.19	1.37
	2	1125092	-	1125092	102.979			103.14		
	3	1104334	-	1104334	101.079			101.25		
	4	1089412	-	1089412	99.713			99.88		
	5	1084748	-	1084748	99.287			99.45		
	6	1114538	-	1114538	102.013			102.18		
15min	1	1104156	-	1104156	101.063	100.97	1.39	101.39	101.30	1.39
	2	1125777	-	1125777	103.042			103.37		
	3	1103621	-	1103621	101.014			101.35		
	4	1089315	-	1089315	99.705			100.03		
	5	1083560	-	1083560	99.178			99.51		
	6	1112226	-	1112226	101.802			102.14		
20min	1	1101805	-	1101805	100.848	100.81	1.41	101.35	101.31	1.40
	2	1123218	-	1123218	102.808			103.31		
	3	1100651	-	1100651	100.742			101.24		
	4	1088641	-	1088641	99.643			100.14		
	5	1080886	-	1080886	98.933			99.43		
	6	1112905	-	1112905	101.864			102.37		
30min	1	1098043	-	1098043	100.503	100.64	1.45	101.17	101.31	1.45
	2	1123300	-	1123300	102.815			103.49		
	3	1098980	-	1098980	100.589			101.26		
	4	1086272	-	1086272	99.426			100.09		
	5	1079716	-	1079716	98.826			99.48		
	6	1110962	-	1110962	101.686			102.36		
45min	1	1095797	-	1095797	100.298	100.40	1.41	101.13	101.24	1.41
	2	1119457	-	1119457	102.463			103.31		
	3	1096264	-	1096264	100.341			101.18		
	4	1083496	-	1083496	99.172			100.00		
	5	1077767	-	1077767	98.648			99.47		
	6	1108667	-	1108667	101.476			102.32		
极限	1	1094800	-	1094800	100.207	99.39	3.19	101.21	100.39	3.17
	2	1115953	-	1115953	102.143			103.16		
	3	1094945	-	1094945	100.220			101.23		
	4	1081437	-	1081437	98.984			99.98		
	5	1019745	-	1019745	93.337			94.32		
	6	1108350	-	1108350	101.447			102.46		

操作者: 谢超君

复核者:

日　期: 2024-07-04

日　期:

未审阅版本

枸橼酸西地那非片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	420012-202204	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	98.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	125
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	0.7118

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	17.27	952742	951713	952126	952071	951988	952128	0.04
2	17.23	950308	950116				950212	0.02

单位质量响应值		RSD%	判断
55131.91	55148.69	0.03	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2024-07-04

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-2024051911批-pH1.2

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	1075297	-	1075297	98.743	99.07	1.65	98.74	99.07	1.65
	2	1092447	-	1092447	100.318			100.32		
	3	1054289	-	1054289	96.814			96.81		
	4	1062992	-	1062992	97.613			97.61		
	5	1099250	-	1099250	100.943			100.94		
	6	1088807	-	1088807	99.984			99.98		
10min	1	1090167	-	1090167	100.109	100.70	1.59	100.27	100.87	1.59
	2	1104951	-	1104951	101.466			101.63		
	3	1073533	-	1073533	98.581			98.74		
	4	1082513	-	1082513	99.406			99.57		
	5	1118971	-	1118971	102.754			102.92		
	6	1109829	-	1109829	101.914			102.08		
15min	1	1087856	-	1087856	99.896	100.66	1.71	100.23	100.99	1.71
	2	1103331	-	1103331	101.317			101.65		
	3	1072288	-	1072288	98.467			98.79		
	4	1081813	-	1081813	99.341			99.67		
	5	1122282	-	1122282	103.058			103.40		
	6	1109384	-	1109384	101.873			102.21		
20min	1	1088625	-	1088625	99.967	100.52	1.58	100.46	101.02	1.58
	2	1102413	-	1102413	101.233			101.74		
	3	1071721	-	1071721	98.415			98.90		
	4	1080316	-	1080316	99.204			99.70		
	5	1116869	-	1116869	102.561			103.07		
	6	1107661	-	1107661	101.715			102.22		
30min	1	1086589	-	1086589	99.780	100.37	1.54	100.44	101.03	1.54
	2	1099215	-	1099215	100.939			101.61		
	3	1071325	-	1071325	98.378			99.03		
	4	1079334	-	1079334	99.114			99.77		
	5	1115447	-	1115447	102.430			103.11		
	6	1105887	-	1105887	101.552			102.23		
45min	1	1084230	-	1084230	99.563	100.04	1.77	100.39	100.88	1.77
	2	1097636	-	1097636	100.794			101.64		
	3	1060498	-	1060498	97.384			98.20		
	4	1077663	-	1077663	98.960			99.78		
	5	1113647	-	1113647	102.265			103.12		
	6	1103048	-	1103048	101.291			102.14		
极限	1	1082097	-	1082097	99.368	99.91	1.54	100.36	100.91	1.54
	2	1094356	-	1094356	100.493			101.50		
	3	1065416	-	1065416	97.836			98.82		
	4	1074995	-	1074995	98.715			99.70		
	5	1109789	-	1109789	101.910			102.93		
	6	1101145	-	1101145	101.117			102.13		

操作者: 谢超君

日　期: 2024-07-04

复核者:

日　期:

未审阅版本

枸橼酸西地那非片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	420012-202204	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	98.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	125
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	0.7118

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	17.27	949969	950233	949952	950368	949955	950095	0.03
2	17.23	948314	948529				948422	0.02

单位质量响应值		RSD%	判断
55014.19	55044.81	0.04	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2024-07-04

复核者:

未审阅版本

供试品溶液-2024052011批-pH1.2

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	1062222	-	1062222	97.739	98.93	1.99	97.74	98.93	1.99
	2	1096729	-	1096729	100.914			100.91		
	3	1091510	-	1091510	100.434			100.43		
	4	1081090	-	1081090	99.475			99.47		
	5	1038994	-	1038994	95.602			95.60		
	6	1080748	-	1080748	99.443			99.44		
10min	1	1083535	-	1083535	99.700	100.58	1.89	99.86	100.75	1.89
	2	1108649	-	1108649	102.011			102.18		
	3	1117996	-	1117996	102.871			103.04		
	4	1104894	-	1104894	101.665			101.83		
	5	1079695	-	1079695	99.347			99.51		
	6	1063928	-	1063928	97.896			98.06		
15min	1	1083311	-	1083311	99.679	101.21	1.24	100.01	101.54	1.24
	2	1111073	-	1111073	102.234			102.57		
	3	1117922	-	1117922	102.864			103.20		
	4	1104173	-	1104173	101.599			101.93		
	5	1086997	-	1086997	100.018			100.34		
	6	1095998	-	1095998	100.847			101.18		
20min	1	1080821	-	1080821	99.450	101.13	1.25	99.95	101.64	1.25
	2	1105990	-	1105990	101.766			102.27		
	3	1117070	-	1117070	102.786			103.30		
	4	1102241	-	1102241	101.421			101.93		
	5	1084837	-	1084837	99.820			100.31		
	6	1103813	-	1103813	101.566			102.06		
30min	1	1078199	-	1078199	99.209	100.83	1.27	99.87	101.50	1.27
	2	1105687	-	1105687	101.738			102.42		
	3	1114711	-	1114711	102.569			103.25		
	4	1100082	-	1100082	101.222			101.90		
	5	1082646	-	1082646	99.618			100.28		
	6	1093827	-	1093827	100.647			101.31		
45min	1	1074682	-	1074682	98.885	100.64	1.26	99.71	101.47	1.26
	2	1103189	-	1103189	101.508			102.36		
	3	1111844	-	1111844	102.305			103.16		
	4	1098752	-	1098752	101.100			101.94		
	5	1082668	-	1082668	99.620			100.44		
	6	1091082	-	1091082	100.394			101.23		
极限	1	1073535	-	1073535	98.780	100.36	1.27	99.77	101.36	1.27
	2	1098790	-	1098790	101.104			102.12		
	3	1110268	-	1110268	102.160			103.18		
	4	1095339	-	1095339	100.786			101.80		
	5	1077247	-	1077247	99.121			100.11		
	6	1088882	-	1088882	100.192			101.19		

操作者: 谢超君

日　期: 2024-07-04

复核者:

未审阅版本

枸橼酸西地那非片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	420012-202204	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	98.8	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	125
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	0.7118

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	17.27	951179	951443	950365	951352	951489	951166	0.05
2	17.23	952272	952293				952282	0.01

单位质量响应值		RSD%	判断
55076.20	55268.83	0.25	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2024-07-04

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-2024052011批-pH1.2

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	1082502	-	1082502	99.347	90.62	7.26	99.35	90.62	7.26
	2	1063761	-	1063761	97.627			97.63		
	3	959283	-	959283	88.039			88.04		
	4	932459	-	932459	85.577			85.58		
	5	982053	-	982053	90.128			90.13		
	6	904109	-	904109	82.975			82.97		
10min	1	1093504	-	1093504	100.357	100.08	1.43	100.52	100.23	1.43
	2	1090418	-	1090418	100.073			100.24		
	3	1062589	-	1062589	97.519			97.67		
	4	1094524	-	1094524	100.450			100.59		
	5	1110602	-	1110602	101.926			102.08		
	6	1091074	-	1091074	100.134			100.27		
15min	1	1094266	-	1094266	100.427	100.57	1.33	100.76	100.89	1.33
	2	1090156	-	1090156	100.049			100.38		
	3	1073845	-	1073845	98.552			98.86		
	4	1099651	-	1099651	100.921			101.23		
	5	1118485	-	1118485	102.649			102.97		
	6	1098845	-	1098845	100.847			101.15		
20min	1	1091598	-	1091598	100.182	100.43	1.26	100.68	100.92	1.26
	2	1089966	-	1089966	100.032			100.53		
	3	1074032	-	1074032	98.570			99.04		
	4	1097396	-	1097396	100.714			101.19		
	5	1116463	-	1116463	102.464			102.95		
	6	1096612	-	1096612	100.642			101.12		
30min	1	1090356	-	1090356	100.068	100.60	1.03	100.73	101.26	1.03
	2	1096550	-	1096550	100.636			101.30		
	3	1081026	-	1081026	99.212			99.85		
	4	1096580	-	1096580	100.639			101.29		
	5	1115283	-	1115283	102.355			103.02		
	6	1097386	-	1097386	100.713			101.35		
45min	1	1088996	-	1088996	99.943	100.25	1.53	100.78	101.07	1.52
	2	1085259	-	1085259	99.600			100.43		
	3	1066745	-	1066745	97.901			98.70		
	4	1092506	-	1092506	100.265			101.08		
	5	1113942	-	1113942	102.232			103.06		
	6	1106388	-	1106388	101.539			102.35		
极限	1	1086496	-	1086496	99.714	99.79	1.40	100.71	100.78	1.39
	2	1080616	-	1080616	99.174			100.17		
	3	1064908	-	1064908	97.732			98.70		
	4	1089082	-	1089082	99.951			100.93		
	5	1111328	-	1111328	101.992			103.00		
	6	1091488	-	1091488	100.172			101.15		

操作者: 谢超君

复核者:

日　期: 2024-07-04

日　期:

未审阅版本

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1531-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 11:25:11　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:31:03　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1532-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 11:29:03　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:31:07　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	956044	100.000	111442	2195	1.139	--
总计		956044	100.000	111442			

图2 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1533-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 11:32:55　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:31:11　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	955375	100.000	111582	2200	1.140	--
总计		955375	100.000	111582			

图3 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1534-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 11:36:47　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:31:14　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	955214	100.000	111838	2205	1.140	--
总计		955214	100.000	111838			

图4 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1535-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 11:40:39　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:31:17　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	955453	100.000	112079	2208	1.140	--
总计		955453	100.000	112079			

图5 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1536-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 11:44:31　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:31:20　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	955046	100.000	112156	2213	1.141	--
总计		955046	100.000	112156			

图6 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1537-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 11:53:09　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:31:23　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.636	1070500	100.000	127967	2311	1.146	--
总计		1070500	100.000	127967			

图7 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1538-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 11:57:02　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:31:25　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.634	1056707	100.000	126031	2306	1.146	--
总计		1056707	100.000	126031			

图8 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1539-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 12:00:54　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:31:28　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.634	1087289	100.000	129716	2302	1.149	--
总计		1087289	100.000	129716			

图9 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1540-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 12:04:46　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:31:31　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.634	1070571	100.000	127552	2301	1.148	--
总计		1070571	100.000	127552			

图10 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1541-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 12:08:39　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:31:33　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.634	1066599	100.000	127061	2297	1.148	--
总计		1066599	100.000	127061			

图11 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1542-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 12:12:32　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:31:36　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.633	1094590	100.000	130481	2291	1.149	--
总计		1094590	100.000	130481			

图12 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1543-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 12:16:24　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:31:39　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	1104355	100.000	131800	2295	1.151	--
总计		1104355	100.000	131800			

图13 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1544-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 12:20:16　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:31:41　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	1125092	100.000	134176	2287	1.153	--
总计		1125092	100.000	134176			

图14 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1545-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 12:24:08　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:31:44　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	1104334	100.000	131733	2290	1.153	--
总计		1104334	100.000	131733			

图15 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1546-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 12:28:00　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:31:47　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	1089412	100.000	130291	2305	1.152	--
总计		1089412	100.000	130291			

图16 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1547-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 12:31:53　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:31:49　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	1084748	100.000	129648	2302	1.151	--
总计		1084748	100.000	129648			

图17 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1548-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 12:35:44　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:31:52　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	1114538	100.000	133181	2295	1.153	--
总计		1114538	100.000	133181			

图18 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1549-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 12:39:36　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:31:55　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	1104156	100.000	131571	2282	1.152	--
总计		1104156	100.000	131571			

图19 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1550-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 12:43:28　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:31:58　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	1125777	100.000	134267	2285	1.152	--
总计		1125777	100.000	134267			

图20 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1551-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 12:47:20　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:32:00　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	1103621	100.000	131657	2285	1.151	--
总计		1103621	100.000	131657			

图21 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1552-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 12:51:12　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:32:03　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	1089315	100.000	129976	2287	1.151	--
总计		1089315	100.000	129976			

图22 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1553-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 12:55:04　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:32:06　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.632	1083560	100.000	129261	2291	1.151	--
总计		1083560	100.000	129261			

图23 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1554-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 12:58:56　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:32:09　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	1112226	100.000	132870	2293	1.152	--
总计		1112226	100.000	132870			

图24 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1555-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 13:02:48　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:32:11　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	1101805	100.000	131620	2294	1.152	--
总计		1101805	100.000	131620			

图25 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1556-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 13:06:40　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:32:14　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	1123218	100.000	134204	2294	1.153	--
总计		1123218	100.000	134204			

图26 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1557-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 13:10:33　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:32:18　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	1100651	100.000	131594	2298	1.152	--
总计		1100651	100.000	131594			

图27 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1558-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 13:14:25　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:32:21　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.631	1088641	100.000	129983	2293	1.152	--
总计		1088641	100.000	129983			

图28 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1559-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 13:18:18　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:32:25　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	1080886	100.000	129222	2296	1.151	--
总计		1080886	100.000	129222			

图29 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1560-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 13:22:10　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:32:30　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	1112905	100.000	132805	2287	1.153	--
总计		1112905	100.000	132805			

图30 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1561-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 13:26:02　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:32:34　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	1098043	100.000	131041	2287	1.153	--
总计		1098043	100.000	131041			

图31 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1562-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 13:29:54　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:32:38　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	1123300	100.000	134012	2286	1.153	--
总计		1123300	100.000	134012			

图32 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1563-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 13:33:47　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:32:43　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.630	1098980	100.000	131292	2293	1.152	--
总计		1098980	100.000	131292			

图33 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1564-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 13:37:39　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:32:47　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	1086272	100.000	129459	2281	1.152	--
总计		1086272	100.000	129459			

图34 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1565-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 13:41:32　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:32:51　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.629	1079716	100.000	128710	2282	1.152	--
总计		1079716	100.000	128710			

图35 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1566-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 13:45:24　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:32:56　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	1110962	100.000	132183	2274	1.155	--
总计		1110962	100.000	132183			

图36 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1567-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 13:49:16　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:33:00　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	1095797	100.000	130532	2281	1.154	--
总计		1095797	100.000	130532			

图37 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1568-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 13:53:09　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:33:04　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	1119457	100.000	133536	2286	1.154	--
总计		1119457	100.000	133536			

图38 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1569-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 13:57:01　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:33:08　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	1096264	100.000	130901	2288	1.152	--
总计		1096264	100.000	130901			

图39 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1570-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 14:00:53　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:33:12　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	1083496	100.000	129412	2291	1.152	--
总计		1083496	100.000	129412			

图40 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1571-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 14:04:45　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:33:16　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	1077767	100.000	128755	2293	1.151	--
总计		1077767	100.000	128755			

图41 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1572-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 14:08:37　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:33:21　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	1108667	100.000	132464	2294	1.153	--
总计		1108667	100.000	132464			

图42 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1573-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 14:12:29　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:33:25　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	1094800	100.000	130506	2287	1.153	--
总计		1094800	100.000	130506			

图43 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1574-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 14:16:22　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:33:29　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	1115953	100.000	133072	2288	1.154	--
总计		1115953	100.000	133072			

图44 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1575-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 14:20:14　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:33:34　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	1094945	100.000	130535	2288	1.154	--
总计		1094945	100.000	130535			

图45 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1576-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 14:24:07　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:33:38　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	1081437	100.000	129063	2293	1.154	--
总计		1081437	100.000	129063			

图46 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1577-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 14:28:00　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:33:42　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.628	1019745	100.000	122093	2305	1.150	--
总计		1019745	100.000	122093			

图47 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1578-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 14:31:52　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:33:46　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	1108350	100.000	132431	2298	1.155	--
总计		1108350	100.000	132431			

图48 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1579-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 14:35:46　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:33:50　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.618	952803	100.000	112118	2212	1.148	--
总计		952803	100.000	112118			

图49 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1580-2 - zzp-2024051911p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 14:39:38　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:33:55　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.618	953458	100.000	112279	2219	1.147	--
总计		953458	100.000	112279			

图50 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1581-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 14:43:32　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:33:59　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图51 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转溶剂

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1582-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 14:47:27　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:34:05　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.618	952742	100.000	112236	2218	1.147	--
总计		952742	100.000	112236			

图52 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1583-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 14:51:22　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:34:09　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.619	951713	100.000	112151	2216	1.146	--
总计		951713	100.000	112151			

图53 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1584-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 14:55:16　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:34:13　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.618	952126	100.000	111885	2209	1.147	--
总计		952126	100.000	111885			

图54 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1585-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 14:59:11　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:34:18　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.618	952071	100.000	111894	2209	1.147	--
总计		952071	100.000	111894			

图55 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1586-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 15:03:05　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:34:21　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.618	951988	100.000	112003	2212	1.147	--
总计		951988	100.000	112003			

图56 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1587-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 15:06:58　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:34:26　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	1075297	100.000	128388	2297	1.153	--
总计		1075297	100.000	128388			

图57 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1588-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 15:10:53　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:34:30　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	1092447	100.000	130285	2287	1.155	--
总计		1092447	100.000	130285			

图58 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1589-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 15:14:47　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:34:35　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	1054289	100.000	125788	2291	1.153	--
总计		1054289	100.000	125788			

图59 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1590-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 15:18:41　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:34:39　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	1062992	100.000	126730	2289	1.155	--
总计		1062992	100.000	126730			

图60 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1591-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 15:22:34　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:34:43　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	1099250	100.000	131107	2291	1.157	--
总计		1099250	100.000	131107			

图61 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1592-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 15:26:27　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:34:48　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	1088807	100.000	129769	2288	1.156	--
总计		1088807	100.000	129769			

图62 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1593-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 15:30:21　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:34:52　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	1090167	100.000	130139	2290	1.155	--
总计		1090167	100.000	130139			

图63 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1594-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 15:34:14　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:34:55　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1104951	100.000	132189	2294	1.156	--
总计		1104951	100.000	132189			

图64 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1595-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 15:38:08　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:34:58　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	1073533	100.000	128291	2294	1.152	--
总计		1073533	100.000	128291			

图65 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1596-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 15:42:02　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:35:01　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1082513	100.000	129390	2291	1.153	--
总计		1082513	100.000	129390			

图66 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1597-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 15:45:55　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:35:03　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1118971	100.000	133806	2291	1.155	--
总计		1118971	100.000	133806			

图67 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1598-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 15:49:48　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:35:06　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1109829	100.000	132671	2291	1.156	--
总计		1109829	100.000	132671			

图68 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1599-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 15:53:41　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:35:09　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1087856	100.000	130026	2290	1.153	--
总计		1087856	100.000	130026			

图69 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1600-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 15:57:34　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:35:11　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1103331	100.000	131790	2289	1.154	--
总计		1103331	100.000	131790			

图70 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1601-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 16:01:28　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:35:14　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1072288	100.000	128207	2292	1.153	--
总计		1072288	100.000	128207			

图71 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1602-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 16:05:22　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:35:17　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1081813	100.000	129370	2292	1.153	--
总计		1081813	100.000	129370			

图72 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1603-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 16:09:15　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:35:19　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	1122282	100.000	134266	2290	1.155	--
总计		1122282	100.000	134266			

图73 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1604-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 16:13:08　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:35:22　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	1109384	100.000	132696	2289	1.154	--
总计		1109384	100.000	132696			

图74 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1605-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 16:17:02　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:35:26　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1088625	100.000	129992	2285	1.153	--
总计		1088625	100.000	129992			

图75 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1606-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 16:20:57　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:35:30　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1102413	100.000	131600	2283	1.152	--
总计		1102413	100.000	131600			

图76 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1607-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 16:24:50　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:35:34　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1071721	100.000	127841	2281	1.150	--
总计		1071721	100.000	127841			

图77 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1608-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 16:28:43　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:35:39　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	1080316	100.000	128841	2282	1.151	--
总计		1080316	100.000	128841			

图78 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1609-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 16:32:37　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:35:43　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	1116869	100.000	133332	2279	1.152	--
总计		1116869	100.000	133332			

图79 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1610-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 16:36:30　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:35:48　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	1107661	100.000	132324	2279	1.152	--
总计		1107661	100.000	132324			

图80 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1611-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 16:40:24　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:35:52　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	1086589	100.000	129918	2286	1.151	--
总计		1086589	100.000	129918			

图81 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1612-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 16:44:17　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:35:56　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	1099215	100.000	131457	2284	1.151	--
总计		1099215	100.000	131457			

图82 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1613-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 16:48:10　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:36:01　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	1071325	100.000	127897	2277	1.150	--
总计		1071325	100.000	127897			

图83 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1614-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 16:52:04　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:36:05　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	1079334	100.000	128875	2276	1.150	--
总计		1079334	100.000	128875			

图84 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1615-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 16:55:58　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:36:09　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	1115447	100.000	133109	2274	1.153	--
总计		1115447	100.000	133109			

图85 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1616-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 16:59:52　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:36:14　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	1105887	100.000	131874	2269	1.151	--
总计		1105887	100.000	131874			

图86 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1617-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 17:03:45　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:36:18　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	1084230	100.000	129418	2275	1.151	--
总计		1084230	100.000	129418			

图87 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1618-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 17:07:39　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:36:21　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	1097636	100.000	131258	2284	1.152	--
总计		1097636	100.000	131258			

图88 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1619-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 17:11:33　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:36:26　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	1060498	100.000	127029	2292	1.149	--
总计		1060498	100.000	127029			

图89 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1620-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 17:15:27　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:36:30　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	1077663	100.000	128916	2286	1.150	--
总计		1077663	100.000	128916			

图90 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1621-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 17:19:20　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:36:34　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	1113647	100.000	133285	2287	1.151	--
总计		1113647	100.000	133285			

图91 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1622-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 17:23:14　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:36:38　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	1103048	100.000	132212	2294	1.150	--
总计		1103048	100.000	132212			

图92 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1623-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 17:27:08　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:36:44　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	1082097	100.000	129762	2296	1.150	--
总计		1082097	100.000	129762			

图93 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1624-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 17:31:03　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:36:47　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	1094356	100.000	131176	2295	1.151	--
总计		1094356	100.000	131176			

图94 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1625-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 17:34:57　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:36:50　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	1065416	100.000	127920	2304	1.148	--
总计		1065416	100.000	127920			

图95 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1626-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 17:38:52　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:36:52　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	1074995	100.000	129046	2303	1.149	--
总计		1074995	100.000	129046			

图96 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1627-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 17:42:45　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:36:55　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	1109789	100.000	133172	2302	1.151	--
总计		1109789	100.000	133172			

图97 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1628-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 17:46:39　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:36:58　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	1101145	100.000	132168	2303	1.151	--
总计		1101145	100.000	132168			

图98 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1629-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 17:50:34　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:37:00　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.616	950308	100.000	111977	2211	1.145	--
总计		950308	100.000	111977			

图99 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1630-2 - zzp-2024051911p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 17:54:28　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:37:03　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.616	950116	100.000	111904	2209	1.146	--
总计		950116	100.000	111904			

图100 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051911批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1631-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 17:58:20　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:37:06　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图101 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1632-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 18:02:12　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:37:09　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.617	949969	100.000	111645	2208	1.145	--
总计		949969	100.000	111645			

图102 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1633-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 18:06:05　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:37:11　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.618	950233	100.000	111590	2205	1.145	--
总计		950233	100.000	111590			

图103 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1634-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 18:09:58　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:37:14　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.617	949952	100.000	111805	2209	1.145	--
总计		949952	100.000	111805			

图104 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1635-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 18:13:50　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:37:17　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.616	950368	100.000	111819	2205	1.143	--
总计		950368	100.000	111819			

图105 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1636-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 18:17:42　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:37:19　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.617	949955	100.000	111819	2209	1.145	--
总计		949955	100.000	111819			

图106 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1637-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 18:21:34　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:37:22　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	1062222	100.000	127013	2295	1.149	--
总计		1062222	100.000	127013			

图107 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1638-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 18:25:27　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:37:25　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1096729	100.000	130995	2287	1.151	--
总计		1096729	100.000	130995			

图108 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1639-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 18:29:18　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:37:28　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1091510	100.000	130638	2295	1.151	--
总计		1091510	100.000	130638			

图109 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1640-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 18:33:10　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:37:30　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1081090	100.000	129582	2301	1.149	--
总计		1081090	100.000	129582			

图110 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1641-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 18:37:03　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:37:33　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	1038994	100.000	124415	2300	1.147	--
总计		1038994	100.000	124415			

图111 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1642-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 18:40:56　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:37:36　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	1080748	100.000	129207	2292	1.150	--
总计		1080748	100.000	129207			

图112 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1643-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 18:44:47　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:37:38　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1083535	100.000	129771	2297	1.150	--
总计		1083535	100.000	129771			

图113 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1644-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 18:48:38　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:37:41　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1108649	100.000	132727	2296	1.150	--
总计		1108649	100.000	132727			

图114 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1645-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 18:52:30　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:37:44　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	1117996	100.000	133608	2291	1.152	--
总计		1117996	100.000	133608			

图115 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1646-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 18:56:22　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:37:47　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1104894	100.000	132079	2291	1.151	--
总计		1104894	100.000	132079			

图116 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1647-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 19:00:14　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:37:49　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	1079695	100.000	129046	2292	1.149	--
总计		1079695	100.000	129046			

图117 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1648-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 19:04:05　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:37:52　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	1063928	100.000	127129	2292	1.147	--
总计		1063928	100.000	127129			

图118 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1649-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 19:07:57　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:37:55　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	1083311	100.000	129446	2291	1.148	--
总计		1083311	100.000	129446			

图119 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1650-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 19:11:49　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:37:57　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	1111073	100.000	132710	2286	1.149	--
总计		1111073	100.000	132710			

图120 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1651-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 19:15:40　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:38:00　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1117922	100.000	133441	2282	1.150	--
总计		1117922	100.000	133441			

图121 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1652-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 19:19:32　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:38:03　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1104173	100.000	131947	2286	1.149	--
总计		1104173	100.000	131947			

图122 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1653-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 19:23:24　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:38:06　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	1086997	100.000	129723	2284	1.149	--
总计		1086997	100.000	129723			

图123 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1654-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 19:27:15　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:38:08　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	1095998	100.000	131081	2286	1.149	--
总计		1095998	100.000	131081			

图124 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1655-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 19:31:06　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:38:11　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1080821	100.000	129085	2284	1.149	--
总计		1080821	100.000	129085			

图125 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1656-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 19:34:58　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:38:14　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	1105990	100.000	132096	2281	1.150	--
总计		1105990	100.000	132096			

图126 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1657-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 19:38:51　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:38:16　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1117070	100.000	133179	2275	1.153	--
总计		1117070	100.000	133179			

图127 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1658-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 19:42:42　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:38:19　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	1102241	100.000	131396	2282	1.151	--
总计		1102241	100.000	131396			

图128 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1659-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 19:46:33　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:38:22　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	1084837	100.000	129470	2285	1.148	--
总计		1084837	100.000	129470			

图129 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1660-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 19:50:25　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:38:25　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	1103813	100.000	131619	2274	1.150	--
总计		1103813	100.000	131619			

图130 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1661-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 19:54:18　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:38:28　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	1078199	100.000	128422	2273	1.148	--
总计		1078199	100.000	128422			

图131 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1662-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 19:58:09　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:38:30　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1105687	100.000	131760	2274	1.150	--
总计		1105687	100.000	131760			

图132 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1663-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 20:02:01　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:38:33　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1114711	100.000	132811	2270	1.151	--
总计		1114711	100.000	132811			

图133 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1664-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 20:05:51　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:38:36　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	1100082	100.000	131104	2277	1.150	--
总计		1100082	100.000	131104			

图134 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1665-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 20:09:42　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:38:38　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	1082646	100.000	128985	2276	1.148	--
总计		1082646	100.000	128985			

图135 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1666-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 20:13:34　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:38:41　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	1093827	100.000	130156	2271	1.150	--
总计		1093827	100.000	130156			

图136 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1667-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 20:17:27　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:38:44　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1074682	100.000	127743	2263	1.149	--
总计		1074682	100.000	127743			

图137 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1668-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 20:21:18　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:38:47　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1103189	100.000	131130	2260	1.150	--
总计		1103189	100.000	131130			

图138 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1669-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 20:25:09　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:38:49　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1111844	100.000	132324	2266	1.151	--
总计		1111844	100.000	132324			

图139 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1670-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 20:29:02　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:38:52　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1098752	100.000	130791	2267	1.150	--
总计		1098752	100.000	130791			

图140 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1671-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 20:32:52　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:38:55　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1082668	100.000	128922	2269	1.149	--
总计		1082668	100.000	128922			

图141 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1672-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 20:36:43　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:38:58　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	1091082	100.000	130192	2278	1.149	--
总计		1091082	100.000	130192			

图142 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1673-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 20:40:35　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:39:01　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1073535	100.000	128127	2282	1.149	--
总计		1073535	100.000	128127			

图143 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1674-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 20:44:26　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:39:03　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1098790	100.000	131220	2283	1.151	--
总计		1098790	100.000	131220			

图144 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1675-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 20:48:18　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:39:06　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1110268	100.000	132534	2283	1.151	--
总计		1110268	100.000	132534			

图145 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1676-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 20:52:09　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:39:09　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1095339	100.000	130602	2277	1.151	--
总计		1095339	100.000	130602			

图146 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1677-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 20:56:01　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:39:11　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1077247	100.000	128462	2276	1.150	--
总计		1077247	100.000	128462			

图147 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1678-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 20:59:52　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:39:14　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.624	1088882	100.000	129910	2277	1.150	--
总计		1088882	100.000	129910			

图148 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1679-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 21:03:45　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:39:17　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.617	948314	100.000	111183	2195	1.144	--
总计		948314	100.000	111183			

图149 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1680-2 - zzp-2024052011p-100mg-1-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 21:07:36　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:39:20　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.617	948529	100.000	111116	2193	1.145	--
总计		948529	100.000	111116			

图150 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1681-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 21:11:31　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:39:22　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图151 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1682-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 21:15:25　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:39:25　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.617	951179	100.000	111345	2184	1.145	--
总计		951179	100.000	111345			

图152 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1683-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 21:19:20　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:39:28　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.617	951443	100.000	110928	2170	1.144	--
总计		951443	100.000	110928			

图153 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1684-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 21:23:13　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:39:30　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.617	950365	100.000	110814	2169	1.145	--
总计		950365	100.000	110814			

图154 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1685-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 21:27:06　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:39:33　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.617	951352	100.000	110830	2168	1.145	--
总计		951352	100.000	110830			

图155 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1686-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 21:31:00　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:39:36　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.618	951489	100.000	111226	2182	1.146	--
总计		951489	100.000	111226			

图156 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1687-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 21:34:54　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:39:38　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	1082502	100.000	128418	2266	1.153	--
总计		1082502	100.000	128418			

图157 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1688-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 21:38:46　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:39:41　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.626	1063761	100.000	126334	2269	1.152	--
总计		1063761	100.000	126334			

图158 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1689-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 21:42:39　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:39:44　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	959283	100.000	114109	2276	1.145	--
总计		959283	100.000	114109			

图159 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1690-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 21:46:31　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:39:46　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	932459	100.000	111022	2279	1.143	--
总计		932459	100.000	111022			

图160 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1691-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 21:50:23　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:39:49　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.625	982053	100.000	116768	2271	1.148	--
总计		982053	100.000	116768			

图161 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1692-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 21:54:15　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:39:52　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.627	904109	100.000	107574	2278	1.143	--
总计		904109	100.000	107574			

图162 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1693-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 21:58:07　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:39:55　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	1093504	100.000	130047	2262	1.155	--
总计		1093504	100.000	130047			

图163 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1694-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 22:02:01　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:39:57　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.622	1090418	100.000	129967	2269	1.155	--
总计		1090418	100.000	129967			

图164 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1695-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 22:05:53　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:40:00　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.623	1062589	100.000	126487	2263	1.153	--
总计		1062589	100.000	126487			

图165 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1696-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 22:09:46　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:40:03　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.621	1094524	100.000	130347	2262	1.154	--
总计		1094524	100.000	130347			

图166 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1697-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 22:13:38　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:40:06　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.620	1110602	100.000	131990	2253	1.156	--
总计		1110602	100.000	131990			

图167 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1698-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 22:17:30　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:40:08　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.621	1091074	100.000	130005	2266	1.154	--
总计		1091074	100.000	130005			

图168 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1699-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 22:21:23　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:40:11　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.620	1094266	100.000	130538	2271	1.154	--
总计		1094266	100.000	130538			

图169 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1700-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 22:25:15　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:40:14　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.620	1090156	100.000	129265	2243	1.153	--
总计		1090156	100.000	129265			

图170 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1701-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 22:29:07　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:40:16　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.620	1073845	100.000	127327	2244	1.151	--
总计		1073845	100.000	127327			

图171 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1702-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 22:33:00　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:40:19　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.617	1099651	100.000	130154	2240	1.154	--
总计		1099651	100.000	130154			

图172 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1703-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 22:36:53　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:40:22　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.617	1118485	100.000	132342	2236	1.155	--
总计		1118485	100.000	132342			

图173 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1704-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 22:40:46　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:40:25　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.617	1098845	100.000	130173	2241	1.154	--
总计		1098845	100.000	130173			

图174 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1705-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 22:44:39　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:40:27　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.617	1091598	100.000	129249	2240	1.153	--
总计		1091598	100.000	129249			

图175 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1706-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 22:48:36　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:40:30　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.616	1089966	100.000	129244	2241	1.154	--
总计		1089966	100.000	129244			

图176 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1707-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 22:52:28　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:40:33　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.617	1074032	100.000	127179	2244	1.154	--
总计		1074032	100.000	127179			

图177 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1708-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 22:56:20　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:40:35　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.617	1097396	100.000	129887	2239	1.155	--
总计		1097396	100.000	129887			

图178 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1709-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 23:00:14　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:40:38　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.617	1116463	100.000	131958	2233	1.157	--
总计		1116463	100.000	131958			

图179 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1710-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 23:04:08　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:40:41　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.617	1096612	100.000	129627	2233	1.156	--
总计		1096612	100.000	129627			

图180 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1711-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 23:08:01　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:40:44　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.617	1090356	100.000	128797	2227	1.156	--
总计		1090356	100.000	128797			

图181 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1712-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 23:11:55　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:40:46　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.616	1096550	100.000	129659	2225	1.157	--
总计		1096550	100.000	129659			

图182 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1713-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 23:15:47　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:40:49　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.616	1081026	100.000	127749	2222	1.157	--
总计		1081026	100.000	127749			

图183 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1714-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 23:19:40　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:40:52　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.615	1096580	100.000	129562	2219	1.157	--
总计		1096580	100.000	129562			

图184 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1715-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 23:23:34　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:40:55　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.614	1115283	100.000	131890	2219	1.157	--
总计		1115283	100.000	131890			

图185 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1716-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 23:27:26　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:40:57　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.615	1097386	100.000	129691	2221	1.157	--
总计		1097386	100.000	129691			

图186 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1717-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 23:31:20　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:41:00　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.615	1088996	100.000	128596	2217	1.157	--
总计		1088996	100.000	128596			

图187 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1718-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 23:35:14　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:41:03　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.615	1085259	100.000	128270	2220	1.156	--
总计		1085259	100.000	128270			

图188 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1719-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 23:39:07　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:41:06　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.615	1066745	100.000	126317	2226	1.153	--
总计		1066745	100.000	126317			

图189 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1720-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 23:42:59　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:41:08　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.615	1092506	100.000	129379	2227	1.155	--
总计		1092506	100.000	129379			

图190 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1721-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 23:46:53　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:41:11　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.614	1113942	100.000	132049	2228	1.156	--
总计		1113942	100.000	132049			

图191 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1722-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 23:50:46　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:41:14　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.614	1106388	100.000	131074	2226	1.155	--
总计		1106388	100.000	131074			

图192 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1723-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 23:54:39　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:41:16　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.614	1086496	100.000	128888	2232	1.155	--
总计		1086496	100.000	128888			

图193 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1724-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/03 23:58:33　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:41:19　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.613	1080616	100.000	128339	2236	1.155	--
总计		1080616	100.000	128339			

图194 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1725-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/04 00:02:27　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:41:22　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.613	1064908	100.000	126380	2234	1.155	--
总计		1064908	100.000	126380			

图195 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1726-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/04 00:06:20　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:41:25　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.614	1089082	100.000	129267	2236	1.156	--
总计		1089082	100.000	129267			

图196 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1727-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/04 00:10:14　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:41:27　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.614	1111328	100.000	132030	2238	1.155	--
总计		1111328	100.000	132030			

图197 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1728-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 10 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/04 00:14:07　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:41:30　　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.613	1091488	100.000	129674	2237	1.154	--
总计		1091488	100.000	129674			

图198 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1729-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/04 00:18:01　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:41:33　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.605	952272	100.000	111493	2159	1.149	--
总计		952272	100.000	111493			

图199 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)　流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃　波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 0-62/24-1730-2 - zzp-2024052011p-100mg-2-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX273.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240703-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/04 00:21:55　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2024/07/04 09:41:35　处理者: xiechaojun
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.604	952293	100.000	111533	2159	1.150	--
总计		952293	100.000	111533			

图200 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024052011批(100mg规格)-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2