



氟伐他汀钠缓释片项目信息

介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	100800-202103	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	93.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	125
标示量(mg)	80	供试品稀释倍数	1	系数	0.9493


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>4</sub>	A <sub>5</sub>	A <sub>平均</sub>	RSD%
1	10.99	1417979	1414056	1411911	1412467	1411825	1413648	0.19
2	11.14	1431057	1425639				1428348	0.27

单位质量响应值		RSD%	判断
128630.39	128217.95	0.23	数据可信

溶出曲线测定

氟伐他汀钠缓释片



操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-07-05

复核者:

未审阅版本



影响因素30天-供试品溶液-2024041821批-水

时间(分钟)	样品	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>平均</sub>	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
30min	1	90553	90838	90696	6.262	6.52	2.97	6.26	6.52	3.00
	2	94790	94863	94826	6.547			6.55		
	3	92167	91920	92044	6.355			6.35		
	4	95629	95615	95622	6.602			6.60		
	5	98270	98992	98631	6.810			6.81		
	6	95040	95173	95106	6.566			6.57		
120min	1	324419	324783	324601	22.411	25.15	6.92	22.42	25.16	6.92
	2	342462	341992	342227	23.628			23.64		
	3	368879	369172	369026	25.478			25.49		
	4	383227	385129	384178	26.524			26.53		
	5	381042	380833	380938	26.300			26.31		
	6	384012	385381	384696	26.560			26.57		
240min	1	672419	673121	672770	46.448	54.48	9.95	46.49	54.53	9.94
	2	712479	711477	711978	49.155			49.20		
	3	821717	821402	821560	56.721			56.77		
	4	873532	874216	873874	60.333			60.38		
	5	818439	818897	818668	56.521			56.57		
	6	835726	835629	835678	57.696			57.75		
480min	1	1436251	1434101	1435176	99.085	102.47	1.73	99.20	102.60	1.73
	2	1500453	1508023	1504238	103.854			103.97		
	3	1491294	1494213	1492754	103.061			103.19		
	4	1502653	1502324	1502488	103.733			103.87		
	5	1479336	1479857	1479596	102.152			102.29		
	6	1490792	1491350	1491071	102.944			103.08		



操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-07-05

复核者:

未审阅版本



氟伐他汀钠缓释片项目信息


介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	100800-202103	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	93.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	125
标示量(mg)	80	供试品稀释倍数	1	系数	0.9493

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>4</sub>	A <sub>5</sub>	A <sub>平均</sub>	RSD%
1	10.99	1398833	1396847	1397077	1397698	1396229	1397337	0.08
2	11.14	1415953	1416030				1415992	0.01
单位质量响应值			RSD%		判断			
127146.22		127108.80		0.03		数据可信		

溶出曲线测定

氟伐他汀钠缓释片



操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-07-05

复核者:

未审阅版本



影响因素30天-供试品溶液-2024041821批-水

时间(分钟)	样品	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>平均</sub>	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
30min	1	84105	84154	84130	5.868	6.64	10.71	5.87	6.64	10.68
	2	100036	99922	99979	6.973			6.97		
	3	95646	96035	95840	6.684			6.68		
	4	81784	81582	81683	5.697			5.70		
	5	105303	105217	105260	7.341			7.34		
	6	104830	104599	104714	7.303			7.30		
120min	1	336080	335810	335945	23.430	25.25	8.01	23.44	25.26	8.01
	2	370712	370344	370528	25.842			25.85		
	3	352495	352870	352682	24.598			24.61		
	4	326623	328438	327530	22.843			22.85		
	5	403682	405595	404638	28.221			28.23		
	6	381002	380715	380858	26.563			26.57		
240min	1	734566	732057	733312	51.145	55.47	8.29	51.19	55.52	8.28
	2	846931	845872	846402	59.032			59.08		
	3	778106	778934	778520	54.298			54.34		
	4	706846	706163	706504	49.275			49.32		
	5	841824	842527	842176	58.737			58.79		
	6	863527	866615	865071	60.334			60.38		
480min	1	1402208	1402087	1402148	97.792	101.63	3.31	97.91	101.76	3.32
	2	1469842	1470366	1470104	102.532			102.67		
	3	1484400	1481830	1483115	103.439			103.57		
	4	1391731	1391887	1391809	97.071			97.19		
	5	1505333	1505874	1505604	105.008			105.15		
	6	1489796	1491005	1490400	103.947			104.09		



操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-07-05

复核者:

未审阅版本



### 氟伐他汀钠缓释片项目信息


介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	100800-202103	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	93.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	125
标示量(mg)	80	供试品稀释倍数	1	系数	0.9493

### 对照品溶液

序号	称样量(mg)	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>4</sub>	A <sub>5</sub>	A <sub>平均</sub>	RSD%
1	10.99	1411601	1415905	1412394	1411890	1411264	1412611	0.14
2	11.14	1411150	1413079				1412114	0.10
单位质量响应值				RSD%	判断			
128536.03		126760.68		0.99	数据可信			

## 溶出曲线测定

氟伐他汀钠缓释片



操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-07-05

复核者:

未审阅版本



影响因素30天-供试品溶液-2024041821批-水

时间(分钟)	样品	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>平均</sub>	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
30min	1	97800	97495	97648	6.783	6.79	10.41	6.78	6.80	10.40
	2	97291	97160	97226	6.754			6.75		
	3	108277	107943	108110	7.510			7.51		
	4	99946	99744	99845	6.936			6.94		
	5	105035	105127	105081	7.299			7.30		
	6	78969	79009	78989	5.487			5.49		
120min	1	395695	397242	396468	27.540	26.43	10.73	27.55	26.44	10.72
	2	419170	419881	419526	29.142			29.15		
	3	387405	387837	387621	26.925			26.94		
	4	348947	346862	347904	24.167			24.18		
	5	315894	315809	315852	21.940			21.95		
	6	414854	417032	415943	28.893			28.90		
240min	1	855885	857106	856496	59.495	56.25	10.13	59.55	56.30	10.13
	2	883449	883670	883560	61.375			61.43		
	3	843489	843397	843443	58.588			58.64		
	4	706084	706662	706373	49.067			49.11		
	5	864562	864510	864536	60.054			60.10		
	6	704064	703978	704021	48.904			48.96		
480min	1	1509312	1508982	1509147	104.831	101.88	3.00	104.97	102.02	2.99
	2	1468648	1468315	1468482	102.006			102.15		
	3	1494292	1493617	1493954	103.775			103.91		
	4	1461641	1466945	1464293	101.715			101.84		
	5	1481131	1479820	1480476	102.839			102.97		
	6	1383412	1384122	1383767	96.121			96.25		



操作者: 谢鑫慧

日期: 2024-07-05

复核者:

未审阅版本




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-403-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-9  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 20:45:27      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:24:16      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转  
 溶剂




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-404-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 20:48:51      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:24:20      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	1417979	100.000	233809	2839	1.120	--
总计		1417979	100.000	233809			

图2 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转  
 对照品溶液-1-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-405-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 20:52:15      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:24:22      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	1414056	100.000	233111	2860	1.119	--
总计		1414056	100.000	233111			

图3 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转  
 对照品溶液-1-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-406-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 20:55:38      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:24:25      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	1411911	100.000	233844	2863	1.120	--
总计		1411911	100.000	233844			

图4 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转  
 对照品溶液-1-3




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-407-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 20:59:02      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:24:28      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.092	1412467	100.000	233260	2875	1.120	--
总计		1412467	100.000	233260			

图5 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转  
 对照品溶液-1-4




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-408-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 21:02:26      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:24:31      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	1411825	100.000	234075	2868	1.120	--
总计		1411825	100.000	234075			

图6 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转  
 对照品溶液-1-5




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-409-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 21:05:49      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:24:33      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	90553	100.000	14965	2875	1.123	--
总计		90553	100.000	14965			

图7 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-410-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 21:09:12      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:24:36      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.094	90838	100.000	15018	2883	1.119	--
总计		90838	100.000	15018			

图8 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片1  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 2.0ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-411-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 21:12:35      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:24:39      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	94790	100.000	15603	2866	1.125	--
总计		94790	100.000	15603			

图9 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-412-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 21:15:58      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:24:41      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.092	94863	100.000	15590	2866	1.124	--
总计		94863	100.000	15590			

图10 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片2  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-413-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-19  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 21:19:20      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:24:44      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	92167	100.000	15266	2876	1.126	--
总计		92167	100.000	15266			

图11 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-414-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-19  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 21:22:43      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:24:47      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	91920	100.000	15247	2877	1.124	--
总计		91920	100.000	15247			

图12 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片3  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C	波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-415-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p4-1.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb	
样品瓶号: 1-28	版本号: 6.115
进样体积: 20 µl	实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/07/04 21:26:05	处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/05 09:24:49	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	95629	100.000	15838	2879	1.122	--
总计		95629	100.000	15838			

图13 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片4  
供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-416-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-28  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 21:29:27      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:24:52      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	95615	100.000	15839	2887	1.124	--
总计		95615	100.000	15839			

图14 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片4  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-417-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-37  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 21:32:50      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:24:55      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.094	98270	100.000	16252	2883	1.121	--
总计		98270	100.000	16252			

图15 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 2.0ml/min  
 柱温: 30°C 波长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-418-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-37  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 21:36:13 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:24:58 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	98992	100.000	16299	2865	1.121	--
总计		98992	100.000	16299			

图16 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片5  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-419-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 21:39:34      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:00      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	95040	100.000	15739	2879	1.124	--
总计		95040	100.000	15739			

图17 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-420-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 21:42:57      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:03      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	95173	100.000	15739	2879	1.125	--
总计		95173	100.000	15739			

图18 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温: 30°C 波长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-421-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-2h-p1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 21:46:20 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:06 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	324419	100.000	53570	2876	1.121	--
总计		324419	100.000	53570			

图19 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-422-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-2h-p1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 21:49:43      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:08      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	324783	100.000	53632	2868	1.121	--
总计		324783	100.000	53632			

图20 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片1  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-423-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-2h-p2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 21:53:06      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:11      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	342462	100.000	56657	2871	1.123	--
总计		342462	100.000	56657			

图21 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-424-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-2h-p2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 21:56:29      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:13      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	341992	100.000	56575	2868	1.123	--
总计		341992	100.000	56575			

图22 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片2  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-425-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-2h-p3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 21:59:52      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:16      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	368879	100.000	60866	2865	1.122	--
总计		368879	100.000	60866			

图23 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-426-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-2h-p3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 22:03:14      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:18      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	369172	100.000	61003	2866	1.124	--
总计		369172	100.000	61003			

图24 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片3  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-427-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-2h-p4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 22:06:37      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:21      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	383227	100.000	63257	2863	1.125	--
总计		383227	100.000	63257			

图25 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-428-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-2h-p4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 22:10:00      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:24      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	385129	100.000	63339	2849	1.124	--
总计		385129	100.000	63339			

图26 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片4  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-429-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-2h-p5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 22:13:23      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:26      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	381042	100.000	62762	2867	1.124	--
总计		381042	100.000	62762			

图27 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-430-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-2h-p5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 22:16:46      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:29      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	380833	100.000	62784	2860	1.123	--
总计		380833	100.000	62784			

图28 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片5  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-431-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-2h-p6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-47  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 22:20:07      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:31      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	384012	100.000	63414	2863	1.126	--
总计		384012	100.000	63414			

图29 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 2.0ml/min  
 柱温: 30°C 波长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-432-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-2h-p6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-47  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 22:23:30 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:34 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	385381	100.000	63419	2871	1.128	--
总计		385381	100.000	63419			

图30 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片6  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-433-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-4h-p1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-3  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 22:26:53      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:36      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.092	672419	100.000	110482	2867	1.125	--
总计		672419	100.000	110482			

图31 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-434-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-4h-p1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-3  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 22:30:16      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:39      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.087	673121	100.000	110887	2853	1.128	--
总计		673121	100.000	110887			

图32 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片1  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-435-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-4h-p2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-12  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 22:33:39      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:42      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	712479	100.000	117263	2847	1.131	--
总计		712479	100.000	117263			

图33 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-436-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-4h-p2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-12  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 22:37:02      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:44      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	711477	100.000	117245	2857	1.130	--
总计		711477	100.000	117245			

图34 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片2  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-437-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-4h-p3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-21  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 22:40:24      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:47      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.087	821717	100.000	135348	2855	1.129	--
总计		821717	100.000	135348			

图35 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-438-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-4h-p3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-21  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 22:43:46      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:49      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	821402	100.000	135023	2862	1.131	--
总计		821402	100.000	135023			

图36 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片3  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 2.0ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-439-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-4h-p4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-30  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 22:47:08      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:52      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	873532	100.000	143599	2865	1.131	--
总计		873532	100.000	143599			

图37 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-440-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-4h-p4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-30  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 22:50:31      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:54      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	874216	100.000	143937	2854	1.129	--
总计		874216	100.000	143937			

图38 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片4  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-441-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-4h-p5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-39  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 22:53:54      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:57      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	818439	100.000	134642	2863	1.129	--
总计		818439	100.000	134642			

图39 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-442-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-4h-p5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-39  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 22:57:17      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:25:59      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	818897	100.000	134728	2851	1.128	--
总计		818897	100.000	134728			

图40 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片5  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-443-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-4h-p6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-48  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 23:00:39      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:26:02      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	835726	100.000	137477	2857	1.129	--
总计		835726	100.000	137477			

图41 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-444-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-4h-p6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-48  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 23:04:02      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:26:05      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	835629	100.000	137460	2857	1.130	--
总计		835629	100.000	137460			

图42 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片6  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温: 30°C 波长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-445-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-8h-p1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-4  
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 23:07:25 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:26:07 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	1436251	100.000	236666	2859	1.130	--
总计		1436251	100.000	236666			

图43 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-446-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-8h-p1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-4  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 23:10:48      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:26:10      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.087	1434101	100.000	236552	2858	1.129	--
总计		1434101	100.000	236552			

图44 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片1  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-447-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-8h-p2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-13  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 23:14:11      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:26:12      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	1500453	100.000	247686	2867	1.129	--
总计		1500453	100.000	247686			

图45 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-448-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-8h-p2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-13  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 23:17:34      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:26:15      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.087	1508023	100.000	248075	2849	1.131	--
总计		1508023	100.000	248075			

图46 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片2  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-449-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-8h-p3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-22  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 23:20:56      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:26:17      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	1491294	100.000	245617	2854	1.131	--
总计		1491294	100.000	245617			

图47 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温: 30°C 波长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-450-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-8h-p3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-22  
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 23:24:19 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:26:20 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	1494213	100.000	245444	2843	1.130	--
总计		1494213	100.000	245444			

图48 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片3  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-451-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-8h-p4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-31  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 23:27:41      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:26:22      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	1502653	100.000	247208	2851	1.132	--
总计		1502653	100.000	247208			

图49 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-452-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-8h-p4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-31  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 23:31:03      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:26:25      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	1502324	100.000	247068	2847	1.131	--
总计		1502324	100.000	247068			

图50 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片4  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-453-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-8h-p5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-40  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 23:34:25      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:26:28      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	1479336	100.000	243104	2846	1.130	--
总计		1479336	100.000	243104			

图51 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-454-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-8h-p5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-40  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 23:37:47      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:26:30      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	1479857	100.000	243164	2844	1.130	--
总计		1479857	100.000	243164			

图52 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片5  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温: 30°C 波长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-455-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-8h-p6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-49  
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 23:41:09 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:26:33 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	1490792	100.000	244948	2845	1.131	--
总计		1490792	100.000	244948			

图53 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-456-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-8h-p6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-49  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 23:44:32      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:26:36      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	1491350	100.000	244377	2858	1.132	--
总计		1491350	100.000	244377			

图54 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片6  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-457-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 23:47:55      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:26:38      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	1431057	100.000	236315	2855	1.129	--
总计		1431057	100.000	236315			

图55 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转  
 对照品溶液-2-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-458-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgw-rcd-shuijz-lf50z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 23:51:19      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:26:41      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	1425639	100.000	235952	2865	1.127	--
总计		1425639	100.000	235952			

图56 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高温HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转  
 对照品溶液-2-2






# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-460-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/04 23:58:08      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:26:46      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	1398833	100.000	231350	2860	1.128	--
总计		1398833	100.000	231350			

图58 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转  
 对照品溶液-1-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-461-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 00:01:33      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:26:49      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	1396847	100.000	231164	2866	1.129	--
总计		1396847	100.000	231164			

图59 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转  
 对照品溶液-1-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-462-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 00:04:58      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:26:52      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	1397077	100.000	231087	2869	1.128	--
总计		1397077	100.000	231087			

图60 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转  
 对照品溶液-1-3




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 2.0ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-463-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 00:08:23      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:26:54      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	1397698	100.000	230490	2867	1.130	--
总计		1397698	100.000	230490			

图61 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转  
 对照品溶液-1-4




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-464-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 00:11:47      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:26:57      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	1396229	100.000	231194	2867	1.130	--
总计		1396229	100.000	231194			

图62 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转  
 对照品溶液-1-5




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-465-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-1  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 00:15:11      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:00      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	84105	100.000	13935	2879	1.125	--
总计		84105	100.000	13935			

图63 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-466-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-1  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 00:18:35      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:02      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	84154	100.000	13942	2862	1.125	--
总计		84154	100.000	13942			

图64 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片1  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-467-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-10  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 00:21:59      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:05      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	100036	100.000	16561	2876	1.128	--
总计		100036	100.000	16561			

图65 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-468-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-10  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 00:25:23      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:07      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	99922	100.000	16573	2864	1.133	--
总计		99922	100.000	16573			

图66 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片2  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-469-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-19  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 00:28:46      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:10      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	95646	100.000	15861	2874	1.129	--
总计		95646	100.000	15861			

图67 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-470-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-19  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 00:32:10      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:12      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	96035	100.000	15874	2860	1.133	--
总计		96035	100.000	15874			

图68 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片3  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-471-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-28  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 00:35:34      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:15      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	81784	100.000	13537	2863	1.130	--
总计		81784	100.000	13537			

图69 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-472-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-1f50z-0.5h-p4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-28  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 00:38:58      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:18      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	81582	100.000	13518	2872	1.132	--
总计		81582	100.000	13518			

图70 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片4  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-473-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-37  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 00:42:21      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:20      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	105303	100.000	17460	2873	1.134	--
总计		105303	100.000	17460			

图71 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-474-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-37  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 00:45:44      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:23      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	105217	100.000	17412	2872	1.133	--
总计		105217	100.000	17412			

图72 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片5  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-475-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-46  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 00:49:08      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:25      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	104830	100.000	17340	2868	1.131	--
总计		104830	100.000	17340			

图73 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-476-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-46  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 00:52:31      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:28      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	104599	100.000	17310	2872	1.130	--
总计		104599	100.000	17310			

图74 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-477-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-2h-p1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-2  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 00:55:55      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:30      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	336080	100.000	55532	2861	1.131	--
总计		336080	100.000	55532			

图75 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-478-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-2h-p1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-2  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 00:59:20      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:33      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	335810	100.000	55518	2862	1.131	--
总计		335810	100.000	55518			

图76 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片1  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-479-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-1f50z-2h-p2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-11  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 01:02:44      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:35      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	370712	100.000	61282	2862	1.129	--
总计		370712	100.000	61282			

图77 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-480-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-2h-p2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-11  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 01:06:08      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:38      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	370344	100.000	61250	2867	1.130	--
总计		370344	100.000	61250			

图78 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片2  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-481-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-1f50z-2h-p3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-20  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 01:09:32      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:41      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	352495	100.000	58279	2870	1.130	--
总计		352495	100.000	58279			

图79 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-482-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-2h-p3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-20  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 01:12:55      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:43      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	352870	100.000	58277	2857	1.131	--
总计		352870	100.000	58277			

图80 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片3  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-483-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-2h-p4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-29  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 01:16:19      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:46      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	326623	100.000	53961	2871	1.133	--
总计		326623	100.000	53961			

图81 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C	波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-484-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-1f50z-2h-p4-2.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb	
样品瓶号: 2-29	版本号: 6.115
进样体积: 20 µl	实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/07/05 01:19:42	处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:49	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	328438	100.000	54118	2847	1.135	--
总计		328438	100.000	54118			

图82 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片4  
供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-485-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-2h-p5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-38  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 01:23:06      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:51      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	403682	100.000	66653	2866	1.133	--
总计		403682	100.000	66653			

图83 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-486-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-2h-p5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-38  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 01:26:30      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:54      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	405595	100.000	66727	2844	1.133	--
总计		405595	100.000	66727			

图84 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片5  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-487-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-2h-p6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-47  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 01:29:54      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:56      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	381002	100.000	62758	2854	1.133	--
总计		381002	100.000	62758			

图85 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温: 30°C 波长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-488-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-1f50z-2h-p6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-47  
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 01:33:17 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:27:59 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	380715	100.000	62779	2862	1.130	--
总计		380715	100.000	62779			

图86 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片6  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-489-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-1f50z-4h-p1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-3  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 01:36:41      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:28:01      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	734566	100.000	120485	2838	1.132	--
总计		734566	100.000	120485			

图87 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-490-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-1f50z-4h-p1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-3  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 01:40:06      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:28:04      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	732057	100.000	120414	2860	1.130	--
总计		732057	100.000	120414			

图88 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片1  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-491-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-4h-p2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-12  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 01:43:30      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:28:06      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	846931	100.000	139909	2862	1.133	--
总计		846931	100.000	139909			

图89 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-492-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-4h-p2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-12  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 01:46:54      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:28:09      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	845872	100.000	139915	2863	1.133	--
总计		845872	100.000	139915			

图90 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片2  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-493-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-4h-p3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-21  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 01:50:17      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:28:12      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	778106	100.000	128275	2871	1.133	--
总计		778106	100.000	128275			

图91 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-494-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-1f50z-4h-p3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-21  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 01:53:41      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:28:14      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	778934	100.000	128635	2864	1.133	--
总计		778934	100.000	128635			

图92 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片3  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 2.0ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-495-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-4h-p4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-30  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 01:57:05      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:28:17      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	706846	100.000	116597	2869	1.135	--
总计		706846	100.000	116597			

图93 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-496-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-1f50z-4h-p4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-30  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 02:00:29      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:28:20      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	706163	100.000	116501	2864	1.134	--
总计		706163	100.000	116501			

图94 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片4  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-497-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-1f50z-4h-p5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-39  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 02:03:53      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:28:22      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	841824	100.000	138871	2869	1.134	--
总计		841824	100.000	138871			

图95 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-498-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-1f50z-4h-p5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-39  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 02:07:17      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:28:25      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	842527	100.000	138999	2852	1.134	--
总计		842527	100.000	138999			

图96 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片5  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-499-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-1f50z-4h-p6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-48  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 02:10:41      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:28:27      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	863527	100.000	141922	2866	1.131	--
总计		863527	100.000	141922			

图97 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 2.0ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-500-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-1f50z-4h-p6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-48  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 02:14:04      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:28:30      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.094	866615	100.000	142105	2858	1.129	--
总计		866615	100.000	142105			

图98 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片6  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-501-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-8h-p1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-4  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 02:17:28      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:28:33      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	1402208	100.000	231333	2852	1.134	--
总计		1402208	100.000	231333			

图99 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-502-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-8h-p1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-4  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 02:20:52      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:28:35      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	1402087	100.000	231280	2853	1.135	--
总计		1402087	100.000	231280			

图100 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片1  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-503-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-8h-p2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-13  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 02:24:17      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:28:38      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	1469842	100.000	242743	2859	1.135	--
总计		1469842	100.000	242743			

图101 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-504-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-1f50z-8h-p2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-13  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 02:27:41      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:28:41      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	1470366	100.000	242733	2855	1.136	--
总计		1470366	100.000	242733			

图102 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片2  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-505-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-8h-p3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-22  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 02:31:05      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:28:43      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	1484400	100.000	243766	2826	1.134	--
总计		1484400	100.000	243766			

图103 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-506-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-8h-p3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-22  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 02:34:29      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:28:46      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	1481830	100.000	243111	2837	1.136	--
总计		1481830	100.000	243111			

图104 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片3  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min  
 柱温: 30°C 波长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-507-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-8h-p4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-31  
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 02:37:54 实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:28:49 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	1391731	100.000	229743	2853	1.135	--
总计		1391731	100.000	229743			

图105 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-508-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-8h-p4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-31  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 02:41:18      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:28:51      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	1391887	100.000	229659	2854	1.136	--
总计		1391887	100.000	229659			

图106 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片4  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-509-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-8h-p5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-40  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 02:44:42      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:28:54      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	1505333	100.000	248159	2852	1.135	--
总计		1505333	100.000	248159			

图107 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-510-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-8h-p5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-40  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 02:48:06      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:28:56      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	1505874	100.000	248052	2855	1.136	--
总计		1505874	100.000	248052			

图108 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片5  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-511-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-8h-p6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-49  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 02:51:30      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:28:59      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	1489796	100.000	244675	2847	1.131	--
总计		1489796	100.000	244675			

图109 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-512-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-8h-p6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-49  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 02:54:54      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:29:02      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	1491005	100.000	244958	2848	1.130	--
总计		1491005	100.000	244958			

图110 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片6  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-513-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 02:58:18      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:29:04      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	1415953	100.000	234099	2858	1.136	--
总计		1415953	100.000	234099			

图111 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转  
 对照品溶液-2-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-514-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgs-rcd-shuijz-lf50z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 03:01:43      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:29:07      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	1416030	100.000	233917	2856	1.136	--
总计		1416030	100.000	233917			

图112 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转  
 对照品溶液-2-2






# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-516-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 03:08:29      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:29:12      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	1411601	100.000	233083	2857	1.137	--
总计		1411601	100.000	233083			

图114 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转  
 对照品溶液-1-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-517-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 03:11:52      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:29:15      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	1415905	100.000	233188	2841	1.137	--
总计		1415905	100.000	233188			

图115 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转  
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-518-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 03:15:15      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:29:17      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.092	1412394	100.000	232331	2868	1.139	--
总计		1412394	100.000	232331			

图116 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转  
 对照品溶液-1-3




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-519-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 03:18:38      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:29:20      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	1411890	100.000	233187	2859	1.138	--
总计		1411890	100.000	233187			

图117 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转  
 对照品溶液-1-4




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-520-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 03:22:01      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:29:23      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	1411264	100.000	232572	2864	1.138	--
总计		1411264	100.000	232572			

图118 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转  
 对照品溶液-1-5




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-521-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-1  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 03:25:23      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:29:25      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	97800	100.000	16150	2862	1.137	--
总计		97800	100.000	16150			

图119 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 2.0ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-522-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-1  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 03:28:46      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:29:28      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	97495	100.000	16107	2865	1.136	--
总计		97495	100.000	16107			

图120 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片1  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-523-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-10  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 03:32:08      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:29:30      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	97291	100.000	16035	2854	1.142	--
总计		97291	100.000	16035			

图121 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-524-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-10  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 03:35:31      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:29:33      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	97160	100.000	16023	2857	1.141	--
总计		97160	100.000	16023			

图122 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片2  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-525-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-19  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 03:38:53      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:29:35      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	108277	100.000	17843	2863	1.136	--
总计		108277	100.000	17843			

图123 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-526-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-19  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 03:42:16      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:29:38      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	107943	100.000	17831	2860	1.140	--
总计		107943	100.000	17831			

图124 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片3  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-527-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-28  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 03:45:38      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:29:41      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	99946	100.000	16497	2856	1.134	--
总计		99946	100.000	16497			

图125 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-528-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-28  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 03:49:00      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:29:43      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	99744	100.000	16459	2870	1.137	--
总计		99744	100.000	16459			

图126 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片4  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-529-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-37  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 03:52:23      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:29:46      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	105035	100.000	17347	2870	1.135	--
总计		105035	100.000	17347			

图127 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-530-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-37  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 03:55:45      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:29:48      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	105127	100.000	17340	2855	1.140	--
总计		105127	100.000	17340			

图128 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片5  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-531-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-46  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 03:59:08      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:29:51      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	78969	100.000	13009	2855	1.137	--
总计		78969	100.000	13009			

图129 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-532-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-0.5h-p6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-46  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 04:02:31      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:29:54      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	79009	100.000	13003	2854	1.134	--
总计		79009	100.000	13003			

图130 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-533-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-2h-p1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-2  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 04:05:52      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:29:57      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	395695	100.000	65186	2852	1.138	--
总计		395695	100.000	65186			

图131 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-534-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-2h-p1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-2  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 04:09:14      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:30:00      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.092	397242	100.000	65019	2843	1.138	--
总计		397242	100.000	65019			

图132 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片1  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C	波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-535-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-2h-p2-1.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb	
样品瓶号: 3-11	版本号: 6.115
进样体积: 20 µl	实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/07/05 04:12:36	处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/05 09:30:03	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	419170	100.000	68998	2840	1.137	--
总计		419170	100.000	68998			

图133 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片2  
供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-536-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-2h-p2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-11  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 04:15:58      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:30:05      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	419881	100.000	68841	2836	1.138	--
总计		419881	100.000	68841			

图134 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片2  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30 $^{\circ}$ C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-537-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-2h-p3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-20  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 04:19:20      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:30:08      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	387405	100.000	63787	2849	1.138	--
总计		387405	100.000	63787			

图135 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速: 2.0ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-538-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-2h-p3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-20  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 04:22:42      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:30:11      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	387837	100.000	63728	2843	1.139	--
总计		387837	100.000	63728			

图136 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片3  
 供试品溶液-2






# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-540-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-2h-p4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-29  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 04:29:26      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:30:16      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	346862	100.000	56995	2842	1.140	--
总计		346862	100.000	56995			

图138 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片4  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 2.0ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-541-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-2h-p5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-38  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 04:32:49      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:30:19      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	315894	100.000	51898	2849	1.139	--
总计		315894	100.000	51898			

图139 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-542-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-2h-p5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-38  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 04:36:12      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:30:21      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	315809	100.000	51934	2849	1.140	--
总计		315809	100.000	51934			

图140 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片5  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-543-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-2h-p6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-47  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 04:39:34      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:30:24      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	414854	100.000	68196	2846	1.140	--
总计		414854	100.000	68196			

图141 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-544-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-2h-p6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-47  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 04:42:56      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:30:26      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	417032	100.000	68269	2844	1.140	--
总计		417032	100.000	68269			

图142 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-120min-片6  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-545-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-4h-p1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-3  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 04:46:18      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:30:29      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	855885	100.000	140230	2843	1.138	--
总计		855885	100.000	140230			

图143 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C	波长: 305nm
数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-546-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-4h-p1-2.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb	
样品瓶号: 3-3	版本号: 6.115
进样体积: 20 µl	实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/07/05 04:49:40	处理者: xiexinhui
处理时间(V2): 2024/07/05 09:30:31	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	857106	100.000	140451	2835	1.137	--
总计		857106	100.000	140451			

图144 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片1  
供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-547-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-4h-p2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-12  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 04:53:02      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:30:34      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	883449	100.000	145062	2845	1.138	--
总计		883449	100.000	145062			

图145 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-548-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-4h-p2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-12  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 04:56:24      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:30:36      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	883670	100.000	145131	2840	1.139	--
总计		883670	100.000	145131			

图146 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片2  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-549-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-4h-p3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-21  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 04:59:46      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:30:39      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.092	843489	100.000	138309	2848	1.139	--
总计		843489	100.000	138309			

图147 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-550-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-4h-p3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-21  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 05:03:08      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:30:41      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	843397	100.000	138564	2840	1.139	--
总计		843397	100.000	138564			

图148 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片3  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-551-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-4h-p4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-30  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 05:06:31      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:30:44      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	706084	100.000	116013	2843	1.139	--
总计		706084	100.000	116013			

图149 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 2.0ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-552-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-4h-p4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-30  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 05:09:53      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:30:47      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	706662	100.000	116028	2842	1.139	--
总计		706662	100.000	116028			

图150 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片4  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-553-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-4h-p5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-39  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 05:13:16      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:30:49      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	864562	100.000	141948	2839	1.140	--
总计		864562	100.000	141948			

图151 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 2.0ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-554-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-4h-p5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-39  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 05:16:37      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:30:52      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	864510	100.000	141710	2838	1.140	--
总计		864510	100.000	141710			

图152 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片5  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-555-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-4h-p6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-48  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 05:19:59      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:30:54      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.092	704064	100.000	115184	2844	1.140	--
总计		704064	100.000	115184			

图153 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 2.0ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-556-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-4h-p6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-48  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 05:23:22      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:30:57      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	703978	100.000	115423	2840	1.139	--
总计		703978	100.000	115423			

图154 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-240min-片6  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速: 2.0ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-557-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-8h-p1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-4  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 05:26:44      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:30:59      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	1509312	100.000	247247	2832	1.139	--
总计		1509312	100.000	247247			

图155 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片1  
 供试品溶液-1






# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-559-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-8h-p2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-13  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 05:33:28      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:31:04      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	1468648	100.000	240636	2836	1.140	--
总计		1468648	100.000	240636			

图157 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片2  
 供试品溶液-1






# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-561-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-8h-p3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-22  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 05:40:11      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:31:10      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.093	1494292	100.000	243898	2835	1.140	--
总计		1494292	100.000	243898			

图159 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-562-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-8h-p3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-22  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 05:43:34      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:31:12      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	1493617	100.000	244935	2833	1.140	--
总计		1493617	100.000	244935			

图160 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片3  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-563-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-8h-p4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-31  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 05:46:56      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:31:15      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	1461641	100.000	239713	2832	1.141	--
总计		1461641	100.000	239713			

图161 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-564-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-8h-p4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-31  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 05:50:18      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:31:17      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.093	1466945	100.000	239209	2827	1.138	--
总计		1466945	100.000	239209			

图162 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片4  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-565-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-8h-p5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-40  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 05:53:40      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:31:20      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	1481131	100.000	242886	2830	1.140	--
总计		1481131	100.000	242886			

图163 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-566-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-8h-p5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-40  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 05:57:02      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:31:22      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	1479820	100.000	242924	2831	1.141	--
总计		1479820	100.000	242924			

图164 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片5  
 供试品溶液-2




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-567-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-8h-p6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-49  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 06:00:24      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:31:25      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	1383412	100.000	226987	2835	1.140	--
总计		1383412	100.000	226987			

图165 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转-480min-片6  
 供试品溶液-1






# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速: 2.0ml/min  
 柱温: 30°C      波长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-569-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 20 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 06:07:09      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:31:30      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	1411150	100.000	232268	2847	1.142	--
总计		1411150	100.000	232268			

图167 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转  
 对照品溶液-2-1




# SMF-4060

## <样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱 温: 30°C      波 长: 305nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4060 - 31-6/31-570-2 - zzp-2024041821p-yxys30t-bzgz-rcd-shuijz-lf50z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-rcqx-FX280.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4060 - SMF-4060-20240704-FX280.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/07/05 06:10:32      实验者: xiexinhui  
 处理时间(V2): 2024/07/05 09:31:33      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX280)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 305nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	1413079	100.000	232730	2846	1.142	--
总计		1413079	100.000	232730			

图168 氟伐他汀钠缓释片溶出曲线测定影响因素30天包装光照HPLC图谱  
 自制品-2024041821批-水介质-篮法-50转  
 对照品溶液-2-2