




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-45-2 - zzp-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 14:12:30 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:45:44 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 总计 | | | | | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-46-2 - zzp-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
进样体积: 10 µl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/07/09 14:16:24 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:45:47
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.813 | 458836 | 100.000 | 52450 | 2436 | 1.089 | -- |
| 总计 | | 458836 | 100.000 | 52450 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-47-2 - zzp-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
 样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/07/09 14:20:18 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/07/10 08:45:50
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.813 | 458975 | 100.000 | 52448 | 2436 | 1.088 | -- |
| 总计 | | 458975 | 100.000 | 52448 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-48-2 - zzp-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 14:24:12 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:45:53 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.813 | 458751 | 100.000 | 52481 | 2440 | 1.088 | -- |
| 总计 | | 458751 | 100.000 | 52481 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-49-2 - zzp-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 14:28:07 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:45:55 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.812 | 458500 | 100.000 | 52461 | 2441 | 1.089 | -- |
| 总计 | | 458500 | 100.000 | 52461 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-50-2 - zzp-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
进样体积: 10 µl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/07/09 14:32:02 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:45:58
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.811 | 458261 | 100.000 | 52454 | 2443 | 1.089 | -- |
| 总计 | | 458261 | 100.000 | 52454 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-51-2 - zzp-2024051711p-jsly-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 14:35:55 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:00 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.817 | 524442 | 100.000 | 60514 | 2505 | 1.092 | -- |
| 总计 | | 524442 | 100.000 | 60514 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-52-2 - zzp-2024051711p-jsly-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
 样品瓶号: 2-1 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/07/09 14:39:49 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:03
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.816 | 523879 | 100.000 | 60555 | 2508 | 1.092 | -- |
| 总计 | | 523879 | 100.000 | 60555 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-53-2 - zzp-2024051711p-jsly-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-10 版本号: 6.115
进样体积: 10 µl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/07/09 14:43:42 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:05
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.816 | 545623 | 100.000 | 63008 | 2499 | 1.094 | -- |
| 总计 | | 545623 | 100.000 | 63008 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-54-2 - zzp-2024051711p-jsly-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-10 版本号: 6.115
进样体积: 10 µl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/07/09 14:47:35 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:07
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.816 | 545484 | 100.000 | 62985 | 2499 | 1.093 | -- |
| 总计 | | 545484 | 100.000 | 62985 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-55-2 - zzp-2024051711p-jsly-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 14:51:29 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:10 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.816 | 527183 | 100.000 | 60983 | 2507 | 1.092 | -- |
| 总计 | | 527183 | 100.000 | 60983 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-56-2 - zzp-2024051711p-jsly-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 14:55:23 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:12 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.815 | 526972 | 100.000 | 60937 | 2503 | 1.093 | -- |
| 总计 | | 526972 | 100.000 | 60937 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-57-2 - zzp-2024051711p-jsly-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 14:59:16 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:15 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.815 | 535164 | 100.000 | 61833 | 2497 | 1.094 | -- |
| 总计 | | 535164 | 100.000 | 61833 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-58-2 - zzp-2024051711p-jsly-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 15:03:09 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:17 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.815 | 534865 | 100.000 | 61865 | 2504 | 1.094 | -- |
| 总计 | | 534865 | 100.000 | 61865 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-59-2 - zzp-2024051711p-jsly-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 15:07:02 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:20 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.814 | 532789 | 100.000 | 61613 | 2500 | 1.094 | -- |
| 总计 | | 532789 | 100.000 | 61613 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-60-2 - zzp-2024051711p-jsly-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 15:10:55 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:22 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.814 | 533167 | 100.000 | 61708 | 2503 | 1.094 | -- |
| 总计 | | 533167 | 100.000 | 61708 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-61-2 - zzp-2024051711p-jsly-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-46 版本号: 6.115
进样体积: 10 µl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/07/09 15:14:48 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:24
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.813 | 532565 | 100.000 | 61586 | 2497 | 1.095 | -- |
| 总计 | | 532565 | 100.000 | 61586 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-62-2 - zzp-2024051711p-jsly-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 15:18:40 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:27 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.812 | 532420 | 100.000 | 61590 | 2497 | 1.095 | -- |
| 总计 | | 532420 | 100.000 | 61590 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-63-2 - zzp-2024051712p-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 15:22:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:29 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.812 | 532624 | 100.000 | 61677 | 2504 | 1.095 | -- |
| 总计 | | 532624 | 100.000 | 61677 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-64-2 - zzp-2024051712p-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 15:26:27 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:32 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.813 | 532892 | 100.000 | 61742 | 2506 | 1.095 | -- |
| 总计 | | 532892 | 100.000 | 61742 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-65-2 - zzp-2024051712p-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-11 版本号: 6.115
进样体积: 10 µl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/07/09 15:30:21 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:34
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.811 | 522364 | 100.000 | 60558 | 2510 | 1.095 | -- |
| 总计 | | 522364 | 100.000 | 60558 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-66-2 - zzp-2024051712p-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-11 版本号: 6.115
进样体积: 10 µl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/07/09 15:34:14 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:37
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.813 | 522824 | 100.000 | 60574 | 2507 | 1.095 | -- |
| 总计 | | 522824 | 100.000 | 60574 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-67-2 - zzp-2024051712p-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 15:38:08 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:39 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.812 | 529104 | 100.000 | 61328 | 2508 | 1.095 | -- |
| 总计 | | 529104 | 100.000 | 61328 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-68-2 - zzp-2024051712p-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 15:42:01 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:41 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.811 | 529435 | 100.000 | 61324 | 2507 | 1.095 | -- |
| 总计 | | 529435 | 100.000 | 61324 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-69-2 - zzp-2024051712p-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 15:45:54 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:44 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.811 | 531341 | 100.000 | 61513 | 2505 | 1.096 | -- |
| 总计 | | 531341 | 100.000 | 61513 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-70-2 - zzp-2024051712p-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 15:49:48 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:46 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.810 | 531744 | 100.000 | 61480 | 2501 | 1.097 | -- |
| 总计 | | 531744 | 100.000 | 61480 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-71-2 - zzp-2024051712p-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 15:53:42 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:49 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.809 | 517092 | 100.000 | 59761 | 2501 | 1.096 | -- |
| 总计 | | 517092 | 100.000 | 59761 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-72-2 - zzp-2024051712p-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 15:57:35 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:51 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.810 | 517222 | 100.000 | 59821 | 2504 | 1.096 | -- |
| 总计 | | 517222 | 100.000 | 59821 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-73-2 - zzp-2024051712p-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 16:01:29 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:54 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.809 | 524496 | 100.000 | 60665 | 2506 | 1.097 | -- |
| 总计 | | 524496 | 100.000 | 60665 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-74-2 - zzp-2024051712p-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 16:05:22 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:56 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.809 | 523862 | 100.000 | 60645 | 2511 | 1.097 | -- |
| 总计 | | 523862 | 100.000 | 60645 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-75-2 - zzp-2024051713p-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
 样品瓶号: 2-3 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/07/09 16:09:16 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/07/10 08:46:59
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.811 | 525764 | 100.000 | 60885 | 2508 | 1.097 | -- |
| 总计 | | 525764 | 100.000 | 60885 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-76-2 - zzp-2024051713p-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 16:13:10 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:47:01 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.811 | 524872 | 100.000 | 60819 | 2509 | 1.097 | -- |
| 总计 | | 524872 | 100.000 | 60819 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-77-2 - zzp-2024051713p-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
 样品瓶号: 2-12 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/07/09 16:17:04 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/07/10 08:47:04
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.809 | 528079 | 100.000 | 61027 | 2502 | 1.098 | -- |
| 总计 | | 528079 | 100.000 | 61027 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-78-2 - zzp-2024051713p-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 16:20:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:47:06 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.809 | 527930 | 100.000 | 61017 | 2501 | 1.099 | -- |
| 总计 | | 527930 | 100.000 | 61017 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-79-2 - zzp-2024051713p-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 16:24:52 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:47:09 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.809 | 533702 | 100.000 | 61746 | 2506 | 1.099 | -- |
| 总计 | | 533702 | 100.000 | 61746 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-80-2 - zzp-2024051713p-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 16:28:45 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:47:11 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.809 | 533682 | 100.000 | 61801 | 2508 | 1.100 | -- |
| 总计 | | 533682 | 100.000 | 61801 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-81-2 - zzp-2024051713p-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-30 版本号: 6.115
进样体积: 10 µl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/07/09 16:32:39 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:47:14
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.808 | 530102 | 100.000 | 61385 | 2505 | 1.099 | -- |
| 总计 | | 530102 | 100.000 | 61385 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-82-2 - zzp-2024051713p-jsly-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-30 版本号: 6.115
进样体积: 10 µl 实验者: xiexinhui
进样时间: 2024/07/09 16:36:32 处理者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:47:16
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.808 | 529677 | 100.000 | 61351 | 2507 | 1.099 | -- |
| 总计 | | 529677 | 100.000 | 61351 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-83-2 - zzp-2024051713p-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 16:40:25 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:47:18 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.807 | 528832 | 100.000 | 61318 | 2503 | 1.100 | -- |
| 总计 | | 528832 | 100.000 | 61318 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
 柱温:30°C 波长: 290nm
 数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-84-2 - zzp-2024051713p-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P5-2.lcd
 方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
 批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
 样品瓶号: 2-39 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: xiexinhui
 进样时间: 2024/07/09 16:44:19 处理者: xiexinhui
 处理时间 (V2): 2024/07/10 08:47:21
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.806 | 529123 | 100.000 | 61390 | 2505 | 1.100 | -- |
| 总计 | | 529123 | 100.000 | 61390 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-85-2 - zzp-2024051713p-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 16:48:12 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:47:23 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.805 | 539553 | 100.000 | 62654 | 2506 | 1.101 | -- |
| 总计 | | 539553 | 100.000 | 62654 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-86-2 - zzp-2024051713p-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 16:52:05 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:47:26 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.806 | 539824 | 100.000 | 62636 | 2505 | 1.101 | -- |
| 总计 | | 539824 | 100.000 | 62636 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-87-2 - zzp-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 16:55:59 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:47:28 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.800 | 457878 | 100.000 | 52500 | 2439 | 1.098 | -- |
| 总计 | | 457878 | 100.000 | 52500 | | | |




SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min
柱温:30°C 波长: 290nm
数据文件名: RC\$SZJ-4096 - 10-3/10-88-2 - zzp-js1y-rcd-50mg-pH2.0jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SZJ-4096 - RCFE-FX259.lcm
批处理文件名: RC\$SZJ-4096 - 20240709-RCD-FX259.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/09 16:59:53 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2024/07/10 08:47:30 处理者: xiexinhui
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 290nm

| 峰号 | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1 | 2.799 | 457909 | 100.000 | 52568 | 2440 | 1.099 | -- |
| 总计 | | 457909 | 100.000 | 52568 | | | |