


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-301-3 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 17:50:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3) : 2024/06/26 13:53:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
溶剂

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-302-3 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 17:54:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3) : 2024/06/26 13:53:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.163	99520	100.000	21670	5233	1.119	--
总计		99520	100.000	21670			


图2 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-303-3 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-dz1-2.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 2-18	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/25 17:57:48	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2024/06/26 13:53:35	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	99394	100.000	21595	5270	1.116	--
总计		99394	100.000	21595			


图3 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-304-3 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 18:01:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3) : 2024/06/26 13:53:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.164	99618	100.000	21660	5239	1.119	--
总计		99618	100.000	21660			

图4 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-305-3 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-dz1-4.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 2-18	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/25 18:04:49	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2024/06/26 13:53:42	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	99930	100.000	21700	5233	1.119	--
总计		99930	100.000	21700			


图5 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-306-3 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 18:08:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3) : 2024/06/26 13:53:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	99955	100.000	21711	5246	1.116	--
总计		99955	100.000	21711			


图6 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-307-3 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 18:11:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3) : 2024/06/26 13:53:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	13570	100.000	2911	5178	1.078	--
总计		13570	100.000	2911			


图7 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-308-3 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-5min-P2.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 2-10	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/25 18:15:18	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2024/06/26 13:53:50	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	14943	100.000	3226	5314	1.112	--
总计		14943	100.000	3226			

图8 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-309-3 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-5min-P3.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 2-19	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/25 18:18:47	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2024/06/26 13:53:53	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	13402	100.000	2848	5162	1.120	--
总计		13402	100.000	2848			

图9 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-310-3 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-5min-P4.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 2-28	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/25 18:22:16	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2024/06/26 13:53:56	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	13181	100.000	2892	5311	1.087	--
总计		13181	100.000	2892			


图10 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-311-3 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 18:25:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3) : 2024/06/26 13:53:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	12835	100.000	2795	5476	1.086	--
总计		12835	100.000	2795			

图11 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片5
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-312-3 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 18:29:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3) : 2024/06/26 13:54:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	12257	100.000	2654	5254	1.107	--
总计		12257	100.000	2654			


图12 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-313-3 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 18:32:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3) : 2024/06/26 13:54:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	24479	100.000	5318	5334	1.091	--
总计		24479	100.000	5318			

图13 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-314-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 18:36:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:54:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	24591	100.000	5513	5500	1.057	--
总计		24591	100.000	5513			

图14 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-315-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 18:39:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:54:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	24223	100.000	5304	5340	1.107	--
总计		24223	100.000	5304			


图15 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-316-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 18:43:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:54:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	24242	100.000	5386	5420	1.084	--
总计		24242	100.000	5386			

图16 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-317-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 18:46:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:54:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	23780	100.000	5216	5305	1.088	--
总计		23780	100.000	5216			


图17 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-318-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 18:50:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:54:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.185	23337	100.000	5120	5370	1.102	--
总计		23337	100.000	5120			

图18 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-319-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 18:53:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:54:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	26499	100.000	5798	5360	1.092	--
总计		26499	100.000	5798			

图19 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-320-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 18:57:09 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:54:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	30766	100.000	6731	5403	1.092	--
总计		30766	100.000	6731			

图20 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-321-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 19:00:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:54:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	29604	100.000	6439	5355	1.079	--
总计		29604	100.000	6439			

图21 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-322-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 19:04:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:54:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.193	31165	100.000	6748	5373	1.093	--
总计		31165	100.000	6748			


图22 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-323-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 19:07:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:54:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	24922	100.000	5429	5376	1.089	--
总计		24922	100.000	5429			

图23 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-324-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 19:11:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:54:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	29632	100.000	6342	5264	1.145	--
总计		29632	100.000	6342			


图24 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-325-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 19:14:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:54:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	32950	100.000	7165	5399	1.098	--
总计		32950	100.000	7165			


图25 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-326-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 19:18:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:54:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	34492	100.000	7513	5344	1.092	--
总计		34492	100.000	7513			

图26 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-327-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 19:21:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:54:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	34118	100.000	7406	5408	1.097	--
总计		34118	100.000	7406			

图27 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-328-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 19:25:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:54:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	34289	100.000	7443	5379	1.105	--
总计		34289	100.000	7443			

图28 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-329-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 19:28:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:54:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	34548	100.000	7552	5400	1.092	--
总计		34548	100.000	7552			

图29 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片5
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-330-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 19:32:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:54:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	34214	100.000	7526	5418	1.092	--
总计		34214	100.000	7526			

图30 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-331-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 19:35:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:54:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	37900	100.000	8271	5355	1.097	--
总计		37900	100.000	8271			


图31 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-332-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 19:39:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:55:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.193	37643	100.000	8211	5376	1.085	--
总计		37643	100.000	8211			


图32 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-333-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-30min-P3.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 2-23	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/25 19:42:32	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:55:03	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	38444	100.000	8445	5456	1.086	--
总计		38444	100.000	8445			


图33 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-334-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 19:46:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:55:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	38619	100.000	8446	5389	1.095	--
总计		38619	100.000	8446			

图34 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-335-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 19:49:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:55:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	39467	100.000	8583	5345	1.092	--
总计		39467	100.000	8583			

图35 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-336-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-30min-P6.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 2-50	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/25 19:53:02	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:55:11	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.186	38779	100.000	8526	5391	1.101	--
总计		38779	100.000	8526			

图36 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-337-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 19:56:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:55:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	40279	100.000	8783	5360	1.095	--
总计		40279	100.000	8783			


图37 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-338-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 20:00:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:55:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	42746	100.000	9278	5308	1.107	--
总计		42746	100.000	9278			


图38 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-339-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-45min-P3.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 2-24	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/25 20:03:31	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:55:20	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	43742	100.000	9260	5144	1.109	--
总计		43742	100.000	9260			


图39 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-340-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 20:07:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:55:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	39476	100.000	8661	5369	1.087	--
总计		39476	100.000	8661			


图40 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-341-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-45min-P5.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 2-42	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/25 20:10:29	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:55:25	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	43306	100.000	9445	5373	1.087	--
总计		43306	100.000	9445			


图41 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-342-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-45min-P6.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 2-51	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/25 20:13:59	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:55:28	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	43628	100.000	9487	5299	1.098	--
总计		43628	100.000	9487			


图42 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-343-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 20:17:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:55:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	41744	100.000	9070	5349	1.098	--
总计		41744	100.000	9070			

图43 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-550-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 09:09:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:55:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	38206	100.000	7263	4064	1.076	--
总计		38206	100.000	7263			

图44 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片2
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-345-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 20:24:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:55:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	44136	100.000	9630	5385	1.086	--
总计		44136	100.000	9630			


图45 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-346-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-60min-P4.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 2-34	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/25 20:27:57	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:55:40	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	44185	100.000	9650	5353	1.089	--
总计		44185	100.000	9650			

图46 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-347-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 20:31:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:55:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	44982	100.000	9773	5351	1.087	--
总计		44982	100.000	9773			


图47 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-348-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-60min-P6.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 2-52	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/25 20:34:58	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:55:46	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.185	46003	100.000	10036	5332	1.098	--
总计		46003	100.000	10036			


图48 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-349-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-90min-P1.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 2-8	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/25 20:38:28	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:55:49	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	43727	100.000	9537	5320	1.089	--
总计		43727	100.000	9537			

图49 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-350-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-90min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-17
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 20:41:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:55:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	44992	100.000	9769	5319	1.089	--
总计		44992	100.000	9769			

图50 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片2
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-351-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-90min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-26
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 20:45:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:55:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	45182	100.000	9870	5355	1.081	--
总计		45182	100.000	9870			

图51 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片3
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-352-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-90min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-35
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 20:48:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:55:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	45346	100.000	9893	5330	1.091	--
总计		45346	100.000	9893			

图52 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片4
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-353-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-90min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-44
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 20:52:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:56:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	46240	100.000	10079	5340	1.087	--
总计		46240	100.000	10079			


图53 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-354-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-90min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-53
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 20:55:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:56:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.186	47524	100.000	10334	5324	1.097	--
总计		47524	100.000	10334			

图54 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片6
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-355-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-Jx-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 4-2
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 20:59:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:56:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	46794	100.000	10202	5330	1.083	--
总计		46794	100.000	10202			

图55 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-356-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-Jx-P2.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 4-11	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/25 21:02:56	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:56:09	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	49153	100.000	10626	5336	1.085	--
总计		49153	100.000	10626			

图56 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-357-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-Jx-P3.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 4-20	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/25 21:06:23	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:56:12	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	49142	100.000	10686	5388	1.083	--
总计		49142	100.000	10686			


图57 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-358-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-Jx-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 4-29
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 21:09:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:56:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	49720	100.000	10653	5310	1.086	--
总计		49720	100.000	10653			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-359-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-Jx-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 4-38
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 21:13:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:56:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	49077	100.000	10655	5427	1.080	--
总计		49077	100.000	10655			




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-360-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-Jx-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 4-47
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 21:16:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:56:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	49558	100.000	10720	5354	1.104	--
总计		49558	100.000	10720			

图60 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-361-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-dz2-1.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 2-27	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/25 21:20:18	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:56:23	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.186	100114	100.000	21435	5222	1.124	--
总计		100114	100.000	21435			


图61 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-7/18-362-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx1-0.4mg-lf100z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 21:23:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 13:56:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	103841	100.000	21696	4976	1.116	--
总计		103841	100.000	21696			

图62 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-363-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-9
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 21:27:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:02:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图63 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
 溶剂

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-364-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 21:30:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:02:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	100381	100.000	21156	5014	1.122	--
总计		100381	100.000	21156			

图64 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-365-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-dz1-2.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 3-18	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/25 21:34:14	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:02:17	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	99621	100.000	21090	5013	1.119	--
总计		99621	100.000	21090			

图65 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-366-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-dz1-3.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 3-18	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/25 21:37:42	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:02:20	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	99287	100.000	21011	5005	1.122	--
总计		99287	100.000	21011			

图66 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-367-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-dz1-4.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 3-18	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/25 21:41:11	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:02:23	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	99101	100.000	21009	4994	1.124	--
总计		99101	100.000	21009			

图67 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-368-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-dz1-5.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 3-18	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/25 21:44:39	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:02:26	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.167	99561	100.000	20921	4960	1.122	--
总计		99561	100.000	20921			


图68 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-369-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 21:48:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:02:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	14249	100.000	3007	4973	1.090	--
总计		14249	100.000	3007			

图69 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-370-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 21:51:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:02:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	16346	100.000	3505	5113	1.082	--
总计		16346	100.000	3505			


图70 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-371-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 21:55:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:02:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	14560	100.000	3151	5196	1.087	--
总计		14560	100.000	3151			


图71 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-372-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 21:58:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:02:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	14413	100.000	3076	5097	1.086	--
总计		14413	100.000	3076			


图72 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-373-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 22:01:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:02:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	12599	100.000	1891	2436	1.417	--
总计		12599	100.000	1891			

图73 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-374-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 22:05:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:02:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.187	12435	100.000	2716	5257	1.127	--
总计		12435	100.000	2716			


图74 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-375-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 22:08:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:02:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.185	19815	100.000	4326	5310	1.089	--
总计		19815	100.000	4326			


图75 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-376-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 22:12:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:02:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.183	26421	100.000	5743	5297	1.099	--
总计		26421	100.000	5743			

图76 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-377-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 22:15:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:02:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.183	24791	100.000	5410	5282	1.098	--
总计		24791	100.000	5410			

图77 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-378-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 22:19:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:02:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.184	25638	100.000	5436	5230	1.143	--
总计		25638	100.000	5436			


图78 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-379-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 22:22:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:02:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.187	26537	100.000	5774	5318	1.108	--
总计		26537	100.000	5774			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-380-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 22:26:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:03:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.183	23544	100.000	5151	5321	1.099	--
总计		23544	100.000	5151			

图80 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-381-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 22:29:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:03:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.181	30789	100.000	6781	5321	1.094	--
总计		30789	100.000	6781			


图81 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-382-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 22:33:09 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:03:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.181	27915	100.000	6179	5368	1.100	--
总计		27915	100.000	6179			


图82 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-383-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 22:36:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:03:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	29865	100.000	6532	5334	1.107	--
总计		29865	100.000	6532			


图83 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-384-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 22:40:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:03:12 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.181	31429	100.000	6797	5305	1.129	--
总计		31429	100.000	6797			

图84 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-385-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 22:43:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:03:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	29687	100.000	6267	5091	1.196	--
总计		29687	100.000	6267			

图85 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-386-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 22:47:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:03:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.182	30243	100.000	6700	5393	1.093	--
总计		30243	100.000	6700			


图86 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-387-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 22:50:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:03:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	35165	100.000	7667	5457	1.098	--
总计		35165	100.000	7667			

图87 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-388-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-13
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 22:53:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:03:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	33896	100.000	7373	5294	1.132	--
总计		33896	100.000	7373			


图88 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-389-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-22
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 22:57:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:03:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	33160	100.000	7322	5391	1.096	--
总计		33160	100.000	7322			


图89 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-390-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-31
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 23:00:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:03:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.186	35475	100.000	7688	5304	1.131	--
总计		35475	100.000	7688			




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-391-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-40
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 23:04:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:03:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.182	39038	100.000	8604	5404	1.100	--
总计		39038	100.000	8604			


图91 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-392-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-49
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 23:07:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:03:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	32409	100.000	7151	5462	1.098	--
总计		32409	100.000	7151			




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-393-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-5
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 23:11:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:03:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.181	39869	100.000	8800	5381	1.093	--
总计		39869	100.000	8800			


图93 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-394-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-14
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 23:14:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:03:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.182	39086	100.000	8626	5412	1.085	--
总计		39086	100.000	8626			


图94 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-395-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-23
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 23:18:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:03:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	37239	100.000	8216	5412	1.088	--
总计		37239	100.000	8216			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-396-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-32
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 23:21:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:03:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.181	41182	100.000	9114	5414	1.088	--
总计		41182	100.000	9114			




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-397-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-41
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 23:25:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:03:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.185	43468	100.000	9545	5406	1.079	--
总计		43468	100.000	9545			

图97 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-398-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-30min-P6.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 3-50	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/25 23:28:32	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:03:53	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	40530	100.000	8939	5360	1.091	--
总计		40530	100.000	8939			


图98 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-399-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-6
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 23:32:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:03:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>


检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	44164	100.000	9725	5354	1.111	--
总计		44164	100.000	9725			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-400-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-45min-P2.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 3-15	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/25 23:35:27	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:03:59	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.185	41756	100.000	9048	5282	1.119	--
总计		41756	100.000	9048			


图100 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-401-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-24
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 23:38:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:04:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	39678	100.000	8810	5499	1.087	--
总计		39678	100.000	8810			


图101 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-402-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-33
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 23:42:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:04:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.183	45140	100.000	9918	5367	1.093	--
总计		45140	100.000	9918			

图102 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-403-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-45min-P5.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 3-42	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/25 23:45:50	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:04:07	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	48615	100.000	10361	5146	1.164	--
总计		48615	100.000	10361			


图103 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-404-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-51
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 23:49:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:04:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	44985	100.000	9929	5401	1.097	--
总计		44985	100.000	9929			


图104 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-405-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-7
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 23:52:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:04:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	45405	100.000	9972	5338	1.107	--
总计		45405	100.000	9972			


图105 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-406-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-16
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 23:56:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:04:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	42891	100.000	9469	5401	1.091	--
总计		42891	100.000	9469			


图106 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-407-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-25
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/25 23:59:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:04:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	39063	100.000	8605	5362	1.090	--
总计		39063	100.000	8605			


图107 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-408-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-34
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 00:03:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:04:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.181	47503	100.000	10557	5426	1.086	--
总计		47503	100.000	10557			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-409-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-43
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 00:06:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:04:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	51572	100.000	11368	5409	1.092	--
总计		51572	100.000	11368			


图109 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-410-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-52
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 00:10:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:04:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	47034	100.000	10339	5381	1.098	--
总计		47034	100.000	10339			

图110 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片6
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-411-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-90min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-8
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 00:13:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:04:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.185	47303	100.000	10386	5431	1.092	--
总计		47303	100.000	10386			

图111 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-412-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-90min-P2.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 3-17	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 00:16:57	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:04:33	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.186	41872	100.000	9272	5467	1.085	--
总计		41872	100.000	9272			


图112 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-413-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-90min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-26
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 00:20:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:04:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	43115	100.000	9428	5496	1.092	--
总计		43115	100.000	9428			


图113 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-414-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-90min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-35
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 00:23:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:04:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	51310	100.000	11347	5512	1.097	--
总计		51310	100.000	11347			


图114 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-415-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-90min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-44
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 00:27:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:04:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	53898	100.000	11721	5346	1.120	--
总计		53898	100.000	11721			


图115 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-416-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-90min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-53
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 00:30:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:04:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.182	46850	100.000	10254	5369	1.100	--
总计		46850	100.000	10254			

图116 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-417-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-Jx-P1.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 4-3	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 00:34:18	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:04:47	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	49720	100.000	11057	5429	1.093	--
总计		49720	100.000	11057			


图117 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-418-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-Jx-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 4-12
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 00:37:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:04:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	48577	100.000	10687	5408	1.093	--
总计		48577	100.000	10687			

图118 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-419-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-Jx-P3.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 4-21	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 00:41:15	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:04:53	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.183	48455	100.000	10717	5428	1.088	--
总计		48455	100.000	10717			

图119 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-420-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-Jx-P4.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 4-30	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 00:44:43	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:04:56	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	50586	100.000	11155	5385	1.092	--
总计		50586	100.000	11155			

图120 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-421-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-Jx-P5.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 4-39	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 00:48:12	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:04:58	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.181	53433	100.000	11839	5415	1.093	--
总计		53433	100.000	11839			

图121 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-422-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-Jx-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 4-48
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 00:51:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:05:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	50511	100.000	11217	5390	1.081	--
总计		50511	100.000	11217			


图122 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-423-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-dz2-1.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 3-27	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 00:55:08	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:05:04	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	98748	100.000	21733	5327	1.129	--
总计		98748	100.000	21733			


图123 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-8/18-424-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-lp-jyx2-0.4mg-lf100z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 00:58:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:05:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	98649	100.000	21716	5312	1.128	--
总计		98649	100.000	21716			

图124 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-I批-pH1.2介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-425-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 01:02:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:05:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图125 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
溶剂

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-426-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 01:05:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:05:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	98923	100.000	21109	4990	1.129	--
总计		98923	100.000	21109			


图126 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-427-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 01:09:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:05:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	98646	100.000	20953	4963	1.129	--
总计		98646	100.000	20953			


图127 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-428-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 01:12:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:05:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	99389	100.000	20959	4952	1.128	--
总计		99389	100.000	20959			


图128 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-429-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 01:16:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:05:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	98646	100.000	20938	4982	1.127	--
总计		98646	100.000	20938			

图129 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-430-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-dz1-5.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 1-18	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 01:19:32	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:05:51	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	98772	100.000	20965	4980	1.126	--
总计		98772	100.000	20965			

图130 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-431-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 01:23:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:05:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	14070	100.000	2967	4938	1.082	--
总计		14070	100.000	2967			


图131 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-432-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-5min-P2.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 1-10	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 01:26:29	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:05:57	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	14060	100.000	2925	4862	1.057	--
总计		14060	100.000	2925			


图132 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-433-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 01:29:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:06:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.182	12112	100.000	2519	4913	1.087	--
总计		12112	100.000	2519			


图133 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-434-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 01:33:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:06:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	14323	100.000	3046	5034	1.086	--
总计		14323	100.000	3046			

图134 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-435-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 01:36:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:06:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	12630	100.000	2701	5008	1.094	--
总计		12630	100.000	2701			


图135 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-436-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-5min-P6.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 1-46	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 01:40:21	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:06:09	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	13126	100.000	2782	4902	1.112	--
总计		13126	100.000	2782			


图136 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-437-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 01:43:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:06:12 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	26241	100.000	5405	4812	1.113	--
总计		26241	100.000	5405			

图137 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-438-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-10min-P2.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 1-11	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 01:47:18	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:06:14	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	23028	100.000	4867	4978	1.084	--
总计		23028	100.000	4867			


图138 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-439-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 01:50:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:06:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	24165	100.000	5129	4972	1.092	--
总计		24165	100.000	5129			

图139 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-440-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 01:54:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:06:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	17998	100.000	3785	4899	1.127	--
总计		17998	100.000	3785			


图140 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-441-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 01:57:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:06:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	24008	100.000	5141	5025	1.084	--
总计		24008	100.000	5141			


图141 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-442-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 02:01:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:06:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	24458	100.000	5300	5045	1.079	--
总计		24458	100.000	5300			


图142 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-443-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 02:04:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:06:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	30747	100.000	6513	4999	1.072	--
总计		30747	100.000	6513			

图143 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-444-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 02:08:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:06:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	28608	100.000	6067	4965	1.078	--
总计		28608	100.000	6067			

图144 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-445-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 02:11:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:06:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	30441	100.000	6489	4999	1.080	--
总计		30441	100.000	6489			


图145 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-446-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-15min-P4.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 1-30	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 02:15:04	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:06:38	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	30251	100.000	6449	4963	1.084	--
总计		30251	100.000	6449			


图146 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-447-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 02:18:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:06:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	29058	100.000	6218	5003	1.083	--
总计		29058	100.000	6218			


图147 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-448-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 02:22:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:06:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	31361	100.000	6727	5020	1.086	--
总计		31361	100.000	6727			

图148 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-449-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 02:25:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:06:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	34528	100.000	7449	5071	1.081	--
总计		34528	100.000	7449			

图149 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-450-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 02:28:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:06:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	31795	100.000	6815	5038	1.082	--
总计		31795	100.000	6815			

图150 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-451-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 02:32:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:06:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	34300	100.000	7376	5063	1.086	--
总计		34300	100.000	7376			

图151 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-452-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 02:35:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:06:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	34159	100.000	7280	5039	1.077	--
总计		34159	100.000	7280			

图152 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-453-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-20min-P5.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 1-40	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 02:39:22	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:06:58	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	32463	100.000	6978	5063	1.088	--
总计		32463	100.000	6978			


图153 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-454-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 02:42:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:07:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	36138	100.000	7693	5011	1.092	--
总计		36138	100.000	7693			


图154 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-455-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-30min-P1.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 1-5	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 02:46:18	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:07:04	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	37992	100.000	8169	5009	1.076	--
总计		37992	100.000	8169			

图155 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-456-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-30min-P2.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 1-14	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 02:49:46	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:07:07	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	34837	100.000	7410	5035	1.077	--
总计		34837	100.000	7410			


图156 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-457-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 02:53:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:07:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	40078	100.000	8518	4997	1.074	--
总计		40078	100.000	8518			

图157 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-458-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 02:56:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:07:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	37819	100.000	8049	5018	1.078	--
总计		37819	100.000	8049			

图158 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-459-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 03:00:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:07:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	35424	100.000	7595	5016	1.082	--
总计		35424	100.000	7595			


图159 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-460-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-30min-P6.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 1-50	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 03:03:39	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:07:19	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	42235	100.000	9023	4983	1.075	--
总计		42235	100.000	9023			

图160 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-461-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 03:07:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:07:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	40119	100.000	8616	5001	1.082	--
总计		40119	100.000	8616			

图161 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-462-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-45min-P2.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 1-15	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 03:10:35	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:07:25	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	38532	100.000	8204	4978	1.082	--
总计		38532	100.000	8204			


图162 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-463-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 03:14:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:07:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	44658	100.000	9561	5049	1.082	--
总计		44658	100.000	9561			


图163 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-464-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 03:17:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:07:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	42155	100.000	8995	4998	1.077	--
总计		42155	100.000	8995			


图164 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-465-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 03:21:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:07:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.168	38218	100.000	8144	5004	1.082	--
总计		38218	100.000	8144			

图165 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-466-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 03:24:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:07:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	45342	100.000	9357	4767	1.150	--
总计		45342	100.000	9357			

图166 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片6
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-467-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 03:27:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:07:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	43939	100.000	9379	4955	1.072	--
总计		43939	100.000	9379			

图167 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片1
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-468-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 03:31:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:07:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	40892	100.000	8717	5023	1.072	--
总计		40892	100.000	8717			


图168 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-469-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 03:34:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:07:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	47758	100.000	10209	5027	1.075	--
总计		47758	100.000	10209			

图169 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片3
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-470-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 03:38:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:07:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	44126	100.000	9365	4961	1.086	--
总计		44126	100.000	9365			

图170 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片4
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-471-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 03:41:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:07:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	38926	100.000	8265	4913	1.105	--
总计		38926	100.000	8265			

图171 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片5
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-472-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 03:45:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:07:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	48349	100.000	10364	4989	1.081	--
总计		48349	100.000	10364			


图172 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-473-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-90min-P1.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 1-8	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 03:48:46	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:07:57	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	42167	100.000	7493	3606	1.301	--
总计		42167	100.000	7493			


图173 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-474-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-90min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-17
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 03:52:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:08:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	48432	100.000	10287	4996	1.085	--
总计		48432	100.000	10287			


图174 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-475-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-90min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-26
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 03:55:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:08:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.183	50512	100.000	10713	5031	1.076	--
总计		50512	100.000	10713			


图175 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-476-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-90min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-35
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 03:59:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:08:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	45943	100.000	9796	5037	1.074	--
总计		45943	100.000	9796			


图176 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-477-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-90min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-44
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 04:02:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:08:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	40972	100.000	8807	5041	1.076	--
总计		40972	100.000	8807			


图177 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-478-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-90min-P6.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 1-53	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 04:06:12	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:08:12	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	51379	100.000	10926	5041	1.080	--
总计		51379	100.000	10926			


图178 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-479-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-Jx-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 4-4
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 04:09:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:08:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	49544	100.000	10551	5030	1.081	--
总计		49544	100.000	10551			

图179 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-480-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-Jx-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 4-13
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 04:13:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:08:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	46673	100.000	10025	5035	1.069	--
总计		46673	100.000	10025			


图180 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-481-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-Jx-P3.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 4-22	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 04:16:41	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:08:20	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.186	47521	100.000	10086	5024	1.075	--
总计		47521	100.000	10086			

图181 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-482-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-Jx-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 4-31
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 04:20:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:08:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	48953	100.000	10477	5019	1.074	--
总计		48953	100.000	10477			

图182 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-483-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-Jx-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 4-40
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 04:23:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:08:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	46178	100.000	9802	5017	1.079	--
总计		46178	100.000	9802			


图183 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-484-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-Jx-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 4-49
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 04:27:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:08:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	52266	100.000	11102	4971	1.074	--
总计		52266	100.000	11102			


图184 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-485-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 04:30:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:08:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	98530	100.000	21054	4990	1.122	--
总计		98530	100.000	21054			

图185 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-486-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx1-0.4mg-lf100z-dz2-2.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 1-27	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 04:34:06	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:08:35	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	98628	100.000	21057	4977	1.119	--
总计		98628	100.000	21057			

图186 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-487-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 04:37:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:08:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图187 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
 溶剂

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-488-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 04:41:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:08:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	98968	100.000	20422	4639	1.119	--
总计		98968	100.000	20422			

图188 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-489-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-dz1-2.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 2-18	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 04:44:36	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:08:44	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	98636	100.000	20385	4658	1.122	--
总计		98636	100.000	20385			


图189 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-490-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 04:48:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:08:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	98410	100.000	20296	4670	1.120	--
总计		98410	100.000	20296			


图190 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-491-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 04:51:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:08:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	98449	100.000	20305	4678	1.116	--
总计		98449	100.000	20305			


图191 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-492-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 04:55:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:08:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	98474	100.000	20329	4693	1.124	--
总计		98474	100.000	20329			

图192 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-5




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-493-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 04:58:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:08:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	13595	100.000	2809	4620	1.074	--
总计		13595	100.000	2809			

图193 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-494-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 05:02:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:08:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	14516	100.000	3026	4713	1.077	--
总计		14516	100.000	3026			


图194 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-495-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 05:05:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:09:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>


检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	13645	100.000	2854	4736	1.074	--
总计		13645	100.000	2854			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-496-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-5min-P4.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 2-28	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 05:09:04	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:09:05	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	13399	100.000	2790	4658	1.088	--
总计		13399	100.000	2790			


图196 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-497-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 05:12:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:09:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	14127	100.000	2933	4680	1.085	--
总计		14127	100.000	2933			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-498-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 05:16:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:09:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	13649	100.000	2850	4726	1.082	--
总计		13649	100.000	2850			


图198 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-499-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-10min-P1.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 2-2	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 05:19:31	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:09:14	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	24544	100.000	5081	4716	1.068	--
总计		24544	100.000	5081			

图199 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-500-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 05:23:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:09:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	24327	100.000	5023	4698	1.083	--
总计		24327	100.000	5023			


图200 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-501-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 05:26:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:09:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	24923	100.000	5175	4673	1.074	--
总计		24923	100.000	5175			


图201 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-502-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 05:29:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:09:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	23901	100.000	4953	4689	1.074	--
总计		23901	100.000	4953			




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-503-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 05:33:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:09:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	23699	100.000	4914	4711	1.086	--
总计		23699	100.000	4914			

图203 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-504-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 05:36:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:09:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	19691	100.000	4068	4669	1.076	--
总计		19691	100.000	4068			


图204 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-505-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 05:40:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:09:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	27386	100.000	5702	4772	1.086	--
总计		27386	100.000	5702			


图205 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-506-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 05:43:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:09:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	26974	100.000	5560	4690	1.071	--
总计		26974	100.000	5560			


图206 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-507-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 05:47:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:09:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	31040	100.000	6472	4720	1.077	--
总计		31040	100.000	6472			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-508-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 05:50:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:09:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	29990	100.000	6241	4683	1.071	--
总计		29990	100.000	6241			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-509-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 05:54:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:09:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	29494	100.000	5969	4572	1.114	--
总计		29494	100.000	5969			

图209 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-510-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 05:57:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:09:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	29137	100.000	6036	4717	1.071	--
总计		29137	100.000	6036			


图210 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-511-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 06:01:24 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:09:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	32833	100.000	6825	4690	1.071	--
总计		32833	100.000	6825			


图211 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-512-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 06:04:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:09:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	32552	100.000	6738	4708	1.076	--
总计		32552	100.000	6738			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-513-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 06:08:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:09:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	35395	100.000	7420	4812	1.075	--
总计		35395	100.000	7420			

图213 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-514-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 06:11:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:09:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	33631	100.000	7036	4722	1.076	--
总计		33631	100.000	7036			


图214 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-515-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 06:15:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:10:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	33530	100.000	6975	4719	1.066	--
总计		33530	100.000	6975			


图215 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-516-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 06:18:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:10:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	32745	100.000	6815	4748	1.077	--
总计		32745	100.000	6815			


图216 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-517-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 06:22:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:10:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	36920	100.000	7687	4706	1.077	--
总计		36920	100.000	7687			


图217 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-518-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-30min-P2.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 2-14	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 06:25:52	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:10:09	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	36157	100.000	7518	4699	1.063	--
总计		36157	100.000	7518			


图218 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-519-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 06:29:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:10:12 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	38010	100.000	7898	4706	1.074	--
总计		38010	100.000	7898			

图219 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-520-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 06:32:51 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:10:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	38118	100.000	7939	4714	1.070	--
总计		38118	100.000	7939			


图220 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-521-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 06:36:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:10:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	36793	100.000	7632	4680	1.069	--
总计		36793	100.000	7632			

图221 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-522-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 06:39:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:10:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.168	37559	100.000	7747	4696	1.068	--
总计		37559	100.000	7747			


图222 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-523-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 06:43:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:10:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	41443	100.000	8590	4685	1.076	--
总计		41443	100.000	8590			


图223 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-524-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 06:46:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:10:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	38768	100.000	8044	4676	1.064	--
总计		38768	100.000	8044			


图224 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-525-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 06:50:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:10:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	44310	100.000	9132	4718	1.066	--
总计		44310	100.000	9132			


图225 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-526-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-45min-P4.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 2-33	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 06:53:49	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:10:32	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	44023	100.000	9124	4735	1.073	--
总计		44023	100.000	9124			

图226 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-527-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 06:57:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:10:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	40592	100.000	8494	4722	1.073	--
总计		40592	100.000	8494			

图227 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-528-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-45min-P6.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 2-51	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 07:00:49	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:10:38	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.168	41412	100.000	8605	4750	1.075	--
总计		41412	100.000	8605			


图228 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-529-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 07:04:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:10:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	43208	100.000	9019	4723	1.071	--
总计		43208	100.000	9019			

图229 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片1
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-530-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 07:07:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:10:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	39829	100.000	8301	4704	1.067	--
总计		39829	100.000	8301			

图230 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-531-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-60min-P3.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 2-25	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 07:11:18	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:10:47	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	46287	100.000	9624	4715	1.066	--
总计		46287	100.000	9624			

图231 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-532-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 07:14:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:10:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	45216	100.000	9391	4700	1.076	--
总计		45216	100.000	9391			

图232 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片4
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-533-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 07:18:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:10:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	42426	100.000	8808	4711	1.070	--
总计		42426	100.000	8808			

图233 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片5
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-534-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 07:21:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:10:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	43250	100.000	8901	4656	1.071	--
总计		43250	100.000	8901			

图234 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片6
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-535-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-90min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-8
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 07:25:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:10:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	44422	100.000	9229	4687	1.070	--
总计		44422	100.000	9229			

图235 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片1
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-536-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-90min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-17
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 07:28:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:11:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	41467	100.000	8577	4654	1.063	--
总计		41467	100.000	8577			


图236 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-537-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-90min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-26
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 07:32:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:11:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	47816	100.000	9950	4684	1.070	--
总计		47816	100.000	9950			

图237 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片3
 供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-538-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-90min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-35
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 07:35:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:11:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	47590	100.000	9810	4653	1.068	--
总计		47590	100.000	9810			


图238 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-539-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-90min-P5.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 2-44	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 07:39:17	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:11:11	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	43993	100.000	9049	4640	1.071	--
总计		43993	100.000	9049			

图239 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-348

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30°C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-540-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-90min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-53
 进样体积: 100 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 07:42:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:11:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	43628	100.000	9035	4674	1.069	--
总计		43628	100.000	9035			


图240 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-541-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-Jx-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 4-5
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 07:46:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:11:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	48331	100.000	9976	4650	1.072	--
总计		48331	100.000	9976			


图241 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-542-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-Jx-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 4-14
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 07:49:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:11:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>


检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	46340	100.000	9602	4654	1.066	--
总计		46340	100.000	9602			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-543-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-Jx-P3.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 4-23	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 07:53:14	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:11:23	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	49654	100.000	10177	4629	1.073	--
总计		49654	100.000	10177			


图243 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-544-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-Jx-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 4-32
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 07:56:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:11:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	49124	100.000	10047	4610	1.071	--
总计		49124	100.000	10047			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-545-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-Jx-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 4-41
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 08:00:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:11:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	47543	100.000	9820	4634	1.072	--
总计		47543	100.000	9820			


图245 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-546-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-Jx-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 4-50
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 08:03:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:11:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	47973	100.000	9842	4637	1.067	--
总计		47973	100.000	9842			


图246 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
 柱温 :30 $^{\circ}$ C 波长:283nm
 数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-547-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 100 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2024/06/26 08:07:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:11:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 283nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	98128	100.000	20128	4588	1.107	--
总计		98128	100.000	20128			

图247 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(4.6mm*150mm,5μm)	流速:1.5ml/min
柱温 :30°C	波长:283nm
数据文件名: RC\$QTL-348 - 18-9/18-548-2 - zzp-24061901p-rcqx-pH1.2jz-jyx2-0.4mg-lf100z-dz2-2.lcd	
方法文件名: RC\$QTL-348 - QTL-348-RC-0.4mg-FX267.lcm	
批处理文件名: RC\$QTL-348 - 20240625-rcqx-fx267.lcb	
样品瓶号: 2-27	版本号:6.115
进样体积: 100 μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2024/06/26 08:10:40	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2024/06/26 14:11:38	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)	

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 283nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.157	98127	100.000	20086	4592	1.105	--
总计		98127	100.000	20086			

图248 叶酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24061901批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2