


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速:1.5ml/min  
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm  
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-116-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-rj.lcd  
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
样品瓶号: 1-9  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号:6.115  
分析时间: 2024/07/24 10:53:39 实验者: wangdan  
处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:55:40 处理者: wangdan  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-24071601批-pH3.8介质-桨法-50转  
溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-117-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 10:56:31      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:55:48      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	193715	100.000	44590	1962	1.131	--
总计		193715	100.000	44590			


图2 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-1

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-118-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 10:59:24      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:55:56      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.250	193860	100.000	44787	1947	1.134	--
总计		193860	100.000	44787			


图3 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-2

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-119-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 11:02:18      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:56:03      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.243	193965	100.000	44695	1922	1.134	--
总计		193965	100.000	44695			

图4 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-120-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 11:05:11      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:56:11      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	193871	100.000	45152	1917	1.136	--
总计		193871	100.000	45152			

图5 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-121-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 11:08:04      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:56:18      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	193985	100.000	44852	1907	1.139	--
总计		193985	100.000	44852			

图6 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-122-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 11:10:57      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:56:25      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	111686	100.000	26864	2062	1.164	--
总计		111686	100.000	26864			

图7 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-桨法-50转-5min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-123-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 11:13:49      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:56:33      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	78770	100.000	19012	2046	1.170	--
总计		78770	100.000	19012			

图8 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-桨法-50转-5min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-124-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-19  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 11:16:41      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:56:41      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	120821	100.000	29212	2055	1.162	--
总计		120821	100.000	29212			

图9 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-桨法-50转-5min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-125-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-28  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 11:19:32      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:56:48      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	114615	100.000	27593	2052	1.164	--
总计		114615	100.000	27593			

图10 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-桨法-50转-5min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-126-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-37  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 11:22:24      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:56:56      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	132087	100.000	31727	2055	1.162	--
总计		132087	100.000	31727			

图11 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-桨法-50转-5min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-127-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 11:25:17      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:57:04      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.224	116241	100.000	28096	2049	1.165	--
总计		116241	100.000	28096			

图12 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-24071601批-pH3.8介质-桨法-50转-5min-片6  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-128-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 11:28:08      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:57:12      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.224	139502	100.000	33749	2045	1.163	--
总计		139502	100.000	33749			

图13 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-10min-片1  
 供试品溶液-1




# JSS-222

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-129-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 11:31:00      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:57:19      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	127011	100.000	30755	2042	1.161	--
总计		127011	100.000	30755			

图14 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-10min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-130-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 11:33:52      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:57:27      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.223	150264	100.000	36524	2051	1.160	--
总计		150264	100.000	36524			

图15 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-10min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-131-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 11:36:43      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:57:34      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	143607	100.000	34958	2050	1.162	--
总计		143607	100.000	34958			

图16 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-10min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-132-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 11:39:35      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:57:42      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	158575	100.000	38497	2044	1.158	--
总计		158575	100.000	38497			

图17 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-10min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-133-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-47  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 11:42:26      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:57:49      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	145619	100.000	35349	2041	1.160	--
总计		145619	100.000	35349			


图18 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-10min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-134-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-3  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 11:45:18      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:57:57      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	151336	100.000	36794	2041	1.158	--
总计		151336	100.000	36794			


图19 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-15min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-135-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-12  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 11:48:10      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:58:04      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	147614	100.000	35864	2044	1.162	--
总计		147614	100.000	35864			

图20 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-15min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-136-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-21  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 11:51:02      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:58:12      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	162790	100.000	39569	2049	1.158	--
总计		162790	100.000	39569			

图21 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-15min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-137-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-30  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 11:53:55      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:58:19      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	155895	100.000	37807	2043	1.159	--
总计		155895	100.000	37807			

图22 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-15min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-138-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-39  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 11:56:46      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:58:27      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	167544	100.000	40728	2045	1.156	--
总计		167544	100.000	40728			


图23 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-15min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-139-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-48  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 11:59:37      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:58:34      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	158817	100.000	38658	2050	1.159	--
总计		158817	100.000	38658			

图24 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-15min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-140-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-4  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 12:02:30      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:58:42      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	159450	100.000	38646	2043	1.158	--
总计		159450	100.000	38646			

图25 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-20min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-141-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-13  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 12:05:21      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:58:49      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	156705	100.000	38158	2053	1.158	--
总计		156705	100.000	38158			

图26 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-20min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-142-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-22  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 12:08:13      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:58:57      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	169835	100.000	41043	2041	1.157	--
总计		169835	100.000	41043			

图27 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-20min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-143-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-31  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 12:11:06      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:59:05      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	163375	100.000	39391	2043	1.159	--
总计		163375	100.000	39391			

图28 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-20min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-144-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-40  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 12:13:58      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:59:13      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	173344	100.000	41690	2037	1.158	--
总计		173344	100.000	41690			

图29 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-20min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-145-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-49  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 12:16:50      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:59:20      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	165578	100.000	39940	2043	1.161	--
总计		165578	100.000	39940			

图30 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-20min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-146-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-5  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 12:19:42      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:59:28      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	169721	100.000	41250	2052	1.155	--
总计		169721	100.000	41250			


图31 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-30min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-147-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-14  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 12:22:34      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:59:35      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	169057	100.000	40843	2041	1.155	--
总计		169057	100.000	40843			

图32 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-30min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-148-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-23  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 12:25:26      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:59:43      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	180008	100.000	43830	2053	1.152	--
总计		180008	100.000	43830			


图33 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-30min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-149-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-32  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 12:28:19      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:59:50      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	173680	100.000	42171	2043	1.155	--
总计		173680	100.000	42171			

图34 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-30min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-150-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-41  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 12:31:11      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 16:59:57      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	180669	100.000	43994	2052	1.153	--
总计		180669	100.000	43994			


图35 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-30min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-151-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-50  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 12:34:02      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:00:05      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	175273	100.000	42707	2052	1.155	--
总计		175273	100.000	42707			

图36 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-152-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-6  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 12:36:54      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:00:12      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	179784	100.000	43742	2049	1.156	--
总计		179784	100.000	43742			

图37 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-45min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-153-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-15  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 12:39:46      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:00:20      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	179385	100.000	43795	2061	1.154	--
总计		179385	100.000	43795			

图38 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-45min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-154-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-24  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 12:42:38      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:00:27      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	188135	100.000	45824	2052	1.152	--
总计		188135	100.000	45824			

图39 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-45min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-155-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-33  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 12:45:30      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:00:35      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	182653	100.000	44539	2057	1.153	--
总计		182653	100.000	44539			

图40 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-45min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-156-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-42  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 12:48:21      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:00:42      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	187265	100.000	45694	2059	1.151	--
总计		187265	100.000	45694			

图41 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-45min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-157-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-51  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 12:51:12      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:00:50      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	183792	100.000	44650	2040	1.155	--
总计		183792	100.000	44650			

图42 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-45min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-158-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-7  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 12:54:05      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:00:58      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	184624	100.000	44828	2045	1.151	--
总计		184624	100.000	44828			


图43 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-60min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-159-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-16  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 12:56:57      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:01:05      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	185223	100.000	45023	2045	1.154	--
总计		185223	100.000	45023			

图44 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-60min-片2  
 供试品溶液-1




# JSS-222

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-160-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-25  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 12:59:48      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:01:13      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	185718	100.000	45168	2051	1.154	--
总计		185718	100.000	45168			

图45 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-60min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-161-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-34  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 13:02:40      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:01:20      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	181906	100.000	44274	2051	1.153	--
总计		181906	100.000	44274			

图46 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-60min-片4  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-162-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-43  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 13:05:33      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:01:28      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	186140	100.000	45310	2054	1.154	--
总计		186140	100.000	45310			

图47 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-60min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-163-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-52  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 13:08:25      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:01:35      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	188291	100.000	45913	2052	1.150	--
总计		188291	100.000	45913			

图48 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-浆法-50转-60min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-164-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jxzs-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-8  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 13:11:18      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:01:43      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	192106	100.000	46761	2052	1.153	--
总计		192106	100.000	46761			

图49 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-桨法-50转-极限转速-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-165-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jxzs-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-17  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 13:14:11      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:01:50      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	193874	100.000	47044	2050	1.151	--
总计		193874	100.000	47044			

图50 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-桨法-50转-极限转速-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-166-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jxzs-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-26  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 13:17:03      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:01:58      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.222	198637	100.000	48462	2059	1.150	--
总计		198637	100.000	48462			

图51 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-桨法-50转-极限转速-片3  
 供试品溶液-1




# JSS-222

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-167-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jxzs-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-35  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 13:19:54      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:02:05      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	194672	100.000	47258	2046	1.153	--
总计		194672	100.000	47258			

图52 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-桨法-50转-极限转速-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-168-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jxzs-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-44  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 13:22:48      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:02:13      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	194925	100.000	47415	2046	1.153	--
总计		194925	100.000	47415			

图53 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-桨法-50转-极限转速-片5  
 供试品溶液-1




# JSS-222

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-169-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jxzs-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-53  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 13:25:40      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:02:20      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	193452	100.000	47132	2060	1.150	--
总计		193452	100.000	47132			

图54 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-桨法-50转-极限转速-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-170-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 13:28:33      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:02:28      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.213	196002	100.000	46138	1879	1.142	--
总计		196002	100.000	46138			

图55 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-171-2 - zzp-24071601p-rcqx-jf50z-pH3.8jz-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 13:31:26      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:02:35      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.216	196903	100.000	46140	1880	1.144	--
总计		196903	100.000	46140			


图56 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-24071601批-pH3.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-2

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-172-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-9  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 13:34:20      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:02:43      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转  
 溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-173-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 13:37:14      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:02:50      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	197665	100.000	46044	1892	1.146	--
总计		197665	100.000	46044			

图58 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-174-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 13:40:09      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:02:58      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	196846	100.000	46091	1896	1.145	--
总计		196846	100.000	46091			

图59 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-175-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 13:43:02      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:03:06      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	197475	100.000	46108	1889	1.145	--
总计		197475	100.000	46108			

图60 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-176-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 13:45:57      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:03:13      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	197867	100.000	46043	1886	1.142	--
总计		197867	100.000	46043			

图61 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-177-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 13:48:51      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:03:21      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.215	197174	100.000	46338	1881	1.144	--
总计		197174	100.000	46338			

图62 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-178-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-1  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 13:51:44      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:03:28      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	43758	100.000	10548	2022	1.189	--
总计		43758	100.000	10548			


图63 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-桨法-50转-5min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-179-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-10  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 13:54:40      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:03:36      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	18218	100.000	4412	2015	1.178	--
总计		18218	100.000	4412			

图64 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-桨法-50转-5min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-180-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-19  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 13:57:33      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:03:43      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	57676	100.000	13892	2028	1.180	--
总计		57676	100.000	13892			


图65 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-桨法-50转-5min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-181-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-28  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 14:00:27      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:03:51      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	55019	100.000	13325	2036	1.179	--
总计		55019	100.000	13325			


图66 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-桨法-50转-5min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-182-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-37  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 14:03:20      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:03:58      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	59811	100.000	14429	2030	1.180	--
总计		59811	100.000	14429			

图67 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-桨法-50转-5min-片5  
 供试品溶液-1




# JSS-222

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-183-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-46  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 14:06:12      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:04:06      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	61917	100.000	14880	2024	1.185	--
总计		61917	100.000	14880			


图68 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-桨法-50转-5min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-184-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-2  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 14:09:06      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:04:13      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	112291	100.000	27207	2040	1.166	--
总计		112291	100.000	27207			

图69 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-10min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-185-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-11  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 14:11:59      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:04:21      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	117986	100.000	28505	2035	1.167	--
总计		117986	100.000	28505			

图70 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-10min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-186-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-20  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 14:14:53      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:04:28      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	128954	100.000	31073	2039	1.167	--
总计		128954	100.000	31073			

图71 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-10min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-187-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-29  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 14:17:45      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:04:36      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	126788	100.000	30622	2038	1.166	--
总计		126788	100.000	30622			

图72 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-10min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-188-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-38  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 14:20:38      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:04:44      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	138389	100.000	33366	2037	1.165	--
总计		138389	100.000	33366			

图73 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-10min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-189-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-47  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 14:23:32      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:04:51      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	139669	100.000	33795	2041	1.161	--
总计		139669	100.000	33795			

图74 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-10min-片6  
 供试品溶液-1




# JSS-222

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-190-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-3  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 14:26:25      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:04:59      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	164062	100.000	39865	2047	1.158	--
总计		164062	100.000	39865			

图75 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-15min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-191-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-12  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 14:29:19      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:05:06      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	160435	100.000	38786	2041	1.160	--
总计		160435	100.000	38786			

图76 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-15min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-192-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-21  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 14:32:12      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:05:14      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.216	169890	100.000	41367	2045	1.158	--
总计		169890	100.000	41367			

图77 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-15min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-193-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-30  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 14:35:04      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:05:22      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	170794	100.000	41325	2043	1.159	--
总计		170794	100.000	41325			

图78 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-15min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-194-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-39  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 14:37:58      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:05:29      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	176305	100.000	42906	2051	1.153	--
总计		176305	100.000	42906			

图79 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-15min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-195-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-48  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 14:40:51      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:05:37      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	174615	100.000	42341	2046	1.156	--
总计		174615	100.000	42341			

图80 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-15min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-196-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-4  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 14:43:45      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:05:44      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	176400	100.000	43001	2052	1.153	--
总计		176400	100.000	43001			

图81 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-20min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-197-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-13  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 14:46:39      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:05:52      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	174104	100.000	42402	2053	1.155	--
总计		174104	100.000	42402			

图82 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-20min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-198-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-22  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 14:49:32      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:05:59      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	180856	100.000	43796	2045	1.155	--
总计		180856	100.000	43796			

图83 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-20min-片3  
 供试品溶液-1




# JSS-222

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-199-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-31  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 14:52:24      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:06:07      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	189167	100.000	46192	2065	1.152	--
总计		189167	100.000	46192			

图84 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-20min-片4  
 供试品溶液-1




# JSS-222

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-200-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-40  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 14:55:18      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:06:14      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.221	183890	100.000	44820	2057	1.154	--
总计		183890	100.000	44820			

图85 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-20min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-201-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-49  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 14:58:11      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:06:22      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	183940	100.000	44676	2044	1.153	--
总计		183940	100.000	44676			

图86 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-20min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-202-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-5  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 15:01:04      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:06:30      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	186871	100.000	45207	2044	1.153	--
总计		186871	100.000	45207			

图87 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-30min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-203-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-14  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 15:03:58      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:06:37      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	184856	100.000	44965	2053	1.153	--
总计		184856	100.000	44965			

图88 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-30min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-204-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-23  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 15:06:51      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:06:45      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	189440	100.000	45966	2052	1.152	--
总计		189440	100.000	45966			


图89 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-30min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-205-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-32  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 15:09:44      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:06:53      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	191354	100.000	46542	2059	1.153	--
总计		191354	100.000	46542			


图90 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-30min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-206-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-41  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 15:12:38      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:07:00      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	191583	100.000	46538	2050	1.150	--
总计		191583	100.000	46538			

图91 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-30min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-207-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-50  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 15:15:32      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:07:08      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	191369	100.000	46665	2054	1.152	--
总计		191369	100.000	46665			

图92 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-1




# JSS-222

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-208-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-6  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 15:18:27      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:07:16      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	191855	100.000	46735	2055	1.151	--
总计		191855	100.000	46735			

图93 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-45min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-209-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-15  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 15:21:20      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:07:23      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	189717	100.000	45768	2047	1.154	--
总计		189717	100.000	45768			

图94 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-45min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-210-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-24  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 15:24:14      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:07:32      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	193624	100.000	47077	2051	1.152	--
总计		193624	100.000	47077			


图95 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-45min-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-211-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-33  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 15:27:07      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:07:40      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	195454	100.000	47196	2046	1.152	--
总计		195454	100.000	47196			


图96 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-45min-片4  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-212-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-42  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 15:30:01      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:07:47      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	193445	100.000	46791	2054	1.153	--
总计		193445	100.000	46791			

图97 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-45min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-213-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-51  
 进样体积: 10 μl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 15:32:54      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:07:55      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	194249	100.000	47068	2046	1.152	--
总计		194249	100.000	47068			


图98 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-45min-片6  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-214-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-7  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 15:35:49      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:08:03      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	192666	100.000	46512	2048	1.154	--
总计		192666	100.000	46512			


图99 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-60min-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-215-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-16  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 15:38:42      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:08:10      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	190489	100.000	46313	2053	1.151	--
总计		190489	100.000	46313			

图100 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-60min-片2  
 供试品溶液-1




# JSS-222

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-216-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-25  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 15:41:37      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:08:18      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	194701	100.000	47289	2049	1.151	--
总计		194701	100.000	47289			

图101 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-60min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-217-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-34  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 15:44:31      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:08:26      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.220	195310	100.000	47497	2062	1.152	--
总计		195310	100.000	47497			


图102 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-60min-片4  
供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-218-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-43  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 15:47:25      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:08:33      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	195723	100.000	47329	2044	1.150	--
总计		195723	100.000	47329			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-219-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-52  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 15:50:19      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:08:41      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	195452	100.000	47251	2052	1.152	--
总计		195452	100.000	47251			

图104 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-浆法-50转-60min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-220-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jxzs-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-8  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 15:53:14      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:08:49      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	191830	100.000	46330	2046	1.153	--
总计		191830	100.000	46330			


图105 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-桨法-50转-极限转速-片1  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-221-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jxzs-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-17  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 15:56:07      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:08:56      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	191456	100.000	46322	2045	1.154	--
总计		191456	100.000	46322			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-222-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jxzs-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-26  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 15:59:01      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:09:04      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	194323	100.000	46986	2050	1.152	--
总计		194323	100.000	46986			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-223-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jxzs-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-35  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 16:01:56      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:09:11      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;


检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	195193	100.000	47276	2047	1.151	--
总计		195193	100.000	47276			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-224-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jxzs-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-44  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 16:04:50      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:09:19      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	195716	100.000	47463	2053	1.151	--
总计		195716	100.000	47463			

图109 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-桨法-50转-极限转速-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-225-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-jxzs-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-53  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 16:07:44      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:09:26      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	195285	100.000	47048	2044	1.153	--
总计		195285	100.000	47048			

图110 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-桨法-50转-极限转速-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30°C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-226-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 10 µl      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 16:10:37      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:09:34      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.215	199595	100.000	47028	1892	1.142	--
总计		199595	100.000	47028			


图111 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-2-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.5ml/min  
 柱温 : 30 $^{\circ}$ C      波长:318nm  
 数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-46/18-227-2 - cbzj-T0704607DDp-rcqx-jf50z-pH3.8jz-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20240724-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号:6.115  
 分析时间: 2024/07/24 16:13:32      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2024/07/24 17:09:41      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.213	198917	100.000	47023	1893	1.142	--
总计		198917	100.000	47023			

图112 盐酸鲁拉西酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
参比制剂-T0704607DD批-pH3.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-2-2