




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 0-18/26-1-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号：1-9
进样体积：10 μl
进样时间：2024/07/27 12:03:25
处理时间(V2)：2024/07/29 09:01:07
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-2-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 12:06:47
处理时间(V2): 2024/07/29 09:01:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	475062	100.000	69704	2676	1.161	--
总计		475062	100.000	69704			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-3-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 12:10:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:01:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	474709	100.000	69644	2677	1.162	--
总计		474709	100.000	69644			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-4-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 12:13:34
处理时间(V2): 2024/07/29 09:01:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	475140	100.000	69507	2672	1.166	--
总计		475140	100.000	69507			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-5-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 12:16:57
处理时间(V2): 2024/07/29 09:01:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	475191	100.000	69920	2681	1.163	--
总计		475191	100.000	69920			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-6-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 12:20:19
处理时间(V2): 2024/07/29 09:01:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	474729	100.000	69918	2677	1.163	--
总计		474729	100.000	69918			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 0-18/26-7-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号：1-1
进样体积：10 μl
进样时间：2024/07/27 12:23:41
处理时间(V2)：2024/07/29 09:01:30
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.287	281187	100.000	45571	3330	1.156	--
总计		281187	100.000	45571			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-8-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-10 版本号: 6.115
进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/07/27 12:27:03 处理者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:01:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.287	261527	100.000	42342	3327	1.156	--
总计		261527	100.000	42342			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-9-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 12:30:25
处理时间(V2): 2024/07/29 09:01:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.287	261005	100.000	42246	3326	1.156	--
总计		261005	100.000	42246			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-10-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 12:33:46
处理时间(V2): 2024/07/29 09:01:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.286	273732	100.000	44272	3328	1.157	--
总计		273732	100.000	44272			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-11-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 12:37:07
处理时间(V2): 2024/07/29 09:01:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.285	248261	100.000	40131	3331	1.157	--
总计		248261	100.000	40131			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 0-18/26-12-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号：1-46
进样体积：10 μl
进样时间：2024/07/27 12:40:28
处理时间(V2)：2024/07/29 09:01:44
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.285	260190	100.000	42042	3331	1.157	--
总计		260190	100.000	42042			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-13-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 12:43:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:01:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	375335	100.000	60583	3331	1.157	--
总计		375335	100.000	60583			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-14-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 12:47:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:01:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	363316	100.000	58642	3332	1.159	--
总计		363316	100.000	58642			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-15-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-20 版本号: 6.115
进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/07/27 12:50:34 处理者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:01:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	368464	100.000	59486	3335	1.159	--
总计		368464	100.000	59486			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-16-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 12:53:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:01:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	369922	100.000	59759	3335	1.159	--
总计		369922	100.000	59759			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-17-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 12:57:18
处理时间(V2): 2024/07/29 09:01:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	348982	100.000	56396	3335	1.159	--
总计		348982	100.000	56396			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 0-18/26-18-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号：1-47
进样体积：10 μl
进样时间：2024/07/27 13:00:40
处理时间(V2)：2024/07/29 09:02:01
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	361455	100.000	58471	3334	1.159	--
总计		361455	100.000	58471			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-19-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-3 版本号: 6.115
进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/07/27 13:04:03 处理者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:02:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	412483	100.000	66828	3332	1.159	--
总计		412483	100.000	66828			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-20-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 13:07:25 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:02:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	404326	100.000	65464	3331	1.160	--
总计		404326	100.000	65464			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-21-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 13:10:47
处理时间(V2): 2024/07/29 09:02:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	405883	100.000	65763	3332	1.159	--
总计		405883	100.000	65763			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-22-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 13:14:09
处理时间(V2): 2024/07/29 09:02:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	404639	100.000	65664	3326	1.160	--
总计		404639	100.000	65664			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-23-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 13:17:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:02:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	394802	100.000	64017	3332	1.160	--
总计		394802	100.000	64017			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-24-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 13:20:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:02:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	396154	100.000	64266	3331	1.160	--
总计		396154	100.000	64266			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-25-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 13:24:15
处理时间(V2): 2024/07/29 09:02:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	431489	100.000	70012	3332	1.159	--
总计		431489	100.000	70012			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-26-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 13:27:38
处理时间(V2): 2024/07/29 09:02:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	423981	100.000	68735	3334	1.160	--
总计		423981	100.000	68735			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-27-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 13:31:00
处理时间(V2): 2024/07/29 09:02:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	424437	100.000	68853	3332	1.160	--
总计		424437	100.000	68853			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-28-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 13:34:21
处理时间(V2): 2024/07/29 09:02:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	425731	100.000	69034	3331	1.160	--
总计		425731	100.000	69034			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-29-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 13:37:43
处理时间(V2): 2024/07/29 09:02:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	416639	100.000	67660	3337	1.160	--
总计		416639	100.000	67660			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 0-18/26-30-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号：1-49
进样体积：10 μl
进样时间：2024/07/27 13:41:04
处理时间(V2)：2024/07/29 09:02:34
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	415532	100.000	67263	3327	1.160	--
总计		415532	100.000	67263			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-31-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 13:44:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:02:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	453707	100.000	73670	3329	1.160	--
总计		453707	100.000	73670			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-32-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 13:47:47
处理时间(V2): 2024/07/29 09:02:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	447704	100.000	72599	3335	1.161	--
总计		447704	100.000	72599			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-33-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 13:51:10
处理时间(V2): 2024/07/29 09:02:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	445319	100.000	72087	3331	1.161	--
总计		445319	100.000	72087			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-34-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-32 版本号: 6.115
进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/07/27 13:54:31 处理者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:02:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	444949	100.000	72162	3335	1.160	--
总计		444949	100.000	72162			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-35-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 13:57:53
处理时间(V2): 2024/07/29 09:02:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	441283	100.000	71512	3335	1.161	--
总计		441283	100.000	71512			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-36-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 14:01:15
处理时间(V2): 2024/07/29 09:02:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	437941	100.000	70997	3333	1.161	--
总计		437941	100.000	70997			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-37-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 14:04:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:02:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	469981	100.000	76255	3326	1.160	--
总计		469981	100.000	76255			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-38-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 14:07:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:02:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	463691	100.000	75047	3331	1.161	--
总计		463691	100.000	75047			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-39-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 14:11:20 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:02:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	461826	100.000	74888	3335	1.161	--
总计		461826	100.000	74888			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-40-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 14:14:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:03:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	461598	100.000	74821	3337	1.162	--
总计		461598	100.000	74821			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-41-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 14:18:03
处理时间(V2): 2024/07/29 09:03:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	456783	100.000	74130	3332	1.161	--
总计		456783	100.000	74130			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-42-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 14:21:25
处理时间(V2): 2024/07/29 09:03:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	455192	100.000	73832	3334	1.161	--
总计		455192	100.000	73832			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-43-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 14:24:46
处理时间(V2): 2024/07/29 09:03:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	479495	100.000	77859	3332	1.161	--
总计		479495	100.000	77859			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 0-18/26-44-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号：1-16
进样体积：10 μl
进样时间：2024/07/27 14:28:07
处理时间(V2)：2024/07/29 09:03:10
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	473097	100.000	76780	3336	1.162	--
总计		473097	100.000	76780			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-45-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 14:31:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:03:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	470237	100.000	76449	3338	1.161	--
总计		470237	100.000	76449			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-46-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 14:34:52
处理时间(V2): 2024/07/29 09:03:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	472022	100.000	76655	3332	1.161	--
总计		472022	100.000	76655			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-47-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 14:38:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:03:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	468346	100.000	76057	3333	1.162	--
总计		468346	100.000	76057			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-48-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 14:41:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:03:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	463749	100.000	75257	3328	1.162	--
总计		463749	100.000	75257			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-49-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 14:44:59
处理时间(V2): 2024/07/29 09:03:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	484882	100.000	78697	3329	1.162	--
总计		484882	100.000	78697			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-50-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 14:48:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:03:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	484026	100.000	78567	3329	1.162	--
总计		484026	100.000	78567			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-51-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 14:51:44
处理时间(V2): 2024/07/29 09:03:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	479165	100.000	77782	3329	1.162	--
总计		479165	100.000	77782			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-52-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 14:55:06
处理时间(V2): 2024/07/29 09:03:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	480207	100.000	77896	3333	1.162	--
总计		480207	100.000	77896			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-53-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 14:58:30
处理时间(V2): 2024/07/29 09:03:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	479614	100.000	77878	3330	1.162	--
总计		479614	100.000	77878			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-54-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 15:01:52
处理时间(V2): 2024/07/29 09:03:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	472420	100.000	76599	3329	1.162	--
总计		472420	100.000	76599			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-55-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 15:05:15
处理时间(V2): 2024/07/29 09:03:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.264	474470	100.000	70195	2690	1.169	--
总计		474470	100.000	70195			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-56-2 - zzp-24072201-1p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 15:08:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:03:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.263	474152	100.000	70157	2691	1.170	--
总计		474152	100.000	70157			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-57-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 15:12:01
处理时间(V2): 2024/07/29 09:03:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-58-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 15:15:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:03:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.262	475775	100.000	70334	2683	1.169	--
总计		475775	100.000	70334			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-59-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 15:18:48
处理时间(V2): 2024/07/29 09:03:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.263	475438	100.000	70389	2692	1.169	--
总计		475438	100.000	70389			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-60-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 15:22:12
处理时间(V2): 2024/07/29 09:03:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.263	475709	100.000	70443	2693	1.169	--
总计		475709	100.000	70443			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-61-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 15:25:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:03:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.263	475295	100.000	70324	2689	1.169	--
总计		475295	100.000	70324			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 0-18/26-62-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：10 μl
进样时间：2024/07/27 15:29:00
处理时间(V2)：2024/07/29 09:03:56
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.262	475356	100.000	70298	2687	1.169	--
总计		475356	100.000	70298			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 0-18/26-63-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号：2-1
进样体积：10 μl
进样时间：2024/07/27 15:32:24
处理时间(V2)：2024/07/29 09:03:58
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	247467	100.000	40195	3331	1.163	--
总计		247467	100.000	40195			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-64-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 15:35:46
处理时间(V2): 2024/07/29 09:04:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	244125	100.000	39671	3338	1.162	--
总计		244125	100.000	39671			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 0-18/26-65-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号：2-19
进样体积：10 μl
进样时间：2024/07/27 15:39:11
处理时间(V2)：2024/07/29 09:04:03
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	275374	100.000	44713	3325	1.163	--
总计		275374	100.000	44713			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-66-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 15:42:33
处理时间(V2): 2024/07/29 09:04:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	209457	100.000	34003	3329	1.162	--
总计		209457	100.000	34003			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-67-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 15:45:56
处理时间(V2): 2024/07/29 09:04:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	227055	100.000	36859	3327	1.162	--
总计		227055	100.000	36859			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-68-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 15:49:20
处理时间(V2): 2024/07/29 09:04:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	228202	100.000	37062	3325	1.162	--
总计		228202	100.000	37062			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 0-18/26-69-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号：2-2
进样体积：10 μl
进样时间：2024/07/27 15:52:43
处理时间(V2)：2024/07/29 09:04:14
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	360703	100.000	58581	3330	1.163	--
总计		360703	100.000	58581			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-70-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 15:56:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:04:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	359022	100.000	58335	3332	1.164	--
总计		359022	100.000	58335			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 0-18/26-71-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号：2-20
进样体积：10 μl
进样时间：2024/07/27 15:59:29
处理时间(V2)：2024/07/29 09:04:19
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	362246	100.000	58821	3332	1.164	--
总计		362246	100.000	58821			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-72-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 16:02:52
处理时间(V2): 2024/07/29 09:04:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	326906	100.000	53087	3333	1.164	--
总计		326906	100.000	53087			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-73-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 16:06:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:04:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	346137	100.000	56192	3332	1.165	--
总计		346137	100.000	56192			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-74-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 16:09:37
处理时间(V2): 2024/07/29 09:04:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	348968	100.000	56685	3333	1.164	--
总计		348968	100.000	56685			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 0-18/26-75-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号：2-3
进样体积：10 μl
进样时间：2024/07/27 16:13:01
处理时间(V2)：2024/07/29 09:04:29
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	402009	100.000	65351	3338	1.165	--
总计		402009	100.000	65351			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-76-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 16:16:24
处理时间(V2): 2024/07/29 09:04:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	399943	100.000	64950	3328	1.164	--
总计		399943	100.000	64950			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 0-18/26-77-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号：2-21
进样体积：10 μl
进样时间：2024/07/27 16:19:47
处理时间(V2)：2024/07/29 09:04:34
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	397747	100.000	64553	3331	1.164	--
总计		397747	100.000	64553			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-78-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 16:23:11
处理时间(V2): 2024/07/29 09:04:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	381811	100.000	61991	3325	1.164	--
总计		381811	100.000	61991			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-79-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 16:26:33
处理时间(V2): 2024/07/29 09:04:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	392615	100.000	63730	3328	1.165	--
总计		392615	100.000	63730			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-80-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 16:29:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:04:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	393894	100.000	63936	3327	1.164	--
总计		393894	100.000	63936			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-81-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 16:33:19 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:04:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	422256	100.000	68496	3326	1.165	--
总计		422256	100.000	68496			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-82-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 16:36:42
处理时间(V2): 2024/07/29 09:04:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	421251	100.000	68351	3326	1.165	--
总计		421251	100.000	68351			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-83-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 16:40:06
处理时间(V2): 2024/07/29 09:04:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	415998	100.000	67507	3326	1.166	--
总计		415998	100.000	67507			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-84-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 16:43:30
处理时间(V2): 2024/07/29 09:04:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	407862	100.000	66194	3323	1.165	--
总计		407862	100.000	66194			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-85-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-40 版本号: 6.115
进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/07/27 16:46:52 处理者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:04:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	417847	100.000	67809	3323	1.165	--
总计		417847	100.000	67809			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-86-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 16:50:16
处理时间(V2): 2024/07/29 09:05:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	413162	100.000	67026	3320	1.165	--
总计		413162	100.000	67026			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 0-18/26-87-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号：2-5 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2024/07/27 16:53:39 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2024/07/29 09:05:02
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	445049	100.000	72219	3327	1.165	--
总计		445049	100.000	72219			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 0-18/26-88-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号：2-14
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/07/27 16:57:02 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2024/07/29 09:05:05 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	446106	100.000	72372	3326	1.166	--
总计		446106	100.000	72372			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 0-18/26-89-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号：2-23
进样体积：10 μl
进样时间：2024/07/27 17:00:26
处理时间(V2)：2024/07/29 09:05:08
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	439582	100.000	71268	3320	1.165	--
总计		439582	100.000	71268			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-90-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 17:04:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:05:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	434361	100.000	70481	3330	1.166	--
总计		434361	100.000	70481			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 0-18/26-91-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号：2-41
进样体积：10 μl
进样时间：2024/07/27 17:08:03
处理时间(V2)：2024/07/29 09:05:13
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	440390	100.000	71448	3328	1.166	--
总计		440390	100.000	71448			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-92-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 17:11:25
处理时间(V2): 2024/07/29 09:05:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	438204	100.000	71082	3325	1.165	--
总计		438204	100.000	71082			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-93-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-6 版本号: 6.115
进样体积: 10 μl 实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/07/27 17:14:49 处理者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:05:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	463324	100.000	75105	3316	1.166	--
总计		463324	100.000	75105			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-94-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 17:18:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:05:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	465477	100.000	75437	3319	1.166	--
总计		465477	100.000	75437			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-95-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 17:21:37 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:05:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	455653	100.000	73837	3317	1.166	--
总计		455653	100.000	73837			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-96-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 17:25:00
处理时间(V2): 2024/07/29 09:05:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	452243	100.000	73301	3321	1.168	--
总计		452243	100.000	73301			



SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 0-18/26-97-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-45min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb

样品瓶号：2-42

进样体积：10 μl

进样时间：2024/07/27 17:28:23

处理时间(V2)：2024/07/29 09:05:29

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	459368	100.000	74433	3314	1.166	--
总计		459368	100.000	74433			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-98-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 17:31:45
处理时间(V2): 2024/07/29 09:05:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	456251	100.000	73970	3319	1.166	--
总计		456251	100.000	73970			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-99-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 17:35:08 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:05:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	473771	100.000	76795	3321	1.166	--
总计		473771	100.000	76795			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-100-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 17:38:31
处理时间(V2): 2024/07/29 09:05:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	476747	100.000	77332	3320	1.166	--
总计		476747	100.000	77332			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-101-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 17:41:54 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:05:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	465950	100.000	75528	3321	1.166	--
总计		465950	100.000	75528			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-102-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 17:45:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:05:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	461769	100.000	74859	3320	1.167	--
总计		461769	100.000	74859			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-103-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 17:48:41 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:05:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	469686	100.000	76137	3316	1.167	--
总计		469686	100.000	76137			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-104-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 17:52:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:05:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	472249	100.000	76514	3316	1.167	--
总计		472249	100.000	76514			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-105-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 17:55:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:05:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	480131	100.000	77745	3315	1.167	--
总计		480131	100.000	77745			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-106-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 17:58:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:05:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	485819	100.000	78761	3321	1.167	--
总计		485819	100.000	78761			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-107-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 18:02:18
处理时间(V2): 2024/07/29 09:05:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	471537	100.000	76453	3320	1.167	--
总计		471537	100.000	76453			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-108-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 18:05:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:05:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	471810	100.000	76453	3315	1.167	--
总计		471810	100.000	76453			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-109-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 18:09:05 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:06:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	478527	100.000	77531	3313	1.167	--
总计		478527	100.000	77531			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 40℃
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-110-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 10 μl
进样时间: 2024/07/27 18:12:29
处理时间(V2): 2024/07/29 09:06:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 250nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	472962	100.000	76647	3316	1.167	--
总计		472962	100.000	76647			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 40℃ 波长: 250nm
数据文件名: RC\$SMF-377 - 0-18/26-111-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/07/27 18:15:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/07/29 09:06:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.262	474395	100.000	70096	2685	1.175	--
总计		474395	100.000	70096			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 0-18/26-112-2 - zzp-24072201-2p-15mg-rcqx-pH4.5+0.1sdsjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX275.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240727-rcqx-FX275.lcb
样品瓶号：2-27
进样体积：10 μl
进样时间：2024/07/27 18:19:17
处理时间(V2)：2024/07/29 09:06:08
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX275)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.261	474194	100.000	70023	2684	1.174	--
总计		474194	100.000	70023			