



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2334-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-rj.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-9

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 11:52:41

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:12:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2335-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-dz1-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 11:57:05

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:12:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	27831	100.000	5372	1303	1.146	--
总计		27831	100.000	5372			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2336-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-dz1-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 12:01:29

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:12:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	27882	100.000	5383	1303	1.146	--
总计		27882	100.000	5383			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2337-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-dz1-3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 12:05:53

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:12:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	28163	100.000	5387	1287	1.133	--
总计		28163	100.000	5387			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2338-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-dz1-4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 12:10:17

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:12:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	27838	100.000	5378	1304	1.146	--
总计		27838	100.000	5378			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2339-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-dz1-5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 12:14:41

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:12:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	27786	100.000	5363	1305	1.147	--
总计		27786	100.000	5363			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2340-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-5min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-1

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 12:19:05

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:12:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.229	10513	100.000	2079	1363	1.133	--
总计		10513	100.000	2079			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2341-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-5min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-10

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 12:23:29

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:12:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	11435	100.000	2246	1360	1.139	--
总计		11435	100.000	2246			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2342-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-5min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-19

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 12:27:52

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:12:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	12636	100.000	2480	1359	1.143	--
总计		12636	100.000	2480			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2343-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-5min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-28

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 12:32:15

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:12:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	13460	100.000	2654	1356	1.139	--
总计		13460	100.000	2654			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2344-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-5min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-37

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 12:36:37

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:12:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	13390	100.000	2634	1355	1.141	--
总计		13390	100.000	2634			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2345-2 - cbzj-8145822p-rcqx-aldp-pH4.5-50z-5min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-46

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 12:40:59

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:12:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	13552	100.000	2675	1361	1.139	--
总计		13552	100.000	2675			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2346-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-10min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-2

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 12:45:22

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:12:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	15733	100.000	3096	1356	1.141	--
总计		15733	100.000	3096			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2347-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-10min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-11

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 12:49:45

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:12:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	17991	100.000	3538	1352	1.137	--
总计		17991	100.000	3538			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2348-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-10min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-20

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 12:54:08

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:12:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	18342	100.000	3616	1361	1.141	--
总计		18342	100.000	3616			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2349-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-10min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-29

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 12:58:31

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:12:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	19607	100.000	3855	1354	1.140	--
总计		19607	100.000	3855			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2350-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-10min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-38

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 13:02:54

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:12:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	19412	100.000	3805	1354	1.142	--
总计		19412	100.000	3805			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2351-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-10min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-47

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 13:07:16

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:12:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	20809	100.000	4092	1357	1.142	--
总计		20809	100.000	4092			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2352-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-15min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-3

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 13:11:39

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:12:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	17887	100.000	3519	1360	1.140	--
总计		17887	100.000	3519			




SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-141/29-2353-2 - cbzjg-8145822p-rcqx-aldp-pH4.5-50z-15min-P2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 13:16:02 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2024/08/01 09:12:58 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	19878	100.000	3905	1354	1.140	-
总计		19878	100.000	3905			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2354-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-15min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-21

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 13:20:25

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:13:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	20546	100.000	4042	1360	1.140	--
总计		20546	100.000	4042			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2355-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-15min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-30

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 13:24:48

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:13:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	22012	100.000	4332	1353	1.141	--
总计		22012	100.000	4332			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2356-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-15min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-39

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 13:29:11

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:13:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	22131	100.000	4348	1355	1.142	--
总计		22131	100.000	4348			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2357-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-15min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-48

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 13:33:33

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:13:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	22789	100.000	4486	1357	1.140	--
总计		22789	100.000	4486			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2358-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-20min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-4

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 13:37:55

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:13:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	19176	100.000	3775	1361	1.140	--
总计		19176	100.000	3775			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2359-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-20min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-13

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 13:42:18

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:13:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	21175	100.000	4144	1358	1.142	--
总计		21175	100.000	4144			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2360-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-20min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-22

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 13:46:41

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:13:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	22079	100.000	4339	1352	1.142	--
总计		22079	100.000	4339			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2361-2 - cbzj-8145822p-rcqx-aldp-pH4.5-50z-20min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-31

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 13:51:04

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:13:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	23782	100.000	4662	1356	1.143	--
总计		23782	100.000	4662			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2362-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-20min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-40

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 13:55:27

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:13:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	23601	100.000	4625	1357	1.146	--
总计		23601	100.000	4625			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2363-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-20min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-49

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 13:59:50

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:13:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	23009	100.000	4523	1362	1.143	--
总计		23009	100.000	4523			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2364-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-30min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-5

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 14:04:13

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:13:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	21220	100.000	4158	1356	1.149	--
总计		21220	100.000	4158			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2365-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-30min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-14

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 14:08:36

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:13:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	23127	100.000	4546	1359	1.143	--
总计		23127	100.000	4546			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2366-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-30min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-23

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 14:12:58

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:13:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	24003	100.000	4721	1360	1.141	--
总计		24003	100.000	4721			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2367-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-30min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-32

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 14:17:21

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:13:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	25253	100.000	4962	1356	1.143	--
总计		25253	100.000	4962			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2368-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-30min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-41

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 14:21:44

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:13:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	24652	100.000	4845	1353	1.143	--
总计		24652	100.000	4845			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2369-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-30min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-50

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 14:26:07

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:13:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	24817	100.000	4869	1361	1.144	--
总计		24817	100.000	4869			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2370-2 - cbzj-8145822p-rcqx-aldp-pH4.5-50z-jx-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-6

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 14:30:30

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:13:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	26896	100.000	5288	1358	1.143	--
总计		26896	100.000	5288			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2371-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-jx-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-15

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 14:34:53

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:13:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	25508	100.000	5017	1357	1.143	--
总计		25508	100.000	5017			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2372-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-jx-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-24

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 14:39:16

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:13:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	25116	100.000	4923	1349	1.144	--
总计		25116	100.000	4923			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2373-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-jx-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-33

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 14:43:39

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:13:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	25818	100.000	5065	1350	1.144	--
总计		25818	100.000	5065			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2374-2 - cbzj-8145822p-rcqx-aldp-pH4.5-50z-jx-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-42

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 14:48:02

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:14:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	24945	100.000	4908	1357	1.142	--
总计		24945	100.000	4908			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2375-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-jx-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-51

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 14:52:24

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:14:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	24412	100.000	4723	1331	1.127	--
总计		24412	100.000	4723			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2376-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-dz2-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-27

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 14:56:48

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:14:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	27671	100.000	5364	1312	1.143	--
总计		27671	100.000	5364			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2377-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-dz2-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-27

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 15:01:12

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:14:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.230	27636	100.000	5356	1315	1.145	--
总计		27636	100.000	5356			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2378-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-rj.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-9

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 15:05:37

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:14:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2379-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-dz1-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 15:10:02

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:14:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	27698	100.000	5370	1313	1.145	--
总计		27698	100.000	5370			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2380-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-dz1-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 15:14:27

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:14:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	27719	100.000	5372	1312	1.143	--
总计		27719	100.000	5372			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2381-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-dz1-3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 15:18:52

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:14:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	27700	100.000	5368	1311	1.146	--
总计		27700	100.000	5368			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2382-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-dz1-4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 15:23:17

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:14:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	27726	100.000	5367	1315	1.144	--
总计		27726	100.000	5367			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2383-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-dz1-5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 15:27:41

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:14:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.231	27675	100.000	5362	1317	1.143	--
总计		27675	100.000	5362			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2384-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-5min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-1

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 15:32:04

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:14:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	5326	100.000	1067	1399	1.132	--
总计		5326	100.000	1067			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2385-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-5min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-10

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 15:36:27

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:14:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	5730	100.000	1148	1406	1.127	--
总计		5730	100.000	1148			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2386-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-5min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-19

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 15:40:50

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:14:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	5363	100.000	1079	1407	1.121	--
总计		5363	100.000	1079			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2387-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-5min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-28

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 15:45:13

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:14:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	6144	100.000	1227	1405	1.125	--
总计		6144	100.000	1227			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2388-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-5min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-37

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 15:49:37

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:14:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	4564	100.000	923	1414	1.122	--
总计		4564	100.000	923			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2389-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-5min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-46

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 15:54:00

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:14:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	5571	100.000	1114	1408	1.130	--
总计		5571	100.000	1114			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2390-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-10min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-2

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 15:58:23

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:14:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	10691	100.000	2129	1395	1.136	--
总计		10691	100.000	2129			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2391-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-10min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-11

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 16:02:47

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:14:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	11265	100.000	2249	1400	1.138	--
总计		11265	100.000	2249			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2392-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-10min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-20

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 16:07:11

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:14:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.239	11126	100.000	2220	1399	1.131	--
总计		11126	100.000	2220			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2394-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-10min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-29

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 16:17:55

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:14:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	12041	100.000	2398	1401	1.136	--
总计		12041	100.000	2398			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2395-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-10min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-38

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 16:22:20

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:14:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	9906	100.000	1976	1402	1.128	--
总计		9906	100.000	1976			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2396-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-10min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-47

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 16:26:44

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:15:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	11369	100.000	2271	1400	1.134	--
总计		11369	100.000	2271			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2397-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-15min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-3

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 16:31:08

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:15:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	12606	100.000	2511	1399	1.137	--
总计		12606	100.000	2511			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2398-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-15min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-12

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 16:35:32

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:15:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	13130	100.000	2608	1393	1.136	--
总计		13130	100.000	2608			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2399-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-15min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-21

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 16:39:57

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:15:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	13708	100.000	2726	1395	1.135	--
总计		13708	100.000	2726			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2400-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-15min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-30

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 16:44:21

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:15:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	13818	100.000	2744	1392	1.139	--
总计		13818	100.000	2744			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2401-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-15min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-39

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 16:48:46

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:15:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	12218	100.000	2437	1401	1.135	--
总计		12218	100.000	2437			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2402-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-15min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-48

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 16:53:09

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:15:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	13322	100.000	2647	1395	1.138	--
总计		13322	100.000	2647			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2403-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-20min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-4

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 16:57:34

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:15:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	14189	100.000	2822	1395	1.136	--
总计		14189	100.000	2822			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2404-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-20min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-13

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 17:01:58

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:15:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	14380	100.000	2858	1395	1.138	--
总计		14380	100.000	2858			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2405-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-20min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-22

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 17:06:22

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:15:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	14715	100.000	2923	1393	1.138	--
总计		14715	100.000	2923			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2406-2 - cbzj-8145822p-rcqx-aldp-pH6.8-50z-20min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-31

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 17:10:48

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:15:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	15006	100.000	2980	1393	1.135	--
总计		15006	100.000	2980			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2407-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-20min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-40

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 17:15:13

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:15:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	14003	100.000	2791	1401	1.135	--
总计		14003	100.000	2791			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2408-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-20min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-49

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 17:19:38

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:15:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	14380	100.000	2867	1399	1.135	--
总计		14380	100.000	2867			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2409-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-30min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-5

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 17:24:03

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:15:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	15635	100.000	3113	1397	1.137	--
总计		15635	100.000	3113			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2410-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-30min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-14

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 17:28:28

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:15:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	15727	100.000	3128	1396	1.136	--
总计		15727	100.000	3128			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2411-2 - cbzj-8145822p-rcqx-aldp-pH6.8-50z-30min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-23

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 17:32:52

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:15:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.238	16451	100.000	3270	1397	1.134	--
总计		16451	100.000	3270			




SMF-209

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速:	2.0ml/min
柱温	:30°C	波长:	237nm
数据文件名	:RC\$SMF-209 - 0-141/29-2412-2 - cbzjg-8145822p-rcqx-aldp-pH6.8-50z-30min-P4.lcd		
方法文件名	:RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm		
批处理文件名	:RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb		
样品瓶号	:2-32		
进样体积	:20 μl	版本号:	6.115
进样时间	:2024/07/31 17:37:18	实验者:	wangdan
处理时间 (V2)	:2024/08/01 09:15:51	处理者:	wangdan
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C(FX278)		

<色譜圖>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	17042	100.000	3377	1388	1.137	-
总计		17042	100.000	3377			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2413-2 - cbzj-8145822p-rcqx-aldp-pH6.8-50z-30min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-41

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 17:41:43

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:15:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	15484	100.000	3083	1398	1.135	--
总计		15484	100.000	3083			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2414-2 - cbzj-8145822p-rcqx-aldp-pH6.8-50z-30min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-50

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 17:46:07

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:15:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	16149	100.000	3203	1395	1.140	--
总计		16149	100.000	3203			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2415-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-jx-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-6

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 17:50:31

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:16:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	24271	100.000	4817	1394	1.136	--
总计		24271	100.000	4817			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2416-2 - cbzj-8145822p-rcqx-aldp-pH6.8-50z-jx-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-15

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 17:54:56

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:16:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	24168	100.000	4793	1393	1.136	--
总计		24168	100.000	4793			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2417-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-jx-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-24

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 17:59:20

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:16:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	23899	100.000	4738	1391	1.138	--
总计		23899	100.000	4738			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2418-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-jx-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-33

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 18:03:46

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:16:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	25199	100.000	4995	1392	1.137	--
总计		25199	100.000	4995			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2419-2 - cbzj-8145822p-rcqx-aldp-pH6.8-50z-jx-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-42

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 18:08:10

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:16:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	24834	100.000	4921	1390	1.139	--
总计		24834	100.000	4921			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2420-2 - cbzj-8145822p-rcqx-aldp-pH6.8-50z-jx-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-51

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 18:12:34

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:16:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	24262	100.000	4818	1395	1.138	--
总计		24262	100.000	4818			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2421-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-dz2-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-27

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 18:16:59

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:16:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	27692	100.000	5357	1316	1.142	--
总计		27692	100.000	5357			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2422-2 - cbzj-8145822p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-dz2-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :2-27

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 18:21:24

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:16:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	27700	100.000	5355	1316	1.142	--
总计		27700	100.000	5355			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2423-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-rj.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-9

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 18:25:47

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:16:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2424-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-dz1-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 18:30:11

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:16:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	27820	100.000	5359	1313	1.142	--
总计		27820	100.000	5359			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2425-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH4.5-50z-dz1-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 18:34:34

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:16:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	27845	100.000	5360	1312	1.143	--
总计		27845	100.000	5360			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2426-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-dz1-3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 18:38:57

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:16:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	27776	100.000	5362	1313	1.143	--
总计		27776	100.000	5362			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2427-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH4.5-50z-dz1-4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 18:43:20

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:16:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	27755	100.000	5367	1314	1.141	--
总计		27755	100.000	5367			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2428-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-dz1-5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 18:47:43

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:16:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	27702	100.000	5358	1316	1.143	--
总计		27702	100.000	5358			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2429-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH4.5-50z-5min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-1

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 18:52:07

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:16:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	13152	100.000	2583	1357	1.136	--
总计		13152	100.000	2583			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2430-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-5min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-10

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 18:56:30

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:16:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	14712	100.000	2881	1348	1.136	--
总计		14712	100.000	2881			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2431-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-5min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-19

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 19:00:53

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:16:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	13951	100.000	2726	1348	1.137	--
总计		13951	100.000	2726			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2432-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH4.5-50z-5min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-28

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 19:05:15

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:16:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	13984	100.000	2731	1343	1.142	--
总计		13984	100.000	2731			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2433-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-5min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-37

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 19:09:38

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:16:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	13647	100.000	2676	1346	1.136	--
总计		13647	100.000	2676			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2434-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-5min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-46

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 19:14:01

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:16:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	9792	100.000	1915	1353	1.135	--
总计		9792	100.000	1915			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2435-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-10min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-2

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 19:18:23

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:17:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	18588	100.000	3639	1347	1.140	--
总计		18588	100.000	3639			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2436-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-10min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-11

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 19:22:46

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:17:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.232	20599	100.000	4026	1343	1.143	--
总计		20599	100.000	4026			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2437-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-10min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-20

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 19:27:08

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:17:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	19872	100.000	3884	1344	1.142	--
总计		19872	100.000	3884			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2438-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-10min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-29

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 19:31:30

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:17:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	20520	100.000	3994	1350	1.143	--
总计		20520	100.000	3994			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2439-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-10min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-38

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 19:35:52

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:17:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	20808	100.000	4058	1347	1.141	--
总计		20808	100.000	4058			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2440-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-10min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-47

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 19:40:14

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:17:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	15697	100.000	3066	1351	1.142	--
总计		15697	100.000	3066			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2441-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH4.5-50z-15min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-3

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 19:44:36

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:17:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	20962	100.000	4091	1348	1.142	--
总计		20962	100.000	4091			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2442-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-15min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-12

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 19:48:57

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:17:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	22993	100.000	4474	1350	1.142	--
总计		22993	100.000	4474			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2443-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH4.5-50z-15min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-21

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 19:53:19

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:17:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	22442	100.000	4367	1350	1.142	--
总计		22442	100.000	4367			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2444-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-15min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-30

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 19:57:41

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:17:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	22840	100.000	4440	1347	1.142	--
总计		22840	100.000	4440			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2445-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-15min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-39

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 20:02:03

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:17:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	23449	100.000	4557	1351	1.141	--
总计		23449	100.000	4557			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2446-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-15min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-48

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 20:06:25

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:17:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	18234	100.000	3549	1347	1.141	--
总计		18234	100.000	3549			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2447-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-20min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-4

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 20:10:48

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:17:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	22504	100.000	4373	1345	1.141	--
总计		22504	100.000	4373			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2448-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH4.5-50z-20min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-13

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 20:15:11

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:17:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	24666	100.000	4796	1345	1.145	--
总计		24666	100.000	4796			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2449-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-20min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-22

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 20:19:33

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:17:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	22797	100.000	4425	1343	1.142	--
总计		22797	100.000	4425			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2450-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-20min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-31

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 20:23:55

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:17:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	24112	100.000	4686	1347	1.142	--
总计		24112	100.000	4686			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2451-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-20min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-40

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 20:28:16

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:17:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	24357	100.000	4734	1348	1.145	--
总计		24357	100.000	4734			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2452-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-20min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-49

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 20:32:39

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:17:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	19356	100.000	3764	1346	1.141	--
总计		19356	100.000	3764			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2453-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-30min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-5

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 20:37:02

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:17:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	23611	100.000	4623	1364	1.140	--
总计		23611	100.000	4623			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2454-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-30min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-14

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 20:41:25

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:18:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	25238	100.000	4911	1355	1.143	--
总计		25238	100.000	4911			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2455-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-30min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-23

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 20:45:47

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:18:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	24052	100.000	4688	1350	1.142	--
总计		24052	100.000	4688			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2456-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH4.5-50z-30min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-32

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 20:50:10

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:18:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	25015	100.000	4880	1358	1.143	--
总计		25015	100.000	4880			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2457-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-30min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-41

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 20:54:32

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:18:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	25122	100.000	4902	1357	1.142	--
总计		25122	100.000	4902			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2458-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-30min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-50

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 20:58:54

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:18:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	21733	100.000	4234	1353	1.140	--
总计		21733	100.000	4234			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2459-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-jx-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-6

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 21:03:16

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:18:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	25422	100.000	4946	1346	1.142	--
总计		25422	100.000	4946			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2460-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-jx-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-15

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 21:07:39

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:18:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	25993	100.000	5054	1347	1.146	--
总计		25993	100.000	5054			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2461-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-jx-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-24

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 21:12:01

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:18:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	24407	100.000	4747	1343	1.140	--
总计		24407	100.000	4747			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2462-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-jx-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-33

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 21:16:23

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:18:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	25711	100.000	5001	1344	1.142	--
总计		25711	100.000	5001			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2463-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-jx-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-42

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 21:20:44

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:18:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.233	25710	100.000	5007	1346	1.144	--
总计		25710	100.000	5007			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2464-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-jx-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-51

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 21:25:06

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:18:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	25697	100.000	5000	1350	1.143	--
总计		25697	100.000	5000			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2465-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-dz2-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-27

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 21:29:29

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:18:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.234	27689	100.000	5321	1311	1.142	--
总计		27689	100.000	5321			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2466-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH4.5-50z-dz2-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :3-27

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 21:33:52

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:18:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>


检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	27720	100.000	5329	1316	1.142	--
总计		27720	100.000	5329			



SMF-209

<样品信息>
色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 :30℃ 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-141/29-2467-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb
样品瓶号 : 4-9
进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 21:38:16 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2024/08/01 09:18:39 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2468-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH6.8-50z-dz1-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 21:42:40

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:18:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	27741	100.000	5321	1312	1.144	--
总计		27741	100.000	5321			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2469-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-dz1-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 21:47:05

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:18:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	27691	100.000	5317	1314	1.144	--
总计		27691	100.000	5317			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2470-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-dz1-3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 21:51:29

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:18:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	27768	100.000	5327	1313	1.143	--
总计		27768	100.000	5327			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2471-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-dz1-4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 21:55:54

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:18:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	27676	100.000	5313	1313	1.144	--
总计		27676	100.000	5313			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2472-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-dz1-5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 22:00:19

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:18:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.235	27541	100.000	5279	1312	1.144	--
总计		27541	100.000	5279			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2473-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-5min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-1

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 22:04:42

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:18:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	8045	100.000	1597	1391	1.132	--
总计		8045	100.000	1597			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2474-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-5min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-10

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 22:09:05

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:19:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	6418	100.000	1279	1399	1.129	--
总计		6418	100.000	1279			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2475-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-5min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-19

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 22:13:28

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:19:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	7418	100.000	1476	1398	1.131	--
总计		7418	100.000	1476			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2476-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-5min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-28

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 22:17:51

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:19:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	7034	100.000	1394	1389	1.127	--
总计		7034	100.000	1394			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2477-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-5min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-37

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 22:22:14

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:19:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.239	6922	100.000	1383	1403	1.128	--
总计		6922	100.000	1383			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2478-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-5min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-46

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 22:26:37

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:19:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	6653	100.000	1330	1406	1.129	--
总计		6653	100.000	1330			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2479-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-10min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-2

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 22:31:01

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:19:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	11971	100.000	2368	1390	1.129	--
总计		11971	100.000	2368			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2480-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-10min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-11

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 22:35:25

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:19:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	10088	100.000	2000	1397	1.140	--
总计		10088	100.000	2000			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2481-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-10min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-20

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 22:39:49

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:19:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	11263	100.000	2229	1394	1.133	--
总计		11263	100.000	2229			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2482-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-10min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-29

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 22:44:12

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:19:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	11298	100.000	2235	1390	1.135	--
总计		11298	100.000	2235			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2483-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-10min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-38

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 22:48:35

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:19:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	10814	100.000	2143	1388	1.135	--
总计		10814	100.000	2143			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2484-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-10min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-47

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 22:52:58

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:19:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	11028	100.000	2180	1397	1.133	--
总计		11028	100.000	2180			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2485-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-15min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-3

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 22:57:21

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:19:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	14394	100.000	2849	1396	1.133	--
总计		14394	100.000	2849			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2486-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-15min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-12

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 23:01:45

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:19:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	12162	100.000	2402	1394	1.134	--
总计		12162	100.000	2402			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2487-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-15min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-21

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 23:06:08

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:19:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	13197	100.000	2606	1389	1.130	--
总计		13197	100.000	2606			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2488-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-15min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-30

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 23:10:31

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:19:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	13314	100.000	2631	1394	1.136	--
总计		13314	100.000	2631			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2489-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-15min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-39

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 23:14:53

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:19:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	12704	100.000	2515	1392	1.137	--
总计		12704	100.000	2515			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2490-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-15min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-48

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 23:19:15

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:19:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	12518	100.000	2474	1387	1.136	--
总计		12518	100.000	2474			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2491-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-20min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-4

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 23:23:39

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:19:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	15629	100.000	3081	1393	1.136	--
总计		15629	100.000	3081			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2492-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-20min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-13

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 23:28:03

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:19:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	13791	100.000	2724	1391	1.134	--
总计		13791	100.000	2724			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2493-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-20min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-22

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 23:32:26

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:19:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	14696	100.000	2899	1392	1.138	--
总计		14696	100.000	2899			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2494-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-20min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-31

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 23:36:49

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:19:59

仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	14912	100.000	2953	1391	1.132	--
总计		14912	100.000	2953			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2495-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-20min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-40

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 23:41:12

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:20:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	14371	100.000	2838	1389	1.135	--
总计		14371	100.000	2838			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2496-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH6.8-50z-20min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-49

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 23:45:35

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:20:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	14034	100.000	2771	1393	1.137	--
总计		14034	100.000	2771			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2497-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-30min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-5

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 23:49:59

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:20:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	16807	100.000	3315	1392	1.136	--
总计		16807	100.000	3315			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2498-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH6.8-50z-30min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-14

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 23:54:23

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:20:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	15357	100.000	3031	1394	1.137	--
总计		15357	100.000	3031			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2499-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-30min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-23

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/07/31 23:58:47

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:20:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	16787	100.000	3310	1397	1.139	--
总计		16787	100.000	3310			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2500-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-30min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-32

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 00:03:11

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:20:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	16515	100.000	3265	1388	1.139	--
总计		16515	100.000	3265			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2501-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-30min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-41

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 00:07:35

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:20:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	16770	100.000	3314	1388	1.138	--
总计		16770	100.000	3314			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2502-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-30min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-50

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 00:11:59

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:20:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	16375	100.000	3235	1398	1.136	--
总计		16375	100.000	3235			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2503-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH6.8-50z-jx-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-6

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 00:16:24

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:20:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	26108	100.000	5153	1387	1.138	--
总计		26108	100.000	5153			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2504-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH6.8-50z-jx-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-15

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 00:20:48

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:20:32

仪器型号 :SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	24961	100.000	4920	1390	1.137	--
总计		24961	100.000	4920			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2505-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-jx-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-24

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 00:25:12

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:20:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	25359	100.000	4999	1389	1.139	--
总计		25359	100.000	4999			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2506-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH6.8-50z-jx-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-33

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 00:29:36

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:20:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	25641	100.000	5051	1382	1.140	--
总计		25641	100.000	5051			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2507-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH6.8-50z-jx-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-42

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 00:34:00

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:20:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	26025	100.000	5124	1390	1.138	--
总计		26025	100.000	5124			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2508-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-jx-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-51

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 00:38:24

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:20:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	25005	100.000	4930	1387	1.139	--
总计		25005	100.000	4930			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2509-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-dz2-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-27

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 00:42:48

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:20:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	27693	100.000	5319	1309	1.141	--
总计		27693	100.000	5319			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2510-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH6.8-50z-dz2-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :4-27

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 00:47:12

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:20:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	27674	100.000	5328	1313	1.142	--
总计		27674	100.000	5328			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2511-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-rj.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-9

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 00:51:36

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:20:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2512-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-dz1-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 00:56:00

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:20:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	27631	100.000	5311	1309	1.142	--
总计		27631	100.000	5311			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2513-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH2.0-75z-dz1-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 01:00:24

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:20:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	27652	100.000	5314	1309	1.144	--
总计		27652	100.000	5314			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2514-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-dz1-3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 01:04:48

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:21:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	27616	100.000	5310	1314	1.142	--
总计		27616	100.000	5310			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2515-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-dz1-4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 01:09:13

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:21:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.236	27678	100.000	5321	1311	1.141	--
总计		27678	100.000	5321			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2516-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH2.0-75z-dz1-5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-18

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 01:13:36

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:21:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.237	27663	100.000	5327	1315	1.140	--
总计		27663	100.000	5327			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2517-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-5min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-1

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 01:17:59

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:21:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	20392	100.000	4015	1381	1.133	--
总计		20392	100.000	4015			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2518-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-5min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-10

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 01:22:22

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:21:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	21383	100.000	4211	1380	1.133	--
总计		21383	100.000	4211			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2519-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-5min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-19

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 01:26:45

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:21:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	22177	100.000	4367	1380	1.136	--
总计		22177	100.000	4367			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2520-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-5min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-28

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 01:31:07

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:21:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	22300	100.000	4403	1386	1.136	--
总计		22300	100.000	4403			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2521-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH2.0-75z-5min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-37

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 01:35:30

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:21:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.239	22762	100.000	4464	1361	1.138	--
总计		22762	100.000	4464			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2522-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-5min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-46

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 01:39:53

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:21:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	21765	100.000	4264	1363	1.132	--
总计		21765	100.000	4264			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2523-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-10min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-2

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 01:44:15

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:21:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	24411	100.000	4782	1365	1.138	--
总计		24411	100.000	4782			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2524-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-10min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-11

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 01:48:38

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:21:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.239	26643	100.000	5214	1359	1.138	--
总计		26643	100.000	5214			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2525-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-10min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-20

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 01:53:00

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:21:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	26033	100.000	5093	1365	1.137	--
总计		26033	100.000	5093			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2526-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-10min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-29

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 01:57:23

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:21:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	25975	100.000	5085	1367	1.137	--
总计		25975	100.000	5085			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2527-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-10min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-38

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 02:01:47

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:21:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	26030	100.000	5094	1374	1.137	--
总计		26030	100.000	5094			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2528-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-10min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-47

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 02:06:10

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:21:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	24487	100.000	4789	1366	1.137	--
总计		24487	100.000	4789			




SMF-209

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速:	2.0ml/min
柱温	:30°C	波长:	237nm
数据文件名	:RC\$SMF-209 - 0-141/29-2529-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH2.0-75z-15min-P1.lcd		
方法文件名	:RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm		
批处理文件名	:RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb		
样品瓶号	:1-3		
进样体积	:20 μl	版本号:	6.115
进样时间	:2024/08/01 02:10:33	实验者:	wangdan
处理时间 (V2)	:2024/08/01 09:21:46	处理者:	wangdan
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C(FX278)		

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	25501	100.000	5020	1383	1.136	-
总计		25501	100.000	5020			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2530-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH2.0-75z-15min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-12

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 02:14:56

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:21:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	26330	100.000	5181	1384	1.135	--
总计		26330	100.000	5181			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2531-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-15min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-21

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 02:19:19

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:21:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	26394	100.000	5179	1371	1.137	--
总计		26394	100.000	5179			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2532-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-15min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-30

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 02:23:42

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:21:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	26510	100.000	5204	1373	1.135	--
总计		26510	100.000	5204			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2533-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-15min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-39

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 02:28:05

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:21:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	25976	100.000	5109	1383	1.135	--
总计		25976	100.000	5109			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2534-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-15min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-48

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 02:32:28

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:22:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	24919	100.000	4896	1373	1.136	--
总计		24919	100.000	4896			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2535-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-20min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-4

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 02:36:50

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:22:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	25789	100.000	5066	1380	1.135	--
总计		25789	100.000	5066			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2536-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH2.0-75z-20min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-13

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 02:41:13

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:22:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	26524	100.000	5209	1377	1.136	--
总计		26524	100.000	5209			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2537-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-20min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-22

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 02:45:36

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:22:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	25944	100.000	5093	1381	1.136	--
总计		25944	100.000	5093			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2538-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH2.0-75z-20min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-31

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 02:49:59

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:22:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	26529	100.000	5204	1369	1.137	--
总计		26529	100.000	5204			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2539-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-20min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-40

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 02:54:22

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:22:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	25770	100.000	5062	1376	1.137	--
总计		25770	100.000	5062			




SMF-209

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速:	2.0ml/min
柱温	:30°C	波长:	237nm
数据文件名	:RC\$SMF-209 - 0-141/29-2540-2 - cbzjg-8170101p-rcqx-aldp-pH2.0-75z-20min-P6.lcd		
方法文件名	:RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm		
批处理文件名	:RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb		
样品瓶号	:1-49		
进样体积	:20 μl	版本号:	6.115
进样时间	:2024/08/01 02:58:44	实验者:	wangdan
处理时间(V2)	:2024/08/01 09:22:19	处理者:	wangdan
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C(FX278)		

<色譜圖>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	25354	100.000	4980	1375	1.134	-
总计		25354	100.000	4980			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2541-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH2.0-75z-30min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-5

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 03:03:07

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:22:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	25985	100.000	5100	1372	1.136	--
总计		25985	100.000	5100			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2542-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH2.0-75z-30min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-14

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 03:07:30

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:22:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	26045	100.000	5105	1372	1.136	--
总计		26045	100.000	5105			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2543-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-30min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-23

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 03:11:53

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:22:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	25600	100.000	5017	1372	1.136	--
总计		25600	100.000	5017			

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2544-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH2.0-75z-30min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-32

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 03:16:16

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:22:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)


流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	26648	100.000	5230	1374	1.136	--
总计		26648	100.000	5230			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2545-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH2.0-75z-30min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-41

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 03:20:39

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:22:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	25752	100.000	5054	1379	1.135	--
总计		25752	100.000	5054			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2546-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-30min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-50

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 03:25:01

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:22:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	24895	100.000	4880	1373	1.135	--
总计		24895	100.000	4880			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2547-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH2.0-75z-jx-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-6

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 03:29:24

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:22:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	26324	100.000	5166	1378	1.136	--
总计		26324	100.000	5166			




SMF-209

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速:	2.0ml/min
柱温	:30℃	波长:	237nm
数据文件名	:RC\$SMF-209 - 0-141/29-2548-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH2.0-75z-jx-P2.lcd		
方法文件名	:RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm		
批处理文件名	:RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb		
样品瓶号	:1-15		
进样体积	:20 μl	版本号:	6.115
进样时间	:2024/08/01 03:33:46	实验者:	wangdan
处理时间 (V2)	:2024/08/01 09:22:42	处理者:	wangdan
仪器型号	:SHIMADZU LC-2050C(FX278)		

<色 谱 图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	25576	100.000	5012	1372	1.134	-
总计		25576	100.000	5012			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2549-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH2.0-75z-jx-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-24

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 03:38:09

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:22:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	25486	100.000	4989	1375	1.134	--
总计		25486	100.000	4989			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2550-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH2.0-75z-jx-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-33

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 03:42:31

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:22:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.241	26331	100.000	5156	1375	1.138	--
总计		26331	100.000	5156			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2551-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-jx-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-42

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 03:46:53

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:22:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.242	25051	100.000	4897	1378	1.133	--
总计		25051	100.000	4897			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2552-2 - cbzj-8170101p-rcqx-al dp-pH2.0-75z-jx-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-51

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 03:51:15

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:22:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.242	25306	100.000	4950	1377	1.137	--
总计		25306	100.000	4950			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2553-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH2.0-75z-dz2-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-27

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 03:55:39

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:22:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	27487	100.000	5306	1327	1.141	--
总计		27487	100.000	5306			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-141/29-2554-2 - cbzj-8170101p-rcqx-aldp-pH2.0-75z-dz2-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240731-FX278.lcb

样品瓶号 :1-27

进样体积 :20 μl

进样时间 :2024/08/01 04:00:03

处理时间 (V2) :2024/08/01 09:23:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.240	27492	100.000	5308	1326	1.142	--
总计		27492	100.000	5308			