



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1006-2 - zzp-albp-rd-rj.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-9

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 01:26:55

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:51:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1007-2 - zzp-albp-rcd-dz1-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-18

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 01:31:18

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:52:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.253	27420	100.000	5171	1295	1.141	--
总计		27420	100.000	5171			




SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 :30℃ 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-135/23-1008-2 - zzp-al dp-r cd-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 20 μL 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 01:35:42 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2024/07/31 09:52:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色譜圖>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.253	27432	100.000	5174	1297	1.144	-
总计		27432	100.000	5174			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1009-2 - zzp-albp-rcd-dz1-3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-18

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 01:40:06

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:52:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.253	27481	100.000	5189	1297	1.140	--
总计		27481	100.000	5189			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1010-2 - zzp-albp-rd-dz1-4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-18

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 01:44:29

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:52:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.254	27469	100.000	5165	1287	1.144	--
总计		27469	100.000	5165			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1011-2 - zzp-albp-rd-dz1-5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-18

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 01:48:52

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:52:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.254	27535	100.000	5171	1284	1.146	--
总计		27535	100.000	5171			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1012-2 - zzp-2024070321p-aldp-rcd-P1-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-1

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 01:53:13

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:52:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.254	25343	100.000	4870	1344	1.150	--
总计		25343	100.000	4870			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1013-2 - zzp-2024070321p-aldp-rcd-P1-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-1

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 01:57:37

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:52:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.254	25338	100.000	4867	1344	1.152	--
总计		25338	100.000	4867			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1014-2 - zzp-2024070321p-aldp-rcd-P2-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-10

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 02:01:59

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:52:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.254	26425	100.000	5088	1349	1.151	--
总计		26425	100.000	5088			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1015-2 - zzp-2024070321p-al dp-rcd-P2-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-10

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 02:06:21

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:52:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.256	26437	100.000	5086	1350	1.150	--
总计		26437	100.000	5086			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1016-2 - zzp-2024070321p-aldp-rcd-P3-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-19

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 02:10:45

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:52:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.254	26030	100.000	5005	1346	1.151	--
总计		26030	100.000	5005			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1017-2 - zzp-2024070321p-aldp-rcd-P3-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-19

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 02:15:07

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:52:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.254	26060	100.000	5009	1344	1.151	--
总计		26060	100.000	5009			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1018-2 - zzp-2024070321p-aldp-rcd-P4-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-28

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 02:19:31

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:52:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.254	26933	100.000	5176	1344	1.152	--
总计		26933	100.000	5176			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1019-2 - zzp-2024070321p-aldp-rcd-P4-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-28

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 02:23:53

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:52:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.254	26924	100.000	5172	1345	1.151	--
总计		26924	100.000	5172			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1020-2 - zzp-2024070321p-aldp-rcd-P5-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-37

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 02:28:16

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:52:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.254	25736	100.000	4941	1341	1.151	--
总计		25736	100.000	4941			




SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 :30°C 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-135/23-1021-2 - zzp-2024070321p-aldp-rcd-P5-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 20 μL 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/31 02:32:38 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2024/07/31 09:52:43 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色 谱 图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.255	25826	100.000	4953	1341	1.154	-
总计		25826	100.000	4953			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1022-2 - zzp-2024070321p-al dp-rcd-P6-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-46

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 02:37:02

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:52:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.255	25917	100.000	4979	1343	1.151	--
总计		25917	100.000	4979			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1023-2 - zzp-2024070321p-aldp-rcd-P6-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-46

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 02:41:23

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:52:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.255	25970	100.000	4983	1343	1.153	--
总计		25970	100.000	4983			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1024-2 - zzp-2024070421p-al dp-rcd-P1-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-2

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 02:45:47

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:52:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.255	24394	100.000	4685	1343	1.150	--
总计		24394	100.000	4685			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1025-2 - zzp-2024070421p-al dp-rcd-P1-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-2

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 02:50:10

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:52:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.255	24436	100.000	4691	1340	1.150	--
总计		24436	100.000	4691			

SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1026-2 - zzp-2024070421p-aldp-rcd-P2-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-11

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 02:54:33

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:52:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)


流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.255	26003	100.000	4991	1341	1.153	--
总计		26003	100.000	4991			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1027-2 - zzp-2024070421p-aldp-rcd-P2-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-11

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 02:58:56

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:52:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.255	26025	100.000	4989	1340	1.151	--
总计		26025	100.000	4989			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1028-2 - zzp-2024070421p-aldp-rcd-P3-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-20

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 03:03:18

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:53:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.255	24808	100.000	4758	1341	1.149	--
总计		24808	100.000	4758			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1029-2 - zzp-2024070421p-aldp-rcd-P3-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-20

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 03:07:41

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:53:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.256	24931	100.000	4765	1335	1.148	--
总计		24931	100.000	4765			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1030-2 - zzp-2024070421p-al dp-rcd-P4-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-29

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 03:12:04

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:53:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.256	25607	100.000	4902	1339	1.148	--
总计		25607	100.000	4902			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1031-2 - zzp-2024070421p-al dp-rcd-P4-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-29

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 03:16:26

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:53:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.256	25613	100.000	4911	1341	1.149	--
总计		25613	100.000	4911			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1032-2 - zzp-2024070421p-aldp-rcd-P5-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-38

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 03:20:49

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:53:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.256	25083	100.000	4811	1340	1.150	--
总计		25083	100.000	4811			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1033-2 - zzp-2024070421p-al dp-rcd-P5-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-38

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 03:25:12

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:53:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.256	25231	100.000	4818	1336	1.157	--
总计		25231	100.000	4818			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1034-2 - zzp-2024070421p-al dp-rcd-P6-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-47

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 03:29:34

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:53:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.256	24709	100.000	4732	1341	1.150	--
总计		24709	100.000	4732			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1035-2 - zzp-2024070421p-al dp-rcd-P6-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-47

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 03:33:56

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:53:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.256	24711	100.000	4733	1339	1.150	--
总计		24711	100.000	4733			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1036-2 - zzp-2024070521p-aldp-rcd-P1-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-3

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 03:38:20

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:53:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	25841	100.000	4940	1345	1.147	--
总计		25841	100.000	4940			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1037-2 - zzp-2024070521p-aldp-rcd-P1-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-3

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 03:42:42

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:53:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	25884	100.000	4937	1347	1.146	--
总计		25884	100.000	4937			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1038-2 - zzp-2024070521p-aldp-rcd-P2-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-12

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 03:47:04

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:53:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	25430	100.000	4871	1346	1.148	--
总计		25430	100.000	4871			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1039-2 - zzp-2024070521p-aldp-rcd-P2-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-12

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 03:51:26

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:53:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.256	25335	100.000	4871	1349	1.151	--
总计		25335	100.000	4871			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1040-2 - zzp-2024070521p-al dp-rcd-P3-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-21

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 03:55:48

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:53:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	25748	100.000	4932	1347	1.149	--
总计		25748	100.000	4932			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1041-2 - zzp-2024070521p-aldp-rcd-P3-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-21

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 04:00:11

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:53:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	25939	100.000	4940	1338	1.157	--
总计		25939	100.000	4940			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1042-2 - zzp-2024070521p-al dp-rcd-P4-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-30

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 04:04:34

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:53:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	25468	100.000	4873	1344	1.150	--
总计		25468	100.000	4873			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1043-2 - zzp-2024070521p-aldp-rcd-P4-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-30

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 04:08:57

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:53:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	25455	100.000	4862	1344	1.150	--
总计		25455	100.000	4862			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1044-2 - zzp-2024070521p-aldp-rcd-P5-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-39

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 04:13:20

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:53:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	25017	100.000	4801	1349	1.149	--
总计		25017	100.000	4801			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1045-2 - zzp-2024070521p-aldp-rcd-P5-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-39

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 04:17:41

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:53:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.256	25043	100.000	4807	1344	1.151	--
总计		25043	100.000	4807			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1046-2 - zzp-2024070521p-al dp-rcd-P6-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-48

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 04:22:05

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:53:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.256	24494	100.000	4695	1338	1.149	--
总计		24494	100.000	4695			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-135/23-1047-2 - zzp-2024070521p-al dp-rcd-P6-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-48

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 04:26:27

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:53:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.256	24478	100.000	4692	1341	1.148	--
总计		24478	100.000	4692			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-136/23-1048-2 - zzp-albp-rcd-dz2-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-27

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 04:30:51

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:55:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	27861	100.000	5196	1275	1.158	--
总计		27861	100.000	5196			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-137/23-1049-2 - zzp-albp-rd-dz2-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-27

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 04:35:14

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:57:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	27517	100.000	5162	1289	1.147	--
总计		27517	100.000	5162			