



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-142/23-830-3 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-rj.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-9

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 12:34:47

处理时间 (V3) :2024/08/01 09:34:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-831-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-18

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 12:39:11

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:58:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.239	27600	100.000	5218	1276	1.139	--
总计		27600	100.000	5218			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-832-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-18

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 12:43:35

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:58:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.239	27568	100.000	5218	1274	1.154	--
总计		27568	100.000	5218			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-833-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-18

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 12:47:59

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:58:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.242	27617	100.000	5190	1278	1.143	--
总计		27617	100.000	5190			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-834-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-18

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 12:52:23

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:58:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.243	27613	100.000	5187	1279	1.142	--
总计		27613	100.000	5187			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-835-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-18

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 12:56:48

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:58:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.243	27578	100.000	5193	1281	1.141	--
总计		27578	100.000	5193			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-836-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-1

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 13:01:11

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:58:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)


流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.246	22070	100.000	4318	1380	1.136	--
总计		22070	100.000	4318			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-837-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-10

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 13:05:34

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:58:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.248	22971	100.000	4475	1375	1.137	--
总计		22971	100.000	4475			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-838-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-5min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-19

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 13:09:57

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:58:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.248	23286	100.000	4543	1380	1.138	--
总计		23286	100.000	4543			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-839-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-28

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 13:14:19

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:58:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.245	23601	100.000	4616	1379	1.136	--
总计		23601	100.000	4616			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-840-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-5min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-37

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 13:18:41

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:58:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.247	22487	100.000	4394	1379	1.138	--
总计		22487	100.000	4394			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-841-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-46

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 13:23:03

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:58:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.247	22978	100.000	4492	1380	1.138	--
总计		22978	100.000	4492			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-842-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-2

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 13:27:26

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:59:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.246	23115	100.000	4511	1375	1.138	--
总计		23115	100.000	4511			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-843-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-10min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-11

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 13:31:49

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:59:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.247	23442	100.000	4581	1381	1.139	--
总计		23442	100.000	4581			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-844-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-20

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 13:36:12

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:59:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>


检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.248	23475	100.000	4577	1376	1.139	--
总计		23475	100.000	4577			



SMF-209

<样品信息>
色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 :30℃ 波长: 237nm
数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-845-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 20 μL 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/30 13:40:33 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2024/07/31 09:59:08 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.251	24001	100.000	4649	1380	1.138	--
总计		24001	100.000	4649			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-846-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-10min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-38

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 13:44:55

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:59:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.248	23093	100.000	4513	1380	1.140	--
总计		23093	100.000	4513			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-847-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-10min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-47

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 13:49:18

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:59:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.251	23051	100.000	4458	1373	1.139	--
总计		23051	100.000	4458			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-848-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-15min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-3

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 13:53:42

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:59:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.249	23189	100.000	4502	1372	1.140	--
总计		23189	100.000	4502			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-849-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-12

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 13:58:06

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:59:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>


检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.249	23393	100.000	4551	1379	1.141	--
总计		23393	100.000	4551			



SMF-209

<样品信息>
色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 :30℃ 波长: 237nm
数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-850-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 20 μL 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/30 14:02:29 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2024/07/31 09:59:23 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.253	23959	100.000	4655	1381	1.139	--
总计		23959	100.000	4655			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-851-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-30

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 14:06:52

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:59:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.251	23940	100.000	4621	1371	1.138	--
总计		23940	100.000	4621			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-852-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-15min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-39

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 14:11:15

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:59:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.250	22902	100.000	4447	1379	1.139	--
总计		22902	100.000	4447			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-853-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-15min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-48

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 14:15:37

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:59:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.252	23044	100.000	4467	1380	1.137	--
总计		23044	100.000	4467			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-854-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-20min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-4

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 14:20:00

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:59:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.251	22740	100.000	4404	1382	1.140	--
总计		22740	100.000	4404			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-855-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-20min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-13

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 14:24:23

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:59:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.250	22961	100.000	4468	1381	1.139	--
总计		22961	100.000	4468			




SMF-209

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速:	2.0ml/min
柱温	:30°C	波长:	237nm
数据文件名	: RC\$SMF-209 - 0-138/23-856-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-20min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb		
样品瓶号	: 1-22		
进样体积	: 20 μL	版本号:	6.115
进样时间	: 2024/07/30 14:28:46	实验者:	wangdan
处理时间 (V2)	: 2024/07/31 09:59:41	处理者:	wangdan
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX272)		

<色 谱 图>

mV




<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.253	23189	100.000	4510	1379	1.142	-
总计		23189	100.000	4510			

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	:30℃	波长	: 237nm
数据文件名	:RC\$SMF-209 - 0-138/23-857-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-20min-P4.lcd		
方法文件名	:RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm		
批处理文件名	:RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb		
样品瓶号	: 1-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μL	实验者	: wangdan
进样时间	: 2024/07/30 14:33:09	处理者	: wangdan
处理时间 (V2)	: 2024/07/31 09:59:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX272)		



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.252	23340	100.000	4526	1378	1.142	--
总计		23340	100.000	4526			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-858-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-20min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-40

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 14:37:32

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:59:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.252	22830	100.000	4424	1375	1.142	--
总计		22830	100.000	4424			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-859-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-20min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-49

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 14:41:55

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:59:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.255	22711	100.000	4409	1376	1.141	--
总计		22711	100.000	4409			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-860-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-30min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-5

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 14:46:18

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:59:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.256	22471	100.000	4371	1386	1.142	--
总计		22471	100.000	4371			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-862-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-23

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 14:55:03

处理时间 (V2) :2024/07/31 09:59:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.253	22749	100.000	4424	1379	1.140	--
总计		22749	100.000	4424			




SMF-209

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	:30℃	波长	: 237nm
数据文件名	: RC\$SMF-209 - 0-138/23-863-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-30min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb		
样品瓶号	: 1-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μL	实验者	: wangdan
进样时间	: 2024/07/30 14:59:26	处理者	: wangdan
处理时间 (V2)	: 2024/07/31 10:00:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX272)		

<色谱图>



<峰表>


检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.254	23094	100.000	4479	1371	1.140	--
总计		23094	100.000	4479			



SMF-209

<样品信息>
色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 :30℃ 波长: 237nm
数据文件名 : RC\$SMF-209 - 0-138/23-864-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 20 μL 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/07/30 15:03:49 实验者: wangdan
处理时间 (V2) : 2024/07/31 10:00:03 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.255	22789	100.000	4424	1377	1.142	--
总计		22789	100.000	4424			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-865-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-50

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 15:08:12

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:00:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	22731	100.000	4402	1379	1.140	--
总计		22731	100.000	4402			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-866-2 - zzp-2024070521p-rcqx-al dp-pH4.5-jf50z-jx-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-6

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 15:12:33

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:00:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.255	22069	100.000	4276	1370	1.141	--
总计		22069	100.000	4276			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-867-2 - zzp-2024070521p-rcqx-al dp-pH4.5-jf50z-jx-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-15

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 15:16:55

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:00:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	22833	100.000	4425	1383	1.140	--
总计		22833	100.000	4425			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-868-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-jx-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-24

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 15:21:17

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:00:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.255	22768	100.000	4439	1390	1.140	--
总计		22768	100.000	4439			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-869-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-jx-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-33

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 15:25:39

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:00:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.251	23142	100.000	4480	1377	1.138	--
总计		23142	100.000	4480			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-870-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-jx-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-42

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 15:30:02

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:00:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.254	22130	100.000	4313	1386	1.139	--
总计		22130	100.000	4313			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-871-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-jx-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-51

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 15:34:25

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:00:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.253	22419	100.000	4362	1381	1.140	--
总计		22419	100.000	4362			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-872-2 - zzp-2024070521p-rcqx-al dp-pH4.5-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-27

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 15:38:48

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:00:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.254	27451	100.000	5195	1303	1.140	--
总计		27451	100.000	5195			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-873-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH4.5-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :1-27

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 15:43:12

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:00:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.250	27626	100.000	5186	1293	1.145	--
总计		27626	100.000	5186			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-874-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-rj.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-9

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 15:47:37

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:00:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-875-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-18

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 15:52:02

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:00:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.250	27503	100.000	5178	1291	1.149	--
总计		27503	100.000	5178			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-876-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-18

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 15:56:26

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:00:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.251	27627	100.000	5176	1289	1.144	--
总计		27627	100.000	5176			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-877-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-18

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 16:00:50

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:00:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.251	27576	100.000	5174	1292	1.144	--
总计		27576	100.000	5174			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-878-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-18

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 16:05:15

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:00:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.250	27734	100.000	5202	1285	1.146	--
总计		27734	100.000	5202			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-879-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-18

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 16:09:40

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:00:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.251	27635	100.000	5180	1289	1.144	--
总计		27635	100.000	5180			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-880-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-1

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 16:14:04

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:00:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	15141	100.000	2953	1413	1.138	--
总计		15141	100.000	2953			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-881-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-10

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 16:18:28

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:00:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.262	15582	100.000	3051	1412	1.134	--
总计		15582	100.000	3051			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-882-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-5min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-19

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 16:22:52

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:00:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	15906	100.000	3105	1413	1.134	--
总计		15906	100.000	3105			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-883-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-28

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 16:27:16

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:00:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	16276	100.000	3182	1416	1.135	--
总计		16276	100.000	3182			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-884-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-5min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-37

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 16:31:40

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:01:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	16155	100.000	3155	1409	1.136	--
总计		16155	100.000	3155			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-885-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-46

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 16:36:03

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:01:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	14392	100.000	2826	1423	1.138	--
总计		14392	100.000	2826			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-886-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-2

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 16:40:27

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:01:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	20446	100.000	3976	1402	1.136	--
总计		20446	100.000	3976			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-887-2 - zzp-2024070321p-rcqx-al dp-pH6.8-jf50z-10min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-11

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 16:44:51

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:01:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	20862	100.000	4058	1405	1.140	--
总计		20862	100.000	4058			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-888-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-20

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 16:49:14

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:01:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.263	21110	100.000	4126	1411	1.135	--
总计		21110	100.000	4126			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-889-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-10min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-29

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 16:53:36

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:01:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	21193	100.000	4131	1407	1.133	--
总计		21193	100.000	4131			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-890-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-10min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-38

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 16:58:00

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:01:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	21417	100.000	4164	1400	1.136	--
总计		21417	100.000	4164			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-891-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-10min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-47

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 17:02:24

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:01:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	20155	100.000	3936	1406	1.133	--
总计		20155	100.000	3936			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-892-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-15min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-3

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 17:06:48

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:01:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.262	21535	100.000	4216	1414	1.135	--
总计		21535	100.000	4216			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-893-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-12

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 17:11:12

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:01:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	22321	100.000	4352	1407	1.137	--
总计		22321	100.000	4352			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-894-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-15min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-21

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 17:15:36

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:01:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	21884	100.000	4269	1411	1.137	--
总计		21884	100.000	4269			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-895-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-30

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 17:20:00

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:01:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.263	22303	100.000	4333	1402	1.142	--
总计		22303	100.000	4333			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-896-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-15min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-39

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 17:24:24

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:01:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.263	22987	100.000	4495	1413	1.137	--
总计		22987	100.000	4495			




SMF-209

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	:30℃	波长	: 237nm
数据文件名	:RC\$SMF-209 - 0-138/23-897-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-15min-P6.lcd		
方法文件名	:RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm		
批处理文件名	:RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb		
样品瓶号	: 2-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μL	实验者	: wangdan
进样时间	: 2024/07/30 17:28:47	处理者	: wangdan
处理时间 (V2)	: 2024/07/31 10:01:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX272)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	22394	100.000	4353	1405	1.137	--
总计		22394	100.000	4353			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-898-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-20min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-4

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 17:33:11

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:01:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	21307	100.000	4133	1400	1.137	--
总计		21307	100.000	4133			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-899-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-20min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-13

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 17:37:35

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:01:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	21991	100.000	4281	1397	1.138	--
总计		21991	100.000	4281			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温 :30℃

波长: 237nm

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-900-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-20min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-22

版本号: 6.115

进样体积 :20 μL

实验者: wangdan


进样时间 :2024/07/30 17:41:59

处理者: wangdan

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:01:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	22454	100.000	4365	1402	1.137	--
总计		22454	100.000	4365			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-901-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-20min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-31

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 17:46:22

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:01:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	21774	100.000	4243	1402	1.139	--
总计		21774	100.000	4243			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-902-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-20min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-40

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 17:50:45

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:01:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	22855	100.000	4434	1406	1.137	--
总计		22855	100.000	4434			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-903-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-20min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-49

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 17:55:09

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:01:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	22452	100.000	4359	1400	1.136	--
总计		22452	100.000	4359			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-904-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-30min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-5

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 17:59:33

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:01:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	21962	100.000	4267	1396	1.139	--
总计		21962	100.000	4267			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-905-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-30min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-14

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 18:03:57

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:02:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	21382	100.000	4164	1400	1.138	--
总计		21382	100.000	4164			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-906-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-23

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 18:08:22

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:02:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	22545	100.000	4390	1397	1.138	--
总计		22545	100.000	4390			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-907-2 - zzp-2024070321p-rcqx-al dp-pH6.8-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-32

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 18:12:46

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:02:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	22267	100.000	4324	1401	1.135	--
总计		22267	100.000	4324			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-908-2 - zzp-2024070321p-rcqx-al dp-pH6.8-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-41

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 18:17:10

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:02:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	23166	100.000	4505	1401	1.139	--
总计		23166	100.000	4505			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-909-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-50

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 18:21:34

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:02:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.257	22596	100.000	4393	1392	1.139	--
总计		22596	100.000	4393			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-910-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-jx-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-6

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 18:25:59

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:02:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	19764	100.000	3850	1397	1.136	--
总计		19764	100.000	3850			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-911-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-jx-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-15

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 18:30:24

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:02:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	20117	100.000	3916	1403	1.137	--
总计		20117	100.000	3916			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-912-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-jx-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-24

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 18:34:49

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:02:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	20422	100.000	3967	1395	1.135	--
总计		20422	100.000	3967			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-913-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-jx-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-33

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 18:39:13

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:02:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	19670	100.000	3826	1396	1.139	--
总计		19670	100.000	3826			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-914-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-jx-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-42

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 18:43:38

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:02:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	20290	100.000	3944	1400	1.140	--
总计		20290	100.000	3944			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-915-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-jx-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-51

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 18:48:01

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:02:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	19988	100.000	3882	1398	1.138	--
总计		19988	100.000	3882			

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温 :30℃

波长: 237nm

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-916-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-27

进样体积 :20 μL

版本号: 6.115


进样时间 :2024/07/30 18:52:25

实验者: wangdan

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:02:33

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.249	27557	100.000	5201	1288	1.146	--
总计		27557	100.000	5201			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-917-2 - zzp-2024070321p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :2-27

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 18:56:50

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:02:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.248	27544	100.000	5201	1286	1.146	--
总计		27544	100.000	5201			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-918-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-rj.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-9

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 19:01:13

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:02:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-919-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-18

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 19:05:36

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:02:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.249	27622	100.000	5200	1286	1.149	--
总计		27622	100.000	5200			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-920-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-18

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 19:09:59

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:02:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.249	27646	100.000	5203	1286	1.148	--
总计		27646	100.000	5203			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-921-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-18

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 19:14:22

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:02:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.249	27582	100.000	5201	1287	1.146	--
总计		27582	100.000	5201			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-922-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-18

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 19:18:45

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:02:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.249	27513	100.000	5183	1288	1.146	--
总计		27513	100.000	5183			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-923-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-18

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 19:23:08

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:02:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.249	27504	100.000	5192	1291	1.147	--
总计		27504	100.000	5192			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-924-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-1

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 19:27:32

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:02:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	14588	100.000	2844	1404	1.137	--
总计		14588	100.000	2844			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-925-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-10

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 19:31:54

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:02:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	16633	100.000	3249	1407	1.138	--
总计		16633	100.000	3249			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-926-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-5min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-19

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 19:36:15

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:03:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	15015	100.000	2921	1405	1.134	--
总计		15015	100.000	2921			

SHIMADZU
LabSolutions

SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-927-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-28

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 19:40:38

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:03:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)


流速: 2.0ml/min

波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	14632	100.000	2853	1403	1.143	--
总计		14632	100.000	2853			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-928-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-5min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-37

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 19:45:00

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:03:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	16261	100.000	3178	1403	1.137	--
总计		16261	100.000	3178			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-929-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-46

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 19:49:23

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:03:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	15307	100.000	3000	1413	1.139	--
总计		15307	100.000	3000			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-930-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-2

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 19:53:45

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:03:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	19610	100.000	3818	1402	1.143	--
总计		19610	100.000	3818			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-931-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-10min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-11

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 19:58:07

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:03:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	21175	100.000	4125	1406	1.141	--
总计		21175	100.000	4125			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-932-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-20

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 20:02:29

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:03:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	20581	100.000	4001	1404	1.138	--
总计		20581	100.000	4001			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-933-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-10min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-29

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 20:06:51

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:03:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	19603	100.000	3833	1405	1.137	--
总计		19603	100.000	3833			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-934-2 - zzp-2024070421p-rcqx-al dp-pH6.8-jf50z-10min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-38

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 20:11:13

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:03:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	21093	100.000	4107	1398	1.139	--
总计		21093	100.000	4107			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-935-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-10min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-47

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 20:15:35

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:03:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	19682	100.000	3846	1405	1.143	--
总计		19682	100.000	3846			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-936-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-15min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-3

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 20:19:57

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:03:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	21508	100.000	4185	1398	1.140	--
总计		21508	100.000	4185			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-937-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-12

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 20:24:20

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:03:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	21733	100.000	4235	1402	1.140	--
总计		21733	100.000	4235			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-938-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-15min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-21

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 20:28:43

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:03:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	21401	100.000	4166	1401	1.137	--
总计		21401	100.000	4166			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-939-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-30

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 20:33:05

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:03:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	20347	100.000	3965	1400	1.141	--
总计		20347	100.000	3965			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-940-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-15min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-39

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 20:37:28

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:03:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	21763	100.000	4233	1399	1.136	--
总计		21763	100.000	4233			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-941-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-15min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-48

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 20:41:50

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:03:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	21379	100.000	4156	1398	1.137	--
总计		21379	100.000	4156			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-942-2 - zzp-2024070421p-rcqx-al dp-pH6.8-jf50z-20min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-4

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 20:46:12

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:03:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	21109	100.000	4111	1401	1.143	--
总计		21109	100.000	4111			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-943-2 - zzp-2024070421p-rcqx-al dp-pH6.8-jf50z-20min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-13

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 20:50:35

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:03:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	22005	100.000	4272	1397	1.141	--
总计		22005	100.000	4272			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-944-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-20min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-22

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 20:54:57

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:03:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>


检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	21705	100.000	4204	1394	1.139	--
总计		21705	100.000	4204			



SMF-209

<样品信息>
色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 :30℃ 波长: 237nm
数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-945-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb
样品瓶号 :3-31
进样体积 :20 μL 版本号: 6.115
进样时间 :2024/07/30 20:59:19 实验者: wangdan
处理时间 (V2) :2024/07/31 10:03:58 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	20736	100.000	4024	1400	1.140	--
总计		20736	100.000	4024			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-946-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-20min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-40

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 21:03:41

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:04:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	21149	100.000	4115	1398	1.130	--
总计		21149	100.000	4115			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-947-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-20min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-49

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 21:08:03

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:04:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>


检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.258	21970	100.000	4267	1398	1.138	--
总计		21970	100.000	4267			



SMF-209

<样品信息>
色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 :30℃ 波长: 237nm
数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-948-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb
样品瓶号 :3-5
进样体积 :20 μL 版本号: 6.115
进样时间 :2024/07/30 21:12:25 实验者: wangdan
处理时间 (V2) :2024/07/31 10:04:06 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	21772	100.000	4225	1401	1.139	--
总计		21772	100.000	4225			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-949-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-30min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-14

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 21:16:48

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:04:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	21854	100.000	4273	1410	1.125	--
总计		21854	100.000	4273			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-950-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-23

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 21:21:10

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:04:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	20461	100.000	3965	1395	1.140	--
总计		20461	100.000	3965			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-951-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-32

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 21:25:32

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:04:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	20966	100.000	4066	1397	1.136	--
总计		20966	100.000	4066			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-952-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-41

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 21:29:54

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:04:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	20257	100.000	3930	1397	1.139	--
总计		20257	100.000	3930			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速:	2.0ml/min
柱温	:30℃	波长:	237nm
数据文件名	: RC\$SMF-209 - 0-138/23-953-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-30min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb		
样品瓶号	: 3-50		
进样体积	: 20 μL	版本号:	6.115
进样时间	: 2024/07/30 21:34:15	实验者:	wangdan
处理时间 (V2)	: 2024/07/31 10:04:20	处理者:	wangdan
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX272)		



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-954-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-jx-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-6

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 21:38:38

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:04:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	19462	100.000	3771	1393	1.139	--
总计		19462	100.000	3771			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-955-2 - zzp-2024070421p-rcqx-al dp-pH6.8-jf50z-jx-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-15

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 21:43:01

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:04:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	18933	100.000	3675	1400	1.137	--
总计		18933	100.000	3675			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-956-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-jx-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-24

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 21:47:23

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:04:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	19549	100.000	3792	1397	1.137	--
总计		19549	100.000	3792			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-957-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-jx-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-33

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 21:51:45

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:04:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	18603	100.000	3615	1399	1.135	--
总计		18603	100.000	3615			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-958-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-jx-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-42

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 21:56:07

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:04:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	18876	100.000	3669	1400	1.139	--
总计		18876	100.000	3669			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-959-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-jx-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-51

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 22:00:28

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:04:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	19267	100.000	3741	1396	1.139	--
总计		19267	100.000	3741			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-960-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-27

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 22:04:51

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:04:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.251	27389	100.000	5140	1295	1.146	--
总计		27389	100.000	5140			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-961-2 - zzp-2024070421p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :3-27

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 22:09:14

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:04:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.251	27371	100.000	5139	1294	1.146	--
总计		27371	100.000	5139			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-962-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-rj.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-9

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 22:13:39

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:04:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-963-2 - zzp-2024070521p-rcqx-al dp-pH6.8-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-18

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 22:18:02

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:04:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.251	27522	100.000	5164	1291	1.144	--
总计		27522	100.000	5164			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-964-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-18

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 22:22:27

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:04:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.251	27500	100.000	5156	1293	1.146	--
总计		27500	100.000	5156			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-965-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-18

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 22:26:51

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:04:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.251	27495	100.000	5159	1294	1.145	--
总计		27495	100.000	5159			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-966-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-18

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 22:31:16

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:04:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.250	27494	100.000	5164	1290	1.145	--
总计		27494	100.000	5164			




SMF-209

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	:30°C	波长	: 237nm
数据文件名	:RC\$SMF-209 - 0-138/23-967-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-dz1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm		
批处理文件名	:RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb		
样品瓶号	: 4-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μL	实验者	: wangdan
进样时间	: 2024/07/30 22:35:40	处理者	: wangdan
处理时间 (V2)	: 2024/07/31 10:05:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX272)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.250	27506	100.000	5167	1288	1.147	--
总计		27506	100.000	5167			




SMF-209

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速:	2.0ml/min
柱温	:30°C	波长:	237nm
数据文件名	: RC\$SMF-209 - 0-138/23-968-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-5min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb		
样品瓶号	: 4-1		
进样体积	: 20 μL	版本号:	6.115
进样时间	: 2024/07/30 22:40:03	实验者:	wangdan
处理时间 (V2)	: 2024/07/31 10:05:03	处理者:	wangdan
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX272)		

<色譜圖>

mV



<峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	14815	100.000	2885	1409	1.136	-
总计		14815	100.000	2885			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-969-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-10

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 22:44:25

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:05:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	12925	100.000	2521	1410	1.151	--
总计		12925	100.000	2521			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-970-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-5min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-19

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 22:48:51

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:05:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.259	14012	100.000	2727	1407	1.139	--
总计		14012	100.000	2727			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-971-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-28

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 22:53:13

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:05:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	13806	100.000	2692	1408	1.135	--
总计		13806	100.000	2692			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-972-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-5min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-37

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 22:57:36

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:05:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	15180	100.000	2969	1409	1.133	--
总计		15180	100.000	2969			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-973-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-46

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 23:01:59

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:05:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	12562	100.000	2445	1402	1.143	--
总计		12562	100.000	2445			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-974-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-2

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 23:06:21

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:05:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	20800	100.000	4047	1403	1.137	--
总计		20800	100.000	4047			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-975-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-10min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-11

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 23:10:44

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:05:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	20208	100.000	3956	1415	1.131	--
总计		20208	100.000	3956			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-976-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-20

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 23:15:07

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:05:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	20302	100.000	3950	1404	1.138	--
总计		20302	100.000	3950			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-977-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-10min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-29

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 23:19:30

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:05:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.260	20179	100.000	3910	1399	1.148	--
总计		20179	100.000	3910			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-978-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-10min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-38

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 23:23:53

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:05:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.262	20759	100.000	4055	1408	1.136	--
总计		20759	100.000	4055			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-979-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-10min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-47

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 23:28:16

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:05:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.262	18291	100.000	3573	1411	1.135	--
总计		18291	100.000	3573			




SMF-209

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	:30℃	波长	: 237nm
数据文件名	:RC\$SMF-209 - 0-138/23-980-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-15min-P1.lcd		
方法文件名	:RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm		
批处理文件名	:RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb		
样品瓶号	:4-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μL	实验者	: wangdan
进样时间	: 2024/07/30 23:32:39	处理者	: wangdan
处理时间 (V2)	: 2024/07/31 10:05:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX272)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	20902	100.000	4066	1399	1.136	--
总计		20902	100.000	4066			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-981-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-12

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 23:37:02

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:05:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	21055	100.000	4103	1405	1.137	--
总计		21055	100.000	4103			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-982-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-15min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-21

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 23:41:26

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:05:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	20976	100.000	4086	1403	1.137	--
总计		20976	100.000	4086			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-983-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-30

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 23:45:48

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:05:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.261	20682	100.000	4038	1409	1.136	--
总计		20682	100.000	4038			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-984-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-15min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-39

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/30 23:50:11

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:05:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.262	21654	100.000	4223	1404	1.138	--
总计		21654	100.000	4223			




SMF-209

<样品信息>

色谱柱	:XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速:	2.0ml/min
柱温	:30°C	波长:	237nm
数据文件名	: RC\$SMF-209 - 0-138/23-985-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-15min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm		
批处理文件名	: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb		
样品瓶号	: 4-48		
进样体积	: 20 μL	版本号:	6.115
进样时间	: 2024/07/30 23:54:34	实验者:	wangdan
处理时间 (V2)	: 2024/07/31 10:05:52	处理者:	wangdan
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C(FX272)		

<色 谱 图>

mV



<峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.262	20312	100.000	3959	1405	1.136	-
总计		20312	100.000	3959			



SMF-209

<样品信息>
色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 :30℃ 波长: 237nm
数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-986-2 - zzp-2024070521p-rcqx-al dp-pH6.8-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb
样品瓶号 :4-4
进样体积 :20 μL 版本号: 6.115
进样时间 :2024/07/30 23:58:58 实验者: wangdan
处理时间 (V2) :2024/07/31 10:05:55 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.262	20939	100.000	4083	1404	1.135	--
总计		20939	100.000	4083			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-987-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-20min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-13

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 00:03:21

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:05:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.262	21650	100.000	4231	1409	1.137	--
总计		21650	100.000	4231			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-988-2 - zzp-2024070521p-rcqx-al dp-pH6.8-jf50z-20min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-22

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 00:07:45

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:06:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>


检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.262	20959	100.000	4089	1405	1.133	--
总计		20959	100.000	4089			



SMF-209

<样品信息>
色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 :30℃ 波长: 237nm
数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-989-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb
样品瓶号 :4-31
进样体积 :20 μL 版本号: 6.115
进样时间 :2024/07/31 00:12:08 实验者: wangdan
处理时间 (V2) :2024/07/31 10:06:05 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.262	21553	100.000	4205	1405	1.137	--
总计		21553	100.000	4205			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-990-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-20min-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-40

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 00:16:32

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:06:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.263	21849	100.000	4248	1400	1.136	--
总计		21849	100.000	4248			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-991-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-20min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-49

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 00:20:55

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:06:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.262	20978	100.000	4098	1408	1.135	--
总计		20978	100.000	4098			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-992-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-30min-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-5

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 00:25:19

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:06:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.263	19561	100.000	3807	1398	1.135	--
总计		19561	100.000	3807			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-993-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-30min-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-14

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 00:29:43

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:06:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.263	21298	100.000	4155	1407	1.136	--
总计		21298	100.000	4155			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-994-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-23

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 00:34:08

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:06:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>


检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.263	19805	100.000	3866	1404	1.135	--
总计		19805	100.000	3866			



SMF-209

<样品信息>
色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 :30℃ 波长: 237nm
数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-995-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb
样品瓶号 :4-32
进样体积 :20 μL 版本号: 6.115
进样时间 :2024/07/31 00:38:33 实验者: wangdan
处理时间 (V2) :2024/07/31 10:06:23 处理者: wangdan
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.262	21687	100.000	4205	1394	1.137	--
总计		21687	100.000	4205			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温 :30℃

波长: 237nm

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-996-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 : 4-41

版本号: 6.115

进样体积 : 20 μL

实验者: wangdan


进样时间 : 2024/07/31 00:42:56

处理者: wangdan

处理时间 (V2) : 2024/07/31 10:06:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.262	21065	100.000	4099	1397	1.134	--
总计		21065	100.000	4099			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-997-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-50

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 00:47:20

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:06:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.263	20990	100.000	4094	1404	1.136	--
总计		20990	100.000	4094			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-998-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-jx-P1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-6

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 00:51:43

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:06:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.263	19067	100.000	3718	1401	1.135	--
总计		19067	100.000	3718			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-999-2 - zzp-2024070521p-rcqx-aldp-pH6.8-jf50z-jx-P2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-15

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 00:56:07

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:06:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.263	20965	100.000	4089	1404	1.137	--
总计		20965	100.000	4089			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-1000-2 - zzp-2024070521p-rcqx-al dp-pH6.8-jf50z-jx-P3.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-24

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 01:00:30

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:06:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.263	19511	100.000	3807	1402	1.134	--
总计		19511	100.000	3807			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-1001-2 - zzp-2024070521p-rcqx-alpH6.8-jf50z-jx-P4.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-33

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 01:04:54

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:06:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.263	21381	100.000	4171	1405	1.136	--
总计		21381	100.000	4171			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-1002-2 - zzp-2024070521p-rcqx-al dp-pH6.8-jf50z-jx-P5.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-42

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 01:09:18

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:06:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.263	19242	100.000	3757	1405	1.133	--
总计		19242	100.000	3757			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-1003-2 - zzp-2024070521p-rcqx-al dp-pH6.8-jf50z-jx-P6.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-51

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 01:13:42

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:06:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.263	21321	100.000	4163	1405	1.134	--
总计		21321	100.000	4163			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-1004-2 - zzp-2024070521p-rcqx-al dp-pH6.8-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-27

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 01:18:06

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:06:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.254	27381	100.000	5165	1296	1.142	--
总计		27381	100.000	5165			



SMF-209

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 :30℃

数据文件名 :RC\$SMF-209 - 0-138/23-1005-2 - zzp-2024070521p-rcqx-al dp-pH6.8-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名 :RC\$SMF-209 - SMF-209-al-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-209 - SMF-209-al-20240730-FX272.lcb

样品瓶号 :4-27

进样体积 :20 μL

进样时间 :2024/07/31 01:22:30

处理时间 (V2) :2024/07/31 10:06:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 2.0ml/min


波长: 237nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.254	27600	100.000	5184	1289	1.146	--
总计		27600	100.000	5184			