


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-227-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 11:08:49 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 15:59:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-228-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 11:12:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 15:59:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.814	174516	52.423	27235	1854	1.182	--
2	2.344	158384	47.577	20243	2082	1.136	2.835
总计		332900	100.000	47478			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-229-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 11:15:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 15:59:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.814	174649	52.372	27355	1873	1.182	--
2	2.346	158826	47.628	20379	2092	1.134	2.851
总计		333475	100.000	47735			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-230-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 11:19:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 15:59:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.818	174592	52.440	27235	1881	1.184	--
2	2.348	158348	47.560	20377	2113	1.136	2.854
总计		332940	100.000	47612			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-231-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 11:22:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 15:59:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.819	174689	52.345	27335	1885	1.181	--
2	2.350	159036	47.655	20373	2107	1.135	2.856
总计		333725	100.000	47708			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-233-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 11:29:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 15:59:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.831	13050	13.630	2215	2253	1.172	--
2	2.362	82696	86.370	11168	2357	1.129	3.043
总计		95746	100.000	13383			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-234-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 11:32:51 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 15:59:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.830	13612	15.385	2319	2231	1.181	--
2	2.363	74860	84.615	10106	2364	1.135	3.046
总计		88471	100.000	12425			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-235-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 11:36:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 15:59:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.830	13332	15.761	2272	2241	1.172	--
2	2.362	71260	84.239	9654	2378	1.130	3.053
总计		84592	100.000	11926			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-236-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 11:39:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/03 16:00:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.830	13492	21.726	2321	2285	1.172	--
2	2.361	48611	78.274	6603	2391	1.125	3.068
总计		62103	100.000	8924			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-237-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 11:43:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:00:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.831	10471	16.389	1803	2300	1.181	--
2	2.362	53424	83.611	7301	2417	1.114	3.079
总计		63895	100.000	9104			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-239-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 11:49:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/03 16:00:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.831	17237	11.394	2959	2294	1.166	--
2	2.362	134052	88.606	18295	2414	1.126	3.079
总计		151289	100.000	21255			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-240-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 11:53:21 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/03 16:00:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.830	17802	12.435	3061	2290	1.163	--
2	2.361	125351	87.565	17098	2411	1.123	3.079
总计		143152	100.000	20158			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-241-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 11:56:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:00:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.830	17689	11.936	3017	2257	1.165	--
2	2.362	130509	88.064	17738	2390	1.126	3.061
总计		148198	100.000	20755			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-242-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 12:00:12 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/03 16:00:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.830	18222	13.972	3128	2283	1.173	--
2	2.362	112192	86.028	15257	2400	1.130	3.072
总计		130414	100.000	18385			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-245-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 12:10:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:00:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.832	17585	10.355	3005	2264	1.184	--
2	2.364	152242	89.645	20674	2396	1.138	3.065
总计		169827	100.000	23679			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-246-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 12:13:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:00:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.829	17833	11.395	3034	2243	1.175	--
2	2.360	138669	88.605	18705	2360	1.133	3.049
总计		156502	100.000	21739			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-247-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 12:17:17 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/08/03 16:00:31 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.829	17846	10.885	3053	2270	1.175	--
2	2.361	146099	89.115	19838	2394	1.131	3.070
总计		163945	100.000	22891			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-248-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 12:20:42 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/08/03 16:00:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.830	17023	11.181	2889	2238	1.172	--
2	2.362	135222	88.819	18240	2357	1.134	3.045
总计		152244	100.000	21129			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-249-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 12:24:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:00:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.829	17717	11.849	3007	2239	1.184	--
2	2.360	131800	88.151	17796	2361	1.136	3.048
总计		149516	100.000	20804			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-251-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 12:30:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:00:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.830	16895	9.776	2871	2231	1.168	--
2	2.362	155918	90.224	20950	2336	1.137	3.036
总计		172813	100.000	23821			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-252-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 12:34:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:00:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.830	17897	10.933	3046	2230	1.178	--
2	2.362	145799	89.067	19762	2383	1.133	3.057
总计		163696	100.000	22807			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-255-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 12:44:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:00:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.829	17395	11.232	2982	2269	1.178	--
2	2.361	137481	88.768	18688	2399	1.133	3.073
总计		154876	100.000	21670			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-256-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 12:47:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:00:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.829	17236	9.898	2930	2245	1.176	--
2	2.361	156908	90.102	21231	2373	1.131	3.055
总计		174144	100.000	24161			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-257-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 12:51:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:00:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	17055	9.588	2881	2203	1.173	--
2	2.360	160817	90.412	21580	2336	1.134	3.031
总计		177872	100.000	24461			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-259-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 12:58:15 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/08/03 16:01:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.829	17036	10.153	2861	2192	1.177	--
2	2.361	150749	89.847	20159	2318	1.135	3.020
总计		167785	100.000	23020			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-260-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 13:01:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:01:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	16536	9.844	2776	2184	1.175	--
2	2.360	151448	90.156	20187	2305	1.135	3.013
总计		167985	100.000	22963			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-261-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 13:05:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:01:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	17240	10.668	2907	2204	1.175	--
2	2.360	144366	89.332	19314	2322	1.134	3.027
总计		161606	100.000	22221			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-263-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 13:11:54 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/08/03 16:01:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.829	16411	9.156	2751	2173	1.168	--
2	2.363	162823	90.844	21684	2295	1.131	3.016
总计		179234	100.000	24435			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-265-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 13:18:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:01:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.830	16726	9.773	2847	2241	1.178	--
2	2.362	154418	90.227	20938	2381	1.130	3.056
总计		171144	100.000	23785			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-268-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 13:28:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:01:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.826	17309	9.225	2935	2237	1.186	--
2	2.360	170325	90.775	23036	2376	1.132	3.063
总计		187634	100.000	25971			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-270-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 13:35:46 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/08/03 16:01:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.827	16503	9.796	2813	2271	1.173	--
2	2.360	151958	90.204	20563	2373	1.123	3.071
总计		168462	100.000	23375			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-273-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 13:46:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:01:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.826	17110	10.071	2901	2235	1.169	--
2	2.358	152776	89.929	20491	2333	1.129	3.043
总计		169885	100.000	23391			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-274-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 13:49:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:01:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.827	16970	9.069	2843	2183	1.185	--
2	2.359	170150	90.931	22650	2310	1.140	3.017
总计		187119	100.000	25492			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-275-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 13:52:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:01:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.826	15883	8.944	2673	2212	1.180	--
2	2.360	161708	91.056	21713	2349	1.136	3.047
总计		177591	100.000	24387			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-283-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 14:20:17 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:02:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-284-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 14:23:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:02:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.814	174703	52.423	27307	1863	1.177	--
2	2.347	158555	47.577	20310	2090	1.130	2.855
总计		333258	100.000	47617			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-285-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 14:27:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:02:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.814	175192	52.446	27461	1873	1.176	--
2	2.347	158852	47.554	20434	2107	1.129	2.865
总计		334043	100.000	47895			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-287-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 14:34:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:02:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.812	174673	52.422	27525	1891	1.179	--
2	2.345	158532	47.578	20494	2129	1.130	2.881
总计		333204	100.000	48019			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-288-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 14:37:31 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/03 16:02:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.814	174729	52.420	27526	1892	1.179	--
2	2.347	158594	47.580	20499	2130	1.129	2.879
总计		333322	100.000	48026			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-289-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 14:40:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:02:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.829	14049	13.974	2402	2274	1.166	--
2	2.362	86494	86.026	11800	2405	1.117	3.081
总计		100544	100.000	14203			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-290-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 14:44:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:02:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	12966	22.877	2213	2253	1.161	--
2	2.361	43710	77.123	5920	2366	1.113	3.060
总计		56676	100.000	8133			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-291-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 14:47:49 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/03 16:02:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.827	13127	19.820	2249	2278	1.165	--
2	2.359	53102	80.180	7190	2381	1.115	3.074
总计		66229	100.000	9439			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-292-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 14:51:14 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/08/03 16:02:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.827	11997	15.659	2036	2241	1.169	--
2	2.360	64618	84.341	8739	2372	1.115	3.061
总计		76615	100.000	10775			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-293-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 14:54:40 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/08/03 16:02:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	10963	14.143	1884	2291	1.174	--
2	2.361	66552	85.857	9092	2413	1.118	3.089
总计		77515	100.000	10976			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-294-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 14:58:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:02:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.826	13406	13.282	2297	2272	1.174	--
2	2.359	87533	86.718	11919	2409	1.124	3.086
总计		100939	100.000	14215			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-297-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 15:08:26 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/08/03 16:02:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	17212	11.949	2940	2259	1.171	--
2	2.363	126829	88.051	17183	2381	1.128	3.073
总计		144041	100.000	20123			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-300-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 15:18:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:02:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.825	17418	11.249	2938	2214	1.176	--
2	2.359	137419	88.751	18412	2339	1.131	3.049
总计		154837	100.000	21349			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-302-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 15:25:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:03:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	17701	10.599	3013	2257	1.181	--
2	2.361	149315	89.401	20220	2377	1.131	3.068
总计		167016	100.000	23233			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-304-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 15:32:28 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:03:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.827	17631	10.751	3046	2317	1.166	--
2	2.361	146355	89.249	20103	2447	1.123	3.115
总计		163985	100.000	23149			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-305-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 15:35:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:03:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.827	17702	10.698	3037	2304	1.181	--
2	2.361	147767	89.302	20199	2428	1.127	3.106
总计		165469	100.000	23236			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-306-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 15:39:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:03:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.826	17448	10.356	2979	2286	1.175	--
2	2.360	151031	89.644	20593	2418	1.123	3.100
总计		168480	100.000	23572			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-307-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 15:42:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:03:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.827	17936	10.050	3079	2301	1.174	--
2	2.361	160525	89.950	21991	2437	1.124	3.105
总计		178461	100.000	25070			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-308-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 15:46:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/03 16:03:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	17625	10.116	3033	2290	1.178	--
2	2.362	156594	89.884	21407	2424	1.123	3.097
总计		174218	100.000	24440			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-310-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 15:53:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/03 16:03:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.826	17661	10.410	3011	2268	1.175	--
2	2.360	151993	89.590	20713	2418	1.121	3.096
总计		169654	100.000	23724			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-311-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 15:56:30 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/03 16:03:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.826	17656	10.288	3003	2254	1.164	--
2	2.361	153952	89.712	20933	2402	1.115	3.084
总计		171607	100.000	23936			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-312-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 15:59:55 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/03 16:03:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.826	17408	9.984	2970	2262	1.151	--
2	2.360	156954	90.016	21265	2387	1.114	3.079
总计		174361	100.000	24236			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-313-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 16:03:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:03:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.827	17741	9.816	2998	2233	1.165	--
2	2.362	162994	90.184	21989	2357	1.115	3.061
总计		180735	100.000	24986			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-314-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 16:06:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/03 16:03:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.827	17374	9.693	2978	2252	1.143	--
2	2.361	161870	90.307	21785	2349	1.120	3.058
总计		179244	100.000	24763			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-316-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 16:13:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:03:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.827	17704	9.916	2999	2233	1.166	--
2	2.361	160835	90.084	21692	2355	1.117	3.057
总计		178539	100.000	24691			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-317-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 16:17:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:03:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	17616	9.849	2996	2256	1.171	--
2	2.363	161237	90.151	21862	2381	1.117	3.076
总计		178852	100.000	24857			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-318-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 16:20:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:03:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.829	17336	9.628	2958	2251	1.163	--
2	2.363	162728	90.372	22104	2389	1.116	3.074
总计		180064	100.000	25062			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-319-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 16:24:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:03:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.827	17641	9.558	2994	2242	1.165	--
2	2.361	166928	90.442	22625	2380	1.115	3.071
总计		184569	100.000	25620			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-320-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 16:27:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:03:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	17394	9.376	2967	2264	1.155	--
2	2.362	168120	90.624	22839	2390	1.116	3.078
总计		185514	100.000	25806			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-321-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 16:30:55 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/08/03 16:03:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.827	17081	9.433	2914	2255	1.167	--
2	2.361	164003	90.567	22302	2395	1.117	3.078
总计		181085	100.000	25216			




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.5ml/min
柱温:30°C	波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-322-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-45min-P4.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb	
样品瓶号: 2-33	版本号: 6.115
进样体积: 50 µl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/08/02 16:34:22	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2024/08/03 16:03:55	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.829	17926	9.621	3066	2258	1.160	--
2	2.362	168393	90.379	22856	2384	1.115	3.072
总计		186318	100.000	25922			




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-323-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 50 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 16:37:49 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/03 16:03:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	17043	9.282	2907	2255	1.171	--
2	2.362	166571	90.718	22683	2400	1.112	3.080
总计		183613	100.000	25590			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-324-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 16:41:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:04:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	17064	9.307	2906	2247	1.160	--
2	2.363	166288	90.693	22550	2376	1.114	3.071
总计		183352	100.000	25456			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-327-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 16:51:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:04:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.829	16179	9.138	2754	2254	1.158	--
2	2.364	160887	90.862	21767	2371	1.112	3.073
总计		177066	100.000	24520			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-328-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 16:55:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:04:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.829	17201	9.324	2921	2230	1.159	--
2	2.365	167271	90.676	22598	2369	1.110	3.068
总计		184471	100.000	25519			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-329-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 16:58:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:04:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	16620	9.017	2816	2234	1.159	--
2	2.362	167700	90.983	22631	2353	1.112	3.055
总计		184319	100.000	25447			




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.5ml/min
柱温:30°C	波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-331-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-JX-P1.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb	
样品瓶号: 2-8	版本号: 6.115
进样体积: 50 µl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/08/02 17:05:22	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:04:19	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	17292	9.330	2956	2277	1.172	--
2	2.362	168041	90.670	22851	2396	1.116	3.086
总计		185333	100.000	25807			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-334-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 17:15:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:04:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.827	17311	9.174	2979	2313	1.175	--
2	2.361	171384	90.826	23487	2441	1.123	3.112
总计		188695	100.000	26467			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-335-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 17:19:09 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:04:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.827	16629	8.892	2871	2315	1.184	--
2	2.361	170380	91.108	23479	2463	1.122	3.122
总计		187009	100.000	26350			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-336-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-JX-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-53
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 17:22:36 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/03 16:04:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.827	16781	9.102	2910	2334	1.171	--
2	2.361	167581	90.898	23124	2474	1.121	3.132
总计		184361	100.000	26034			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-337-2 - zzp-2023120821p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 17:26:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:04:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.811	176249	52.389	28167	1948	1.184	--
2	2.346	160175	47.611	21055	2204	1.133	2.937
总计		336424	100.000	49221			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-340-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 17:36:20 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/08/03 16:04:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.812	175217	52.466	28071	1957	1.181	--
2	2.346	158745	47.534	20950	2219	1.128	2.943
总计		333962	100.000	49021			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-341-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 17:39:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:04:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.812	175248	52.438	28101	1962	1.180	--
2	2.346	158954	47.562	20977	2222	1.128	2.946
总计		334202	100.000	49078			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-342-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 17:43:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:04:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.814	175318	52.469	28107	1962	1.179	--
2	2.348	158821	47.531	20940	2220	1.128	2.942
总计		334140	100.000	49046			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-344-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 17:50:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:04:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.812	175242	52.474	27933	1938	1.177	--
2	2.346	158716	47.526	20819	2193	1.126	2.927
总计		333958	100.000	48752			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-347-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 18:00:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:05:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	14372	17.005	2492	2333	1.168	--
2	2.362	70145	82.995	9638	2442	1.115	3.120
总计		84517	100.000	12130			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-348-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 18:03:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:05:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.829	15080	13.911	2619	2334	1.163	--
2	2.365	93322	86.089	12854	2465	1.115	3.131
总计		108402	100.000	15473			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-349-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 18:07:07 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:05:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.830	13538	14.538	2336	2308	1.172	--
2	2.365	79581	85.462	10916	2439	1.108	3.106
总计		93119	100.000	13253			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-350-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 18:10:32 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/08/03 16:05:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	12705	18.484	2196	2315	1.164	--
2	2.363	56031	81.516	7636	2408	1.113	3.102
总计		68736	100.000	9832			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-351-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 18:13:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:05:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	17852	11.505	3053	2267	1.170	--
2	2.362	137324	88.495	18636	2387	1.118	3.082
总计		155176	100.000	21689			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-353-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 18:20:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:05:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.827	17858	13.790	3073	2302	1.169	--
2	2.362	111644	86.210	15286	2433	1.124	3.108
总计		129502	100.000	18359			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-354-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 18:24:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:05:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	17860	11.669	3077	2316	1.179	--
2	2.362	135202	88.331	18549	2445	1.126	3.116
总计		153062	100.000	21626			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-356-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 18:31:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:05:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.827	17295	16.651	2974	2309	1.173	--
2	2.361	86575	83.349	11826	2424	1.124	3.109
总计		103870	100.000	14800			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-357-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 18:34:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:05:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	18442	11.006	3190	2323	1.184	--
2	2.363	149120	88.994	20488	2445	1.128	3.117
总计		167562	100.000	23678			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-358-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 18:37:50 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/08/03 16:05:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.830	18685	12.651	3233	2328	1.180	--
2	2.364	129013	87.349	17699	2449	1.130	3.117
总计		147698	100.000	20932			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-359-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 18:41:14 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:05:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	18424	13.348	3196	2349	1.183	--
2	2.362	119604	86.652	16550	2485	1.131	3.139
总计		138029	100.000	19746			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-360-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 18:44:39 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/08/03 16:05:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.830	17748	10.845	3076	2356	1.180	--
2	2.364	145905	89.155	20129	2474	1.135	3.135
总计		163653	100.000	23205			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-361-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 18:48:03 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/08/03 16:05:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	18562	11.252	3224	2347	1.183	--
2	2.364	146405	88.748	20251	2487	1.133	3.143
总计		164967	100.000	23475			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-363-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 18:54:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:05:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.827	18070	10.844	3104	2280	1.185	--
2	2.362	148571	89.156	20274	2415	1.133	3.098
总计		166641	100.000	23378			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-364-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-13
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 18:58:17 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/08/03 16:05:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.827	18453	12.392	3161	2294	1.176	--
2	2.361	130458	87.608	17803	2415	1.130	3.099
总计		148910	100.000	20964			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
柱温:30°C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-365-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 50 µl 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 19:01:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:05:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.829	17849	12.840	3100	2306	1.139	--
2	2.364	121165	87.160	16511	2410	1.124	3.101
总计		139015	100.000	19611			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-369-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-5
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 19:15:19 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/03 16:06:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.827	18030	10.612	3047	2218	1.174	--
2	2.361	151865	89.388	20450	2349	1.125	3.054
总计		169895	100.000	23497			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-372-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-32
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 19:25:31 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/08/03 16:06:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.830	16971	10.097	2904	2268	1.165	--
2	2.365	151107	89.903	20578	2414	1.122	3.090
总计		168078	100.000	23482			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 232nm

数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-373-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 50 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/02 19:28:56

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/08/03 16:06:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	17819	10.213	3073	2286	1.163	--
2	2.363	156654	89.787	21450	2427	1.114	3.102
总计		174473	100.000	24523			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-374-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 19:32:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:06:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.829	17412	14.016	3013	2321	1.164	--
2	2.364	106819	85.984	14680	2445	1.112	3.119
总计		124231	100.000	17693			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-377-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-24
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 19:42:31 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/03 16:06:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.827	17863	12.618	3014	2201	1.171	--
2	2.361	123710	87.382	16618	2336	1.117	3.043
总计		141573	100.000	19632			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-378-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 19:45:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:06:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	16948	9.876	2851	2198	1.160	--
2	2.363	154659	90.124	20682	2311	1.119	3.033
总计		171608	100.000	23533			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-380-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 19:52:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:06:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	17062	13.411	2872	2188	1.162	--
2	2.363	110162	86.589	14743	2317	1.120	3.033
总计		127224	100.000	17615			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-381-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 19:56:07 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:06:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.826	17861	10.271	2968	2148	1.165	--
2	2.361	156044	89.729	20614	2258	1.126	3.000
总计		173906	100.000	23582			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-383-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
 样品瓶号: 3-25
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/02 20:02:55 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/08/03 16:06:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.828	17263	12.381	2897	2189	1.152	--
2	2.363	122175	87.619	16299	2300	1.115	3.026
总计		139439	100.000	19196			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-385-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 20:09:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:06:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.826	17190	9.769	2917	2243	1.166	--
2	2.360	158775	90.231	21449	2365	1.119	3.070
总计		175966	100.000	24366			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-386-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 20:13:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:06:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.827	16691	13.237	2785	2155	1.167	--
2	2.362	109408	86.763	14533	2279	1.120	3.010
总计		126099	100.000	17319			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-387-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 20:16:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:06:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.826	17283	9.821	2865	2144	1.169	--
2	2.361	158692	90.179	21007	2265	1.120	3.004
总计		175975	100.000	23872			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-388-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 20:19:56 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:06:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.827	17712	10.211	2977	2194	1.161	--
2	2.362	155752	89.789	20896	2324	1.114	3.041
总计		173464	100.000	23873			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-389-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 20:23:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:06:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.830	17665	10.089	2969	2182	1.153	--
2	2.365	157423	89.911	21006	2305	1.115	3.027
总计		175088	100.000	23975			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-74/24-393-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-1-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240802-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/02 20:37:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:07:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.812	175066	52.474	27087	1819	1.172	--
2	2.348	158562	47.526	20074	2036	1.125	2.838
总计		333628	100.000	47160			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-453-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/03 11:25:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:08:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-454-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/03 11:28:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:08:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	175994	52.362	28639	2086	1.192	--
2	2.379	160117	47.638	21367	2345	1.137	3.015
总计		336111	100.000	50006			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-455-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/03 11:32:08 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/08/03 16:08:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.839	177006	52.419	28862	2094	1.193	--
2	2.380	160667	47.581	21539	2371	1.136	3.041
总计		337674	100.000	50402			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-456-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/03 11:35:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:08:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.841	176715	52.376	28666	2085	1.194	--
2	2.382	160682	47.624	21456	2357	1.139	3.025
总计		337396	100.000	50122			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-457-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/03 11:39:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:08:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.838	176003	52.388	28621	2081	1.193	--
2	2.378	159957	47.612	21355	2348	1.137	3.021
总计		335960	100.000	49976			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-459-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
 样品瓶号: 4-1
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/03 11:45:55 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/03 16:08:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.851	14576	14.410	2535	2432	1.175	--
2	2.391	86576	85.590	12059	2586	1.120	3.188
总计		101152	100.000	14594			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-460-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/03 11:49:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:08:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.852	15267	15.866	2665	2439	1.179	--
2	2.393	80954	84.134	11238	2596	1.121	3.198
总计		96220	100.000	13903			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-461-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/03 11:52:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:08:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.851	13260	30.407	2336	2487	1.167	--
2	2.391	30347	69.593	4230	2602	1.110	3.211
总计		43607	100.000	6566			




SMF-4068

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.5ml/min
柱温:30°C	波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-462-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-5min-P4.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb	
样品瓶号: 4-28	版本号: 6.115
进样体积: 50 µl	实验者: xiechaojun
进样时间: 2024/08/03 11:56:09	处理者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:08:25	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.851	15017	14.128	2648	2494	1.178	--
2	2.390	91278	85.872	12836	2636	1.118	3.227
总计		106295	100.000	15484			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-463-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
 样品瓶号: 4-37
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/03 11:59:34 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/08/03 16:08:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.850	15245	16.039	2671	2472	1.179	--
2	2.391	79802	83.961	11181	2620	1.121	3.219
总计		95048	100.000	13852			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-465-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/03 12:06:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:08:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.851	17966	11.710	3150	2485	1.183	--
2	2.392	135457	88.290	18956	2625	1.121	3.222
总计		153423	100.000	22107			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-468-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/03 12:16:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:08:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.852	17641	12.483	3095	2459	1.181	--
2	2.393	123682	87.517	17241	2612	1.130	3.214
总计		141323	100.000	20336			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-470-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/03 12:23:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:08:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.851	17958	15.989	3184	2525	1.179	--
2	2.391	94356	84.011	13324	2675	1.125	3.251
总计		112314	100.000	16507			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-472-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/03 12:30:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:08:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.851	18071	11.394	3198	2533	1.179	--
2	2.391	140522	88.606	19850	2681	1.127	3.255
总计		158593	100.000	23048			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-476-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/03 12:44:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:09:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.852	18034	14.997	3200	2530	1.176	--
2	2.392	102219	85.003	14452	2686	1.123	3.255
总计		120253	100.000	17652			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-477-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/03 12:47:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:09:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.853	18476	10.826	3272	2515	1.182	--
2	2.394	152191	89.174	21543	2695	1.126	3.252
总计		170667	100.000	24815			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-479-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/03 12:54:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:09:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.852	18429	11.036	3260	2527	1.184	--
2	2.392	148557	88.964	20991	2689	1.124	3.256
总计		166986	100.000	24251			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-480-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
 样品瓶号: 4-31
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/03 12:57:51 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/03 16:09:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.854	17401	11.329	3111	2570	1.182	--
2	2.394	136201	88.671	19391	2725	1.123	3.275
总计		153602	100.000	22501			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-481-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
 样品瓶号: 4-40
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/03 13:01:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/03 16:09:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.852	17293	11.566	3080	2552	1.180	--
2	2.392	132220	88.434	18763	2706	1.123	3.268
总计		149513	100.000	21843			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-482-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
 样品瓶号: 4-49
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/03 13:04:41 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/08/03 16:09:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.853	17556	14.169	3150	2581	1.170	--
2	2.393	106343	85.831	15124	2717	1.123	3.276
总计		123898	100.000	18275			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-484-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/03 13:11:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:09:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.851	17789	10.843	3119	2546	1.229	--
2	2.391	146274	89.157	20785	2709	1.124	3.267
总计		164063	100.000	23904			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-485-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
 样品瓶号: 4-23
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/03 13:14:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/03 16:09:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.852	17910	10.701	3198	2571	1.177	--
2	2.391	149463	89.299	21337	2733	1.123	3.281
总计		167373	100.000	24535			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-487-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/03 13:21:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:09:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.852	16391	10.971	2951	2582	1.162	--
2	2.392	133013	89.029	18915	2716	1.123	3.279
总计		149404	100.000	21866			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-490-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
 样品瓶号: 4-15
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/03 13:32:07 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/03 16:09:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.852	18053	10.575	3240	2589	1.178	--
2	2.392	152654	89.425	21786	2739	1.123	3.286
总计		170707	100.000	25026			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-491-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
 样品瓶号: 4-24
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/03 13:35:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/03 16:09:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.854	17798	10.524	3186	2578	1.181	--
2	2.394	151322	89.476	21602	2739	1.122	3.287
总计		169120	100.000	24788			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-492-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/03 13:38:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:09:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.852	16880	10.839	3020	2569	1.176	--
2	2.392	138862	89.161	19765	2725	1.122	3.277
总计		155743	100.000	22785			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-493-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
 样品瓶号: 4-42
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/03 13:42:24 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/03 16:09:47 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.853	16639	11.018	2978	2568	1.181	--
2	2.393	134385	88.982	19099	2723	1.126	3.274
总计		151025	100.000	22077			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.5ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 232nm

数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-494-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb

样品瓶号: 4-51

进样体积: 50 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/03 13:45:50

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2024/08/03 16:09:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.854	17164	13.010	3103	2605	1.174	--
2	2.394	114760	86.990	16414	2749	1.123	3.294
总计		131924	100.000	19518			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-496-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/03 13:52:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:09:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.852	17312	10.541	3079	2554	1.180	--
2	2.392	146920	89.459	20863	2711	1.124	3.271
总计		164232	100.000	23941			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-499-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/03 14:03:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:10:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.852	16685	10.876	2972	2560	1.179	--
2	2.392	136728	89.124	19462	2728	1.121	3.278
总计		153413	100.000	22434			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-500-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/03 14:06:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:10:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.853	17361	12.808	3114	2585	1.172	--
2	2.393	118189	87.192	16844	2737	1.122	3.285
总计		135550	100.000	19957			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 232nm
 数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-501-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-JX-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
 样品瓶号: 4-8
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/03 14:09:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/03 16:10:08 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.852	17389	9.472	3112	2572	1.174	--
2	2.392	166186	90.528	23593	2717	1.122	3.275
总计		183574	100.000	26705			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-502-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/03 14:13:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2024/08/03 16:10:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.853	17698	9.886	3175	2570	1.174	--
2	2.393	161326	90.114	22922	2719	1.123	3.276
总计		179024	100.000	26097			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 232nm
数据文件名: RC\$SMF-4068 - 0-75/24-505-2 - zzp-2023120822p-10mg10mg-rcqx-pH4.5jz-2-lf100z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4068 - SMF-4068-20240803-FX273.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/03 14:23:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/03 16:10:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 232nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.851	16369	9.610	2919	2563	1.175	--
2	2.392	153957	90.390	21910	2725	1.123	3.280
总计		170326	100.000	24829			

