SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1209-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-rj.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 11:41:25
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:28:16
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1210-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 11:45:48 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:28:20 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.023	3054861	100.000	379591	3424	1.377	--
总计		3054861	100.000	379591			

图2 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1211-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 11:50:10
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:28:24
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.021	3054660	100.000	375417	3344	1.385	--
总计		3054660	100.000	375417			

图3 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1212-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 12:00:30 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:28:27 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.070	3053992	100.000	390709	3679	1.327	--
总计		3053992	100.000	390709			

图4 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1213-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 12:04:53
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:28:30
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.066	3052456	100.000	384676	3615	1.365	--
总计		3052456	100.000	384676			

图5 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1214-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 12:09:16
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:28:33
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.066	3050990	100.000	384413	3650	1.390	--
总计		3050990	100.000	384413			

图6 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1215-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 12:13:38 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:28:36 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.075	352504	100.000	45544	3988	1.446	--
总计		352504	100.000	45544			

图7 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1216-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 12:18:00 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:28:40 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.077	371077	100.000	48269	4008	1.424	--
总计		371077	100.000	48269			

图8 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1217-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 12:22:23 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:28:43 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.080	292250	100.000	38316	4028	1.404	--
总计		292250	100.000	38316			

图9 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1218-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 12:26:44 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:28:46 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.083	337363	100.000	44604	4098	1.380	--
总计		337363	100.000	44604			

图10 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1219-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 12:31:05 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:28:49 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.085	323838	100.000	43143	4155	1.372	--
总计		323838	100.000	43143			

图11 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1220-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 12:35:27 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:28:53 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.087	357935	100.000	47935	4179	1.362	--
总计		357935	100.000	47935			

图12 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1221-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 12:39:49 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:28:56 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.090	843428	100.000	113353	4215	1.353	--
总计		843428	100.000	113353			

图13 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1222-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 12:44:11 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:28:59 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.094	857485	100.000	115597	4264	1.342	--
总计		857485	100.000	115597			

图14 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1223-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 12:48:32
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:29:02
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.097	716754	100.000	97172	4293	1.335	--
总计		716754	100.000	97172			

图15 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1224-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 12:52:54 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:29:05 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.099	814837	100.000	110424	4302	1.334	--
总计		814837	100.000	110424			

图16 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1225-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 12:57:16 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:29:08 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.102	807623	100.000	109489	4322	1.329	--
总计		807623	100.000	109489			

图17 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1226-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 13:01:37 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:29:11 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.103	812267	100.000	109373	4249	1.332	--
总计		812267	100.000	109373			

图18 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1227-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/01 13:05:59
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:29:14
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	1285227	100.000	172971	4250	1.328	--
总计		1285227	100.000	172971			

图19 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1228-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 5 µl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 13:10:21 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:29:17 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.109	1312569	100.000	176738	4278	1.322	--
总计		1312569	100.000	176738			

图20 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1229-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 5 µl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 13:14:42 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:29:20 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	1145651	100.000	156287	4374	1.314	--
总计		1145651	100.000	156287			

图21 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1230-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 5 µl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 13:19:04 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:29:22 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.115	1251489	100.000	169790	4334	1.318	--
总计		1251489	100.000	169790			

图22 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1231-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 13:23:26 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:29:25 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.118	1259988	100.000	170324	4336	1.321	--
总计		1259988	100.000	170324			

图23 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1232-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 13:27:47 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:29:29 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.119	1262599	100.000	170354	4330	1.323	--
总计		1262599	100.000	170354			

图24 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1233-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 13:32:09 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:29:32 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.121	1671019	100.000	225339	4316	1.327	--
总计		1671019	100.000	225339			

图25 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1234-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 13:36:30 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:29:35 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.123	1705528	100.000	229285	4292	1.332	--
总计		1705528	100.000	229285			

图26 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1235-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 13:40:51 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:29:38 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.125	1525761	100.000	204341	4284	1.337	--
总计		1525761	100.000	204341			

图27 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1236-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 13:45:13 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:29:41 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.126	1631510	100.000	217554	4270	1.340	--
总计		1631510	100.000	217554			

图28 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1237-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 13:49:35 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:29:44 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.127	1655882	100.000	220268	4243	1.346	--
总计		1655882	100.000	220268			

图29 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1238-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 13:53:56 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:29:47 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.129	1649096	100.000	218896	4219	1.352	--
总计		1649096	100.000	218896			

图30 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1239-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 13:58:18 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:29:50 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.129	2222655	100.000	293805	4181	1.359	--
总计		2222655	100.000	293805			

图31 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1240-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 14:02:39 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:29:53 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.130	2235036	100.000	294527	4161	1.365	--
总计		2235036	100.000	294527			

图32 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1241-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 14:07:01 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:29:57 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	2080288	100.000	272952	4132	1.371	--
总计		2080288	100.000	272952			

图33 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1242-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 14:11:23 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:30:00 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.132	2184696	100.000	284875	4099	1.380	--
总计		2184696	100.000	284875			

图34 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1243-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 14:15:45 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:30:03 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.133	2234263	100.000	289958	4066	1.385	--
总计		2234263	100.000	289958			

图35 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1244-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 14:20:06 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:30:06 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.134	2205473	100.000	285891	4074	1.388	--
总计		2205473	100.000	285891			

图36 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1245-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 14:24:28 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:30:09 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.133	2675757	100.000	345651	4042	1.392	--
总计		2675757	100.000	345651			

图37 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1246-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 14:28:49 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:30:12 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.134	2661115	100.000	342392	4024	1.396	--
总计		2661115	100.000	342392			

图38 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1247-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 14:33:10 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:30:15 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.133	2601709	100.000	334283	3999	1.400	--
总计		2601709	100.000	334283			

图39 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1248-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 14:37:32 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:30:18 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.132	2668376	100.000	341880	3969	1.404	--
总计		2668376	100.000	341880			

图40 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1249-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 14:41:54 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:30:21 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.133	2700849	100.000	344461	3949	1.409	--
总计		2700849	100.000	344461			

图41 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1250-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 14:46:15
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:30:24
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.132	2647359	100.000	337341	3931	1.413	--
总计		2647359	100.000	337341			

图42 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1251-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/01 14:50:37
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:30:27
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.133	2845879	100.000	361517	3920	1.417	--
总计		2845879	100.000	361517			

图43 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1252-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 14:54:59 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:30:30 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.133	2813053	100.000	355943	3899	1.421	--
总计		2813053	100.000	355943			

图44 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1253-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 14:59:21 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:30:33 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.133	2815886	100.000	355837	3880	1.425	--
总计		2815886	100.000	355837			

图45 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1254-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 15:03:42
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:30:36
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	2852797	100.000	359789	3854	1.428	--
总计		2852797	100.000	359789			

图46 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1255-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 15:08:04 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:30:39 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.133	2872164	100.000	360167	3834	1.434	--
总计		2872164	100.000	360167			

图47 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1256-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 15:12:26 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:30:42 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.132	2826490	100.000	354581	3822	1.436	--
总计		2826490	100.000	354581			

图48 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1257-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 15:16:48 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:30:45 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	2912835	100.000	365396	3821	1.438	--
总计		2912835	100.000	365396			

图49 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1258-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 15:21:11 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:30:48 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.132	2882637	100.000	360929	3817	1.439	--
总计		2882637	100.000	360929			

图50 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1259-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 15:25:34 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:30:51 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.133	2904768	100.000	363190	3813	1.441	--
总计		2904768	100.000	363190			

图51 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1260-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 15:29:56 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:30:54 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.132	2923255	100.000	365712	3810	1.442	--
总计		2923255	100.000	365712			

图52 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1261-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 15:34:19 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:30:57 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	2939410	100.000	367576	3811	1.445	--
总计		2939410	100.000	367576			

图53 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1262-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 15:38:41 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:31:00 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.132	2903407	100.000	362275	3805	1.450	--
总计		2903407	100.000	362275			

图54 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1263-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 15:43:04
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:31:03
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.122	3046878	100.000	368903	3536	1.443	--
总计		3046878	100.000	368903			

图55 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1264-2 - zzp1-1-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 15:47:27 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:31:07 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.120	3044753	100.000	367703	3529	1.450	--
总计		3044753	100.000	367703			

图56 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1265-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-rj.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 15:51:51 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:31:10 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1266-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 16:07:41　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:31:13　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.086	3042117	100.000	464765	5186	1.154	--
总计		3042117	100.000	464765			

图58 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1267-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 16:12:05 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:31:16 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.084	3048278	100.000	463800	5166	1.158	--
总计		3048278	100.000	463800			

图59 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1268-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 16:16:29　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:31:19　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.082	3043430	100.000	463939	5156	1.159	--
总计		3043430	100.000	463939			

图60 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1269-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 16:20:54
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:31:22
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.082	3043694	100.000	463625	5142	1.158	--
总计		3043694	100.000	463625			

图61 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1270-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 16:25:18
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:31:25
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.080	3041715	100.000	463440	5136	1.157	--
总计		3041715	100.000	463440			

图62 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1271-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 16:29:41 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:31:28 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.087	318051	100.000	50338	5575	1.147	--
总计		318051	100.000	50338			

图63 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1272-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 16:34:05 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:31:31 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.091	324555	100.000	51162	5560	1.146	--
总计		324555	100.000	51162			

图64 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1273-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 16:38:28
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:31:34
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.092	316645	100.000	49795	5562	1.145	--
总计		316645	100.000	49795			

图65 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1274-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 16:42:51 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:31:37 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.092	341556	100.000	53670	5559	1.144	--
总计		341556	100.000	53670			

图66 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1275-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 16:47:14
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:31:40
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.091	303459	100.000	47826	5552	1.140	--
总计		303459	100.000	47826			

图67 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1276-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 16:51:36　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:31:42　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.091	364620	100.000	57364	5542	1.139	--
总计		364620	100.000	57364			

图68 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1277-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 16:55:59
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:31:45
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.090	789488	100.000	124326	5528	1.139	--
总计		789488	100.000	124326			

图69 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1278-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 17:00:23
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:31:48
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.091	779493	100.000	122493	5530	1.137	--
总计		779493	100.000	122493			

图70 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1279-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 5 µl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 17:04:45
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:31:52
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.092	808097	100.000	126899	5529	1.135	--
总计		808097	100.000	126899			

图71 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1280-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 17:09:08 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:31:55 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.100	851509	100.000	132771	5493	1.135	--
总计		851509	100.000	132771			

图72 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1281-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 17:13:31 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:31:58 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.106	766758	100.000	120079	5508	1.132	--
总计		766758	100.000	120079			

图73 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1282-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 17:17:54 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:32:02 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.109	837649	100.000	130599	5526	1.130	--
总计		837649	100.000	130599			

图74 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1283-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 17:22:17 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:32:05 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1253158	100.000	195533	5507	1.129	--
总计		1253158	100.000	195533			

图75 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1284-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 17:26:40 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:32:08 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.114	1225739	100.000	191484	5507	1.127	--
总计		1225739	100.000	191484			

图76 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1285-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 17:31:03 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:32:12 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1334785	100.000	208183	5490	1.125	--
总计		1334785	100.000	208183			

图77 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1286-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 17:35:26 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:32:14 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1341966	100.000	209381	5503	1.125	--
总计		1341966	100.000	209381			

图78 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1287-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 17:39:49 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:32:18 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.114	1202837	100.000	187797	5502	1.124	--
总计		1202837	100.000	187797			

图79 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1288-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 17:44:12 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:32:21 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1298339	100.000	202221	5487	1.122	--
总计		1298339	100.000	202221			

图80 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1289-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/01 17:48:36
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:32:24
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.104	1645852	100.000	257911	5509	1.122	--
总计		1645852	100.000	257911			

图81 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1290-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 17:52:59 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:32:27 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.093	1612900	100.000	251721	5465	1.121	--
总计		1612900	100.000	251721			

图82 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1291-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 17:57:22
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:32:30
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.094	1734450	100.000	271114	5464	1.121	--
总计		1734450	100.000	271114			

图83 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1292-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 18:01:45 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:32:33 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.093	1738496	100.000	271171	5459	1.120	--
总计		1738496	100.000	271171			

图84 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1293-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 18:06:08
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:32:36
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.094	1578242	100.000	246317	5451	1.119	--
总计		1578242	100.000	246317			

图85 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1294-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 18:10:31 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:32:38 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.094	1676683	100.000	261699	5450	1.118	--
总计		1676683	100.000	261699			

图86 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1295-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 18:14:54 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:32:41 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.094	2206573	100.000	343698	5434	1.117	--
总计		2206573	100.000	343698			

图87 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1296-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 18:19:17 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:32:44 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	2172432	100.000	336429	5428	1.116	--
总计		2172432	100.000	336429			

图88 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1297-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 18:23:41 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:32:47 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	2290248	100.000	355405	5427	1.115	--
总计		2290248	100.000	355405			

图89 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1298-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 18:28:04 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:32:50 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	2299631	100.000	356829	5427	1.114	--
总计		2299631	100.000	356829			

图90 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1299-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 18:32:27 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:32:53 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	2160454	100.000	335044	5420	1.113	--
总计		2160454	100.000	335044			

图91 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1300-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 18:36:50 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:32:56 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.114	2249249	100.000	348547	5414	1.112	--
总计		2249249	100.000	348547			

图92 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1301-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 18:41:14 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:32:59 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.114	2687448	100.000	416214	5412	1.112	--
总计		2687448	100.000	416214			

图93 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1302-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 18:45:37 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:33:02 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.114	2649519	100.000	410444	5412	1.111	--
总计		2649519	100.000	410444			

图94 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1303-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 18:50:01 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:33:05 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.114	2723212	100.000	421627	5404	1.110	--
总计		2723212	100.000	421627			

图95 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1304-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 18:54:24 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:33:08 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	2715613	100.000	418569	5382	1.110	--
总计		2715613	100.000	418569			

图96 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1305-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 18:58:48 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:33:11 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.114	2650672	100.000	409875	5391	1.108	--
总计		2650672	100.000	409875			

图97 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1306-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 19:03:11 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:33:14 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.114	2683873	100.000	414772	5384	1.107	--
总计		2683873	100.000	414772			

图98 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1307-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 19:07:34 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:33:17 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.114	2852888	100.000	441264	5395	1.107	--
总计		2852888	100.000	441264			

图99 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1308-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 19:11:57 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:33:20 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	2827769	100.000	436830	5373	1.106	--
总计		2827769	100.000	436830			

图100 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1309-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 19:16:21 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:33:23 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	2877299	100.000	444349	5372	1.105	--
总计		2877299	100.000	444349			

图101 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1310-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 19:20:44 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:33:26 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.114	2872767	100.000	443159	5361	1.104	--
总计		2872767	100.000	443159			

图102 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1311-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 19:25:08 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:33:29 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.115	2841978	100.000	437907	5359	1.103	--
总计		2841978	100.000	437907			

图103 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1312-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 19:29:31 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:33:32 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.115	2885672	100.000	444380	5356	1.101	--
总计		2885672	100.000	444380			

图104 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1313-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 19:33:55　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:33:35　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.115	2916175	100.000	449138	5353	1.101	--
总计		2916175	100.000	449138			

图105 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1314-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 19:38:19
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:33:38
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.115	2904731	100.000	446922	5345	1.100	--
总计		2904731	100.000	446922			

图106 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1315-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 19:42:42　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:33:41　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.115	2936892	100.000	451700	5340	1.099	--
总计		2936892	100.000	451700			

图107 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1316-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 19:47:06 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:33:44 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	2926237	100.000	449452	5337	1.099	--
总计		2926237	100.000	449452			

图108 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1317-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 19:51:30 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:33:47 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.115	2910802	100.000	447298	5330	1.098	--
总计		2910802	100.000	447298			

图109 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1318-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 19:55:53 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:33:50 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.115	2953411	100.000	454262	5334	1.097	--
总计		2953411	100.000	454262			

图110 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1319-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 20:00:17 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:33:53 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.108	3114325	100.000	460928	4916	1.097	--
总计		3114325	100.000	460928			

图111 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1320-2 - zzp1-2-2023010811p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 20:04:41
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:33:56
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.108	3117318	100.000	460810	4908	1.096	--
总计		3117318	100.000	460810			

图112 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1321-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-rj.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 20:09:04
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:33:59
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1322-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 20:13:26　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:34:03　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.108	3063774	100.000	451973	4891	1.095	--
总计		3063774	100.000	451973			

图114 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1323-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 20:17:48　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:34:06　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.108	3062314	100.000	451028	4890	1.095	--
总计		3062314	100.000	451028			

图115 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1324-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 20:22:10 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:34:09 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.104	3066414	100.000	452333	4868	1.095	--
总计		3066414	100.000	452333			

图116 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1325-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 20:26:32
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:34:12
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.102	3065156	100.000	450751	4854	1.094	--
总计		3065156	100.000	450751			

图117 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1326-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 20:30:54　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:34:15　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.092	3047851	100.000	450463	4867	1.096	--
总计		3047851	100.000	450463			

图118 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1327-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 20:35:16 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:34:18 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.102	419971	100.000	64187	5244	1.087	--
总计		419971	100.000	64187			

图119 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1328-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 20:39:38 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:34:20 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.118	374032	100.000	56977	5288	1.088	--
总计		374032	100.000	56977			

图120 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1329-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 20:43:59
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:34:23
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	401786	100.000	61292	5258	1.086	--
总计		401786	100.000	61292			

图121 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1330-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 20:48:21 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:34:26 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	330959	100.000	50594	5274	1.084	--
总计		330959	100.000	50594			

图122 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1331-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 20:52:42　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:34:30　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.098	385366	100.000	59101	5248	1.084	--
总计		385366	100.000	59101			

图123 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1332-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 20:57:04 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:34:33 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.102	367758	100.000	56119	5225	1.082	--
总计		367758	100.000	56119			

图124 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1333-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 21:01:25
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:34:36
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.114	873784	100.000	133204	5237	1.082	--
总计		873784	100.000	133204			

图125 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1334-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 21:05:47
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:34:39
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.106	841016	100.000	128356	5220	1.081	--
总计		841016	100.000	128356			

图126 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1335-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 21:10:08
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:34:42
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.104	893869	100.000	136387	5205	1.079	--
总计		893869	100.000	136387			

图127 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1336-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 21:14:29
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:34:45
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.102	779949	100.000	118843	5217	1.079	--
总计		779949	100.000	118843			

图128 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1337-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 21:18:51 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:34:48 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.099	840821	100.000	128311	5212	1.078	--
总计		840821	100.000	128311			

图129 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1338-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 21:23:12 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:34:51 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.099	782849	100.000	119406	5200	1.078	--
总计		782849	100.000	119406			

图130 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1339-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 21:27:33 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:34:54 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.101	1322088	100.000	201048	5200	1.079	--
总计		1322088	100.000	201048			

图131 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1340-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 21:31:54 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:34:57 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.100	1286775	100.000	195970	5205	1.078	--
总计		1286775	100.000	195970			

图132 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1341-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 21:36:15 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:35:00 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.100	1318724	100.000	200684	5206	1.077	--
总计		1318724	100.000	200684			

图133 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1342-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 21:40:37
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:35:03
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.100	1235228	100.000	187911	5193	1.076	--
总计		1235228	100.000	187911			

图134 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1343-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 21:44:58 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:35:06 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.099	1276503	100.000	194271	5181	1.076	--
总计		1276503	100.000	194271			

图135 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1344-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 21:49:19
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:35:09
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.100	1225583	100.000	186069	5180	1.075	--
总计		1225583	100.000	186069			

图136 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1345-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 21:53:41
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:35:12
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.109	1686958	100.000	255296	5179	1.074	--
总计		1686958	100.000	255296			

图137 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1346-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 21:58:03
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:35:15
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	1676294	100.000	254563	5182	1.072	--
总计		1676294	100.000	254563			

图138 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1347-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 22:02:24
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:35:18
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1676483	100.000	254017	5173	1.074	--
总计		1676483	100.000	254017			

图139 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1348-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 22:06:45 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:35:22 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.114	1626533	100.000	246092	5152	1.073	--
总计		1626533	100.000	246092			

图140 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1349-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 22:11:06 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:35:24 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1647053	100.000	249213	5155	1.071	--
总计		1647053	100.000	249213			

图141 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1350-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 22:15:27
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:35:28
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	1600787	100.000	241615	5148	1.069	--
总计		1600787	100.000	241615			

图142 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1351-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 22:19:49 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:35:30 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	2215127	100.000	334131	5101	1.071	--
总计		2215127	100.000	334131			

图143 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1352-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 22:24:11 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:35:33 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.118	2239182	100.000	336259	5134	1.070	--
总计		2239182	100.000	336259			

图144 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1353-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 22:28:32 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:35:36 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.118	2234916	100.000	335926	5136	1.069	--
总计		2234916	100.000	335926			

图145 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1354-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 22:32:53
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:35:39
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.120	2204045	100.000	331769	5130	1.068	--
总计		2204045	100.000	331769			

图146 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1355-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 22:37:14
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:35:42
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.118	2202249	100.000	330559	5124	1.068	--
总计		2202249	100.000	330559			

图147 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1356-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 22:41:35 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:35:45 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	2176288	100.000	327267	5116	1.068	--
总计		2176288	100.000	327267			

图148 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1357-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 22:45:56 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:35:48 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.120	2640607	100.000	396513	5107	1.065	--
总计		2640607	100.000	396513			

图149 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1358-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 22:50:17 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:35:51 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.119	2668495	100.000	400617	5107	1.066	--
总计		2668495	100.000	400617			

图150 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1359-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 22:54:38 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:35:54 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.119	2685819	100.000	402451	5088	1.064	--
总计		2685819	100.000	402451			

图151 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1360-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 22:58:58 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:35:57 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.119	2645483	100.000	396784	5100	1.064	--
总计		2645483	100.000	396784			

图152 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1361-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 23:03:19 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:36:00 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.120	2635881	100.000	395028	5085	1.064	--
总计		2635881	100.000	395028			

图153 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1362-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 23:07:39
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:36:02
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.102	2609660	100.000	392341	5075	1.064	--
总计		2609660	100.000	392341			

图154 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1363-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 23:11:59 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:36:05 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.101	2785150	100.000	417847	5063	1.063	--
总计		2785150	100.000	417847			

图155 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1364-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 23:16:20 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:36:09 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.101	2795315	100.000	419260	5059	1.063	--
总计		2795315	100.000	419260			

图156 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1365-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 23:20:40
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:36:12
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.102	2805830	100.000	420795	5053	1.063	--
总计		2805830	100.000	420795			

图157 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1366-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 23:25:01
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:36:15
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.103	2801485	100.000	420794	5052	1.062	--
总计		2801485	100.000	420794			

图158 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1367-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 23:29:20　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:36:18　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.102	2866745	100.000	429590	5042	1.062	--
总计		2866745	100.000	429590			

图159 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1368-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 23:33:41 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:36:21 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.101	2797186	100.000	418476	5035	1.061	--
总计		2797186	100.000	418476			

图160 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1369-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 23:38:03　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:36:24　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.102	2855543	100.000	427653	5033	1.060	--
总计		2855543	100.000	427653			

图161 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1370-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 23:42:25
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:36:27
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.102	2869024	100.000	428949	5017	1.059	--
总计		2869024	100.000	428949			

图162 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1371-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 23:46:46 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:36:30 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	2890616	100.000	431246	5007	1.059	--
总计		2890616	100.000	431246			

图163 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1372-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 23:51:08 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:36:33 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.125	2912920	100.000	429840	4974	1.047	--
总计		2912920	100.000	429840			

图164 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1373-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 23:55:30
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:36:36
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.115	2849724	100.000	426183	5038	1.057	--
总计		2849724	100.000	426183			

图165 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1374-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/01 23:59:51
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:36:39
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.114	2886681	100.000	431152	5016	1.058	--
总计		2886681	100.000	431152			

图166 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1375-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 00:04:13　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:36:42　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.108	3065188	100.000	438957	4609	1.058	--
总计		3065188	100.000	438957			

图167 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1376-2 - zzp1-1-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 00:08:36　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:36:45　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.109	3063537	100.000	438035	4617	1.057	--
总计		3063537	100.000	438035			

图168 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1377-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-rj.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/02 00:12:59
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:36:48
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1378-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 00:17:22 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:36:51 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	3063424	100.000	438562	4606	1.057	--
总计		3063424	100.000	438562			

图170 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1379-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 00:21:46　　实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:36:54　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.101	3050886	100.000	436956	4597	1.057	--
总计		3050886	100.000	436956			

图171 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1380-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 00:26:09 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:36:57 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.094	3051331	100.000	437825	4579	1.057	--
总计		3051331	100.000	437825			

图172 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1381-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 00:30:32　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:37:00　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.102	3067593	100.000	436997	4542	1.056	--
总计		3067593	100.000	436997			

图173 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1382-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 00:34:56　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:37:03　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.114	3065888	100.000	437792	4581	1.056	--
总计		3065888	100.000	437792			

图174 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1383-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 00:39:18 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:37:06 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	324514	100.000	48359	4971	1.048	--
总计		324514	100.000	48359			

图175 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1384-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 00:43:40
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:37:09
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.118	317034	100.000	46872	4960	1.046	--
总计		317034	100.000	46872			

图176 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1385-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 00:48:02
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:37:12
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.122	349397	100.000	51884	4983	1.045	--
总计		349397	100.000	51884			

图177 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1386-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 00:52:24 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:37:15 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.120	272747	100.000	40324	4937	1.044	--
总计		272747	100.000	40324			

图178 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1387-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 00:56:46 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:37:18 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.115	378482	100.000	55928	4918	1.043	--
总计		378482	100.000	55928			

图179 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1388-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 01:01:08 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:37:21 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.119	327427	100.000	48409	4945	1.043	--
总计		327427	100.000	48409			

图180 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1389-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 01:05:30 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:37:24 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.122	779113	100.000	115030	4924	1.045	--
总计		779113	100.000	115030			

图181 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1390-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 01:09:53 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:37:27 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.120	760942	100.000	112080	4908	1.046	--
总计		760942	100.000	112080			

图182 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1391-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 01:14:16 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:37:31 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.118	773815	100.000	113637	4901	1.044	--
总计		773815	100.000	113637			

图183 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1392-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 01:18:38 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:37:34 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.121	771994	100.000	113803	4907	1.043	--
总计		771994	100.000	113803			

图184 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1393-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 01:23:00
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:37:37
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	809939	100.000	119559	4916	1.043	--
总计		809939	100.000	119559			

图185 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1394-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 01:27:21 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:37:40 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	757521	100.000	111365	4882	1.043	--
总计		757521	100.000	111365			

图186 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1395-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 01:31:44　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:37:43　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	1254719	100.000	185027	4903	1.044	--
总计		1254719	100.000	185027			

图187 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1396-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 01:36:06 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:37:46 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.108	1209648	100.000	177681	4860	1.043	--
总计		1209648	100.000	177681			

图188 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1397-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 01:40:27 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:37:49 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.115	1276130	100.000	188522	4913	1.044	--
总计		1276130	100.000	188522			

图189 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1398-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 01:44:49 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:37:52 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	1224324	100.000	180713	4883	1.044	--
总计		1224324	100.000	180713			

图190 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1399-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 01:49:11 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:37:55 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.105	1249337	100.000	184368	4869	1.042	--
总计		1249337	100.000	184368			

图191 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1400-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 5 µl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 01:53:33 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:37:58 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.114	1216542	100.000	178534	4843	1.041	--
总计		1216542	100.000	178534			

图192 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1401-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 01:57:55 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:38:01 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.127	1658695	100.000	242352	4873	1.041	--
总计		1658695	100.000	242352			

图193 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1402-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 02:02:18 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:38:04 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.127	1620592	100.000	236675	4866	1.040	--
总计		1620592	100.000	236675			

图194 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1403-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 02:06:41 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:38:07 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.128	1694949	100.000	247939	4869	1.040	--
总计		1694949	100.000	247939			

图195 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1404-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 02:11:03 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:38:10 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.118	1627692	100.000	237290	4830	1.040	--
总计		1627692	100.000	237290			

图196 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1405-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 02:15:25 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:38:13 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.124	1626888	100.000	238751	4887	1.040	--
总计		1626888	100.000	238751			

图197 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1406-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 02:19:48　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:38:16　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	1591767	100.000	233446	4832	1.040	--
总计		1591767	100.000	233446			

图198 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1407-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 02:24:11 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:38:19 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	2208314	100.000	323732	4821	1.039	--
总计		2208314	100.000	323732			

图199 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1408-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 02:28:33　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:38:22　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	2177774	100.000	318902	4811	1.038	--
总计		2177774	100.000	318902			

图200 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1409-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 02:32:56 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:38:25 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	2260618	100.000	330968	4811	1.038	--
总计		2260618	100.000	330968			

图201 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1410-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 02:37:19
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:38:29
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	2177658	100.000	318723	4807	1.037	--
总计		2177658	100.000	318723			

图202 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1411-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 02:41:42 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:38:32 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	2190280	100.000	320398	4802	1.037	--
总计		2190280	100.000	320398			

图203 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1412-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 02:46:04　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:38:35　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	2132426	100.000	311379	4791	1.036	--
总计		2132426	100.000	311379			

图204 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1413-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 02:50:27 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:38:38 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	2649432	100.000	386718	4781	1.036	--
总计		2649432	100.000	386718			

图205 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1414-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 02:54:50 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:38:41 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.108	2626524	100.000	382707	4782	1.035	--
总计		2626524	100.000	382707			

图206 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1415-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 02:59:13 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:38:44 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	2646651	100.000	385601	4766	1.034	--
总计		2646651	100.000	385601			

图207 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1416-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 03:03:36 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:38:47 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.108	2653454	100.000	386019	4765	1.034	--
总计		2653454	100.000	386019			

图208 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1417-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 5 µl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 03:07:58 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:38:50 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	2631515	100.000	382907	4763	1.033	--
总计		2631515	100.000	382907			

图209 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1418-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 03:12:21　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:38:53　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	2610003	100.000	380105	4770	1.032	--
总计		2610003	100.000	380105			

图210 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1419-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 03:16:44 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:38:57 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.118	2828877	100.000	408578	4742	1.031	--
总计		2828877	100.000	408578			

图211 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1420-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 03:21:07 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:39:00 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.119	2820683	100.000	407723	4739	1.032	--
总计		2820683	100.000	407723			

图212 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1421-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 03:25:30 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:39:03 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.108	2787858	100.000	404902	4752	1.032	--
总计		2787858	100.000	404902			

图213 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1422-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 03:29:53 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:39:06 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.108	2823357	100.000	409634	4741	1.032	--
总计		2823357	100.000	409634			

图214 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1423-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 03:34:16 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:39:08 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	2812603	100.000	408423	4735	1.031	--
总计		2812603	100.000	408423			

图215 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1424-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 03:38:38
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:39:11
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.108	2786680	100.000	404200	4731	1.031	--
总计		2786680	100.000	404200			

图216 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1425-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 03:43:01
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:39:14
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.108	2882738	100.000	417159	4725	1.031	--
总计		2882738	100.000	417159			

图217 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1426-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 03:47:24
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:39:17
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	2900497	100.000	420310	4715	1.030	--
总计		2900497	100.000	420310			

图218 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1427-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 03:51:47
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:39:20
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.108	2858613	100.000	413601	4711	1.030	--
总计		2858613	100.000	413601			

图219 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1428-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/02 03:56:10
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:39:23
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.108	2879581	100.000	416181	4706	1.030	--
总计		2879581	100.000	416181			

图220 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1429-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 04:00:33 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:39:27 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.108	2858211	100.000	412672	4700	1.029	--
总计		2858211	100.000	412672			

图221 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1430-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 04:04:57 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:39:30 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.109	2857668	100.000	411879	4695	1.028	--
总计		2857668	100.000	411879			

图222 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1431-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 04:09:20
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:39:33
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.101	3041465	100.000	422835	4334	1.030	--
总计		3041465	100.000	422835			

图223 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1432-2 - zzp1-2-2023011011p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 04:13:43　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:39:36　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.101	3038871	100.000	422292	4322	1.029	--
总计		3038871	100.000	422292			

图224 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1433-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-rj.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 04:18:05 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:39:39 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图225 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1434-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 04:22:27
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:39:42
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.100	3043628	100.000	422583	4311	1.029	--
总计		3043628	100.000	422583			

图226 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1435-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/02 04:26:50
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:39:45
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.101	3048422	100.000	422715	4307	1.029	--
总计		3048422	100.000	422715			

图227 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1436-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 04:31:13 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:39:48 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.099	3045826	100.000	422986	4296	1.029	--
总计		3045826	100.000	422986			

图228 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1437-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 04:35:37 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:39:51 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.099	3043813	100.000	422508	4291	1.028	--
总计		3043813	100.000	422508			

图229 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1438-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 04:39:59
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:39:54
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.099	3044488	100.000	422462	4286	1.029	--
总计		3044488	100.000	422462			

图230 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1439-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 04:44:21 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:39:57 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.125	340370	100.000	48689	4655	1.022	--
总计		340370	100.000	48689			

图231 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1440-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 04:48:43
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:40:00
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.126	349166	100.000	50054	4684	1.021	--
总计		349166	100.000	50054			

图232 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1441-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 04:53:05
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:40:03
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.119	354924	100.000	50934	4656	1.022	--
总计		354924	100.000	50934			

图233 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1442-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 04:57:27　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:40:06　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	351325	100.000	50342	4634	1.020	--
总计		351325	100.000	50342			

图234 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1443-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/02 05:01:49
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:40:09
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	336820	100.000	48350	4628	1.019	--
总计		336820	100.000	48350			

图235 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1444-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 05:06:11 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:40:12 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	337172	100.000	48297	4620	1.019	--
总计		337172	100.000	48297			

图236 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1445-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/02 05:10:33
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:40:15
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	768006	100.000	109983	4609	1.018	--
总计		768006	100.000	109983			

图237 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1446-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/02 05:14:55
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:40:18
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	833494	100.000	119351	4604	1.018	--
总计		833494	100.000	119351			

图238 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1447-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 05:19:18 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:40:21 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	793230	100.000	113438	4595	1.017	--
总计		793230	100.000	113438			

图239 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1448-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 05:23:38 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:40:24 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	779457	100.000	111442	4594	1.017	--
总计		779457	100.000	111442			

图240 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1449-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 05:28:00 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:40:27 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	754323	100.000	107843	4591	1.017	--
总计		754323	100.000	107843			

图241 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1450-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/02 05:32:22
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:40:30
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	797314	100.000	113718	4566	1.016	--
总计		797314	100.000	113718			

图242 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1451-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 05:36:44 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:40:34 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.121	1202309	100.000	170762	4556	1.017	--
总计		1202309	100.000	170762			

图243 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1452-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 05:41:06 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:40:37 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	1304578	100.000	185318	4584	1.016	--
总计		1304578	100.000	185318			

图244 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1453-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 05:45:28　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:40:40　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	1240613	100.000	176193	4580	1.015	--
总计		1240613	100.000	176193			

图245 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1454-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 05:49:50
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:40:43
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1220166	100.000	173782	4552	1.015	--
总计		1220166	100.000	173782			

图246 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1455-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/02 05:54:12
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:40:46
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1171338	100.000	166625	4543	1.014	--
总计		1171338	100.000	166625			

图247 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1456-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/02 05:58:34
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:40:49
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1251024	100.000	177842	4539	1.014	--
总计		1251024	100.000	177842			

图248 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1457-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 06:02:56 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:40:52 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	1546346	100.000	219847	4537	1.014	--
总计		1546346	100.000	219847			

图249 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1458-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 06:07:19
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:40:54
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1683683	100.000	239101	4528	1.014	--
总计		1683683	100.000	239101			

图250 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1459-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 06:11:40
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:40:57
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	1633278	100.000	231987	4526	1.014	--
总计		1633278	100.000	231987			

图251 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1460-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 06:16:00 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:41:00 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1575394	100.000	223610	4523	1.013	--
总计		1575394	100.000	223610			

图252 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1461-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 06:20:22 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:41:03 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	1541335	100.000	218519	4509	1.012	--
总计		1541335	100.000	218519			

图253 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1462-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 06:24:44 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:41:06 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	1625482	100.000	230354	4506	1.013	--
总计		1625482	100.000	230354			

图254 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1463-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 06:29:06 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:41:09 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	2093648	100.000	296383	4496	1.012	--
总计		2093648	100.000	296383			

图255 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1464-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 06:33:29
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:41:12
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.115	2235605	100.000	314440	4451	1.012	--
总计		2235605	100.000	314440			

图256 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1465-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 06:37:50 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:41:15 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.142	2233676	100.000	306169	4297	1.010	--
总计		2233676	100.000	306169			

图257 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1466-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 06:42:12 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:41:18 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.151	2126031	100.000	297543	4538	1.011	--
总计		2126031	100.000	297543			

图258 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1467-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 06:46:34 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:41:21 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	2089813	100.000	293473	4497	1.012	--
总计		2089813	100.000	293473			

图259 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1468-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 06:50:56 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:41:24 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.133	2150746	100.000	301676	4483	1.010	--
总计		2150746	100.000	301676			

图260 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1469-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 06:55:18 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:41:27 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	2599275	100.000	364756	4471	1.010	--
总计		2599275	100.000	364756			

图261 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1470-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 06:59:41
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:41:30
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	2665779	100.000	373820	4465	1.010	--
总计		2665779	100.000	373820			

图262 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1471-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 07:04:02 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:41:33 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	2632361	100.000	368684	4454	1.009	--
总计		2632361	100.000	368684			

图263 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）　　流速：1.0ml/min
柱 温:30℃　　波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1472-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 5 μl　　版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 07:08:23　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:41:36　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.134	2567790	100.000	358561	4464	1.009	--
总计		2567790	100.000	358561			

图264 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1473-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 07:12:45 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:41:39 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.133	2572286	100.000	359747	4461	1.010	--
总计		2572286	100.000	359747			

图265 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1474-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 07:17:07 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:41:42 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.132	2637280	100.000	365592	4373	1.001	--
总计		2637280	100.000	365592			

图266 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1475-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 07:21:29
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:41:46
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	2813934	100.000	393462	4440	1.009	--
总计		2813934	100.000	393462			

图267 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1476-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 07:25:51 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:41:49 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	2833593	100.000	396266	4437	1.009	--
总计		2833593	100.000	396266			

图268 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1477-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 07:30:13 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:41:52 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.134	2823993	100.000	393450	4435	1.008	--
总计		2823993	100.000	393450			

图269 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1478-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 07:34:33 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:41:55 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.132	2774907	100.000	387129	4422	1.008	--
总计		2774907	100.000	387129			

图270 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1479-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 07:38:55 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:41:58 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.132	2764564	100.000	385119	4418	1.007	--
总计		2764564	100.000	385119			

图271 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1480-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 07:43:17 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:42:01 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.136	2798710	100.000	389857	4425	1.007	--
总计		2798710	100.000	389857			

图272 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1481-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 07:47:40
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:42:04
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.133	2912066	100.000	405122	4413	1.006	--
总计		2912066	100.000	405122			

图273 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1482-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 07:52:02 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:42:07 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.132	2906551	100.000	404720	4403	1.006	--
总计		2906551	100.000	404720			

图274 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1483-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 07:56:25
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:42:10
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	2912196	100.000	405600	4403	1.006	--
总计		2912196	100.000	405600			

图275 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm） 流速：1.0ml/min
柱 温:30℃ 波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1484-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 5 μl 版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 08:00:47 实验者: wangdan
处理时间（V2） : 2024/08/02 09:42:13 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	2909139	100.000	400107	4260	1.000	--
总计		2909139	100.000	400107			

图276 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1485-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 08:05:10
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:42:16
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.134	2872574	100.000	399362	4414	1.008	--
总计		2872574	100.000	399362			

图277 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1486-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/02 08:09:32
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:42:19
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

流速：1.0ml/min
波长：256nm
版本号：6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.134	2887119	100.000	401055	4416	1.008	--
总计		2887119	100.000	401055			

图278 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1487-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 08:13:55
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:42:22
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.124	3068386	100.000	412136	4063	1.011	--
总计		3068386	100.000	412136			

图279 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm）
柱 温:30℃
流速：1.0ml/min
波长：256nm
数据文件名: RC$938 - 0-151/18-1488-2 - zzp1-1-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$938 - 938-RCQX-FX267.lcm
批处理文件名: RC$938 - 938-rcqx-20240801-FX267.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 5 μl
版本号：6.115
进样时间:2024/08/02 08:18:18
实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2024/08/02 09:42:25
处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.128	3072342	100.000	411828	4057	1.010	--
总计		3072342	100.000	411828			

图280 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-2-2