

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-395-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-rj.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 04:00:39

实验者: wangdan


处理时间 (V2) : 2024/08/02 09:58:26

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-396-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 04:05:02

实验者: wangdan


处理时间 (V2) : 2024/08/02 09:58:30

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.072	3021497	100.000	447051	4934	1.145	--
总计		3021497	100.000	447051			

图2 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-397-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 04:09:25

实验者: wangdan


处理时间 (V2) : 2024/08/02 09:58:33

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.073	3027609	100.000	447752	4943	1.146	--
总计		3027609	100.000	447752			

图3 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-398-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μl

进样时间:2024/08/02 04:13:48

处理时间 (V2) : 2024/08/02 09:58:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.072	3031946	100.000	448394	4935	1.146	--
总计		3031946	100.000	448394			

图4 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-399-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 04:18:11

实验者: wangdan


处理时间 (V2) : 2024/08/02 09:58:39

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.072	3024077	100.000	447247	4935	1.146	--
总计		3024077	100.000	447247			

图5 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-400-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 04:22:33

实验者: wangdan


处理时间 (V2) : 2024/08/02 09:58:42

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.072	3021252	100.000	446967	4934	1.146	--
总计		3021252	100.000	446967			

图6 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-1-5




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
 柱温:30℃
 数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-401-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm
 批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 5 μl
 进样时间:2024/08/02 04:26:56
 处理时间 (V2) : 2024/08/02 09:58:45
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 1.0ml/min
 波长: 256nm
 版本号: 6.115
 实验者: wangdan
 处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.081	349402	100.000	53059	5251	1.147	--
总计		349402	100.000	53059			

图7 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-402-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 04:31:18

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 09:58:48

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.082	327092	100.000	49676	5261	1.146	--
总计		327092	100.000	49676			

图8 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-403-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 04:35:39

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 09:58:51

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.080	360773	100.000	54819	5251	1.144	--
总计		360773	100.000	54819			

图9 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-404-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 04:40:01

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 09:58:53

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.082	315084	100.000	47799	5253	1.144	--
总计		315084	100.000	47799			

图10 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-405-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 04:44:23

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 09:58:56

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.081	312557	100.000	47465	5253	1.144	--
总计		312557	100.000	47465			

图11 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-406-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 04:48:45

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 09:58:59

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.081	325487	100.000	49418	5242	1.144	--
总计		325487	100.000	49418			

图12 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-407-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 04:53:07

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 09:59:03

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.082	786563	100.000	119261	5245	1.145	--
总计		786563	100.000	119261			

图13 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-408-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 04:57:29

实验者: wangdan


处理时间(V2): 2024/08/02 09:59:06

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.081	762409	100.000	115570	5243	1.145	--
总计		762409	100.000	115570			

图14 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-409-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 05:01:50

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 09:59:10

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.081	801547	100.000	121555	5241	1.144	--
总计		801547	100.000	121555			

图15 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-410-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 05:06:11

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 09:59:14

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.081	711993	100.000	107976	5235	1.144	--
总计		711993	100.000	107976			

图16 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-411-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 05:10:34

实验者: wangdan


处理时间 (V2) : 2024/08/02 09:59:17

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.081	719326	100.000	109043	5232	1.144	--
总计		719326	100.000	109043			

图17 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-412-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 05:14:55

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 09:59:21

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.082	710656	100.000	107634	5234	1.145	--
总计		710656	100.000	107634			

图18 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-413-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 05:19:16

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 09:59:24

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.081	1178375	100.000	178538	5228	1.145	--
总计		1178375	100.000	178538			

图19 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-414-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 05:23:38

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 09:59:27

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.081	1186030	100.000	179641	5225	1.145	--
总计		1186030	100.000	179641			

图20 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-415-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 05:28:00

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 09:59:30

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.081	1233428	100.000	186770	5230	1.145	--
总计		1233428	100.000	186770			

图21 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-416-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 05:32:22

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 09:59:33

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.082	1120784	100.000	169640	5227	1.146	--
总计		1120784	100.000	169640			

图22 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-417-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 05:36:44

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 09:59:36

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.082	1125375	100.000	170232	5225	1.146	--
总计		1125375	100.000	170232			

图23 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-418-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 05:41:05

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 09:59:39

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.081	1127720	100.000	170764	5229	1.145	--
总计		1127720	100.000	170764			

图24 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-419-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 05:45:27

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 09:59:42

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.081	1528263	100.000	231243	5221	1.146	--
总计		1528263	100.000	231243			

图25 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-420-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 05:49:49

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 09:59:46

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.082	1560689	100.000	235968	5222	1.146	--
总计		1560689	100.000	235968			

图26 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-421-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 05:54:11

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 09:59:49

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.081	1588074	100.000	240427	5222	1.146	--
总计		1588074	100.000	240427			

图27 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-422-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 05:58:33

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 09:59:53

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.083	1486657	100.000	224555	5221	1.146	--
总计		1486657	100.000	224555			

图28 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-423-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 06:02:55

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 09:59:58

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.081	1471825	100.000	222614	5218	1.146	--
总计		1471825	100.000	222614			

图29 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-424-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 5 μl

进样时间:2024/08/02 06:07:16

处理时间 (V2) : 2024/08/02 10:00:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.082	1474428	100.000	222866	5210	1.146	--
总计		1474428	100.000	222866			

图30 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-425-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 06:11:38

实验者: wangdan


处理时间 (V2) : 2024/08/02 10:00:05

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.082	2059197	100.000	311128	5212	1.147	--
总计		2059197	100.000	311128			

图31 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-426-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 06:16:00

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 10:00:08

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.082	2106069	100.000	318317	5217	1.147	--
总计		2106069	100.000	318317			

图32 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-427-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 06:20:22

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 10:00:12

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.082	2122541	100.000	320590	5208	1.147	--
总计		2122541	100.000	320590			

图33 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-428-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 06:24:44

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 10:00:15

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.082	2014176	100.000	304131	5212	1.147	--
总计		2014176	100.000	304131			

图34 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-429-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 06:29:06

实验者: wangdan


处理时间 (V2) : 2024/08/02 10:00:19

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.082	2007254	100.000	303290	5208	1.146	--
总计		2007254	100.000	303290			

图35 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-430-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 06:33:28

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 10:00:23

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.082	2016481	100.000	304390	5206	1.147	--
总计		2016481	100.000	304390			

图36 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-431-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 06:37:49

实验者: wangdan


处理时间 (V2) : 2024/08/02 10:00:27

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.082	2540417	100.000	383633	5206	1.147	--
总计		2540417	100.000	383633			

图37 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-432-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 06:42:10

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 10:00:30

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.082	2558923	100.000	386213	5203	1.147	--
总计		2558923	100.000	386213			

图38 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-433-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 5 μ l

进样时间:2024/08/02 06:46:33

处理时间 (V2) : 2024/08/02 10:00:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.083	2576819	100.000	387889	5202	1.148	--
总计		2576819	100.000	387889			

图39 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-434-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 06:50:55

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 10:00:37

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.083	2496355	100.000	376583	5205	1.147	--
总计		2496355	100.000	376583			

图40 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-435-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 06:55:17

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 10:00:41

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.083	2494848	100.000	376107	5197	1.147	--
总计		2494848	100.000	376107			

图41 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-436-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 06:59:38

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 10:00:44

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.083	2487982	100.000	374792	5203	1.147	--
总计		2487982	100.000	374792			

图42 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-437-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 07:04:00

实验者: wangdan


处理时间 (V2) : 2024/08/02 10:00:48

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.082	2754512	100.000	415317	5198	1.148	--
总计		2754512	100.000	415317			

图43 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-438-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 07:08:21

实验者: wangdan


处理时间 (V2) : 2024/08/02 10:00:52

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.083	2734462	100.000	411803	5191	1.148	--
总计		2734462	100.000	411803			

图44 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-439-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 07:12:43

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 10:00:55

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.083	2776007	100.000	418166	5201	1.148	--
总计		2776007	100.000	418166			

图45 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-440-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 07:17:05

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 10:00:59

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.083	2730827	100.000	411614	5196	1.148	--
总计		2730827	100.000	411614			

图46 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-441-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 07:21:27

实验者: wangdan


处理时间 (V2) : 2024/08/02 10:01:03

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.083	2721414	100.000	409552	5190	1.148	--
总计		2721414	100.000	409552			

图47 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-442-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 07:25:48

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 10:01:07

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.084	2710249	100.000	407580	5195	1.148	--
总计		2710249	100.000	407580			

图48 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-60min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-443-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p1-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 5 μl

进样时间:2024/08/02 07:30:11

处理时间 (V2) : 2024/08/02 10:01:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.083	2844680	100.000	428096	5189	1.148	--
总计		2844680	100.000	428096			

图49 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-444-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p2-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 07:34:34

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 10:01:13

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.084	2827227	100.000	424840	5190	1.147	--
总计		2827227	100.000	424840			

图50 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-445-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p3-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 07:38:56

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 10:01:17

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.083	2876920	100.000	432808	5185	1.148	--
总计		2876920	100.000	432808			

图51 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-446-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p4-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 5 μl

进样时间:2024/08/02 07:43:19

处理时间 (V2) : 2024/08/02 10:01:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: wangdan

处理者: wangdan

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.083	2830765	100.000	425669	5185	1.148	--
总计		2830765	100.000	425669			

图52 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-447-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p5-jxzs.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 07:47:42

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 10:01:25

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.084	2823920	100.000	424330	5186	1.148	--
总计		2823920	100.000	424330			

图53 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-448-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-p6-jxzs.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 5 μl
进样时间:2024/08/02 07:52:04
处理时间 (V2) : 2024/08/02 10:01:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.084	2835721	100.000	425741	5180	1.148	--
总计		2835721	100.000	425741			

图54 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-449-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 07:56:26

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 10:01:32

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.075	3029257	100.000	444413	4882	1.145	--
总计		3029257	100.000	444413			

图55 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-153/23-450-2 - zzp1-2-2023011111p-0.2g-rcqx-pH1.0-0.5tw-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-RCQX-FX272.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20240801-FX272.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2024/08/02 08:00:49

实验者: wangdan


处理时间 (V2): 2024/08/02 10:01:36

处理者: wangdan

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX272)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.075	3038198	100.000	445557	4885	1.145	--
总计		3038198	100.000	445557			

图56 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween)介质
对照品溶液-2-2