SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-153-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-rj.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 14:03:24
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:17:40
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-154-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 14:07:24
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:17:44
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.819	473874	100.000	51911	2290	1.189	--
总计		473874	100.000	51911			

图2 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-155-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 14:11:17
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:17:47
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.820	473975	100.000	51957	2290	1.189	--
总计		473975	100.000	51957			

图3 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-156-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 14:15:10
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:17:49
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.819	474085	100.000	51885	2285	1.188	--
总计		474085	100.000	51885			

图4 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-157-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 14:19:03
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:17:52
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.819	473816	100.000	51889	2287	1.188	--
总计		473816	100.000	51889			

图5 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-158-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 14:22:57
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:17:56
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.819	473778	100.000	51900	2288	1.187	--
总计		473778	100.000	51900			

图6 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-159-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 14:26:49
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:17:58
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	537179	100.000	59823	2384	1.193	--
总计		537179	100.000	59823			

图7 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-160-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 14:30:41
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:18:01
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.827	514247	100.000	57232	2381	1.191	--
总计		514247	100.000	57232			

图8 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-161-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 14:34:34
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:18:04
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	513211	100.000	57150	2382	1.190	--
总计		513211	100.000	57150			

图9 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-162-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 14:38:25
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:18:06
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.826	515028	100.000	57297	2382	1.190	--
总计		515028	100.000	57297			

图10 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-163-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 14:42:16
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:18:09
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.826	537803	100.000	59850	2384	1.193	--
总计		537803	100.000	59850			

图11 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-164-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 14:46:06
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:18:12
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.826	542522	100.000	60288	2377	1.193	--
总计		542522	100.000	60288			

图12 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-165-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 14:49:58
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:18:14
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.828	542585	100.000	60434	2384	1.192	--
总计		542585	100.000	60434			

图13 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-166-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 14:53:51
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:18:17
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.826	522047	100.000	58053	2381	1.191	--
总计		522047	100.000	58053			

图14 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-167-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 14:57:41
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:18:19
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.826	529635	100.000	58914	2382	1.191	--
总计		529635	100.000	58914			

图15 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-168-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 15:01:33
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:18:22
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.826	523338	100.000	58237	2383	1.191	--
总计		523338	100.000	58237			

图16 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-169-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 15:05:25
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:18:25
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	543065	100.000	60431	2380	1.193	--
总计		543065	100.000	60431			

图17 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-170-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 15:09:16
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:18:27
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	548841	100.000	61108	2379	1.193	--
总计		548841	100.000	61108			

图18 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-171-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 15:13:08
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:18:30
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.827	542324	100.000	60335	2381	1.193	--
总计		542324	100.000	60335			

图19 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-172-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 15:17:00
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:18:32
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.827	511255	100.000	56944	2386	1.190	--
总计		511255	100.000	56944			

图20 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-173-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 15:20:52
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:18:35
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.826	531447	100.000	59105	2380	1.192	--
总计		531447	100.000	59105			

图21 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-174-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 15:24:44
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:18:38
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.827	521366	100.000	58075	2386	1.191	--
总计		521366	100.000	58075			

图22 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-175-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 15:28:36
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:18:40
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.826	542581	100.000	60365	2382	1.192	--
总计		542581	100.000	60365			

图23 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-176-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 15:32:28
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:18:43
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.826	549268	100.000	61094	2382	1.193	--
总计		549268	100.000	61094			

图24 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-177-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 15:36:19
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:18:45
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.826	541532	100.000	60252	2385	1.193	--
总计		541532	100.000	60252			

图25 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-178-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 15:40:11
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:18:48
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.826	523891	100.000	58324	2387	1.193	--
总计		523891	100.000	58324			

图26 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-179-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 15:44:03
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:18:51
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	529316	100.000	58972	2386	1.193	--
总计		529316	100.000	58972			

图27 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-180-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 15:47:55
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:18:54
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	521861	100.000	58106	2382	1.192	--
总计		521861	100.000	58106			

图28 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-181-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 15:51:47
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:18:57
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.824	539832	100.000	60192	2386	1.192	--
总计		539832	100.000	60192			

图29 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-182-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 15:55:39
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:19:00
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	549761	100.000	61227	2384	1.193	--
总计		549761	100.000	61227			

图30 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-183-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 15:59:32
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:19:02
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.826	542976	100.000	60420	2384	1.194	--
总计		542976	100.000	60420			

图31 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-184-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 16:03:24
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:19:05
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.826	527107	100.000	58650	2383	1.193	--
总计		527107	100.000	58650			

图32 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-185-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 16:07:15
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:19:08
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.824	529094	100.000	58986	2383	1.193	--
总计		529094	100.000	58986			

图33 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-186-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 16:11:06
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:19:10
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	523284	100.000	58212	2382	1.193	--
总计		523284	100.000	58212			

图34 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-187-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 16:14:58
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:19:13
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	539518	100.000	60066	2385	1.193	--
总计		539518	100.000	60066			

图35 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-188-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 16:18:51
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:19:15
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.824	550135	100.000	61357	2387	1.194	--
总计		550135	100.000	61357			

图36 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-189-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-45min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 16:22:42
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:19:18
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	540998	100.000	60293	2385	1.193	--
总计		540998	100.000	60293			

图37 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-190-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-45min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 16:26:35
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:19:21
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	527272	100.000	58770	2387	1.192	--
总计		527272	100.000	58770			

图38 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-191-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-45min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 16:30:28
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:19:23
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	529929	100.000	59000	2381	1.193	--
总计		529929	100.000	59000			

图39 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-192-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-45min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 16:34:20
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:19:26
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.824	524963	100.000	58513	2386	1.193	--
总计		524963	100.000	58513			

图40 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-193-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-45min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 16:38:12
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:19:28
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.824	539494	100.000	60117	2383	1.192	--
总计		539494	100.000	60117			

图41 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-194-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-45min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 16:42:04
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:19:31
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.824	551841	100.000	61556	2386	1.194	--
总计		551841	100.000	61556			

图42 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-195-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 16:45:56
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:19:34
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	540989	100.000	60273	2386	1.193	--
总计		540989	100.000	60273			

图43 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-196-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 16:49:49
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:19:36
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.826	529384	100.000	58885	2384	1.192	--
总计		529384	100.000	58885			

图44 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-197-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 16:53:40
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:19:39
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	536582	100.000	59783	2385	1.193	--
总计		536582	100.000	59783			

图45 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-198-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 16:57:30
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:19:41
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	528671	100.000	58924	2385	1.192	--
总计		528671	100.000	58924			

图46 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-199-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 17:01:23
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:19:44
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	538679	100.000	59976	2382	1.193	--
总计		538679	100.000	59976			

图47 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-200-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 17:05:16
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:19:47
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	555372	100.000	61871	2388	1.194	--
总计		555372	100.000	61871			

图48 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-201-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 17:09:10
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:19:49
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.816	473565	100.000	51997	2291	1.188	--
总计		473565	100.000	51997			

图49 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-202-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-btq-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 17:13:26
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:19:52
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.814	474329	100.000	52054	2288	1.189	--
总计		474329	100.000	52054			

图50 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-不脱气-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-203-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-rj.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 17:17:19
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:19:55
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图51 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-204-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 17:21:13
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:19:57
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.815	473082	100.000	51987	2295	1.188	--
总计		473082	100.000	51987			

图52 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-205-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 17:25:07
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:20:00
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.815	473235	100.000	51984	2292	1.187	--
总计		473235	100.000	51984			

图53 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-206-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 17:29:01
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:20:03
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.815	473755	100.000	52019	2292	1.188	--
总计		473755	100.000	52019			

图54 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-207-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 17:32:54
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:20:05
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.815	473226	100.000	51936	2290	1.188	--
总计		473226	100.000	51936			

图55 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-208-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 17:36:49
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:20:08
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.815	472788	100.000	51937	2293	1.188	--
总计		472788	100.000	51937			

图56 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-209-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 17:40:41
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:20:11
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.824	514973	100.000	57499	2392	1.193	--
总计		514973	100.000	57499			

图57 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-210-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 17:44:34
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:20:13
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.824	537451	100.000	59872	2381	1.194	--
总计		537451	100.000	59872			

图58 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-211-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 17:48:26
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:20:16
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	524595	100.000	58517	2384	1.193	--
总计		524595	100.000	58517			

图59 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-212-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 17:52:19
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:20:19
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.825	521440	100.000	58059	2388	1.193	--
总计		521440	100.000	58059			

图60 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-213-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 17:56:12
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:20:21
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.824	543106	100.000	60545	2385	1.195	--
总计		543106	100.000	60545			

图61 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-214-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 18:00:05
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:20:24
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.824	521087	100.000	58052	2384	1.193	--
总计		521087	100.000	58052			

图62 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-215-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 18:03:58
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:20:26
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	532925	100.000	59447	2383	1.193	--
总计		532925	100.000	59447			

图63 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-216-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 18:07:51
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:20:29
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	548004	100.000	61135	2384	1.195	--
总计		548004	100.000	61135			

图64 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-217-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 18:11:44
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:20:31
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	535657	100.000	59755	2385	1.195	--
总计		535657	100.000	59755			

图65 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-218-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 18:15:37
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:20:34
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	529876	100.000	59094	2382	1.195	--
总计		529876	100.000	59094			

图66 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-219-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 18:19:30
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:20:37
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	550597	100.000	61454	2383	1.196	--
总计		550597	100.000	61454			

图67 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-220-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 18:23:23
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:20:39
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	531724	100.000	59320	2381	1.195	--
总计		531724	100.000	59320			

图68 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-221-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 18:27:17
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:20:42
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	534306	100.000	59635	2386	1.195	--
总计		534306	100.000	59635			

图69 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-222-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 18:31:10
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:20:44
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	550013	100.000	61317	2379	1.196	--
总计		550013	100.000	61317			

图70 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-223-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 18:35:04
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:20:47
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	537677	100.000	59977	2383	1.196	--
总计		537677	100.000	59977			

图71 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-224-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 18:38:57
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:20:49
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	528763	100.000	59057	2388	1.194	--
总计		528763	100.000	59057			

图72 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-225-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 18:42:50
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:20:52
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	553035	100.000	61647	2378	1.197	--
总计		553035	100.000	61647			

图73 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-226-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 18:46:43
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:20:55
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	532138	100.000	59368	2383	1.195	--
总计		532138	100.000	59368			

图74 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-227-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 18:50:37
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:20:58
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	535776	100.000	59714	2382	1.196	--
总计		535776	100.000	59714			

图75 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-228-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 18:54:30
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:21:01
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	550754	100.000	61400	2382	1.196	--
总计		550754	100.000	61400			

图76 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-229-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 18:58:25
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:21:04
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	537618	100.000	60006	2386	1.196	--
总计		537618	100.000	60006			

图77 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-230-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 19:02:18
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:21:06
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	528992	100.000	59039	2383	1.195	--
总计		528992	100.000	59039			

图78 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-231-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 19:06:12
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:21:09
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	552810	100.000	61699	2385	1.197	--
总计		552810	100.000	61699			

图79 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-232-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 19:10:06
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:21:12
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	533666	100.000	59523	2383	1.195	--
总计		533666	100.000	59523			

图80 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-233-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 19:13:58
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:21:14
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	534811	100.000	59685	2385	1.196	--
总计		534811	100.000	59685			

图81 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-234-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 19:17:52
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:21:17
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	549141	100.000	61239	2382	1.197	--
总计		549141	100.000	61239			

图82 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-235-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 19:21:46
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:21:19
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	538860	100.000	60105	2381	1.195	--
总计		538860	100.000	60105			

图83 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-236-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 19:25:39
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:21:22
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	528553	100.000	58988	2385	1.196	--
总计		528553	100.000	58988			

图84 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-237-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 19:29:31
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:21:25
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	553140	100.000	61728	2385	1.197	--
总计		553140	100.000	61728			

图85 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-238-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 19:33:24
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:21:28
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	532247	100.000	59362	2384	1.195	--
总计		532247	100.000	59362			

图86 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-239-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-45min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 19:37:17
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:21:30
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	533866	100.000	59573	2385	1.195	--
总计		533866	100.000	59573			

图87 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-240-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-45min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 19:41:11
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:21:33
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	547867	100.000	61169	2386	1.195	--
总计		547867	100.000	61169			

图88 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-241-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-45min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 19:45:04
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:21:36
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	537425	100.000	59913	2382	1.196	--
总计		537425	100.000	59913			

图89 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-242-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-45min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 19:48:58
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:21:38
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	528487	100.000	58973	2387	1.195	--
总计		528487	100.000	58973			

图90 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-243-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-45min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 19:52:53
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:21:41
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	551031	100.000	61479	2386	1.197	--
总计		551031	100.000	61479			

图91 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-244-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-45min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 19:56:46
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:21:44
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	531250	100.000	59205	2382	1.195	--
总计		531250	100.000	59205			

图92 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-245-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 20:00:40
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:21:46
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	531761	100.000	59340	2389	1.195	--
总计		531761	100.000	59340			

图93 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-246-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 20:04:36
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:21:49
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	547568	100.000	61054	2381	1.197	--
总计		547568	100.000	61054			

图94 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-247-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 20:08:29
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:21:52
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	537620	100.000	59960	2378	1.196	--
总计		537620	100.000	59960			

图95 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-248-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 20:12:21
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:21:55
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	528208	100.000	58924	2384	1.196	--
总计		528208	100.000	58924			

图96 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-249-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 20:16:15
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:21:57
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.820	548130	100.000	61109	2379	1.197	--
总计		548130	100.000	61109			

图97 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-250-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 20:20:09
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:22:00
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	530307	100.000	59109	2380	1.196	--
总计		530307	100.000	59109			

图98 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-251-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 20:24:03
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:22:03
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.811	474232	100.000	52021	2286	1.191	--
总计		474232	100.000	52021			

图99 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-252-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-36d-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 20:27:57
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:22:05
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.811	472797	100.000	51919	2290	1.192	--
总计		472797	100.000	51919			

图100 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-36℃-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-253-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-rj.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 20:31:50
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:22:08
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图101 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-254-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 20:35:42
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:22:11
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.811	471656	100.000	51785	2291	1.192	--
总计		471656	100.000	51785			

图102 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-255-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 20:39:33
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:22:13
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.812	473271	100.000	52015	2294	1.192	--
总计		473271	100.000	52015			

图103 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-256-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 20:43:26
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:22:16
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.813	473222	100.000	52017	2294	1.191	--
总计		473222	100.000	52017			

图104 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-257-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 20:47:18
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:22:19
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.811	472490	100.000	51893	2292	1.192	--
总计		472490	100.000	51893			

图105 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-258-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 20:51:10
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:22:21
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.812	472965	100.000	51969	2292	1.191	--
总计		472965	100.000	51969			

图106 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-259-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 20:55:03
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:22:24
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	521929	100.000	58259	2386	1.196	--
总计		521929	100.000	58259			

图107 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38°C-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-260-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 20:58:54
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:22:27
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	535754	100.000	59728	2381	1.197	--
总计		535754	100.000	59728			

图108 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-261-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 21:02:46
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:22:29
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	544920	100.000	60771	2382	1.197	--
总计		544920	100.000	60771			

图109 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-262-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 21:06:38
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:22:32
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	528576	100.000	58937	2381	1.196	--
总计		528576	100.000	58937			

图110 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-263-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 21:10:31
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:22:34
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	515386	100.000	57492	2383	1.195	--
总计		515386	100.000	57492			

图111 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-264-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 21:14:22
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:22:37
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	531113	100.000	59249	2386	1.196	--
总计		531113	100.000	59249			

图112 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-265-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 21:18:12
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:22:40
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	534475	100.000	59635	2388	1.197	--
总计		534475	100.000	59635			

图113 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-266-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 21:22:04
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:22:42
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	545101	100.000	60803	2383	1.196	--
总计		545101	100.000	60803			

图114 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-267-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 21:25:56
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:22:45
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.820	554152	100.000	61849	2386	1.198	--
总计		554152	100.000	61849			

图115 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-268-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 21:29:47
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:22:47
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	541940	100.000	60423	2381	1.196	--
总计		541940	100.000	60423			

图116 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-269-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 21:33:38
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:22:50
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	525846	100.000	58688	2387	1.196	--
总计		525846	100.000	58688			

图117 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-270-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 21:37:31
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:22:53
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	542910	100.000	60578	2386	1.197	--
总计		542910	100.000	60578			

图118 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-271-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 21:41:21
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:22:55
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	535570	100.000	59682	2379	1.197	--
总计		535570	100.000	59682			

图119 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-272-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 21:45:12
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:22:58
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	543615	100.000	60606	2382	1.197	--
总计		543615	100.000	60606			

图120 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-273-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 21:49:04
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:23:01
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	554815	100.000	61824	2379	1.198	--
总计		554815	100.000	61824			

图121 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-274-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 21:52:56
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:23:04
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	545007	100.000	60742	2382	1.197	--
总计		545007	100.000	60742			

图122 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-275-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 21:56:46
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:23:06
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	527251	100.000	58767	2382	1.196	--
总计		527251	100.000	58767			

图123 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-276-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 22:00:39
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:23:09
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	544342	100.000	60646	2378	1.197	--
总计		544342	100.000	60646			

图124 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-277-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 22:04:30
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:23:12
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	535037	100.000	59686	2384	1.196	--
总计		535037	100.000	59686			

图125 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-278-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 22:08:21
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:23:14
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	544509	100.000	60663	2378	1.197	--
总计		544509	100.000	60663			

图126 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-279-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 22:12:13
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:23:17
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	552716	100.000	61671	2387	1.198	--
总计		552716	100.000	61671			

图127 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-280-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 22:16:04
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:23:20
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	543559	100.000	60625	2385	1.198	--
总计		543559	100.000	60625			

图128 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-281-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 22:19:56
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:23:22
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	525201	100.000	58560	2386	1.196	--
总计		525201	100.000	58560			

图129 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
流速: 1.8ml/min
柱 温:30℃
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-282-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 22:23:47
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:23:25
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	543558	100.000	60621	2385	1.197	--
总计		543558	100.000	60621			

图130 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-283-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 22:27:39
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:23:28
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	536779	100.000	59862	2385	1.196	--
总计		536779	100.000	59862			

图131 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-284-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 22:31:31
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:23:30
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	543020	100.000	60533	2382	1.196	--
总计		543020	100.000	60533			

图132 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-285-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 22:35:23
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:23:33
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	553422	100.000	61720	2385	1.198	--
总计		553422	100.000	61720			

图133 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-286-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 22:39:13
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:23:36
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	543900	100.000	60673	2386	1.197	--
总计		543900	100.000	60673			

图134 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-287-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 22:43:05
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:23:38
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	525864	100.000	58652	2385	1.195	--
总计		525864	100.000	58652			

图135 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-288-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 22:46:55
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:23:41
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	543174	100.000	60592	2388	1.196	--
总计		543174	100.000	60592			

图136 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-289-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-45min-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 22:50:47
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:23:43
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	536914	100.000	59845	2384	1.196	--
总计		536914	100.000	59845			

图137 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-290-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-45min-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 22:54:38
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:23:46
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	542746	100.000	60529	2385	1.197	--
总计		542746	100.000	60529			

图138 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-291-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-45min-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 22:58:30
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:23:49
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	551638	100.000	61547	2386	1.198	--
总计		551638	100.000	61547			

图139 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-292-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-45min-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 23:02:20
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:23:51
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.821	545358	100.000	60754	2378	1.197	--
总计		545358	100.000	60754			

图140 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-293-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-45min-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 23:06:12
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:23:54
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	525390	100.000	58591	2385	1.196	--
总计		525390	100.000	58591			

图141 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-294-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-45min-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 23:10:02
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:23:56
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	543132	100.000	60576	2384	1.197	--
总计		543132	100.000	60576			

图142 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-295-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 23:13:53
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:23:59
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	534928	100.000	59648	2384	1.198	--
总计		534928	100.000	59648			

图143 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-296-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 23:17:44
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:24:02
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	541648	100.000	60400	2387	1.197	--
总计		541648	100.000	60400			

图144 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-297-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 23:21:36
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:24:04
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	551674	100.000	61509	2386	1.198	--
总计		551674	100.000	61509			

图145 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-298-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 23:25:26
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:24:08
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	544581	100.000	60687	2381	1.198	--
总计		544581	100.000	60687			

图146 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-299-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 23:29:16
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:24:11
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.823	525889	100.000	58651	2385	1.196	--
总计		525889	100.000	58651			

图147 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-300-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 23:33:06
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:24:13
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.822	541528	100.000	60354	2382	1.198	--
总计		541528	100.000	60354			

图148 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-301-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 23:36:57
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:24:16
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.813	471903	100.000	51791	2289	1.191	--
总计		471903	100.000	51791			

图149 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

SZJ-4096

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
流速: 1.8ml/min
波长: 290nm
数据文件名: RC$SZJ-4096 - 7-6/27-302-2 - zzp-2024051711p-rcqx-pH2.0jz-lf100z-38d-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$SZJ-4096 - RCFF-FX276.lcm
批处理文件名: RC$SZJ-4096 - 20240807-RCQX-FX276.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/07 23:40:49
实验者: jiangjinwei
处理时间（V2）: 2024/08/10 10:24:19
处理者: jiangjinwei
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 290nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.813	472385	100.000	51872	2292	1.192	--
总计		472385	100.000	51872			

图150 枸橼酸西地那非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024051711批-38℃-pH2.0介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2