




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1536-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-rj.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-9  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 14:22:29      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:50:06      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转  
 溶剂

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1537-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-18  
 进样体积 : 40 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 14:26:56      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:50:11      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.779	2830911	100.000	502139	5823	1.101	--
总计		2830911	100.000	502139			

图2 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转  
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1538-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-18  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 14:31:21      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:50:14      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.779	2831930	100.000	502326	5827	1.100	--
总计		2831930	100.000	502326			

图3 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-2




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1539-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-18  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 14:35:45      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:50:18      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.779	2831369	100.000	502281	5830	1.098	--
总计		2831369	100.000	502281			

图4 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-3




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1540-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-18  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 14:40:12      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:50:21      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.779	2831793	100.000	502721	5835	1.095	--
总计		2831793	100.000	502721			

图5 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1541-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-dz1-5.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-18  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 14:44:38      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:50:24      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.780	2829925	100.000	503470	5852	1.093	--
总计		2829925	100.000	503470			

图6 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转  
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1542-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-5min-P1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-1  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 14:49:04      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:50:27      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.805	2218193	100.000	424982	6964	1.078	--
总计		2218193	100.000	424982			

图7 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1543-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-5min-P2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-10  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 14:53:29      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:50:30      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.805	2195325	100.000	421066	6986	1.075	--
总计		2195325	100.000	421066			

图8 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1544-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-5min-P3.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-19  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 14:57:53      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:50:33      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.805	2211015	100.000	424051	6971	1.073	--
总计		2211015	100.000	424051			

图9 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3  
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1545-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-5min-P4.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-28  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 15:02:17      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:50:36      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	2159274	100.000	413897	6974	1.071	--
总计		2159274	100.000	413897			

图10 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1546-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-5min-P5.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-37  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 15:06:41      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:50:39      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	2183083	100.000	418378	6972	1.069	--
总计		2183083	100.000	418378			

图11 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1547-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-5min-P6.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-46  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 15:11:05      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:50:42      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	2074478	100.000	397410	6970	1.067	--
总计		2074478	100.000	397410			

图12 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1548-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-10min-P1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-2  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 15:15:28      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:50:45      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	2715877	100.000	520069	6964	1.065	--
总计		2715877	100.000	520069			

图13 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1549-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-10min-P2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-11  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 15:19:53      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:50:49      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	2663464	100.000	509718	6959	1.063	--
总计		2663464	100.000	509718			

图14 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1550-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-10min-P3.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-20  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 15:24:17      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:50:52      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	2680473	100.000	512915	6955	1.061	--
总计		2680473	100.000	512915			

图15 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1551-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-10min-P4.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-29  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 15:28:41      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:50:55      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2649749	100.000	506613	6950	1.060	--
总计		2649749	100.000	506613			

图16 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1552-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-10min-P5.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-38  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 15:33:05      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:50:58      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2655556	100.000	507616	6943	1.059	--
总计		2655556	100.000	507616			

图17 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1553-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-10min-P6.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-47  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 15:37:29      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:51:01      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2602335	100.000	496443	6944	1.058	--
总计		2602335	100.000	496443			

图18 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1554-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-15min-P1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-3  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 15:41:53      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:51:04      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2843460	100.000	542205	6940	1.057	--
总计		2843460	100.000	542205			

图19 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1555-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-15min-P2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-12  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 15:46:17      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:51:07      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	2808975	100.000	535066	6931	1.056	--
总计		2808975	100.000	535066			

图20 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1556-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-15min-P3.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-21  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 15:50:42      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:51:10      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	2800728	100.000	533019	6927	1.056	--
总计		2800728	100.000	533019			

图21 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1557-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-15min-P4.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-30  
 进样体积 : 40 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 15:55:06      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:51:13      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2844994	100.000	542637	6911	1.055	--
总计		2844994	100.000	542637			

图22 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1558-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-15min-P5.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-39  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 15:59:30      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:51:16      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2789961	100.000	531911	6912	1.054	--
总计		2789961	100.000	531911			

图23 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1559-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-15min-P6.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-48  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 16:03:54      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:51:20      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2756761	100.000	525377	6912	1.053	--
总计		2756761	100.000	525377			

图24 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1560-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-20min-P1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-4  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 16:08:18      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:51:23      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	2922654	100.000	555620	6904	1.052	--
总计		2922654	100.000	555620			

图25 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1561-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-20min-P2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-13  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 16:12:42      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:51:26      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	2867189	100.000	545185	6907	1.052	--
总计		2867189	100.000	545185			

图26 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1562-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-20min-P3.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-22  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 16:17:05      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:51:29      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	2858937	100.000	542693	6895	1.051	--
总计		2858937	100.000	542693			

图27 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1563-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-20min-P4.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-31  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 16:21:29      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:51:32      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	2924336	100.000	554745	6887	1.050	--
总计		2924336	100.000	554745			

图28 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1564-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-20min-P5.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-40  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 16:25:53      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:51:36      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	2845662	100.000	539660	6887	1.050	--
总计		2845662	100.000	539660			

图29 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1565-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-20min-P6.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-49  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 16:30:17      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:51:39      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	2824673	100.000	535730	6878	1.049	--
总计		2824673	100.000	535730			

图30 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1566-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-30min-P1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-5  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 16:34:42      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:51:42      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	3005593	100.000	568951	6870	1.048	--
总计		3005593	100.000	568951			

图31 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1567-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-30min-P2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-14  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 16:39:06      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:51:45      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	2962868	100.000	561086	6866	1.047	--
总计		2962868	100.000	561086			

图32 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1568-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-30min-P3.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-23  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 16:43:30      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:51:48      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2929828	100.000	556405	6861	1.047	--
总计		2929828	100.000	556405			

图33 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1569-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-30min-P4.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-32  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 16:47:54      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:51:52      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2988902	100.000	566775	6853	1.046	--
总计		2988902	100.000	566775			

图34 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1570-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-30min-P5.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-41  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 16:52:18      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:51:55      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2918949	100.000	553729	6843	1.045	--
总计		2918949	100.000	553729			

图35 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1571-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-30min-P6.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-50  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 16:56:41      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:51:58      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	2892701	100.000	548141	6852	1.045	--
总计		2892701	100.000	548141			

图36 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1572-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-45min-P1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-6  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 17:01:05      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:52:01      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	3043631	100.000	577358	6833	1.044	--
总计		3043631	100.000	577358			

图37 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1573-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-45min-P2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-15  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 17:05:29      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:52:04      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	3041713	100.000	576348	6819	1.044	--
总计		3041713	100.000	576348			

图38 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1574-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-45min-P3.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-24  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 17:09:53      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:52:07      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2971810	100.000	563220	6822	1.043	--
总计		2971810	100.000	563220			

图39 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1575-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-45min-P4.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-33  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 17:14:17      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:52:11      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	3025204	100.000	572645	6823	1.043	--
总计		3025204	100.000	572645			

图40 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1576-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-45min-P5.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-42  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 17:18:41      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:52:14      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2964877	100.000	561264	6811	1.042	--
总计		2964877	100.000	561264			

图41 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1577-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-45min-P6.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-51  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 17:23:05      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:52:17      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2970770	100.000	561945	6815	1.041	--
总计		2970770	100.000	561945			

图42 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1578-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-60min-P1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-7  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 17:27:29      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:52:20      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	3051874	100.000	576394	6808	1.041	--
总计		3051874	100.000	576394			

图43 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1579-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-60min-P2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-16  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 17:31:54      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:52:23      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	3056366	100.000	577104	6811	1.040	--
总计		3056366	100.000	577104			

图44 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1580-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-60min-P3.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-25  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 17:36:18      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:52:26      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	2984361	100.000	563081	6800	1.040	--
总计		2984361	100.000	563081			

图45 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1581-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-60min-P4.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-34  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 17:40:42      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:52:30      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	3035525	100.000	572726	6789	1.040	--
总计		3035525	100.000	572726			

图46 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1582-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-60min-P5.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-43  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 17:45:06      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:52:33      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2985884	100.000	564312	6783	1.039	--
总计		2985884	100.000	564312			

图47 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1583-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-60min-P6.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-52  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 17:49:30      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:52:36      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2998879	100.000	566303	6768	1.038	--
总计		2998879	100.000	566303			

图48 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1584-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-JX-P1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-8  
 进样体积 : 40 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 17:53:55      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:52:39      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	3075143	100.000	580120	6780	1.038	--
总计		3075143	100.000	580120			

图49 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1585-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-JX-P2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-17  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 17:58:20      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:52:42      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	3114390	100.000	587018	6775	1.038	--
总计		3114390	100.000	587018			

图50 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1586-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-JX-P3.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-26  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 18:02:45      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:52:45      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	3045564	100.000	573697	6767	1.037	--
总计		3045564	100.000	573697			

图51 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1587-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-JX-P4.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-35  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 18:07:10      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:52:48      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	3092273	100.000	582118	6757	1.037	--
总计		3092273	100.000	582118			

图52 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1588-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-JX-P5.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-44  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 18:11:35      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:52:51      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	3067293	100.000	577985	6761	1.037	--
总计		3067293	100.000	577985			

图53 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1589-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-JX-P6.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-53  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 18:16:00      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:52:54      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	3054248	100.000	575143	6742	1.036	--
总计		3054248	100.000	575143			

图54 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1590-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-27  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 18:20:25      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:52:57      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.782	2850821	100.000	500870	5722	1.053	--
总计		2850821	100.000	500870			

图55 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转  
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1591-3 - 2024053011p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-dz2-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 1-27  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 18:24:50      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:53:00      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.783	2856110	100.000	500986	5718	1.053	--
总计		2856110	100.000	500986			

图56 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转  
 对照品溶液-2-2




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1592-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-rj.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-9  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 18:29:16      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:53:04      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转  
 溶剂




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1593-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 18:33:42      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:53:08      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.781	2836764	100.000	496869	5672	1.053	--
总计		2836764	100.000	496869			

图58 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转  
 对照品溶液-1-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1594-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 18:38:08      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:53:11      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.781	2836712	100.000	496559	5666	1.052	--
总计		2836712	100.000	496559			

图59 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-2




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1595-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 18:42:34      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:53:14      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.782	2834958	100.000	495739	5670	1.052	--
总计		2834958	100.000	495739			

图60 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转  
 对照品溶液-1-3




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1596-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 18:47:00      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:53:17      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.782	2835269	100.000	495218	5660	1.052	--
总计		2835269	100.000	495218			

图61 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1597-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-dz1-5.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 18:51:26      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:53:21      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.781	2836234	100.000	495527	5649	1.051	--
总计		2836234	100.000	495527			

图62 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1598-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-5min-P1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-1  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 18:55:52      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:53:24      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	2137780	100.000	401801	6694	1.034	--
总计		2137780	100.000	401801			

图63 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1  
供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1599-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-5min-P2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-10  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 19:00:17      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:53:27      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	2094946	100.000	393641	6693	1.033	--
总计		2094946	100.000	393641			

图64 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1600-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-5min-P3.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-19  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 19:04:42      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:53:30      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2211330	100.000	415142	6687	1.032	--
总计		2211330	100.000	415142			

图65 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1601-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-5min-P4.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-28  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 19:09:07      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:53:33      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2011284	100.000	377543	6693	1.032	--
总计		2011284	100.000	377543			

图66 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1602-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-5min-P5.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-37  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 19:13:32      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:53:36      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2142594	100.000	401644	6683	1.032	--
总计		2142594	100.000	401644			

图67 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1603-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-5min-P6.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-46  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 19:17:57      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:53:39      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	2089392	100.000	392028	6675	1.031	--
总计		2089392	100.000	392028			

图68 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1604-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-10min-P1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-2  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 19:22:22      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:53:43      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2663727	100.000	499268	6669	1.030	--
总计		2663727	100.000	499268			

图69 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1605-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-10min-P2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-11  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 19:26:48      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:53:46      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2614413	100.000	489712	6666	1.030	--
总计		2614413	100.000	489712			

图70 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1606-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-10min-P3.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-20  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 19:31:13      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:53:49      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2671919	100.000	500131	6661	1.029	--
总计		2671919	100.000	500131			

图71 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1607-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-10min-P4.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-29  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 19:35:38      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:53:52      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2607504	100.000	488449	6658	1.030	--
总计		2607504	100.000	488449			

图72 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1608-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-10min-P5.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-38  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 19:40:03      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:53:55      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2693681	100.000	504007	6656	1.029	--
总计		2693681	100.000	504007			

图73 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1609-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-10min-P6.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-47  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 19:44:28      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:53:58      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2630074	100.000	492146	6644	1.028	--
总计		2630074	100.000	492146			

图74 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1610-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-15min-P1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-3  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 19:48:54      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:54:01      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2808156	100.000	525132	6642	1.029	--
总计		2808156	100.000	525132			

图75 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1611-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-15min-P2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-12  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 19:53:19      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:54:05      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	2785414	100.000	521171	6636	1.028	--
总计		2785414	100.000	521171			

图76 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1612-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-15min-P3.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-21  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 19:57:44      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:54:08      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	2808778	100.000	525441	6632	1.028	--
总计		2808778	100.000	525441			

图77 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1613-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-15min-P4.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-30  
 进样体积 : 40 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 20:02:09      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:54:11      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	2779835	100.000	519766	6625	1.027	--
总计		2779835	100.000	519766			

图78 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1614-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-15min-P5.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-39  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 20:06:34      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:54:14      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2839839	100.000	530729	6627	1.027	--
总计		2839839	100.000	530729			

图79 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1615-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-15min-P6.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-48  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 20:10:59      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:54:17      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2764599	100.000	516373	6625	1.027	--
总计		2764599	100.000	516373			

图80 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1616-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-20min-P1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-4  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 20:15:25      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:54:20      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2875910	100.000	537382	6621	1.027	--
总计		2875910	100.000	537382			

图81 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1617-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-20min-P2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-13  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 20:19:51      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:54:23      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	2864385	100.000	535057	6619	1.026	--
总计		2864385	100.000	535057			

图82 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1618-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-20min-P3.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-22  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 20:24:17      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:54:26      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	2890117	100.000	539906	6611	1.026	--
总计		2890117	100.000	539906			

图83 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1619-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-20min-P4.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-31  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 20:28:43      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:54:29      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	2838703	100.000	530124	6607	1.026	--
总计		2838703	100.000	530124			

图84 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1620-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-20min-P5.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-40  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 20:33:09      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:54:32      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	2905036	100.000	542189	6597	1.025	--
总计		2905036	100.000	542189			

图85 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1621-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-20min-P6.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-49  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 20:37:34      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:54:36      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	2822531	100.000	526572	6594	1.024	--
总计		2822531	100.000	526572			

图86 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1622-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-30min-P1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-5  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 20:41:59      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:54:39      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2962908	100.000	552116	6593	1.024	--
总计		2962908	100.000	552116			

图87 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1623-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-30min-P2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-14  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 20:46:24      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:54:42      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2953865	100.000	550426	6581	1.024	--
总计		2953865	100.000	550426			

图88 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1624-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-30min-P3.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-23  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 20:50:50      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:54:45      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	2976054	100.000	554503	6580	1.023	--
总计		2976054	100.000	554503			

图89 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1625-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-30min-P4.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-32  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 20:55:15      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:54:48      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	2914551	100.000	542938	6575	1.023	--
总计		2914551	100.000	542938			

图90 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1626-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-30min-P5.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-41  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 20:59:41      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:54:51      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.806	2979145	100.000	554738	6572	1.023	--
总计		2979145	100.000	554738			

图91 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1627-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-30min-P6.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-50  
 进样体积 : 40 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 21:04:06      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:54:55      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2916524	100.000	541663	6557	1.022	--
总计		2916524	100.000	541663			

图92 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1628-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-45min-P1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-6  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 21:08:32      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:54:58      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	3003771	100.000	558004	6561	1.023	--
总计		3003771	100.000	558004			

图93 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1629-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-45min-P2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-15  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 21:12:58      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:55:01      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2987383	100.000	555375	6561	1.022	--
总计		2987383	100.000	555375			

图94 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1630-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-45min-P3.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-24  
 进样体积 : 40 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 21:17:24      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:55:04      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	3014215	100.000	560050	6553	1.022	--
总计		3014215	100.000	560050			

图95 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1631-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-45min-P4.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-33  
 进样体积 : 40 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 21:21:50      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:55:07      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2968491	100.000	551302	6561	1.022	--
总计		2968491	100.000	551302			

图96 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1632-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-45min-P5.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-42  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 21:26:16      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:55:10      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	3011049	100.000	558956	6553	1.022	--
总计		3011049	100.000	558956			

图97 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1633-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-45min-P6.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-51  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 21:30:41      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:55:14      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2995703	100.000	556157	6550	1.022	--
总计		2995703	100.000	556157			

图98 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1634-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-60min-P1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-7  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 21:35:07      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:55:17      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2994054	100.000	555715	6546	1.022	--
总计		2994054	100.000	555715			

图99 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1635-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-60min-P2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-16  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 21:39:33      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:55:20      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2992302	100.000	555568	6552	1.022	--
总计		2992302	100.000	555568			

图100 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1636-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-60min-P3.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-25  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 21:43:58      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:55:23      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	3022211	100.000	560889	6540	1.021	--
总计		3022211	100.000	560889			

图101 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1637-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-60min-P4.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-34  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 21:48:24      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:55:26      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	2994153	100.000	555545	6530	1.021	--
总计		2994153	100.000	555545			

图102 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1638-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-60min-P5.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-43  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 21:52:50      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:55:29      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	3012795	100.000	558631	6526	1.021	--
总计		3012795	100.000	558631			

图103 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1639-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-60min-P6.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-52  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 21:57:15      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:55:32      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	3009782	100.000	557955	6530	1.020	--
总计		3009782	100.000	557955			

图104 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5μm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1640-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-JX-P1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-8  
 进样体积 : 40 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 22:01:41      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:55:35      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	3026758	100.000	561201	6519	1.020	--
总计		3026758	100.000	561201			

图105 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1641-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-JX-P2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-17  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 22:06:08      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:55:38      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	3024899	100.000	560251	6511	1.020	--
总计		3024899	100.000	560251			

图106 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1642-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-JX-P3.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-26  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 22:10:35      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:55:41      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	3058685	100.000	566676	6512	1.019	--
总计		3058685	100.000	566676			

图107 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1643-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-JX-P4.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-35  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 22:15:01      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:55:45      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	3036110	100.000	562276	6506	1.019	--
总计		3036110	100.000	562276			

图108 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1644-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-JX-P5.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-44  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 22:19:26      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:55:48      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.808	3068317	100.000	566506	6501	1.019	--
总计		3068317	100.000	566506			

图109 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1645-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-JX-P6.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-53  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 22:23:51      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:55:51      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.807	3029363	100.000	560363	6503	1.019	--
总计		3029363	100.000	560363			

图110 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1646-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-27  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 22:28:17      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:55:54      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.782	2837576	100.000	490158	5541	1.038	--
总计		2837576	100.000	490158			

图111 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转  
 对照品溶液-2-1




# SMF-4033

## <样品信息>

色谱柱 : LP-C8(150mm\*4.6mm,5µm)      流 速: 2.0ml/min  
 柱温 : 40°C      波 长: 224nm  
 数据文件名 : RC\$SMF-4033 - 0-84/18-1647-3 - 2024053011p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-10mg-jf50z-dz2-2.lcd  
 方法文件名 : RC\$SMF-4033 - SMF-4033-rcqx-FX267.lcm  
 批处理文件名 : RC\$SMF-4033 - 20240809-rcqx-FX267.lcb  
 样品瓶号 : 2-27  
 进样体积 : 40 µl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/09 22:32:43      实验者: wangdan  
 处理时间(V3) : 2024/08/12 17:55:57      处理者: wangdan  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 224nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.783	2842683	100.000	490463	5529	1.037	--
总计		2842683	100.000	490463			

图112 依折麦布片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2024053011批(10mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-2