


## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3013-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-rj.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-9  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 11:09:26 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:37:58 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3µm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3014-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 µl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 11:13:49                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:38:02                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	32548	1.521	6411	4074	1.049	--
2	2.763	2106801	98.479	314883	4163	1.041	4.445
总计		2139349	100.000	321294			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3015-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 11:18:11                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:38:05                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	32636	1.525	6443	4068	1.049	--
2	2.768	2106850	98.475	313405	4168	1.040	4.479
总计		2139486	100.000	319849			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3016-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 11:22:35 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:38:08 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	32529	1.520	6447	4069	1.045	--
2	2.770	2107632	98.480	314517	4175	1.039	4.499
总计		2140160	100.000	320964			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
 柱温: 40°C 波长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3017-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 11:26:58 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:38:12 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	32487	1.519	6449	4066	1.053	--
2	2.774	2106590	98.481	314043	4182	1.039	4.529
总计		2139077	100.000	320492			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3018-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 11:31:21 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:38:15 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	32557	1.522	6460	4062	1.047	--
2	2.777	2106815	98.478	313898	4193	1.038	4.554
总计		2139372	100.000	320358			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
 柱温: 40°C 波长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3019-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 11:35:44 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:38:17 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.085	23935	4.199	4706	4019	1.069	--
2	2.789	546022	95.801	83165	4407	0.992	4.703
总计		569957	100.000	87871			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3020-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-10  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 11:41:57                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:38:20                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	23541	4.168	4638	4023	1.070	--
2	2.791	541210	95.832	82190	4413	0.992	4.726
总计		564751	100.000	86828			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3021-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-19  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 11:46:20                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:38:23                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	22829	4.455	4506	3993	1.076	--
2	2.792	489646	95.545	74152	4403	0.992	4.734
总计		512475	100.000	78658			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3022-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-28  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 11:50:42 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:38:25 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	22335	4.442	4417	4009	1.068	--
2	2.793	480496	95.558	72928	4417	0.991	4.746
总计		502831	100.000	77345			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3023-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 11:55:04

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:38:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	22918	4.428	4543	4020	1.070	--
2	2.793	494607	95.572	75052	4413	0.991	4.754
总计		517525	100.000	79595			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3024-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 11:59:26                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:38:31                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	21754	4.709	4298	4008	1.072	--
2	2.797	440214	95.291	67016	4424	0.989	4.772
总计		461968	100.000	71314			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流速: 1.0ml/min

柱温: 40°C

波长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3025-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 12:03:48

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:38:34

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	33611	3.022	6649	4024	1.066	--
2	2.794	1078669	96.978	162603	4355	1.006	4.731
总计		1112280	100.000	169253			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3026-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 12:08:10                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:38:36                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	29985	2.773	5941	4016	1.064	--
2	2.794	1051343	97.227	158752	4364	1.005	4.741
总计		1081328	100.000	164693			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3027-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-20  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 12:12:33 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:38:39 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	31428	3.078	6240	4024	1.065	--
2	2.795	989477	96.922	149713	4370	1.003	4.754
总计		1020905	100.000	155952			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3028-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 12:16:54                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:38:42                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	32551	3.060	6454	4004	1.065	--
2	2.794	1031245	96.940	155567	4355	1.005	4.752
总计		1063796	100.000	162020			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3029-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-38  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 12:21:15 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:38:44 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	32793	3.089	6496	4015	1.067	--
2	2.795	1028686	96.911	156188	4403	1.005	4.763
总计		1061479	100.000	162683			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3030-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 12:25:36

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:38:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	31661	3.104	6293	4026	1.066	--
2	2.797	988348	96.896	149565	4376	1.003	4.773
总计		1020009	100.000	155858			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3031-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-3  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 12:29:58 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:38:50 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	34924	2.565	6916	4018	1.061	--
2	2.797	1326601	97.435	199737	4325	1.013	4.747
总计		1361525	100.000	206653			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3032-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-12  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 12:34:20 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:38:53 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	34306	2.519	6809	4014	1.060	--
2	2.796	1327641	97.481	199652	4314	1.014	4.747
总计		1361947	100.000	206461			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3033-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 12:38:42

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:38:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	33667	2.569	6693	4030	1.068	--
2	2.795	1276614	97.431	192218	4332	1.011	4.755
总计		1310281	100.000	198912			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3034-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 12:43:04

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:38:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	35136	2.559	6981	4024	1.063	--
2	2.798	1337760	97.441	201499	4341	1.012	4.764
总计		1372897	100.000	208480			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3035-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 12:47:25

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:39:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	35597	2.576	7055	4023	1.065	--
2	2.795	1346025	97.424	202467	4321	1.012	4.766
总计		1381622	100.000	209522			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3036-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-48  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 12:51:47                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:39:04                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	33743	2.530	6689	4020	1.063	--
2	2.799	1299931	97.470	195434	4338	1.011	4.771
总计		1333674	100.000	202123			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3037-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 12:56:09

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:39:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	35778	2.309	7082	4011	1.063	--
2	2.797	1513832	97.691	227463	4308	1.018	4.749
总计		1549610	100.000	234546			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3038-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-13  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 13:00:31                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:39:10                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	35425	2.281	7029	4035	1.062	--
2	2.794	1517530	97.719	227590	4307	1.018	4.757
总计		1552955	100.000	234619			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3039-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-22  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 13:04:53                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:39:13                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	34535	2.302	6850	4018	1.065	--
2	2.799	1465883	97.698	220224	4324	1.016	4.770
总计		1500418	100.000	227074			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3040-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-31  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 13:09:15                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:39:15                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	35278	2.249	7016	4034	1.062	--
2	2.799	1533508	97.751	230306	4320	1.018	4.770
总计		1568786	100.000	237322			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3041-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 13:13:37

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:39:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	36252	2.303	7184	4018	1.062	--
2	2.798	1537654	97.697	231028	4315	1.017	4.771
总计		1573906	100.000	238213			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3042-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 13:17:59

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:39:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	35100	2.282	6964	4023	1.061	--
2	2.798	1503143	97.718	226130	4328	1.016	4.776
总计		1538243	100.000	233094			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3043-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-5  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 13:22:21                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:39:24                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	35291	1.987	6997	4020	1.060	--
2	2.799	1740672	98.013	260568	4288	1.024	4.759
总计		1775963	100.000	267565			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3044-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-14  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 13:26:43                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:39:27                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	35328	1.977	7031	4040	1.056	--
2	2.797	1751380	98.023	262653	4292	1.023	4.752
总计		1786708	100.000	269684			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3045-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 13:31:04

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:39:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	32810	1.906	6682	4147	1.040	--
2	2.796	1688282	98.094	252865	4281	1.021	4.796
总计		1721091	100.000	259547			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流速: 1.0ml/min

柱温: 40°C

波长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3046-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 13:35:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:39:32

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	35492	1.957	7097	4034	1.060	--
2	2.789	1778183	98.043	266407	4260	1.023	4.762
总计		1813674	100.000	273503			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3047-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 13:39:48

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:39:35

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	36772	2.011	7334	4071	1.058	--
2	2.795	1791643	97.989	269842	4331	1.024	4.759
总计		1828415	100.000	277176			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3048-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 13:44:10

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:39:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	35613	1.960	7093	4056	1.058	--
2	2.797	1781108	98.040	266987	4286	1.023	4.764
总计		1816721	100.000	274079			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3049-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 13:48:32

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:39:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	37416	1.839	7408	4026	1.058	--
2	2.790	1997503	98.161	299674	4283	1.030	4.747
总计		2034919	100.000	307082			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3050-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 13:52:54

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:39:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	37974	1.857	7559	4047	1.059	--
2	2.796	2007496	98.143	300498	4272	1.027	4.756
总计		2045471	100.000	308056			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3051-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-24  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 13:57:16                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:39:46                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	36813	1.849	7342	4057	1.059	--
2	2.798	1954518	98.151	292451	4279	1.027	4.762
总计		1991331	100.000	299794			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3052-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-33  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 14:01:39 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:39:49 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	35915	1.790	7127	4034	1.058	--
2	2.798	1970750	98.210	294587	4263	1.029	4.764
总计		2006665	100.000	301714			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3053-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-42  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 14:05:59                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:39:51                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	36411	1.831	7235	4036	1.057	--
2	2.798	1951996	98.169	291803	4272	1.029	4.760
总计		1988407	100.000	299038			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3054-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-51  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 14:10:21 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:39:54 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	36053	1.793	7166	4061	1.058	--
2	2.796	1974410	98.207	295735	4279	1.028	4.768
总计		2010462	100.000	302901			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3055-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 14:14:42

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:39:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	35623	1.734	7086	4036	1.059	--
2	2.799	2019016	98.266	301575	4270	1.030	4.760
总计		2054640	100.000	308661			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3056-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-16  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 14:19:04                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:40:00                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	35311	1.692	7027	4044	1.057	--
2	2.796	2051882	98.308	307288	4274	1.030	4.751
总计		2087193	100.000	314315			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3057-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-25  
 进样体积: 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 14:23:26                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:40:02                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	35107	1.694	7001	4064	1.058	--
2	2.797	2037499	98.306	304701	4262	1.031	4.766
总计		2072606	100.000	311702			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3058-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-34  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 14:27:48                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:40:05                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	36384	1.698	7224	4033	1.056	--
2	2.798	2106896	98.302	314641	4262	1.031	4.760
总计		2143280	100.000	321866			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3059-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-43  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 14:32:10                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:40:08                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	36345	1.725	7228	4044	1.057	--
2	2.799	2070958	98.275	309182	4263	1.030	4.768
总计		2107303	100.000	316410			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3060-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-52  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 14:36:31                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:40:11                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	34398	1.637	6832	4041	1.059	--
2	2.799	2066443	98.363	308659	4265	1.030	4.769
总计		2100841	100.000	315491			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3061-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-90min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 14:40:54

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:40:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	36379	1.687	6962	4000	1.077	--
2	2.796	2119726	98.313	316068	4235	1.034	4.753
总计		2156105	100.000	323030			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3062-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-90min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 14:45:17

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:40:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	36748	1.663	7311	4042	1.059	--
2	2.798	2172757	98.337	324201	4249	1.034	4.752
总计		2209505	100.000	331512			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3063-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-90min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 14:49:40

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:40:19

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	36513	1.623	7276	4060	1.052	--
2	2.796	2212706	98.377	330390	4248	1.033	4.751
总计		2249219	100.000	337667			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流速: 1.0ml/min

柱温: 40°C

波长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3064-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-90min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 14:54:03

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:40:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	37089	1.630	7402	4066	1.058	--
2	2.797	2238890	98.370	334009	4241	1.036	4.751
总计		2275979	100.000	341411			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3065-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-90min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 14:58:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:40:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	39214	1.726	7755	4046	--	--
2	2.798	2233392	98.274	332966	4250	1.035	4.752
总计		2272606	100.000	340721			






# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3067-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-120min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-1  
 进样体积: 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 15:07:11                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:40:29                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	34794	1.619	6873	4020	1.057	--
2	2.797	2113918	98.381	314993	4231	1.035	4.753
总计		2148713	100.000	321865			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3068-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-120min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-10  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 15:11:33                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:40:32                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	34741	1.580	6913	4051	1.055	--
2	2.798	2164050	98.420	322685	4246	1.033	4.762
总计		2198791	100.000	329598			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3µm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3069-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-120min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-19  
 进样体积: 10 µl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 15:15:55                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:40:35                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	34182	1.580	6743	4024	1.057	--
2	2.797	2129396	98.420	318110	4251	1.032	4.766
总计		2163578	100.000	324853			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3070-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-120min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-28  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 15:20:18                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:40:38                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	34823	1.586	6899	4026	1.057	--
2	2.799	2160791	98.414	321578	4241	1.034	4.768
总计		2195614	100.000	328476			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3071-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-120min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-37  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 15:24:40 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:40:40 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	34621	1.602	6846	4018	1.057	--
2	2.797	2126462	98.398	317229	4241	1.034	4.768
总计		2161083	100.000	324075			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3072-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-120min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-46  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 15:29:02 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:40:43 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	35127	1.619	6973	4035	1.055	--
2	2.799	2134498	98.381	317881	4244	1.034	4.766
总计		2169625	100.000	324854			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3073-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-2  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 15:33:24 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:40:46 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	35873	1.605	7100	4044	1.056	--
2	2.798	2199450	98.395	328021	4240	1.034	4.770
总计		2235323	100.000	335121			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3074-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-11  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 15:37:46 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:40:49 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	34210	1.553	6785	4036	1.059	--
2	2.799	2168892	98.447	323511	4255	1.034	4.772
总计		2203102	100.000	330296			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3075-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-20  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 15:42:09 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:40:51 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	34313	1.610	6774	4012	1.060	--
2	2.800	2096940	98.390	311430	4237	1.036	4.772
总计		2131253	100.000	318204			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3076-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-29  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 15:46:31                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:40:54                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	35326	1.596	6978	4028	1.057	--
2	2.796	2178120	98.404	324872	4236	1.035	4.760
总计		2213447	100.000	331850			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
 柱温: 40°C 波长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3077-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-38  
 进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 15:50:53 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:40:57 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	35511	1.596	7059	4036	1.057	--
2	2.799	2189388	98.404	326076	4246	1.034	4.769
总计		2224899	100.000	333135			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3078-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-47  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 15:55:16 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:41:00 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	34685	1.575	6890	4039	1.056	--
2	2.801	2168210	98.425	321940	4248	1.034	4.775
总计		2202895	100.000	328830			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3079-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 15:59:39                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:41:02                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	32618	1.526	6429	4021	1.060	--
2	2.800	2104701	98.474	312652	4248	1.035	4.782
总计		2137319	100.000	319081			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3080-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz2-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-27  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 16:04:02 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:41:05 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	32566	1.525	6422	4017	1.058	--
2	2.798	2102738	98.475	313945	4254	1.035	4.774
总计		2135304	100.000	320367			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3081-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-rj.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 2-9  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 16:08:26 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:41:08 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3082-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 16:12:50                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:41:10                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	32598	1.530	6451	4028	1.060	--
2	2.800	2097643	98.470	312251	4247	1.034	4.774
总计		2130241	100.000	318701			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3083-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 16:17:14                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:41:13                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	32451	1.525	6447	4042	1.060	--
2	2.797	2095101	98.475	312949	4249	1.033	4.782
总计		2127552	100.000	319397			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3084-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-18  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 16:21:38                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:41:16                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	32581	1.529	6450	4019	1.058	--
2	2.800	2097677	98.471	312101	4241	1.035	4.770
总计		2130258	100.000	318551			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3085-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 16:26:02 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:41:19 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	32638	1.533	6442	4014	1.060	--
2	2.799	2095968	98.467	312359	4249	1.033	4.782
总计		2128606	100.000	318801			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3086-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 16:30:26 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:41:22 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	32582	1.531	6458	4006	1.060	--
2	2.796	2095818	98.469	312313	4225	1.036	4.769
总计		2128400	100.000	318771			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3087-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 2-1  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 16:34:49 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:41:25 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	23918	4.344	4745	4000	1.071	--
2	2.808	526637	95.656	79805	4442	0.992	4.904
总计		550556	100.000	84549			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3088-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-10  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 16:39:12                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:41:28                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	21805	4.257	4331	4016	1.073	--
2	2.808	490412	95.743	74340	4443	0.990	4.917
总计		512218	100.000	78671			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3089-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-19  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 16:43:35                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:41:30                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	22306	4.337	4411	4002	1.067	--
2	2.811	492003	95.663	74683	4453	0.990	4.917
总计		514309	100.000	79095			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3090-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-28  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 16:47:58                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:41:33                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	22802	4.442	4515	4009	1.069	--
2	2.811	490556	95.558	74439	4453	0.990	4.918
总计		513357	100.000	78954			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3091-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 2-37  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 16:52:21 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:41:36 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	20798	4.533	4130	4005	1.068	--
2	2.810	438030	95.467	66458	4453	0.991	4.915
总计		458827	100.000	70588			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3092-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-46  
 进样体积: 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 16:56:44                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:41:38                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	23328	4.713	4637	3995	1.074	--
2	2.807	471654	95.287	71627	4438	0.991	4.904
总计		494981	100.000	76264			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3093-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 17:01:08

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:41:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	32355	3.075	6425	4021	1.073	--
2	2.806	1019872	96.925	153958	4379	1.005	4.873
总计		1052227	100.000	160383			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3094-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 17:05:30

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:41:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	32028	2.987	6330	4016	1.070	--
2	2.807	1040315	97.013	156915	4388	1.005	4.875
总计		1072342	100.000	163245			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3095-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-20  
 进样体积 : 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 17:09:52                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:41:46                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	31668	3.016	6245	4009	1.068	--
2	2.807	1018494	96.984	153878	4397	1.006	4.874
总计		1050161	100.000	160123			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3096-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-29  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 17:14:15                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:41:49                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	33231	3.094	6581	4007	1.068	--
2	2.807	1040671	96.906	157023	4387	1.005	4.877
总计		1073902	100.000	163604			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3097-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 2-38  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 17:18:38 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:41:52 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	32676	3.123	6477	3997	1.066	--
2	2.806	1013788	96.877	153211	4393	1.004	4.875
总计		1046465	100.000	159688			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3098-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 2-47  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 17:23:01 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:41:54 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	32567	3.205	6430	3980	1.072	--
2	2.800	983620	96.795	148228	4370	1.003	4.876
总计		1016187	100.000	154659			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3099-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 17:27:25

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:41:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	34755	2.573	6910	4002	1.069	--
2	2.800	1315734	97.427	197550	4337	1.012	4.840
总计		1350489	100.000	204460			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3100-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 17:31:47

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:42:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	34487	2.533	6854	4025	1.068	--
2	2.802	1326941	97.467	200241	4384	1.013	4.851
总计		1361428	100.000	207094			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3101-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-21  
 进样体积 : 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 17:36:11                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:42:03                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	34253	2.541	6741	3983	1.067	--
2	2.799	1313802	97.459	197663	4334	1.012	4.856
总计		1348055	100.000	204403			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3102-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 10  $\mu$ l

进样时间: 2024/08/22 17:40:34

处理时间(V2): 2024/08/23 09:42:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	35747	2.589	7058	4027	1.066	--
2	2.806	1344723	97.411	202454	4355	1.013	4.858
总计		1380469	100.000	209512			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3103-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 17:44:57

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:42:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	34564	2.586	6849	4025	1.068	--
2	2.806	1301829	97.414	196150	4354	1.012	4.861
总计		1336393	100.000	202999			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3104-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-48  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 17:49:21                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:42:11                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	35039	2.673	6949	4018	1.068	--
2	2.806	1275934	97.327	192412	4364	1.011	4.865
总计		1310973	100.000	199361			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3105-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 2-4  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 17:53:44                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:42:14                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	35964	2.319	7114	4024	1.065	--
2	2.805	1514583	97.681	227573	4331	1.017	4.845
总计		1550547	100.000	234687			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3106-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-13  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 17:58:07                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:42:16                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	35545	2.258	7058	4035	1.067	--
2	2.802	1538432	97.742	230746	4329	1.018	4.833
总计		1573978	100.000	237804			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3107-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 2-22  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 18:02:31 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:42:19 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	35077	2.270	6978	4020	1.067	--
2	2.802	1510404	97.730	226525	4323	1.017	4.843
总计		1545481	100.000	233503			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3108-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 18:06:54

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:42:22

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	36717	2.327	7273	4017	1.065	--
2	2.804	1540937	97.673	231504	4325	1.018	4.842
总计		1577654	100.000	238776			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3µm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3109-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-40  
 进样体积 : 10 µl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 18:11:17                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:42:25                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	35775	2.293	7129	4031	1.067	--
2	2.803	1524671	97.707	229003	4331	1.017	4.848
总计		1560446	100.000	236131			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3110-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 18:15:41

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:42:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	36209	2.388	7177	4012	1.066	--
2	2.804	1479927	97.612	222600	4335	1.016	4.846
总计		1516137	100.000	229777			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3111-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-5  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 18:20:05                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:42:30                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	36454	2.030	7191	4019	1.063	--
2	2.804	1759172	97.970	263934	4312	1.023	4.827
总计		1795626	100.000	271125			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3112-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-14  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 18:24:29                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:42:33                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	34623	1.910	6868	4036	1.062	--
2	2.802	1777720	98.090	265584	4288	1.026	4.819
总计		1812343	100.000	272452			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3113-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-23  
 进样体积 : 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 18:28:53                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:42:35                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	35203	1.983	6938	4013	1.066	--
2	2.803	1739874	98.017	260182	4289	1.025	4.811
总计		1775077	100.000	267121			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3114-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-32  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 18:33:16                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:42:38                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	36141	2.037	7175	4030	1.063	--
2	2.802	1738352	97.963	260554	4325	1.024	4.831
总计		1774493	100.000	267729			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3115-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 2-41  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 18:37:39 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:42:41 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	36238	2.007	7189	4026	1.063	--
2	2.803	1769004	97.993	264679	4293	1.025	4.826
总计		1805242	100.000	271867			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3116-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-50  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 18:42:03                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:42:44                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	36532	2.061	7240	4032	1.067	--
2	2.804	1736440	97.939	260232	4303	1.023	4.833
总计		1772972	100.000	267473			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3117-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-6  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 18:46:26                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:42:46                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	36059	1.822	7167	4006	1.062	--
2	2.798	1943486	98.178	290580	4272	1.030	4.803
总计		1979545	100.000	297747			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3118-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 18:50:50

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:42:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	36476	1.809	7271	4051	1.061	--
2	2.795	1979479	98.191	297233	4297	1.030	4.794
总计		2015954	100.000	304503			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3119-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-24  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 18:55:14                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:42:52                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	35696	1.807	7101	4023	1.063	--
2	2.801	1940122	98.193	288758	4272	1.029	4.817
总计		1975818	100.000	295859			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3120-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 18:59:38

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:42:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	37144	1.832	7343	4041	1.062	--
2	2.804	1990725	98.168	297560	4284	1.029	4.819
总计		2027868	100.000	304903			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3121-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 2-42  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 19:04:02 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:42:57 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	37074	1.819	7331	4038	1.062	--
2	2.804	2000878	98.181	298820	4273	1.030	4.815
总计		2037953	100.000	306151			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3122-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-51  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 19:08:25                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:43:00                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	36655	1.849	7245	4030	1.062	--
2	2.803	1946154	98.151	290962	4287	1.029	4.820
总计		1982810	100.000	298207			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3123-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-7  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 19:12:49                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:43:04                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	36147	1.766	7138	4017	1.062	--
2	2.803	2010364	98.234	300568	4285	1.032	4.812
总计		2046510	100.000	307705			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3124-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-16  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 19:17:13                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:43:07                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	36923	1.734	7258	4003	--	--
2	2.799	2092147	98.266	311673	4250	1.033	4.788
总计		2129071	100.000	318931			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3125-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-25  
 进样体积 : 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 19:21:37                                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:43:09                                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	37418	1.767	7408	4040	1.061	--
2	2.803	2079901	98.233	310296	4269	1.032	4.807
总计		2117319	100.000	317705			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3126-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-34  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 19:26:01                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:43:12                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	36297	1.744	7465	4162	1.039	--
2	2.800	2045230	98.256	304571	4260	1.032	4.846
总计		2081527	100.000	312035			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3127-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-43  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 19:30:24                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:43:15                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	36891	1.723	7302	4038	1.062	--
2	2.803	2104499	98.277	313849	4264	1.033	4.808
总计		2141390	100.000	321151			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3128-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 2-52  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 19:34:48 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:43:18 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	36971	1.751	7344	4056	1.060	--
2	2.804	2074133	98.249	310045	4283	1.031	4.818
总计		2111103	100.000	317388			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3129-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-90min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 19:39:12

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:43:20

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	35964	1.663	7108	4025	1.062	--
2	2.803	2127122	98.337	316725	4252	1.035	4.805
总计		2163086	100.000	323833			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3130-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-90min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-17  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 19:43:37                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:43:23                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	36214	1.626	7179	4039	1.058	--
2	2.799	2191293	98.374	326151	4240	1.036	4.786
总计		2227507	100.000	333330			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3131-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-90min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-26  
 进样体积 : 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 19:48:00                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:43:27                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	36107	1.635	7142	4044	1.061	--
2	2.802	2172406	98.365	322967	4253	1.034	4.800
总计		2208513	100.000	330109			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3132-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-90min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 19:52:25

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:43:29

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	37865	1.698	7479	4033	1.063	--
2	2.802	2191933	98.302	325822	4239	1.036	4.795
总计		2229797	100.000	333300			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3133-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-90min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-44  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 19:56:48                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:43:32                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	37041	1.651	7330	4031	1.063	--
2	2.803	2205949	98.349	328181	4244	1.035	4.800
总计		2242991	100.000	335511			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3134-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-90min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 20:01:13

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:43:35

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	37531	1.696	7437	4050	1.061	--
2	2.804	2175274	98.304	324480	4266	1.035	4.812
总计		2212805	100.000	331917			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3135-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-120min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-3  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 20:05:34                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:43:38                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	36392	1.669	7218	4028	1.063	--
2	2.802	2143762	98.331	319142	4252	1.035	4.809
总计		2180154	100.000	326360			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3136-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-120min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-12  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 20:09:58 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:43:40 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	35897	1.622	7125	4030	1.060	--
2	2.800	2177521	98.378	323723	4245	1.036	4.794
总计		2213419	100.000	330849			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3137-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-120min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-21  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 20:14:20 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:43:43 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	34872	1.602	6928	4033	1.063	--
2	2.802	2141543	98.398	318854	4263	1.034	4.813
总计		2176415	100.000	325782			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3µm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3138-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-120min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-30  
 进样体积: 10 µl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 20:18:42                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:43:46                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	35098	1.600	6961	4033	1.061	--
2	2.802	2157878	98.400	321219	4252	1.035	4.811
总计		2192976	100.000	328180			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3139-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-120min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-39  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 20:23:05 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:43:49 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	35096	1.577	6968	4032	1.064	--
2	2.802	2190160	98.423	325865	4248	1.037	4.809
总计		2225256	100.000	332834			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3140-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-120min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-48  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 20:27:26 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:43:52 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	35087	1.631	6959	4003	1.063	--
2	2.802	2115938	98.369	314369	4236	1.037	4.802
总计		2151025	100.000	321327			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3141-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-4  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 20:31:50 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:43:55 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	35373	1.633	7030	4018	1.060	--
2	2.801	2130425	98.367	316728	4253	1.036	4.801
总计		2165798	100.000	323758			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3142-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-13  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 20:36:13                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:43:57                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	35387	1.587	7006	4030	1.062	--
2	2.803	2194198	98.413	326656	4250	1.036	4.803
总计		2229585	100.000	333662			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3143-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-22  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 20:40:36 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:44:00 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	34268	1.569	6798	4030	1.062	--
2	2.801	2149829	98.431	319551	4253	1.035	4.805
总计		2184097	100.000	326349			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流速: 1.0ml/min

柱温: 40°C

波长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3144-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 20:44:57

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:44:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	35498	1.616	7086	4040	1.062	--
2	2.798	2161016	98.384	323128	4267	1.036	4.815
总计		2196514	100.000	330214			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流速: 1.0ml/min

柱温: 40°C

波长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3145-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 20:49:21

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:44:06

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	35391	1.590	7024	4016	1.065	--
2	2.795	2190064	98.410	325835	4219	1.035	4.806
总计		2225455	100.000	332858			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3146-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-49  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 20:53:44                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:44:08                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	34854	1.606	6938	4012	1.062	--
2	2.800	2135324	98.394	317308	4241	1.035	4.813
总计		2170178	100.000	324247			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3µm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3147-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-27  
 进样体积 : 10 µl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 20:58:07                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:44:11                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	32566	1.526	6482	4015	1.059	--
2	2.800	2101598	98.474	312354	4242	1.036	4.803
总计		2134164	100.000	318836			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3148-2 - zzp-z3-24032001p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 2-27  
 进样体积 : 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 21:02:32      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:44:14      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.065	32453	1.522	6474	4018	1.066	--
2	2.792	2099763	98.478	312166	4219	1.035	4.809
总计		2132217	100.000	318640			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3149-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-rj.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 3-9  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 21:06:54 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:44:17 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3150-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 3-18  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 21:11:17                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:44:19                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	32750	1.528	6518	4008	1.059	--
2	2.801	2110025	98.472	313179	4243	1.035	4.816
总计		2142776	100.000	319697			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3151-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 3-18  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 21:15:39                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:44:22                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	32794	1.532	6493	4023	1.063	--
2	2.802	2108154	98.468	313634	4249	1.035	4.805
总计		2140948	100.000	320128			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3152-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 21:20:01                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:44:25                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	32644	1.524	6516	4034	1.064	--
2	2.800	2108773	98.476	313820	4241	1.035	4.811
总计		2141417	100.000	320337			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3153-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 21:24:24                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:44:28                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	32669	1.528	6511	4030	1.063	--
2	2.801	2105588	98.472	313212	4257	1.035	4.817
总计		2138257	100.000	319723			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3154-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 21:28:45 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:44:30 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	32743	1.528	6509	4015	1.060	--
2	2.803	2109608	98.472	314368	4255	1.035	4.818
总计		2142351	100.000	320877			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3155-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 3-1  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 21:33:07 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:44:33 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	23932	4.032	4749	3987	1.074	--
2	2.808	569671	95.968	86537	4463	0.996	4.941
总计		593602	100.000	91286			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3156-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-10  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 21:37:29                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:44:36                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	22814	4.004	4535	4006	1.075	--
2	2.813	546999	95.996	83158	4458	0.993	4.954
总计		569812	100.000	87693			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3157-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 3-19  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 21:41:52 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:44:39 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	17530	4.101	3470	3980	1.073	--
2	2.812	409891	95.899	62443	4481	0.990	4.960
总计		427422	100.000	65913			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3158-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 3-28  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 21:46:13                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:44:42                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	24633	4.226	4871	3986	1.076	--
2	2.810	558298	95.774	84637	4446	0.993	4.956
总计		582931	100.000	89508			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3159-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 3-37  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 21:50:35 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:44:44 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	22081	4.271	4388	4000	1.073	--
2	2.812	494935	95.729	75278	4458	0.992	4.943
总计		517016	100.000	79665			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3µm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3160-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-46  
 进样体积: 10 µl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 21:54:57                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:44:47                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	22381	4.232	4446	3984	1.074	--
2	2.813	506432	95.768	76985	4455	0.992	4.947
总计		528813	100.000	81431			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3161-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 21:59:18

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:44:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	32422	2.946	6435	3996	1.072	--
2	2.808	1068023	97.054	160996	4388	1.007	4.914
总计		1100446	100.000	167431			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3162-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 3-11  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 22:03:40 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:44:53 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	31502	2.864	6270	4003	1.071	--
2	2.809	1068515	97.136	160895	4394	1.008	4.910
总计		1100016	100.000	167165			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3163-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 3-20  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 22:08:01 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:44:55 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	30683	3.079	6080	3985	1.071	--
2	2.807	965861	96.921	145931	4392	1.005	4.910
总计		996544	100.000	152011			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3164-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 3-29  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 22:12:23 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:44:58 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	33183	3.021	6608	4005	1.070	--
2	2.810	1065335	96.979	160746	4405	1.006	4.916
总计		1098518	100.000	167354			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3165-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 22:16:46

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:45:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	31550	2.945	6294	4035	1.072	--
2	2.807	1039858	97.055	157387	4403	1.005	4.912
总计		1071409	100.000	163681			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3166-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-47  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 22:21:07                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:45:04                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	32054	2.977	6373	4004	1.072	--
2	2.808	1044770	97.023	157646	4390	1.006	4.900
总计		1076824	100.000	164019			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3167-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 3-3  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 22:25:27                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:45:07                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	33884	2.444	6718	3996	1.074	--
2	2.810	1352555	97.556	203041	4366	1.014	4.895
总计		1386440	100.000	209759			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3168-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 22:29:48

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:45:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	34539	2.453	6887	4020	1.071	--
2	2.807	1373490	97.547	206671	4358	1.015	4.892
总计		1408029	100.000	213558			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3169-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 22:34:10

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:45:12

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	34563	2.587	6875	4002	1.069	--
2	2.808	1301647	97.413	195966	4372	1.014	4.890
总计		1336210	100.000	202841			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3170-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 10  $\mu$ l

进样时间: 2024/08/22 22:38:32

处理时间(V2): 2024/08/23 09:45:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	35019	2.504	6965	4005	1.069	--
2	2.806	1363257	97.496	205642	4366	1.014	4.889
总计		1398276	100.000	212607			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3171-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 3-39  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 22:42:54                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:45:17                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	33956	2.478	6763	4014	1.069	--
2	2.805	1336517	97.522	201599	4363	1.013	4.892
总计		1370473	100.000	208362			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3172-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 22:47:16

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:45:20

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	34055	2.493	6784	4013	1.070	--
2	2.808	1332169	97.507	200383	4361	1.014	4.891
总计		1366224	100.000	207167			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流速: 1.0ml/min

柱温: 40°C

波长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3173-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 22:51:38

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:45:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	34584	2.204	6891	4002	1.068	--
2	2.805	1534571	97.796	230747	4332	1.020	4.872
总计		1569155	100.000	237638			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3174-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 22:55:59

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:45:26

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	35410	2.204	7039	4013	1.071	--
2	2.807	1571319	97.796	236343	4346	1.020	4.875
总计		1606729	100.000	243382			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3175-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 3-22  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 23:00:21                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:45:29                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	35285	2.327	7015	3995	1.069	--
2	2.807	1481034	97.673	222587	4344	1.018	4.884
总计		1516319	100.000	229602			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3176-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 23:04:43

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:45:32

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	35060	2.235	6964	4008	1.066	--
2	2.808	1533601	97.765	230307	4340	1.020	4.874
总计		1568661	100.000	237271			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3177-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 3-40  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 23:09:04 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:45:35 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	34074	2.172	6788	4019	1.070	--
2	2.806	1534900	97.828	230488	4329	1.018	4.872
总计		1568974	100.000	237276			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3178-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-20min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 3-49  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/22 23:13:25 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:45:37 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	35092	2.230	6983	4021	1.073	--
2	2.808	1538661	97.770	230777	4349	1.018	4.885
总计		1573753	100.000	237761			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3179-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 3-5  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 23:17:46                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:45:40                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	35445	1.971	7048	4004	1.069	--
2	2.805	1763306	98.029	264369	4305	1.025	4.868
总计		1798751	100.000	271417			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3180-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-14  
 进样体积: 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 23:22:09                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:45:43                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	35505	1.940	7072	4023	1.069	--
2	2.806	1794454	98.060	269205	4312	1.026	4.857
总计		1829959	100.000	276278			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流速: 1.0ml/min

柱温: 40°C

波长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3181-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 23:26:29

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:45:46

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	36726	2.049	7311	4015	1.067	--
2	2.805	1755662	97.951	263581	4318	1.024	4.866
总计		1792388	100.000	270892			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3182-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 23:30:51

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:45:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	35909	1.986	7142	4007	1.067	--
2	2.808	1772566	98.014	265604	4323	1.025	4.869
总计		1808475	100.000	272746			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3183-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 3-41  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 23:35:13                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:45:51                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	34910	1.949	6945	4025	1.070	--
2	2.805	1756582	98.051	263474	4311	1.025	4.855
总计		1791492	100.000	270420			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3184-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 10  $\mu$ l

进样时间: 2024/08/22 23:39:34

处理时间(V2): 2024/08/23 09:45:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	34480	1.921	6868	4025	1.068	--
2	2.806	1760801	98.079	263810	4310	1.025	4.865
总计		1795281	100.000	270678			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3185-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 3-6  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/22 23:43:56                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:45:57                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	35941	1.816	7153	4013	1.069	--
2	2.806	1943410	98.184	290745	4286	1.031	4.851
总计		1979350	100.000	297898			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3µm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3186-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-15  
 进样体积: 10 µl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/22 23:48:17                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:45:59                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	35892	1.782	7122	4019	1.067	--
2	2.806	1978229	98.218	295912	4289	1.031	4.844
总计		2014120	100.000	303034			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3187-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 23:52:38

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:46:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	36486	1.854	7283	4024	1.068	--
2	2.803	1931882	98.146	289097	4292	1.030	4.846
总计		1968368	100.000	296380			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3188-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/22 23:57:00

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:46:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	36495	1.839	7216	4000	1.065	--
2	2.802	1948208	98.161	291158	4297	1.029	4.863
总计		1984702	100.000	298375			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3189-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/23 00:01:21

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:46:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	34994	1.765	6975	4024	1.066	--
2	2.806	1948050	98.235	291434	4288	1.030	4.851
总计		1983044	100.000	298409			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3µm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3190-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 3-51  
 进样体积 : 10 µl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/23 00:05:43                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:46:10                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	34000	1.665	6796	4039	1.063	--
2	2.802	2008134	98.335	299028	4269	1.031	4.830
总计		2042134	100.000	305824			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3191-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/23 00:10:04

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:46:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	34945	1.717	6960	4021	1.066	--
2	2.800	2000150	98.283	299893	4308	1.034	4.842
总计		2035096	100.000	306853			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3192-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/23 00:14:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:46:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	35268	1.689	7018	4026	1.064	--
2	2.806	2053330	98.311	306707	4279	1.033	4.851
总计		2088598	100.000	313724			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3193-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 3-25  
 进样体积 : 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/23 00:18:47                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:46:19                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	36933	1.781	7353	4016	1.064	--
2	2.805	2036744	98.219	304604	4279	1.033	4.837
总计		2073677	100.000	311957			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3194-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-34  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 00:23:08                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:46:21                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	36340	1.725	7239	4030	1.063	--
2	2.805	2070844	98.275	309441	4278	1.033	4.846
总计		2107184	100.000	316680			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流速: 1.0ml/min

柱温: 40°C

波长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3195-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/23 00:27:30

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:46:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	35427	1.697	7044	4017	1.066	--
2	2.806	2051723	98.303	306792	4282	1.034	4.841
总计		2087149	100.000	313836			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3196-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/23 00:31:51

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:46:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	34157	1.678	6791	4001	1.066	--
2	2.803	2000911	98.322	298900	4277	1.032	4.844
总计		2035068	100.000	305691			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3µm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3197-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-90min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 3-8  
 进样体积 : 10 µl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/23 00:36:13                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:46:30                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	36202	1.671	7222	4022	1.067	--
2	2.804	2130382	98.329	317874	4260	1.036	4.836
总计		2166584	100.000	325096			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3198-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-90min-P2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/23 00:40:35

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:46:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	36040	1.653	7180	4030	1.069	--
2	2.804	2144621	98.347	320241	4265	1.036	4.838
总计		2180661	100.000	327420			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3199-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-90min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-26  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 00:44:59                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:46:35                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	37134	1.714	7383	4017	1.068	--
2	2.806	2128795	98.286	317606	4266	1.035	4.845
总计		2165928	100.000	324989			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流速: 1.0ml/min

柱温: 40°C

波长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3200-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-90min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/23 00:49:21

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:46:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	36518	1.700	7274	4012	1.062	--
2	2.803	2111141	98.300	314750	4259	1.036	4.827
总计		2147659	100.000	322024			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3201-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-90min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 3-44  
 进样体积: 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 00:53:43                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:46:41                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	34668	1.609	6899	4023	1.067	--
2	2.805	2120182	98.391	316249	4259	1.035	4.840
总计		2154850	100.000	323148			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3202-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-90min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 3-53  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/23 00:58:04                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:46:43                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	35242	1.613	7034	4034	1.065	--
2	2.803	2149960	98.387	320297	4255	1.035	4.833
总计		2185202	100.000	327332			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3203-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-120min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-5  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 01:02:27                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:46:46                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	34625	1.611	6894	4020	1.064	--
2	2.804	2115139	98.389	315813	4268	1.036	4.833
总计		2149764	100.000	322707			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3204-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-120min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-14  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 01:06:49                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:46:49                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	36122	1.619	7207	4035	1.063	--
2	2.804	2194432	98.381	327133	4257	1.037	4.842
总计		2230554	100.000	334339			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3205-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-120min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-23  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/23 01:11:13 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:46:52 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	35246	1.640	7026	4014	1.065	--
2	2.804	2114392	98.360	315449	4257	1.035	4.843
总计		2149638	100.000	322475			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3µm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3206-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-120min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-32  
 进样体积: 10 µl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 01:15:36                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:46:55                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	36496	1.676	7289	4052	1.062	--
2	2.801	2141325	98.324	318955	4271	1.037	4.825
总计		2177821	100.000	326244			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3µm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3207-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-120min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-41  
 进样体积: 10 µl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 01:19:59                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:46:57                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	34477	1.554	6885	4036	1.065	--
2	2.802	2183950	98.446	325332	4271	1.037	4.837
总计		2218427	100.000	332218			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3208-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-120min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-50  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/23 01:24:22 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:47:00 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	35834	1.600	7149	4018	1.063	--
2	2.804	2203668	98.400	328719	4255	1.037	4.837
总计		2239502	100.000	335868			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3209-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 4-6

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/23 01:28:45

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:47:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	35219	1.608	7015	4009	1.067	--
2	2.803	2155191	98.392	320533	4239	1.038	4.827
总计		2190409	100.000	327548			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3210-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-15  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 01:33:08                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:47:06                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	37748	1.695	7525	4035	1.066	--
2	2.804	2189022	98.305	326378	4257	1.038	4.835
总计		2226770	100.000	333904			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3211-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P3.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-24  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/23 01:37:31 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:47:09 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	37960	1.715	7581	4036	1.064	--
2	2.802	2175381	98.285	324308	4264	1.036	4.839
总计		2213341	100.000	331888			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3212-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-33  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/23 01:41:54 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:47:12 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	37564	1.717	7479	4026	1.069	--
2	2.807	2149815	98.283	320542	4268	1.035	4.844
总计		2187379	100.000	328021			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3213-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-42  
 进样体积: 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 01:46:16                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:47:15                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	35657	1.561	7100	4050	1.064	--
2	2.802	2247899	98.439	334123	4242	1.038	4.813
总计		2283556	100.000	341223			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3214-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-jxzs-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-51  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 01:50:38                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:47:18                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	36850	1.643	7328	4020	1.063	--
2	2.806	2205630	98.357	328284	4243	1.039	4.835
总计		2242480	100.000	335613			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3µm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3215-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 3-27  
 进样体积 : 10 µl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/23 01:55:00                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:47:20                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	32619	1.532	6498	4011	1.063	--
2	2.805	2096826	98.468	312693	4254	1.036	4.837
总计		2129445	100.000	319191			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3216-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 3-27  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/23 01:59:22                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:47:23                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	32561	1.528	6491	4015	1.063	--
2	2.804	2098241	98.472	312947	4255	1.036	4.837
总计		2130801	100.000	319438			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3217-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-rj.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-9  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/23 02:03:45 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:47:26 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3218-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/23 02:08:08 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:47:29 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	32557	1.526	6508	4035	1.062	--
2	2.803	2101308	98.474	312982	4250	1.036	4.838
总计		2133865	100.000	319490			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3219-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 02:12:32                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:47:32                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	32699	1.531	6500	4016	1.062	--
2	2.806	2102589	98.469	313558	4255	1.036	4.835
总计		2135288	100.000	320058			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3220-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 02:16:55                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:47:34                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	32635	1.529	6509	4022	1.067	--
2	2.804	2101096	98.471	313144	4251	1.036	4.837
总计		2133731	100.000	319653			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3221-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 02:21:17                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:47:37                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	32542	1.524	6503	4028	1.067	--
2	2.805	2102758	98.476	313570	4257	1.036	4.842
总计		2135299	100.000	320074			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3µm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3222-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 µl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 02:25:39                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:47:40                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	32522	1.524	6486	4014	1.064	--
2	2.805	2101882	98.476	313380	4251	1.036	4.840
总计		2134404	100.000	319866			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3223-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/23 02:30:02

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:47:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	24561	3.824	4890	4007	1.075	--
2	2.813	617776	96.176	93864	4452	0.995	4.960
总计		642336	100.000	98754			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3224-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 02:34:24                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:47:45                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	24674	4.072	4909	4004	1.074	--
2	2.815	581300	95.928	88252	4451	0.995	4.972
总计		605974	100.000	93161			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3µm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3225-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-19  
 进样体积: 10 µl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 02:38:46                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:47:48                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	24334	4.268	4820	3999	1.072	--
2	2.814	545762	95.732	82922	4458	0.993	4.981
总计		570096	100.000	87742			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3226-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-28  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 02:43:07                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:47:51                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	24763	4.477	4931	4015	1.075	--
2	2.814	528314	95.523	80334	4461	0.993	4.965
总计		553077	100.000	85265			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3227-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-37  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 02:47:28                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:47:54                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	24012	4.112	4780	4006	1.077	--
2	2.815	559943	95.888	84946	4450	0.994	4.970
总计		583955	100.000	89727			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3228-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 02:51:49                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:47:56                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	23077	4.406	4597	4010	1.075	--
2	2.815	500646	95.594	76141	4470	0.992	4.983
总计		523724	100.000	80738			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3229-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 02:56:11                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:47:59                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	32000	2.865	6363	4005	1.074	--
2	2.812	1085062	97.135	163829	4394	1.008	4.931
总计		1117062	100.000	170192			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3230-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 03:00:33                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:48:02                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	33258	2.948	6601	3992	1.073	--
2	2.811	1095010	97.052	165019	4385	1.008	4.925
总计		1128267	100.000	171620			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3231-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/23 03:04:55

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:48:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	34290	3.095	6749	3984	--	--
2	2.808	1073681	96.905	162239	4410	1.007	4.930
总计		1107970	100.000	168988			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3232-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 03:09:16                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:48:07                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	33990	3.196	6750	3992	1.073	--
2	2.811	1029466	96.804	155417	4405	1.008	4.926
总计		1063456	100.000	162167			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3233-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 03:13:38                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:48:10                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	32094	2.907	6383	4005	1.074	--
2	2.808	1071993	97.093	161265	4379	1.007	4.913
总计		1104087	100.000	167648			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3234-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/23 03:17:59

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:48:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	33460	3.068	6642	3998	1.073	--
2	2.812	1057147	96.932	159799	4408	1.006	4.942
总计		1090608	100.000	166441			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3235-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-3  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/23 03:22:21 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:48:16 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	33426	2.403	6647	4009	1.072	--
2	2.809	1357317	97.597	203410	4355	1.016	4.910
总计		1390743	100.000	210057			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3236-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-12  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/23 03:26:44 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:48:18 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	35066	2.515	6955	4008	1.073	--
2	2.805	1359479	97.485	205629	4384	1.016	4.910
总计		1394545	100.000	212584			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3237-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 10  $\mu$ l

进样时间: 2024/08/23 03:31:05

处理时间(V2): 2024/08/23 09:48:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	33786	2.433	6897	4131	1.046	--
2	2.806	1354953	97.567	203809	4339	1.015	4.935
总计		1388738	100.000	210706			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3238-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-30  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/23 03:35:28 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:48:24 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	35900	2.657	7092	3990	1.072	--
2	2.804	1315320	97.343	198272	4350	1.013	4.897
总计		1351220	100.000	205363			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3239-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-39  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 03:39:50                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:48:26                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	33672	2.424	6664	3999	1.072	--
2	2.805	1355222	97.576	204180	4344	1.017	4.899
总计		1388893	100.000	210844			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3240-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-15min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-48  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/23 03:44:12 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:48:29 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	35459	2.558	7059	4006	1.068	--
2	2.809	1350986	97.442	202713	4369	1.015	4.906
总计		1386446	100.000	209772			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3241-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-4  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 03:48:34                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:48:32                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.065	34171	2.198	6789	3982	1.071	--
2	2.804	1520151	97.802	228225	4313	1.020	4.904
总计		1554322	100.000	235013			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3242-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-13  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 03:52:57                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:48:35                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	36189	2.267	7189	3991	1.068	--
2	2.809	1560396	97.733	232946	4318	1.023	4.883
总计		1596585	100.000	240136			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3243-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/23 03:57:19

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:48:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	35586	2.300	7080	4002	1.069	--
2	2.808	1511923	97.700	226549	4331	1.020	4.894
总计		1547509	100.000	233629			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3244-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-31  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 04:01:41                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:48:40                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	36419	2.392	7208	4011	1.100	--
2	2.809	1485858	97.608	222051	4329	1.019	4.890
总计		1522277	100.000	229259			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3245-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-40  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/23 04:06:03 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:48:43 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	34311	2.185	6833	4014	1.068	--
2	2.806	1535706	97.815	231157	4349	1.022	4.893
总计		1570017	100.000	237990			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3246-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-20min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-49  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/23 04:10:25 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:48:46 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	36214	2.284	7202	4007	1.072	--
2	2.807	1549301	97.716	232593	4331	1.021	4.893
总计		1585516	100.000	239795			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3247-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-5  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 04:14:47                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:48:48                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	35737	1.953	7119	4023	1.071	--
2	2.808	1793885	98.047	268457	4310	1.027	4.875
总计		1829622	100.000	275576			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3248-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-14  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/23 04:19:09 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:48:51 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	36617	2.010	7288	4003	1.068	--
2	2.808	1785202	97.990	266533	4304	1.028	4.879
总计		1821818	100.000	273821			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3249-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/23 04:23:30

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 09:48:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	36487	2.035	7254	4004	1.066	--
2	2.808	1756851	97.965	262593	4313	1.027	4.877
总计		1793338	100.000	269847			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3250-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-32  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/23 04:27:52 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 09:48:57 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	36952	2.100	7365	4029	1.071	--
2	2.807	1722605	97.900	257918	4312	1.025	4.878
总计		1759557	100.000	265282			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3251-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-41  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/23 04:32:14                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:48:59                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	35492	1.929	7078	4024	1.070	--
2	2.808	1804087	98.071	269285	4302	1.027	4.879
总计		1839579	100.000	276363			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-92/24-3252-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-50  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/23 04:36:36                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 09:49:02                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	36362	2.009	7240	4010	1.068	--
2	2.808	1773416	97.991	264802	4304	1.027	4.881
总计		1809778	100.000	272042			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3µm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-93/24-3253-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-6  
 进样体积: 10 µl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 04:40:58                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 10:12:22                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	35538	1.736	7308	4137	1.090	--
2	2.807	2011770	98.264	302918	4326	1.031	4.901
总计		2047308	100.000	310226			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-93/24-3254-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-15  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 04:45:20                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 10:12:26                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	37561	1.775	7725	4149	1.091	--
2	2.807	2078357	98.225	313225	4328	1.032	4.903
总计		2115917	100.000	320950			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-93/24-3255-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-24  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 04:49:42                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 10:12:29                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	38111	1.796	7840	4138	1.089	--
2	2.807	2083563	98.204	313907	4329	1.031	4.903
总计		2121675	100.000	321747			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-93/24-3256-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/23 04:54:03

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 10:12:32

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	37209	1.824	7651	4140	1.086	--
2	2.808	2002244	98.176	301763	4332	1.030	4.898
总计		2039453	100.000	309414			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-93/24-3257-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-42  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 04:58:24                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 10:12:35                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	36259	1.692	7455	4159	1.087	--
2	2.806	2106131	98.308	316630	4321	1.032	4.887
总计		2142389	100.000	324084			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-93/24-3258-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-51  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/23 05:02:45                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 10:12:38                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	36930	1.746	7591	4131	1.088	--
2	2.809	2078342	98.254	313029	4328	1.032	4.909
总计		2115272	100.000	320620			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3259-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-7  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 05:07:06                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 10:13:46                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	35243	1.701	7014	4012	1.069	--
2	2.805	2037267	98.299	304419	4273	1.034	4.859
总计		2072510	100.000	311433			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3260-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-16  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 05:11:29                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 10:13:49                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	37708	1.753	7500	4017	1.066	--
2	2.808	2112864	98.247	314649	4271	1.036	4.854
总计		2150572	100.000	322149			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3261-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-25  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 05:15:51                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 10:13:52                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	37403	1.783	7451	4016	1.067	--
2	2.807	2060616	98.217	307315	4272	1.034	4.857
总计		2098018	100.000	314767			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3262-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-34  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 05:20:13                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 10:13:55                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	37048	1.817	7394	4025	1.067	--
2	2.807	2001767	98.183	298697	4275	1.032	4.859
总计		2038814	100.000	306091			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3263-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-43  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/23 05:24:35 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 10:13:58 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	35489	1.671	7074	4029	1.065	--
2	2.808	2088653	98.329	310842	4263	1.035	4.855
总计		2124142	100.000	317916			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3264-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-52  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/23 05:28:57                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 10:14:00                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	36622	1.734	7285	4007	1.065	--
2	2.806	2074825	98.266	309616	4265	1.035	4.846
总计		2111447	100.000	316901			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3265-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-90min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-8  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 05:33:19                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 10:14:03                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	35086	1.628	6999	4022	1.065	--
2	2.808	2120022	98.372	315292	4268	1.036	4.864
总计		2155108	100.000	322291			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3266-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-90min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-17  
 进样体积: 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 05:37:42                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 10:14:06                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	37246	1.697	7426	4020	1.064	--
2	2.807	2157275	98.303	321438	4263	1.037	4.854
总计		2194521	100.000	328864			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3267-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-90min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-26  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 05:42:05                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 10:14:08                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	37480	1.728	7471	4017	1.064	--
2	2.807	2131572	98.272	317668	4264	1.037	4.856
总计		2169052	100.000	325139			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3268-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-90min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-35  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 05:46:27                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 10:14:11                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	37101	1.737	7403	4023	1.063	--
2	2.805	2098363	98.263	312786	4255	1.035	4.848
总计		2135464	100.000	320188			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3269-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-90min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 1-44  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 05:50:50                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 10:14:14                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	35006	1.598	6987	4021	1.067	--
2	2.804	2155157	98.402	320859	4240	1.037	4.843
总计		2190162	100.000	327846			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3270-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-90min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号 : 1-53  
 进样体积 : 10 μl                                              版本号: 6.115  
 进样时间 : 2024/08/23 05:55:13                      实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 10:14:17                      处理者: xiechaojun  
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	36444	1.650	7269	4019	1.066	--
2	2.808	2172731	98.350	323024	4256	1.037	4.857
总计		2209175	100.000	330293			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3271-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-120min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-7  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/23 05:59:36 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 10:14:19 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	35321	1.626	7010	3989	1.069	--
2	2.804	2137454	98.374	317781	4235	1.039	4.833
总计		2172774	100.000	324791			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3272-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-120min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-16  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 06:03:59                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 10:14:22                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	35971	1.624	7089	3935	1.069	--
2	2.807	2178917	98.376	322271	4217	1.039	4.816
总计		2214888	100.000	329360			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 40°C

波 长: 237nm

数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3273-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-120min-P3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb

样品瓶号: 4-25

进样体积: 10  $\mu$ l

版本号: 6.115

进样时间: 2024/08/23 06:08:23

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2024/08/23 10:14:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	37193	1.684	7408	4014	1.065	--
2	2.808	2171582	98.316	322637	4257	1.038	4.856
总计		2208776	100.000	330045			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3274-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-120min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-34  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 06:12:46                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 10:14:27                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	36050	1.659	7173	3997	1.065	--
2	2.806	2136650	98.341	318340	4252	1.037	4.851
总计		2172699	100.000	325513			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
 柱温: 40°C 波长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3275-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-120min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-43  
 进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 06:17:10 实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 10:14:30 处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	34532	1.575	6900	4026	1.068	--
2	2.805	2158461	98.425	321681	4249	1.037	4.846
总计		2192993	100.000	328581			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3276-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-120min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-52  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/23 06:21:33 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 10:14:33 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.069	34633	1.584	6896	4029	1.065	--
2	2.802	2151429	98.416	320580	4257	1.036	4.856
总计		2186062	100.000	327476			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3277-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-8  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/23 06:25:56 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 10:14:35 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.059	36128	1.628	7180	4013	1.070	--
2	2.790	2182807	98.372	326537	4245	1.038	4.852
总计		2218936	100.000	333717			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3278-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-17  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/23 06:30:19 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 10:14:38 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	35923	1.609	7172	4031	1.068	--
2	2.806	2197206	98.391	327431	4254	1.039	4.847
总计		2233129	100.000	334603			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3279-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-26  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 06:34:43                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 10:14:41                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	36570	1.651	7291	4021	1.064	--
2	2.806	2178139	98.349	324786	4257	1.037	4.854
总计		2214708	100.000	332077			




# SMF-203

## <样品信息>

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3μm)                      流 速: 1.0ml/min  
 柱 温: 40°C                                                      波 长: 237nm  
 数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3280-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
 样品瓶号: 4-35  
 进样体积: 10 μl                                                      版本号: 6.115  
 进样时间: 2024/08/23 06:39:06                              实验者: xiechaojun  
 处理时间(V2): 2024/08/23 10:14:44                        处理者: xiechaojun  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	36801	1.670	7325	4014	1.069	--
2	2.804	2166231	98.330	322225	4232	1.039	4.843
总计		2203033	100.000	329550			




## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3282-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-jxzs-P6.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 4-53  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/23 06:47:53 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 10:14:49 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	35159	1.604	7009	4021	1.067	--
2	2.807	2156206	98.396	320829	4251	1.038	4.851
总计		2191365	100.000	327837			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3283-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz2-1.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-27  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/23 06:52:16 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 10:14:52 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.071	32553	1.530	6480	4008	1.065	--
2	2.806	2094662	98.470	312024	4249	1.036	4.853
总计		2127215	100.000	318504			

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱: XB-C8(50mm\*4.6mm,3 $\mu$ m) 流速: 1.0ml/min  
柱温: 40°C 波长: 237nm  
数据文件名: RC\$SMF-203 - 0-94/24-3284-2 - zzp-z3-24032501p-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz2-2.lcd  
方法文件名: RC\$SMF-203 - SMF-203-rcqx-FX273.lcm  
批处理文件名: RC\$SMF-203 - 20240822-rcqx-FX273.lcb  
样品瓶号: 1-27  
进样体积: 10  $\mu$ l 版本号: 6.115  
进样时间: 2024/08/23 06:56:39 实验者: xiechaojun  
处理时间(V2): 2024/08/23 10:14:55 处理者: xiechaojun  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	32581	1.531	6492	4014	1.065	--
2	2.809	2095987	98.469	310934	4257	1.037	4.864
总计		2128568	100.000	317427			