




SMF-386

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-76/3-249-2 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2024/08/26 11:46:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2024/08/27 09:07:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-76/3-250-2 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 11:50:18 实验者: xiechaojun
 处理时间(V2): 2024/08/27 09:07:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.786	308941	100.000	55812	5841	1.160	--
总计		308941	100.000	55812			


图2 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-76/3-251-2 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 11:54:13 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V2): 2024/08/27 09:07:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.768	311837	100.000	56017	5753	1.167	--
总计		311837	100.000	56017			


图3 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-252-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 11:58:08 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:16:26 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.765	309348	100.000	56043	5786	1.161	--
总计		309348	100.000	56043			


图4 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-253-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 12:02:04 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:16:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.763	309566	100.000	56117	5775	1.160	--
总计		309566	100.000	56117			


图5 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-254-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 12:05:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:16:31 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.763	309592	100.000	56108	5777	1.159	--
总计		309592	100.000	56108			


图6 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-255-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 12:09:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:16:34 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.763	109577	100.000	19763	5770	1.138	--
总计		109577	100.000	19763			


图7 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-256-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 12:13:49 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:16:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.764	106600	100.000	19265	5777	1.136	--
总计		106600	100.000	19265			


图8 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-257-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 12:17:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:16:39 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.764	100927	100.000	18217	5775	1.135	--
总计		100927	100.000	18217			


图9 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-258-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 12:21:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:16:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.764	107347	100.000	19405	5770	1.138	--
总计		107347	100.000	19405			


图10 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-259-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 12:25:33 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:16:44 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.764	91435	100.000	16537	5790	1.135	--
总计		91435	100.000	16537			


图11 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-260-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 12:29:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:16:46 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.763	115634	100.000	20896	5770	1.140	--
总计		115634	100.000	20896			


图12 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-261-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 12:33:21 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:16:49 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.760	253144	100.000	45483	5726	1.156	--
总计		253144	100.000	45483			


图13 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-262-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 12:37:16 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:16:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.760	248605	100.000	44636	5727	1.156	--
总计		248605	100.000	44636			


图14 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-263-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 12:41:11 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:16:54 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	249266	100.000	44719	5717	1.156	--
总计		249266	100.000	44719			


图15 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-264-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 12:45:06 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:16:57 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	250489	100.000	44921	5725	1.155	--
总计		250489	100.000	44921			


图16 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-265-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 12:49:00 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:16:59 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.760	243224	100.000	43747	5723	1.154	--
总计		243224	100.000	43747			


图17 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-266-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 12:52:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:17:02 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	250484	100.000	44942	5716	1.157	--
总计		250484	100.000	44942			


图18 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-267-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 12:56:49 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:17:05 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	285684	100.000	51312	5705	1.161	--
总计		285684	100.000	51312			


图19 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-268-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 13:00:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:17:07 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	283068	100.000	50850	5706	1.161	--
总计		283068	100.000	50850			


图20 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-269-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 13:04:39 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:17:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	281966	100.000	50535	5702	1.160	--
总计		281966	100.000	50535			


图21 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-270-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 13:08:34 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:17:12 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	286489	100.000	51424	5702	1.161	--
总计		286489	100.000	51424			


图22 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-271-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 13:12:28 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:17:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	277317	100.000	49905	5701	1.160	--
总计		277317	100.000	49905			


图23 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-272-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 13:16:22 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:17:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	280532	100.000	50438	5705	1.159	--
总计		280532	100.000	50438			


图24 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-273-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 13:20:17 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:17:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	294225	100.000	52800	5697	1.162	--
总计		294225	100.000	52800			


图25 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-274-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 13:24:11 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:17:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	291691	100.000	52306	5697	1.161	--
总计		291691	100.000	52306			


图26 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-275-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 13:28:05 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:17:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	290850	100.000	52163	5696	1.161	--
总计		290850	100.000	52163			


图27 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-276-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 13:32:00 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:17:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	295085	100.000	52960	5697	1.162	--
总计		295085	100.000	52960			


图28 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-277-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 13:35:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:17:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	286184	100.000	51368	5696	1.161	--
总计		286184	100.000	51368			


图29 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-278-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 13:39:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:17:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	288444	100.000	51654	5707	1.162	--
总计		288444	100.000	51654			


图30 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-279-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 13:43:42 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:17:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	298360	100.000	53628	5694	1.163	--
总计		298360	100.000	53628			


图31 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-280-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 13:47:37 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:17:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	296746	100.000	53410	5691	1.162	--
总计		296746	100.000	53410			


图32 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-281-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 13:51:32 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:17:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	295525	100.000	53109	5699	1.162	--
总计		295525	100.000	53109			


图33 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-282-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 13:55:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:17:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	300257	100.000	53987	5699	1.162	--
总计		300257	100.000	53987			


图34 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-283-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 13:59:22 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:17:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	290954	100.000	52238	5696	1.162	--
总计		290954	100.000	52238			


图35 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-284-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 14:03:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:17:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	292662	100.000	52619	5699	1.162	--
总计		292662	100.000	52619			


图36 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-285-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 14:07:11 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:17:52 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	300787	100.000	54138	5693	1.162	--
总计		300787	100.000	54138			


图37 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-286-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 14:11:06 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:17:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	299316	100.000	53797	5694	1.163	--
总计		299316	100.000	53797			


图38 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-287-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 14:15:01 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:17:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	297959	100.000	53535	5694	1.163	--
总计		297959	100.000	53535			


图39 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-288-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 14:18:56 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:18:00 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	303106	100.000	54516	5689	1.163	--
总计		303106	100.000	54516			


图40 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-289-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 14:22:51 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:18:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	294158	100.000	52865	5692	1.162	--
总计		294158	100.000	52865			


图41 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-290-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 14:26:45 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:18:05 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	294865	100.000	52980	5693	1.162	--
总计		294865	100.000	52980			


图42 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-291-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 14:30:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:18:08 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	300636	100.000	54009	5691	1.162	--
总计		300636	100.000	54009			


图43 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-292-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 14:34:34 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:18:10 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	299878	100.000	53891	5688	1.163	--
总计		299878	100.000	53891			


图44 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-293-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 14:38:29 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:18:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	298525	100.000	53596	5695	1.163	--
总计		298525	100.000	53596			


图45 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-294-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 14:42:24 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:18:15 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	304041	100.000	54596	5694	1.163	--
总计		304041	100.000	54596			


图46 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-295-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 14:46:19 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:18:18 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	294816	100.000	52919	5693	1.163	--
总计		294816	100.000	52919			


图47 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-296-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 14:50:14 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:18:20 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	295024	100.000	52989	5697	1.162	--
总计		295024	100.000	52989			


图48 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-297-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-8
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 14:54:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:18:23 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	302039	100.000	54267	5689	1.163	--
总计		302039	100.000	54267			


图49 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-298-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-17
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 14:58:06 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:18:25 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	304425	100.000	54713	5689	1.163	--
总计		304425	100.000	54713			


图50 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-299-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-26
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 15:02:01 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:18:28 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	301811	100.000	54267	5686	1.163	--
总计		301811	100.000	54267			


图51 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-300-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-35
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 15:05:57 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:18:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	307548	100.000	55259	5689	1.163	--
总计		307548	100.000	55259			


图52 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-301-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-44
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 15:09:52 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:18:33 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	299851	100.000	53871	5681	1.162	--
总计		299851	100.000	53871			


图53 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-302-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-53
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 15:13:48 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:18:36 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	299717	100.000	53693	5691	1.164	--
总计		299717	100.000	53693			


图54 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-303-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 15:17:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:18:38 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.761	309154	100.000	55825	5755	1.160	--
总计		309154	100.000	55825			


图55 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-78/3-304-3 - zzp-24082101p-pH6.8jz-180mg-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 15:21:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:18:41 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.760	309026	100.000	55697	5754	1.161	--
总计		309026	100.000	55697			


图56 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082101批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-79/3-305-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 15:25:37 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:20:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图57 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
 溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-306-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 15:29:33 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:21:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.760	308922	100.000	55684	5753	1.160	--
总计		308922	100.000	55684			


图58 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-307-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 15:33:29 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:21:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.761	308732	100.000	55750	5754	1.160	--
总计		308732	100.000	55750			


图59 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-308-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 15:37:26 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:21:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.761	308658	100.000	55799	5759	1.160	--
总计		308658	100.000	55799			


图60 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-309-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 15:41:23 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:21:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.761	308673	100.000	55805	5756	1.160	--
总计		308673	100.000	55805			


图61 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-310-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 15:45:20 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:21:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.761	308979	100.000	55838	5756	1.160	--
总计		308979	100.000	55838			


图62 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-311-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 15:49:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:21:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.761	122168	100.000	21982	5742	1.140	--
总计		122168	100.000	21982			


图63 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-312-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 15:53:13 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:21:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.761	107395	100.000	19319	5737	1.141	--
总计		107395	100.000	19319			


图64 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-313-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 15:57:09 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:21:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.761	89767	100.000	16133	5733	1.137	--
总计		89767	100.000	16133			


图65 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-314-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 16:01:05 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:21:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.761	93533	100.000	16808	5730	1.134	--
总计		93533	100.000	16808			


图66 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-315-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 16:05:02 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:21:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.761	103679	100.000	18683	5747	1.134	--
总计		103679	100.000	18683			


图67 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-316-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 16:08:58 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:21:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.761	125764	100.000	22625	5747	1.140	--
总计		125764	100.000	22625			


图68 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-317-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 16:12:54 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:21:42 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	250667	100.000	44987	5698	1.158	--
总计		250667	100.000	44987			


图69 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-318-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 16:16:50 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:21:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	257785	100.000	46272	5692	1.158	--
总计		257785	100.000	46272			


图70 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-319-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 16:20:47 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:21:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	247751	100.000	44481	5696	1.158	--
总计		247751	100.000	44481			


图71 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-320-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 16:24:43 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:21:50 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	241688	100.000	43405	5692	1.156	--
总计		241688	100.000	43405			


图72 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-321-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 16:28:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:21:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	251683	100.000	45113	5702	1.158	--
总计		251683	100.000	45113			


图73 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-322-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 16:32:33 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:21:55 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	259712	100.000	46556	5705	1.157	--
总计		259712	100.000	46556			


图74 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-323-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 16:36:28 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:21:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	278949	100.000	50160	5687	1.160	--
总计		278949	100.000	50160			


图75 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-324-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 16:40:24 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:22:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	293219	100.000	52659	5670	1.162	--
总计		293219	100.000	52659			


图76 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-325-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 16:44:20 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:22:03 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	286370	100.000	51435	5670	1.161	--
总计		286370	100.000	51435			


图77 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-326-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 16:48:16 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:22:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	283536	100.000	50970	5672	1.161	--
总计		283536	100.000	50970			


图78 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-327-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 16:52:12 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:22:08 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	284850	100.000	51222	5692	1.161	--
总计		284850	100.000	51222			


图79 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-328-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 16:56:08 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:22:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	288260	100.000	51834	5697	1.161	--
总计		288260	100.000	51834			


图80 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-329-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 17:00:05 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:22:13 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	285766	100.000	51389	5683	1.160	--
总计		285766	100.000	51389			


图81 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-330-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 17:04:01 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:22:16 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	302052	100.000	54266	5661	1.164	--
总计		302052	100.000	54266			


图82 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-331-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 17:07:57 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:22:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	295058	100.000	53035	5671	1.163	--
总计		295058	100.000	53035			


图83 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-332-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 17:11:54 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:22:21 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	293487	100.000	52736	5672	1.162	--
总计		293487	100.000	52736			


图84 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-333-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 17:15:50 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:22:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	292385	100.000	52525	5690	1.161	--
总计		292385	100.000	52525			


图85 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-334-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 17:19:46 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:22:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	294988	100.000	52954	5695	1.162	--
总计		294988	100.000	52954			


图86 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-335-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 17:23:42 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:22:30 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	289688	100.000	52065	5695	1.161	--
总计		289688	100.000	52065			


图87 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-336-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 17:27:39 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:22:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	305860	100.000	54916	5670	1.164	--
总计		305860	100.000	54916			


图88 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-337-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 17:31:35 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:22:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	299122	100.000	53693	5679	1.163	--
总计		299122	100.000	53693			


图89 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-338-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 17:35:31 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:22:37 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	299105	100.000	53477	5680	1.162	--
总计		299105	100.000	53477			


图90 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-339-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 17:39:27 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:22:40 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	296461	100.000	53241	5698	1.162	--
总计		296461	100.000	53241			


图91 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-340-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 17:43:24 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:22:43 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	299114	100.000	53777	5697	1.162	--
总计		299114	100.000	53777			


图92 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-341-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 17:47:20 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:22:45 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	292153	100.000	52552	5686	1.161	--
总计		292153	100.000	52552			


图93 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-342-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 17:51:17 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:22:48 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	307744	100.000	55339	5672	1.163	--
总计		307744	100.000	55339			


图94 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-343-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 17:55:13 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:22:51 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	300743	100.000	54029	5676	1.163	--
总计		300743	100.000	54029			


图95 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-344-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 17:59:10 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:22:53 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	301363	100.000	54042	5678	1.163	--
总计		301363	100.000	54042			


图96 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-345-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 18:03:06 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:22:56 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	298315	100.000	53624	5702	1.161	--
总计		298315	100.000	53624			


图97 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-346-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 18:07:02 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:22:58 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	301703	100.000	54136	5703	1.162	--
总计		301703	100.000	54136			


图98 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-347-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 18:10:59 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:23:01 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	292729	100.000	52719	5686	1.160	--
总计		292729	100.000	52719			


图99 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-348-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 18:14:55 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:23:04 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	307714	100.000	55279	5676	1.163	--
总计		307714	100.000	55279			


图100 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-349-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 50 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 18:18:51 实验者: xiechaojun
 处理时间(V3): 2024/08/27 09:23:06 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	300782	100.000	54103	5680	1.162	--
总计		300782	100.000	54103			


图101 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-350-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 18:22:47 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:23:09 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	302115	100.000	54245	5690	1.162	--
总计		302115	100.000	54245			


图102 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-351-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 18:26:44 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:23:11 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	298332	100.000	53715	5703	1.161	--
总计		298332	100.000	53715			


图103 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-352-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 18:30:40 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:23:14 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	301572	100.000	54153	5709	1.161	--
总计		301572	100.000	54153			


图104 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-353-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-8
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 18:34:36 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:23:17 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	292520	100.000	52682	5694	1.160	--
总计		292520	100.000	52682			


图105 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-354-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-17
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 18:38:33 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:23:19 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	309126	100.000	55469	5680	1.163	--
总计		309126	100.000	55469			


图106 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-355-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-26
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 18:42:29 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:23:22 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.756	303196	100.000	54596	5678	1.161	--
总计		303196	100.000	54596			


图107 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-356-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-35
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 18:46:25 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:23:24 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.757	302714	100.000	54405	5681	1.162	--
总计		302714	100.000	54405			


图108 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-357-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-44
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 18:50:22 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:23:27 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.758	297977	100.000	53578	5702	1.161	--
总计		297977	100.000	53578			


图109 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-358-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-53
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 18:54:19 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:23:29 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.759	302935	100.000	54321	5704	1.161	--
总计		302935	100.000	54321			


图110 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-359-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 18:58:16 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:23:32 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.761	308887	100.000	55938	5781	1.158	--
总计		308887	100.000	55938			


图111 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50*4.6mm,3μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温:30℃ 波长: 214nm
 数据文件名: RC\$SMF-386 - 0-80/3-360-3 - zzp-24082102p-pH6.8jz-180mg-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-386 - SMF-386-rcqx-FX253.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-386 - 20240826-rcqx-FX253.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 50 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2024/08/26 19:02:13 实验者: xiechaojun
 处理时间 (V3): 2024/08/27 09:23:35 处理者: xiechaojun
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX253)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 214nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.762	308903	100.000	56002	5781	1.157	--
总计		308903	100.000	56002			

图112 贝派度酸片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-24082102批(180mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2