



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-1-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-rj.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-9

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 11:49:45

处理时间(V2)：2024/09/12 09:49:40

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
溶剂



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377


<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-2-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μ l
进样时间：2024/09/11 11:54:22
处理时间(V2)：2024/09/12 09:49:45
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	100.000	473423	73255	3034	1.229	--
总计		100.000	473423	73255			

图2 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-3-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 11:57:45

处理时间(V2)：2024/09/12 09:49:48

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	100.000	473733	73176	3034	1.237	--
总计		100.000	473733	73176			

图3 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-2



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-4-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 12:01:08

处理时间(V2)：2024/09/12 09:49:50

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	100.000	473543	73041	3033	1.243	--
总计		100.000	473543	73041			

图4 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-3



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-5-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 12:04:30

处理时间(V2)：2024/09/12 09:49:54

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	100.000	473337	72955	3037	1.247	--
总计		100.000	473337	72955			

图5 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-4



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-6-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 12:07:53

处理时间(V2)：2024/09/12 09:49:56

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	100.000	473179	72797	3031	1.250	--
总计		100.000	473179	72797			

图6 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-5



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-7-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-1

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 12:11:14

处理时间(V2)：2024/09/12 09:49:59

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	100.000	341133	56844	3687	1.273	--
总计		100.000	341133	56844			

图7 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-8-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：1-10
进样体积：10 μ l
进样时间：2024/09/11 12:14:37
处理时间(V2)：2024/09/12 09:50:02
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	100.000	344985	57425	3686	1.278	--
总计		100.000	344985	57425			

图8 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-9-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-19

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 12:17:59

处理时间(V2)：2024/09/12 09:50:04

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	100.000	330087	54980	3689	1.279	--
总计		100.000	330087	54980			

图9 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-10-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-28

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 12:21:21

处理时间(V2)：2024/09/12 09:50:07

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	100.000	328909	54718	3690	1.283	--
总计		100.000	328909	54718			

图10 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-11-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-37

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 12:24:43

处理时间(V2)：2024/09/12 09:50:10

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	100.000	328639	54689	3695	1.284	--
总计		100.000	328639	54689			

图11 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-12-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-46

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 12:28:05

处理时间(V2)：2024/09/12 09:50:12

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	100.000	321254	53432	3695	1.286	--
总计		100.000	321254	53432			

图12 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-13-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-2

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 12:31:27

处理时间(V2)：2024/09/12 09:50:16

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	100.000	412887	68634	3694	1.288	--
总计		100.000	412887	68634			

图13 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-14-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-11

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 12:34:50

处理时间(V2)：2024/09/12 09:50:19

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	100.000	405598	67413	3698	1.289	--
总计		100.000	405598	67413			

图14 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-15-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-20

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 12:38:12

处理时间(V2)：2024/09/12 09:50:22

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	100.000	406226	67463	3694	1.292	--
总计		100.000	406226	67463			

图15 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-16-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-29

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 12:41:34

处理时间(V2)：2024/09/12 09:50:26

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	100.000	403750	67097	3697	1.291	--
总计		100.000	403750	67097			

图16 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-17-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-38

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 12:44:56

处理时间(V2)：2024/09/12 09:50:29

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	100.000	401865	66742	3697	1.294	--
总计		100.000	401865	66742			

图17 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-18-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-47

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 12:48:18

处理时间(V2)：2024/09/12 09:50:31

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	100.000	406063	67427	3696	1.295	--
总计		100.000	406063	67427			

图18 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-19-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-3

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 12:51:40

处理时间(V2)：2024/09/12 09:50:34

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	100.000	440051	73029	3695	1.295	--
总计		100.000	440051	73029			

图19 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-20-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-12

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 12:55:02

处理时间(V2)：2024/09/12 09:50:37

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	100.000	430509	71360	3688	1.298	--
总计		100.000	430509	71360			

图20 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-21-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-21

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 12:58:24

处理时间(V2)：2024/09/12 09:50:40

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	100.000	431907	71606	3690	1.298	--
总计		100.000	431907	71606			

图21 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-22-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-30

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 13:01:46

处理时间(V2)：2024/09/12 09:50:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	100.000	430655	71390	3691	1.300	--
总计		100.000	430655	71390			

图22 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-23-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：1-39
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/09/11 13:05:08 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 09:50:45 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	427262	70810	3692	1.300	--
总计		100.000	427262	70810			

图23 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-24-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-48

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 13:08:30

处理时间(V2)：2024/09/12 09:50:48

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	100.000	434138	71964	3693	1.301	--
总计		100.000	434138	71964			

图24 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-25-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-4

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 13:11:52

处理时间(V2)：2024/09/12 09:50:50

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	100.000	453852	75290	3698	1.299	--
总计		100.000	453852	75290			

图25 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-26-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-13

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 13:15:14

处理时间(V2)：2024/09/12 09:50:53

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	442867	73422	3696	1.301	--
总计		100.000	442867	73422			

图26 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-27-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-22

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 13:18:35

处理时间(V2)：2024/09/12 09:50:56

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	100.000	446766	74034	3693	1.303	--
总计		100.000	446766	74034			

图27 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-28-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-31

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 13:21:56

处理时间(V2)：2024/09/12 09:50:59

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	444607	73662	3695	1.304	--
总计		100.000	444607	73662			

图28 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-29-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：1-40
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/09/11 13:25:17 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 09:51:02 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	440604	72924	3690	1.304	--
总计		100.000	440604	72924			

图29 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-30-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-49

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 13:28:39

处理时间(V2)：2024/09/12 09:51:05

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	448398	74247	3693	1.304	--
总计		100.000	448398	74247			

图30 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-31-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-5

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 13:32:01

处理时间(V2)：2024/09/12 09:51:08

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	470345	77835	3690	1.305	--
总计		100.000	470345	77835			

图31 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-30min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-32-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-14

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 13:35:24

处理时间(V2)：2024/09/12 09:51:11

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	458657	75895	3692	1.306	--
总计		100.000	458657	75895			

图32 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-30min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-33-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：1-23
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/09/11 13:38:46 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 09:51:14 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	460504	76178	3691	1.307	--
总计		100.000	460504	76178			

图33 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-34-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：1-32
进样体积：10 μ l
进样时间：2024/09/11 13:42:08
处理时间(V2)：2024/09/12 09:51:16
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	459897	76167	3698	1.307	--
总计		100.000	459897	76167			

图34 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-30min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-35-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：1-41
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/09/11 13:45:30 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 09:51:19 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	455180	75411	3700	1.306	--
总计		100.000	455180	75411			

图35 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-30min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-36-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-50

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 13:48:52

处理时间(V2)：2024/09/12 09:51:22

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	463400	76749	3699	1.307	--
总计		100.000	463400	76749			

图36 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-30min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-37-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：1-6
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/09/11 13:52:14 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 09:51:24 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	481839	79756	3697	1.307	--
总计		100.000	481839	79756			

图37 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-45min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-38-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-15

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 13:55:36

处理时间(V2)：2024/09/12 09:51:27

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	470831	77975	3700	1.307	--
总计		100.000	470831	77975			

图38 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-45min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-39-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-24

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 13:58:58

处理时间(V2)：2024/09/12 09:51:30

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	472394	78226	3700	1.308	--
总计		100.000	472394	78226			

图39 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-45min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-40-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-33

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 14:02:19

处理时间(V2)：2024/09/12 09:51:32

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	472724	78241	3697	1.308	--
总计		100.000	472724	78241			

图40 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-41-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：1-42
进样体积：10 μ l
进样时间：2024/09/11 14:05:41
处理时间(V2)：2024/09/12 09:51:35
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	466930	77262	3696	1.309	--
总计		100.000	466930	77262			

图41 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-45min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-42-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-51

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 14:09:03

处理时间(V2)：2024/09/12 09:51:38

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	474384	78544	3701	1.309	--
总计		100.000	474384	78544			

图42 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-43-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-7

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 14:12:26

处理时间(V2)：2024/09/12 09:51:40

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	487679	80687	3697	1.309	--
总计		100.000	487679	80687			

图43 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-60min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-44-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-16

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 14:15:49

处理时间(V2)：2024/09/12 09:51:43

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	478925	79287	3701	1.310	--
总计		100.000	478925	79287			

图44 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-45-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：1-25
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/09/11 14:19:11 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 09:51:45 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	480397	79574	3703	1.308	--
总计		100.000	480397	79574			

图45 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-46-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：1-34
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/09/11 14:22:33 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 09:51:48 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	477135	78998	3702	1.309	--
总计		100.000	477135	78998			

图46 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-47-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-43

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 14:25:55

处理时间(V2)：2024/09/12 09:51:51

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	472326	78199	3700	1.309	--
总计		100.000	472326	78199			

图47 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-60min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-48-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-52

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 14:29:17

处理时间(V2)：2024/09/12 09:51:54

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	480721	79570	3701	1.310	--
总计		100.000	480721	79570			

图48 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377


<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-49-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：1-8
进样体积：10 μ l
进样时间：2024/09/11 14:32:39
处理时间(V2)：2024/09/12 09:51:56
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	499798	82587	3692	1.312	--
总计		100.000	499798	82587			

图49 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-50-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-17

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 14:36:02

处理时间(V2)：2024/09/12 09:51:59

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	489011	80908	3699	1.310	--
总计		100.000	489011	80908			

图50 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-51-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-26

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 14:39:25

处理时间(V2)：2024/09/12 09:52:02

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	497094	82157	3695	1.312	--
总计		100.000	497094	82157			

图51 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-52-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：1-35
进样体积：10 μ l
进样时间：2024/09/11 14:42:48
处理时间(V2)：2024/09/12 09:52:04
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	489173	80814	3694	1.313	--
总计		100.000	489173	80814			

图52 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-53-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：1-44
进样体积：10 μ l
进样时间：2024/09/11 14:46:10
处理时间(V2)：2024/09/12 09:52:07
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	485341	80181	3691	1.313	--
总计		100.000	485341	80181			

图53 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-54-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-53

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 14:49:33

处理时间(V2)：2024/09/12 09:52:10

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	490821	81114	3696	1.312	--
总计		100.000	490821	81114			

图54 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-55-2 - cbzj-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz2-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-27

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 14:52:56

处理时间(V2)：2024/09/12 09:52:13

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	100.000	472110	71729	3025	1.298	--
总计		100.000	472110	71729			

图55 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-2-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-56-2 - cbzj-ph4.5-0.1SDSjz-15mg-dz2-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-27

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 14:56:19

处理时间(V2)：2024/09/12 09:52:15

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	100.000	472579	71886	3024	1.298	--
总计		100.000	472579	71886			

图56 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂(15mg规格)-JPS7157-js1M批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-2-2



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-57-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-rj.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-9

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 14:59:43

处理时间(V2)：2024/09/12 09:52:18

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
溶剂



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-58-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/09/11 15:03:07 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 09:52:21 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	100.000	473402	71978	3031	1.298	--
总计		100.000	473402	71978			

图58 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-59-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 15:06:31

处理时间(V2)：2024/09/12 09:52:24

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	100.000	473591	71975	3029	1.298	--
总计		100.000	473591	71975			

图59 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-2



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-60-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 15:09:55

处理时间(V2)：2024/09/12 09:52:26

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	100.000	473689	71990	3030	1.298	--
总计		100.000	473689	71990			

图60 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-61-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/09/11 15:13:19 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 09:52:29 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	100.000	473313	71927	3030	1.299	--
总计		100.000	473313	71927			

图61 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-4



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-62-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 15:16:42

处理时间(V2)：2024/09/12 09:52:32

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	100.000	473317	72027	3031	1.298	--
总计		100.000	473317	72027			

图62 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-5



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-63-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-1

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 15:20:05

处理时间(V2)：2024/09/12 09:52:34

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	312630	51638	3693	1.315	--
总计		100.000	312630	51638			

图63 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-64-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-10

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 15:23:28

处理时间(V2)：2024/09/12 09:52:37

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	333328	55073	3694	1.315	--
总计		100.000	333328	55073			

图64 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-65-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-19

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 15:26:51

处理时间(V2)：2024/09/12 09:52:40

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	354768	58600	3694	1.316	--
总计		100.000	354768	58600			

图65 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-66-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-28

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 15:30:14

处理时间(V2)：2024/09/12 09:52:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	341966	56519	3700	1.316	--
总计		100.000	341966	56519			

图66 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-67-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-37

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 15:33:37

处理时间(V2)：2024/09/12 09:52:45

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	339214	56070	3698	1.315	--
总计		100.000	339214	56070			

图67 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-68-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-46

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 15:37:00

处理时间(V2)：2024/09/12 09:52:48

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	310128	51254	3698	1.316	--
总计		100.000	310128	51254			

图68 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-69-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-2

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 15:40:24

处理时间(V2)：2024/09/12 09:52:50

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	431987	71395	3699	1.316	--
总计		100.000	431987	71395			

图69 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-70-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-11

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 15:43:47

处理时间(V2)：2024/09/12 09:52:53

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	440918	72854	3699	1.316	--
总计		100.000	440918	72854			

图70 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-71-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-20

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 15:47:11

处理时间(V2)：2024/09/12 09:52:56

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	456077	75280	3696	1.317	--
总计		100.000	456077	75280			

图71 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-72-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-29

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 15:50:34

处理时间(V2)：2024/09/12 09:52:59

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	431204	71162	3697	1.317	--
总计		100.000	431204	71162			

图72 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-73-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-38

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 15:53:57

处理时间(V2)：2024/09/12 09:53:01

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	432947	71462	3690	1.317	--
总计		100.000	432947	71462			

图73 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-74-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-47

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 15:57:20

处理时间(V2)：2024/09/12 09:53:04

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	421372	69528	3693	1.317	--
总计		100.000	421372	69528			

图74 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-75-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-3

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 16:00:43

处理时间(V2)：2024/09/12 09:53:07

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	465867	76854	3694	1.318	--
总计		100.000	465867	76854			

图75 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-76-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-12

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 16:04:07

处理时间(V2)：2024/09/12 09:53:10

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	467229	77385	3712	1.309	--
总计		100.000	467229	77385			

图76 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-77-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-21

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 16:07:31

处理时间(V2)：2024/09/12 09:53:12

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	481260	79539	3701	1.312	--
总计		100.000	481260	79539			

图77 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-78-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-30

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 16:10:54

处理时间(V2)：2024/09/12 09:53:15

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	463011	76619	3705	1.312	--
总计		100.000	463011	76619			

图78 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-79-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-39

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 16:14:17

处理时间(V2)：2024/09/12 09:53:18

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	461950	76334	3702	1.313	--
总计		100.000	461950	76334			

图79 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-80-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-48

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 16:17:40

处理时间(V2)：2024/09/12 09:53:21

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	460629	76124	3701	1.313	--
总计		100.000	460629	76124			

图80 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-81-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-4

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 16:21:04

处理时间(V2)：2024/09/12 09:53:24

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	480456	79523	3708	1.312	--
总计		100.000	480456	79523			

图81 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-82-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-13

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 16:24:28

处理时间(V2)：2024/09/12 09:53:26

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	478439	79137	3703	1.312	--
总计		100.000	478439	79137			

图82 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-83-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-22

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 16:27:51

处理时间(V2)：2024/09/12 09:53:29

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	493260	81623	3707	1.313	--
总计		100.000	493260	81623			

图83 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-84-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-31

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 16:31:15

处理时间(V2)：2024/09/12 09:53:32

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	476838	78754	3702	1.314	--
总计		100.000	476838	78754			

图84 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-85-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-40

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 16:34:38

处理时间(V2)：2024/09/12 09:53:35

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	474824	78320	3696	1.319	--
总计		100.000	474824	78320			

图85 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-86-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-49

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 16:38:01

处理时间(V2)：2024/09/12 09:53:37

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	477979	78864	3697	1.318	--
总计		100.000	477979	78864			

图86 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-87-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-5

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 16:41:25

处理时间(V2)：2024/09/12 09:53:40

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	493830	81522	3696	1.319	--
总计		100.000	493830	81522			

图87 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-30min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-88-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-14

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 16:44:49

处理时间(V2)：2024/09/12 09:53:43

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	490158	80955	3699	1.318	--
总计		100.000	490158	80955			

图88 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-30min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-89-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-23

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 16:48:12

处理时间(V2)：2024/09/12 09:53:45

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	504523	83302	3696	1.318	--
总计		100.000	504523	83302			

图89 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-30min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-90-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-32

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 16:51:35

处理时间(V2)：2024/09/12 09:53:48

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	491559	81092	3697	1.319	--
总计		100.000	491559	81092			

图90 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-30min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-91-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-41

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 16:54:59

处理时间(V2)：2024/09/12 09:53:51

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	484627	79934	3698	1.319	--
总计		100.000	484627	79934			

图91 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-30min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-92-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-50

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 16:58:22

处理时间(V2)：2024/09/12 09:53:53

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	492539	81196	3694	1.319	--
总计		100.000	492539	81196			

图92 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-30min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-93-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-6

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 17:01:46

处理时间(V2)：2024/09/12 09:53:56

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	503771	83112	3699	1.319	--
总计		100.000	503771	83112			

图93 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-45min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-94-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-15

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 17:05:10

处理时间(V2)：2024/09/12 09:53:59

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	498037	82103	3697	1.319	--
总计		100.000	498037	82103			

图94 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-45min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-95-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-24

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 17:08:34

处理时间(V2)：2024/09/12 09:54:02

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	513544	84637	3694	1.321	--
总计		100.000	513544	84637			

图95 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-45min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-96-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：2-33
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/09/11 17:11:57 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 09:54:04 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	500054	82456	3695	1.319	--
总计		100.000	500054	82456			

图96 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-45min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-97-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-42

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 17:15:21

处理时间(V2)：2024/09/12 09:54:07

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	499287	82366	3699	1.319	--
总计		100.000	499287	82366			

图97 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-45min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-98-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：2-51
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/09/11 17:18:44 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 09:54:10 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	502002	82804	3697	1.320	--
总计		100.000	502002	82804			

图98 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-99-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-7

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 17:22:07

处理时间(V2)：2024/09/12 09:54:12

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	507439	83818	3701	1.318	--
总计		100.000	507439	83818			

图99 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-60min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-100-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-16

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 17:25:31

处理时间(V2)：2024/09/12 09:54:16

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	501752	82868	3702	1.319	--
总计		100.000	501752	82868			

图100 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-101-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-25

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 17:28:55

处理时间(V2)：2024/09/12 09:54:18

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	519079	85774	3704	1.317	--
总计		100.000	519079	85774			

图101 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-102-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-34

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 17:32:18

处理时间(V2)：2024/09/12 09:54:21

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	504838	83242	3697	1.320	--
总计		100.000	504838	83242			

图102 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-103-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-43

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 17:35:42

处理时间(V2)：2024/09/12 09:54:24

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	501878	82767	3696	1.319	--
总计		100.000	501878	82767			

图103 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-60min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-104-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-52

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 17:39:05

处理时间(V2)：2024/09/12 09:54:27

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	505523	83304	3694	1.322	--
总计		100.000	505523	83304			

图104 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-105-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-8

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 17:42:29

处理时间(V2)：2024/09/12 09:54:30

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	518708	85576	3696	1.321	--
总计		100.000	518708	85576			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-106-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-17

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 17:45:52

处理时间(V2)：2024/09/12 09:54:33

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	513468	84706	3700	1.319	--
总计		100.000	513468	84706			

图106 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-107-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-26

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 17:49:16

处理时间(V2)：2024/09/12 09:54:36

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	526479	86804	3695	1.320	--
总计		100.000	526479	86804			

图107 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-108-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-35

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 17:52:40

处理时间(V2)：2024/09/12 09:54:38

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	517255	85296	3698	1.320	--
总计		100.000	517255	85296			

图108 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-109-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-44

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 17:56:03

处理时间(V2)：2024/09/12 09:54:41

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	513333	84623	3697	1.321	--
总计		100.000	513333	84623			

图109 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-110-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-53

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 17:59:27

处理时间(V2)：2024/09/12 09:54:44

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	516209	85069	3694	1.321	--
总计		100.000	516209	85069			

图110 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-111-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz2-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-27

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 18:02:50

处理时间(V2)：2024/09/12 09:54:47

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	100.000	472868	71670	3025	1.307	--
总计		100.000	472868	71670			

图111 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-2-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-112-2 - zzp1-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz2-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：2-27

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 18:06:14

处理时间(V2)：2024/09/12 09:54:49

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	100.000	472997	71692	3024	1.307	--
总计		100.000	472997	71692			

图112 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24090901批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-2-2



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-113-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-rj.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-9

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 18:09:36

处理时间(V2)：2024/09/12 09:54:52

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc1批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
溶剂



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-114-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 18:12:58

处理时间(V2)：2024/09/12 09:54:55

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	100.000	473340	71829	3026	1.306	--
总计		100.000	473340	71829			

图114 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc1批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-115-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 18:16:20

处理时间(V2)：2024/09/12 09:54:58

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	100.000	473415	71806	3026	1.307	--
总计		100.000	473415	71806			

图115 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc1批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-2



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-116-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 18:19:42

处理时间(V2)：2024/09/12 09:55:00

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	100.000	473499	71848	3027	1.307	--
总计		100.000	473499	71848			

图116 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc1批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-3



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-117-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 18:23:03

处理时间(V2)：2024/09/12 09:55:03

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	100.000	473294	71770	3025	1.307	--
总计		100.000	473294	71770			

图117 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc1批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-4



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-118-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 18:26:26

处理时间(V2)：2024/09/12 09:55:06

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	100.000	473212	71819	3029	1.306	--
总计		100.000	473212	71819			

图118 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc1批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-5



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-119-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-1

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 18:29:48

处理时间(V2)：2024/09/12 09:55:09

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	289562	47746	3695	1.321	--
总计		100.000	289562	47746			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-120-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-10

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 18:33:09

处理时间(V2)：2024/09/12 09:55:12

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	289692	47769	3696	1.322	--
总计		100.000	289692	47769			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-121-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-19

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 18:36:31

处理时间(V2)：2024/09/12 09:55:15

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	293675	48415	3697	1.323	--
总计		100.000	293675	48415			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-122-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-28

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 18:39:53

处理时间(V2)：2024/09/12 09:55:17

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	294058	48428	3695	1.323	--
总计		100.000	294058	48428			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-123-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-37

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 18:43:15

处理时间(V2)：2024/09/12 09:55:20

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	283834	46749	3696	1.323	--
总计		100.000	283834	46749			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-124-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-46

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 18:46:37

处理时间(V2)：2024/09/12 09:55:23

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	286995	47261	3696	1.323	--
总计		100.000	286995	47261			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-125-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-2

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 18:49:59

处理时间(V2)：2024/09/12 09:55:25

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	388745	64130	3697	1.323	--
总计		100.000	388745	64130			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-126-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-11

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 18:53:20

处理时间(V2)：2024/09/12 09:55:28

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	391305	64605	3702	1.323	--
总计		100.000	391305	64605			




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-127-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：3-20
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/09/11 18:56:42 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 09:55:31 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	393710	64936	3697	1.323	--
总计		100.000	393710	64936			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-128-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-29

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 19:00:04

处理时间(V2)：2024/09/12 09:55:33

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	384126	63216	3696	1.324	--
总计		100.000	384126	63216			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-129-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：3-38
进样体积：10 μ l
进样时间：2024/09/11 19:03:26
处理时间(V2)：2024/09/12 09:55:36
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	389160	64052	3696	1.325	--
总计		100.000	389160	64052			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-130-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：3-47
进样体积：10 μ l
进样时间：2024/09/11 19:06:47
处理时间(V2)：2024/09/12 09:55:39
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	390611	64331	3698	1.324	--
总计		100.000	390611	64331			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-131-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-3

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 19:10:08

处理时间(V2)：2024/09/12 09:55:41

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	425833	70239	3699	1.323	--
总计		100.000	425833	70239			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-132-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-12

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 19:13:30

处理时间(V2)：2024/09/12 09:55:44

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	428356	70643	3697	1.323	--
总计		100.000	428356	70643			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-133-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-21

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 19:16:51

处理时间(V2)：2024/09/12 09:55:47

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	428080	70621	3699	1.323	--
总计		100.000	428080	70621			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-134-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-30

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 19:20:12

处理时间(V2)：2024/09/12 09:55:49

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	416187	68495	3693	1.324	--
总计		100.000	416187	68495			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-135-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-39

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 19:23:33

处理时间(V2)：2024/09/12 09:55:52

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	425224	70032	3695	1.324	--
总计		100.000	425224	70032			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-136-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-48

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 19:26:55

处理时间(V2)：2024/09/12 09:55:55

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	425798	70149	3697	1.324	--
总计		100.000	425798	70149			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-137-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-4

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 19:30:16

处理时间(V2)：2024/09/12 09:55:57

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	442944	73027	3700	1.324	--
总计		100.000	442944	73027			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-138-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-13

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 19:33:37

处理时间(V2)：2024/09/12 09:56:00

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	443727	73175	3697	1.324	--
总计		100.000	443727	73175			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μm)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-139-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-22

进样体积：10 μl

进样时间：2024/09/11 19:36:58

处理时间(V2)：2024/09/12 09:56:03

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	100.000	446043	73583	3701	1.323	--
总计		100.000	446043	73583			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-140-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：3-31
进样体积：10 μ l
进样时间：2024/09/11 19:40:20
处理时间(V2)：2024/09/12 09:56:06
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	100.000	434093	71621	3705	1.324	--
总计		100.000	434093	71621			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-141-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：3-40
进样体积：10 μ l
进样时间：2024/09/11 19:43:40
处理时间(V2)：2024/09/12 09:56:08
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	442548	72974	3698	1.324	--
总计		100.000	442548	72974			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-142-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-49

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 19:47:02

处理时间(V2)：2024/09/12 09:56:11

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	430295	70819	3694	1.324	--
总计		100.000	430295	70819			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-143-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-5

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 19:50:23

处理时间(V2)：2024/09/12 09:56:14

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	462946	76299	3694	1.324	--
总计		100.000	462946	76299			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-144-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-14

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 19:53:44

处理时间(V2)：2024/09/12 09:56:16

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	462685	76232	3690	1.325	--
总计		100.000	462685	76232			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-145-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：3-23
进样体积：10 μ l
进样时间：2024/09/11 19:57:06
处理时间(V2)：2024/09/12 09:56:19
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	464759	76578	3698	1.325	--
总计		100.000	464759	76578			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-146-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-32

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 20:00:27

处理时间(V2)：2024/09/12 09:56:21

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	450539	74115	3693	1.325	--
总计		100.000	450539	74115			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-147-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：3-41
进样体积：10 μ l
进样时间：2024/09/11 20:03:48
处理时间(V2)：2024/09/12 09:56:24
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	461507	75941	3695	1.325	--
总计		100.000	461507	75941			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-148-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-50

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 20:07:10

处理时间(V2)：2024/09/12 09:56:27

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	460972	75815	3695	1.326	--
总计		100.000	460972	75815			




SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-149-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：3-6
进样体积：10 μ l
进样时间：2024/09/11 20:10:31
处理时间(V2)：2024/09/12 09:56:30
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	476225	78421	3694	1.325	--
总计		100.000	476225	78421			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377


<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-150-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：3-15
进样体积：10 μ l
进样时间：2024/09/11 20:13:52
处理时间(V2)：2024/09/12 09:56:33
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	476409	78509	3691	1.325	--
总计		100.000	476409	78509			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-151-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：3-24
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/09/11 20:17:13 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 09:56:36 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	481094	79256	3695	1.325	--
总计		100.000	481094	79256			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-152-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-33

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 20:20:34

处理时间(V2)：2024/09/12 09:56:39

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	465268	76530	3695	1.325	--
总计		100.000	465268	76530			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-153-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-42

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 20:23:55

处理时间(V2)：2024/09/12 09:56:41

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	476749	78455	3694	1.325	--
总计		100.000	476749	78455			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-154-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-51

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 20:27:16

处理时间(V2)：2024/09/12 09:56:44

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	477367	78537	3692	1.326	--
总计		100.000	477367	78537			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-155-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-7

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 20:30:37

处理时间(V2)：2024/09/12 09:56:47

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	484328	79762	3694	1.325	--
总计		100.000	484328	79762			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-156-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-16

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 20:33:58

处理时间(V2)：2024/09/12 09:56:50

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	485656	80003	3694	1.325	--
总计		100.000	485656	80003			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-157-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-25

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 20:37:20

处理时间(V2)：2024/09/12 09:56:52

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	491790	81009	3694	1.325	--
总计		100.000	491790	81009			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-158-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-34

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 20:40:41

处理时间(V2)：2024/09/12 09:56:55

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	473409	77844	3691	1.326	--
总计		100.000	473409	77844			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-159-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-43

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 20:44:02

处理时间(V2)：2024/09/12 09:56:58

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	485379	79828	3690	1.326	--
总计		100.000	485379	79828			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-160-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-52

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 20:47:23

处理时间(V2)：2024/09/12 09:57:01

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	487355	80139	3692	1.326	--
总计		100.000	487355	80139			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-161-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-8

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 20:50:45

处理时间(V2)：2024/09/12 09:57:04

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	497640	81995	3694	1.325	--
总计		100.000	497640	81995			

图161 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc1批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-
极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-162-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-17

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 20:54:08

处理时间(V2)：2024/09/12 09:57:06

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	494821	81482	3694	1.326	--
总计		100.000	494821	81482			

图162 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc1批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-
极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-163-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-26

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 20:57:30

处理时间(V2)：2024/09/12 09:57:09

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	497960	81901	3693	1.326	--
总计		100.000	497960	81901			

图163 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc1批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-
极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-164-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-35

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 21:00:52

处理时间(V2)：2024/09/12 09:57:12

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	484352	79661	3694	1.326	--
总计		100.000	484352	79661			

图164 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc1批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-
极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-165-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：3-44
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/09/11 21:04:14 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 09:57:14 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	496592	81650	3692	1.326	--
总计		100.000	496592	81650			

图165 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc1批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-
极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-166-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-53

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 21:07:35

处理时间(V2)：2024/09/12 09:57:17

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	492745	81144	3693	1.327	--
总计		100.000	492745	81144			

图166 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc1批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-
极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-167-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz2-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-27

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 21:10:57

处理时间(V2)：2024/09/12 09:57:20

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	100.000	472229	71483	3024	1.314	--
总计		100.000	472229	71483			

图167 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc1批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-2-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-168-2 - zzp2-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz2-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：3-27

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 21:14:19

处理时间(V2)：2024/09/12 09:57:23

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	100.000	472292	71509	3024	1.314	--
总计		100.000	472292	71509			

图168 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc1批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-2-2



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 28-3/28-169-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号 : 4-9

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2024/09/11 21:17:43

处理时间(V2) : 2024/09/12 09:57:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速: 1.0ml/min


波长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc2批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
溶剂



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-170-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：4-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/09/11 21:21:06 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 09:57:28 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	100.000	472650	71533	3021	1.313	--
总计		100.000	472650	71533			

图170 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc2批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-171-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 21:24:30

处理时间(V2)：2024/09/12 09:57:30

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	100.000	472606	71502	3018	1.313	--
总计		100.000	472606	71502			

图171 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc2批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-2



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-172-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 21:27:54

处理时间(V2)：2024/09/12 09:57:33

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	100.000	472748	71545	3022	1.313	--
总计		100.000	472748	71545			

图172 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc2批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-3



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-173-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 21:31:18

处理时间(V2)：2024/09/12 09:57:36

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	100.000	472758	71552	3022	1.314	--
总计		100.000	472758	71552			

图173 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc2批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-4



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-174-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 21:34:41

处理时间(V2)：2024/09/12 09:57:38

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	100.000	472263	71442	3021	1.314	--
总计		100.000	472263	71442			

图174 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc2批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-5



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-175-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-1

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 21:38:03

处理时间(V2)：2024/09/12 09:57:41

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	291457	47930	3691	1.328	--
总计		100.000	291457	47930			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-176-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-10

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 21:41:25

处理时间(V2)：2024/09/12 09:57:44

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	275868	45395	3691	1.328	--
总计		100.000	275868	45395			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-177-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-19

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 21:44:48

处理时间(V2)：2024/09/12 09:57:46

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	276690	45535	3692	1.328	--
总计		100.000	276690	45535			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-178-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-28

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 21:48:10

处理时间(V2)：2024/09/12 09:57:49

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	272383	44757	3689	1.329	--
总计		100.000	272383	44757			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-179-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-37

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 21:51:32

处理时间(V2)：2024/09/12 09:57:52

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	269393	44277	3690	1.329	--
总计		100.000	269393	44277			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-180-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-46

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 21:54:54

处理时间(V2)：2024/09/12 09:57:54

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	263335	43244	3687	1.329	--
总计		100.000	263335	43244			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-181-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-2

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 21:58:17

处理时间(V2)：2024/09/12 09:57:57

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	393637	64755	3689	1.329	--
总计		100.000	393637	64755			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-182-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-11

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 22:01:40

处理时间(V2)：2024/09/12 09:58:00

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	390204	64200	3690	1.327	--
总计		100.000	390204	64200			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-183-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-20

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 22:05:02

处理时间(V2)：2024/09/12 09:58:03

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	386170	63570	3688	1.328	--
总计		100.000	386170	63570			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-184-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：4-29
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/09/11 22:08:24 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 09:58:05 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	380205	62479	3690	1.328	--
总计		100.000	380205	62479			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-185-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-38

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 22:11:47

处理时间(V2)：2024/09/12 09:58:08

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	377816	62109	3692	1.329	--
总计		100.000	377816	62109			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-186-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-47

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 22:15:09

处理时间(V2)：2024/09/12 09:58:11

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	374683	61656	3691	1.328	--
总计		100.000	374683	61656			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-187-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-3

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 22:18:31

处理时间(V2)：2024/09/12 09:58:13

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	426746	70108	3690	1.328	--
总计		100.000	426746	70108			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-188-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-12

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 22:21:53

处理时间(V2)：2024/09/12 09:58:16

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	424995	69822	3688	1.329	--
总计		100.000	424995	69822			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-189-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-21

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 22:25:15

处理时间(V2)：2024/09/12 09:58:19

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	422132	69370	3691	1.329	--
总计		100.000	422132	69370			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-190-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-30

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 22:28:37

处理时间(V2)：2024/09/12 09:58:21

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	417492	68782	3695	1.328	--
总计		100.000	417492	68782			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-191-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-39

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 22:31:59

处理时间(V2)：2024/09/12 09:58:24

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	414832	68176	3688	1.328	--
总计		100.000	414832	68176			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-192-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-48

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 22:35:22

处理时间(V2)：2024/09/12 09:58:27

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	415332	68342	3692	1.328	--
总计		100.000	415332	68342			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-193-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-4

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 22:38:45

处理时间(V2)：2024/09/12 09:58:29

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	444535	73008	3687	1.329	--
总计		100.000	444535	73008			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-194-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-13

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 22:42:08

处理时间(V2)：2024/09/12 09:58:32

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	445888	73260	3688	1.329	--
总计		100.000	445888	73260			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-195-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-22

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 22:45:31

处理时间(V2)：2024/09/12 09:58:35

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	441007	72460	3689	1.329	--
总计		100.000	441007	72460			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-196-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-31

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 22:48:53

处理时间(V2)：2024/09/12 09:58:38

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	436580	71709	3687	1.329	--
总计		100.000	436580	71709			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-197-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-40

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 22:52:16

处理时间(V2)：2024/09/12 09:58:41

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	432817	71095	3687	1.330	--
总计		100.000	432817	71095			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-198-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-49

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 22:55:39

处理时间(V2)：2024/09/12 09:58:43

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	436814	71828	3687	1.329	--
总计		100.000	436814	71828			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-199-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-5

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 22:59:02

处理时间(V2)：2024/09/12 09:58:46

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	462993	76044	3687	1.330	--
总计		100.000	462993	76044			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-200-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-14

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 23:02:25

处理时间(V2)：2024/09/12 09:58:49

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	462125	75872	3686	1.330	--
总计		100.000	462125	75872			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-201-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-23

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 23:05:47

处理时间(V2)：2024/09/12 09:58:52

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	460036	75655	3687	1.329	--
总计		100.000	460036	75655			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-202-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-32

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 23:09:10

处理时间(V2)：2024/09/12 09:58:54

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	456948	75097	3689	1.328	--
总计		100.000	456948	75097			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-203-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：4-41
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/09/11 23:12:33 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 09:58:57 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	452345	74276	3686	1.330	--
总计		100.000	452345	74276			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-204-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-50

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 23:15:56

处理时间(V2)：2024/09/12 09:59:00

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	455406	74820	3688	1.329	--
总计		100.000	455406	74820			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-205-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-6

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 23:19:19

处理时间(V2)：2024/09/12 09:59:03

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	479455	78967	3698	1.327	--
总计		100.000	479455	78967			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-206-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-15

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 23:22:42

处理时间(V2)：2024/09/12 09:59:05

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	475475	78204	3690	1.329	--
总计		100.000	475475	78204			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-207-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：4-24
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/09/11 23:26:05 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 09:59:08 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	475982	78296	3686	1.329	--
总计		100.000	475982	78296			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-208-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-33

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 23:29:28

处理时间(V2)：2024/09/12 09:59:11

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	472057	77538	3687	1.330	--
总计		100.000	472057	77538			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-209-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-42

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 23:32:51

处理时间(V2)：2024/09/12 09:59:13

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	468609	76980	3688	1.330	--
总计		100.000	468609	76980			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-210-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：4-51
进样体积：10 μ l
进样时间：2024/09/11 23:36:13
处理时间(V2)：2024/09/12 09:59:16
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	470636	77240	3679	1.330	--
总计		100.000	470636	77240			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-211-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-7

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 23:39:36

处理时间(V2)：2024/09/12 09:59:19

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	489174	80371	3679	1.330	--
总计		100.000	489174	80371			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-212-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-16

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 23:42:59

处理时间(V2)：2024/09/12 09:59:22

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	486379	79793	3677	1.331	--
总计		100.000	486379	79793			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-213-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-25

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 23:46:23

处理时间(V2)：2024/09/12 09:59:24

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	482931	79373	3682	1.329	--
总计		100.000	482931	79373			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-214-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-34

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 23:49:46

处理时间(V2)：2024/09/12 09:59:27

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	477760	78370	3678	1.331	--
总计		100.000	477760	78370			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-215-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-43

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 23:53:09

处理时间(V2)：2024/09/12 09:59:30

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	475918	78079	3678	1.331	--
总计		100.000	475918	78079			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-216-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-52

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 23:56:33

处理时间(V2)：2024/09/12 09:59:32

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	479047	78581	3675	1.331	--
总计		100.000	479047	78581			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-217-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-8

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/11 23:59:55

处理时间(V2)：2024/09/12 09:59:35

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	492934	80957	3675	1.331	--
总计		100.000	492934	80957			

图217 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc2批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-
极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-218-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-17

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 00:03:19

处理时间(V2)：2024/09/12 09:59:38

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	492097	80841	3677	1.331	--
总计		100.000	492097	80841			

图218 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc2批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-
极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-219-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-26

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 00:06:42

处理时间(V2)：2024/09/12 09:59:40

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	489994	80501	3679	1.330	--
总计		100.000	489994	80501			

图219 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc2批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-
极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-220-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：4-35
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/09/12 00:10:06 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 09:59:43 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.322	100.000	488067	80148	3671	1.332	--
总计		100.000	488067	80148			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-221-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：4-44
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/09/12 00:13:30 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 09:59:46 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	487289	79978	3679	1.331	--
总计		100.000	487289	79978			

图221 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc2批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-
极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-222-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：4-53

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 00:16:52

处理时间(V2)：2024/09/12 09:59:49

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	488344	80101	3678	1.331	--
总计		100.000	488344	80101			

图222 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc2批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-
极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 1.0ml/min
柱 温 : 40℃ 波 长: 250nm
数据文件名 : RC\$SMF-377 - 28-3/28-223-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号 : 4-27
进样体积 : 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2024/09/12 00:20:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2024/09/12 09:59:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	100.000	474436	71622	3014	1.320	--
总计		100.000	474436	71622			

图223 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc2批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-2-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-224-2 - zzp3-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：4-27
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/09/12 00:23:38 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 09:59:54 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	100.000	474870	71650	3013	1.321	--
总计		100.000	474870	71650			

图224 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc2批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-2-2



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱 温 : 40℃

数据文件名 : RC\$SMF-377 - 28-3/28-225-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名 : RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 10 μ l

进样时间 : 2024/09/12 00:27:01

处理时间(V2) : 2024/09/12 09:59:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 250nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图225 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc3批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
溶剂



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-226-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 00:30:24

处理时间(V2)：2024/09/12 10:00:00

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	100.000	473826	71461	3002	1.320	--
总计		100.000	473826	71461			

图226 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc3批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-227-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 00:33:47

处理时间(V2)：2024/09/12 10:00:03

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	100.000	474114	71476	3001	1.320	--
总计		100.000	474114	71476			

图227 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc3批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-2



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-228-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 00:37:10

处理时间(V2)：2024/09/12 10:00:05

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	100.000	473963	71446	3002	1.320	--
总计		100.000	473963	71446			

图228 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc3批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-3



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-229-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/09/12 00:40:33 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 10:00:08 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	100.000	473838	71428	3002	1.320	--
总计		100.000	473838	71428			

图229 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc3批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-4



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-230-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz1-5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 00:43:56

处理时间(V2)：2024/09/12 10:00:11

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	100.000	473422	71410	3005	1.320	--
总计		100.000	473422	71410			

图230 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc3批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-1-5



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-231-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-1

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 00:47:19

处理时间(V2)：2024/09/12 10:00:14

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	293568	48177	3677	1.332	--
总计		100.000	293568	48177			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-232-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-10

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 00:50:41

处理时间(V2)：2024/09/12 10:00:16

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	291246	47805	3676	1.331	--
总计		100.000	291246	47805			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-233-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-19

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 00:54:03

处理时间(V2)：2024/09/12 10:00:19

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	296625	48675	3674	1.332	--
总计		100.000	296625	48675			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-234-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-28

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 00:57:25

处理时间(V2)：2024/09/12 10:00:22

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	298431	48996	3675	1.332	--
总计		100.000	298431	48996			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-235-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-37

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 01:00:47

处理时间(V2)：2024/09/12 10:00:25

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	279389	45873	3678	1.332	--
总计		100.000	279389	45873			



SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-236-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-5min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-46

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 01:04:09

处理时间(V2)：2024/09/12 10:00:27

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	297783	48878	3677	1.333	--
总计		100.000	297783	48878			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-237-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-2

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 01:07:31

处理时间(V2)：2024/09/12 10:00:30

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	385812	63336	3675	1.332	--
总计		100.000	385812	63336			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-238-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：1-11
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/09/12 01:10:53 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 10:00:33 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	391552	64301	3677	1.332	--
总计		100.000	391552	64301			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-239-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-20

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 01:14:15

处理时间(V2)：2024/09/12 10:00:35

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	391254	64160	3676	1.332	--
总计		100.000	391254	64160			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-240-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-29

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 01:17:36

处理时间(V2)：2024/09/12 10:00:38

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	397442	65168	3674	1.333	--
总计		100.000	397442	65168			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-241-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-38

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 01:20:58

处理时间(V2)：2024/09/12 10:00:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	384702	63148	3676	1.333	--
总计		100.000	384702	63148			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-242-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-10min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-47

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 01:24:19

处理时间(V2)：2024/09/12 10:00:44

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	394048	64662	3676	1.333	--
总计		100.000	394048	64662			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-243-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-3

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 01:27:41

处理时间(V2)：2024/09/12 10:00:47

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	100.000	423179	69451	3678	1.331	--
总计		100.000	423179	69451			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-244-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-12

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 01:31:04

处理时间(V2)：2024/09/12 10:00:50

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	426348	69932	3674	1.333	--
总计		100.000	426348	69932			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-245-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-21

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 01:34:26

处理时间(V2)：2024/09/12 10:00:53

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	425881	69869	3676	1.333	--
总计		100.000	425881	69869			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μm) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-246-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：1-30
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2024/09/12 01:37:48 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 10:00:55 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	432443	70936	3673	1.332	--
总计		100.000	432443	70936			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-247-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-39

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 01:41:10

处理时间(V2)：2024/09/12 10:00:58

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	421398	69146	3675	1.332	--
总计		100.000	421398	69146			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-248-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-15min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：1-48
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/09/12 01:44:32 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 10:01:01 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	425286	69798	3677	1.332	--
总计		100.000	425286	69798			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-249-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-4

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 01:47:55

处理时间(V2)：2024/09/12 10:01:03

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	443299	72741	3675	1.332	--
总计		100.000	443299	72741			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-250-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-13

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 01:51:16

处理时间(V2)：2024/09/12 10:01:06

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	443035	72789	3680	1.331	--
总计		100.000	443035	72789			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-251-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：1-22
进样体积：10 μ l
进样时间：2024/09/12 01:54:39
处理时间(V2)：2024/09/12 10:01:09
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	443582	72883	3682	1.332	--
总计		100.000	443582	72883			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-252-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-31

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 01:58:01

处理时间(V2)：2024/09/12 10:01:12

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	450923	74088	3680	1.331	--
总计		100.000	450923	74088			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-253-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-40

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 02:01:23

处理时间(V2)：2024/09/12 10:01:14

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	438228	71990	3680	1.332	--
总计		100.000	438228	71990			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-254-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-20min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-49

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 02:04:45

处理时间(V2)：2024/09/12 10:01:17

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm							
峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	440534	72362	3679	1.332	--
总计		100.000	440534	72362			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-255-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-5

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 02:08:07

处理时间(V2)：2024/09/12 10:01:20

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	463607	76124	3677	1.332	--
总计		100.000	463607	76124			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-256-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-14

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 02:11:29

处理时间(V2)：2024/09/12 10:01:23

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	462307	75970	3681	1.331	--
总计		100.000	462307	75970			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-257-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-23

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 02:14:50

处理时间(V2)：2024/09/12 10:01:25

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	463372	76115	3677	1.331	--
总计		100.000	463372	76115			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-258-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-32

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 02:18:12

处理时间(V2)：2024/09/12 10:01:28

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	469271	77079	3678	1.332	--
总计		100.000	469271	77079			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-259-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-41

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 02:21:34

处理时间(V2)：2024/09/12 10:01:31

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	459158	75440	3680	1.332	--
总计		100.000	459158	75440			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-260-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-30min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：1-50
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/09/12 02:24:56 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 10:01:34 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	459246	75402	3676	1.332	--
总计		100.000	459246	75402			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-261-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-6

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 02:28:18

处理时间(V2)：2024/09/12 10:01:36

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	479143	78713	3680	1.331	--
总计		100.000	479143	78713			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：40℃ 波长：250nm
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-262-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：1-15
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2024/09/12 02:31:40 实验者：jiangjinwei
处理时间(V2)：2024/09/12 10:01:39 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	479578	78781	3679	1.332	--
总计		100.000	479578	78781			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-263-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-24

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 02:35:03

处理时间(V2)：2024/09/12 10:01:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	477344	78372	3674	1.332	--
总计		100.000	477344	78372			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-264-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-33

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 02:38:23

处理时间(V2)：2024/09/12 10:01:44

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	485044	79672	3679	1.332	--
总计		100.000	485044	79672			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-265-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-42

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 02:41:46

处理时间(V2)：2024/09/12 10:01:47

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	473945	77823	3676	1.332	--
总计		100.000	473945	77823			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-266-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-45min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-51

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 02:45:08

处理时间(V2)：2024/09/12 10:01:50

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	477895	78511	3681	1.332	--
总计		100.000	477895	78511			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-267-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-7

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 02:48:30

处理时间(V2)：2024/09/12 10:01:52

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	486205	79891	3681	1.332	--
总计		100.000	486205	79891			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-268-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-16

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 02:51:52

处理时间(V2)：2024/09/12 10:01:55

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	485080	79677	3678	1.331	--
总计		100.000	485080	79677			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-269-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-25

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 02:55:14

处理时间(V2)：2024/09/12 10:01:58

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	485881	79795	3677	1.332	--
总计		100.000	485881	79795			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-270-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-34

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 02:58:36

处理时间(V2)：2024/09/12 10:02:01

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	492687	80934	3680	1.332	--
总计		100.000	492687	80934			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)
柱温：40℃
数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-271-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb
样品瓶号：1-43
进样体积：10 μ l
进样时间：2024/09/12 03:01:58
处理时间(V2)：2024/09/12 10:02:03
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min
波长：250nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	482698	79210	3673	1.332	--
总计		100.000	482698	79210			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-272-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-60min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-52

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 03:05:19

处理时间(V2)：2024/09/12 10:02:06

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.320	100.000	484067	79459	3676	1.332	--
总计		100.000	484067	79459			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-273-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-8

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 03:08:42

处理时间(V2)：2024/09/12 10:02:09

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	494084	81228	3685	1.332	--
总计		100.000	494084	81228			

图273 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc3批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-
极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-274-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-17

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 03:12:04

处理时间(V2)：2024/09/12 10:02:12

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	494169	81120	3674	1.332	--
总计		100.000	494169	81120			

图274 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc3批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-
极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-275-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-26

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 03:15:27

处理时间(V2)：2024/09/12 10:02:14

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	491789	80732	3677	1.333	--
总计		100.000	491789	80732			

图275 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc3批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-
极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-276-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-35

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 03:18:50

处理时间(V2)：2024/09/12 10:02:17

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	499013	81915	3675	1.333	--
总计		100.000	499013	81915			

图276 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc3批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-
极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-277-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-44

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 03:22:11

处理时间(V2)：2024/09/12 10:02:20

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	487040	80058	3683	1.331	--
总计		100.000	487040	80058			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-278-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-jxzs-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-53

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 03:25:33

处理时间(V2)：2024/09/12 10:02:23

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min


波长：250nm

版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.321	100.000	488584	80490	3690	1.324	--
总计		100.000	488584	80490			

图278 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc3批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质-
极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-279-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz2-1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-27

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 03:28:56

处理时间(V2)：2024/09/12 10:02:25

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	100.000	473980	71741	3016	1.314	--
总计		100.000	473980	71741			

图279 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc3批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-2-1



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-377

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

柱温：40℃

数据文件名：RC\$SMF-377 - 28-3/28-280-2 - zzp4-pH4.5-0.1SDSjz-15mg-dz2-2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-377 - SMF-377-RCQX-FX277.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-377 - 20240911-rcqx-Fx277.lcb

样品瓶号：1-27

进样体积：10 μ l

进样时间：2024/09/12 03:32:19

处理时间(V2)：2024/09/12 10:02:28

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX277)

流速：1.0ml/min

波长：250nm


版本号：6.115

实验者：jiangjinwei

处理者：jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积%	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	100.000	474044	71680	3011	1.314	--
总计		100.000	474044	71680			

图280 利伐沙班口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-(15mg规格)-24080701-js1M-bc3批-pH4.5(内含0.1%SDS)介质
对照品溶液-2-2