




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-455-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/02 22:13:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:26:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-456-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 22:16:07
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:27:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.107	192729	100.000	43372	1478	1.266	--
总计		192729	100.000	43372			

图2 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-457-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 22:19:01
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:27:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	193111	100.000	43278	1483	1.268	--
总计		193111	100.000	43278			

图3 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-458-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 22:21:55
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:27:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	193039	100.000	43258	1482	1.268	--
总计		193039	100.000	43258			

图4 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-459-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/02 22:24:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:27:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.107	192741	100.000	43359	1480	1.265	--
总计		192741	100.000	43359			

图5 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-460-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/02 22:27:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:27:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	192820	100.000	43219	1483	1.268	--
总计		192820	100.000	43219			

图6 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-461-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 22:30:36
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:27:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	3542	100.000	796	1685	1.208	--
总计		3542	100.000	796			

图7 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.5ml/min
柱 温 : 30℃ 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-462-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/02 22:33:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:27:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	2815	100.000	612	1660	1.398	--
总计		2815	100.000	612			

图8 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-463-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/02 22:36:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:27:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图9 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-464-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 22:39:15
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:27:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.164	538	100.000	134	1940	1.055	--
总计		538	100.000	134			

图10 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-465-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 22:42:08
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:27:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图11 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-466-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 22:45:01
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:27:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图12 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-467-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 22:47:54
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:27:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	1401	100.000	329	1715	1.191	--
总计		1401	100.000	329			

图13 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-468-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/02 22:50:46

处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:27:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	1311	100.000	320	1797	1.258	--
总计		1311	100.000	320			

图14 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-469-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 22:53:38
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:27:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	1070	100.000	251	1834	1.012	--
总计		1070	100.000	251			

图15 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-470-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 22:56:31
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:27:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	1490	100.000	328	1585	1.306	--
总计		1490	100.000	328			

图16 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-471-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 22:59:24
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:27:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	1339	100.000	302	1771	1.222	--
总计		1339	100.000	302			

图17 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-472-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/02 23:02:17

处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:27:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	1384	100.000	300	1662	1.358	--
总计		1384	100.000	300			

图18 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-473-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 23:05:10
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:27:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	1728	100.000	370	1592	1.281	--
总计		1728	100.000	370			

图19 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-474-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 23:08:03
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:27:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	3048	100.000	702	1727	1.263	--
总计		3048	100.000	702			

图20 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-475-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 23:10:55
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:27:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	1139	100.000	293	1914	1.129	--
总计		1139	100.000	293			

图21 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-476-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/02 23:13:48

处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:27:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	1567	100.000	366	1823	1.383	--
总计		1567	100.000	366			

图22 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-477-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/02 23:16:41

处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:28:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	1849	100.000	388	1532	1.343	--
总计		1849	100.000	388			

图23 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-478-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 23:19:33
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:28:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	1545	100.000	345	1610	1.323	--
总计		1545	100.000	345			

图24 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-479-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/02 23:22:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:28:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	1583	100.000	371	1747	1.242	--
总计		1583	100.000	371			

图25 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-480-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 23:25:19
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:28:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	1679	100.000	379	1578	1.324	--
总计		1679	100.000	379			

图26 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-481-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/02 23:28:12

处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:28:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	1393	100.000	318	1679	1.239	--
总计		1393	100.000	318			

图27 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.5ml/min
柱温 : 30 $^{\circ}$ C 波长:318nm
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-482-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
分析时间: 2025/01/02 23:31:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:28:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	1542	100.000	366	1831	1.159	--
总计		1542	100.000	366			

图28 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-483-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/02 23:33:57

处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:28:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	4666	100.000	1045	1691	1.387	--
总计		4666	100.000	1045			

图29 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-484-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 23:36:49
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:28:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	1693	100.000	358	1602	1.435	--
总计		1693	100.000	358			

图30 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-485-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 23:39:42
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:28:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	4546	100.000	1007	1633	1.405	--
总计		4546	100.000	1007			

图31 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-486-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/02 23:42:36

处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:28:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	1672	100.000	368	1641	1.209	--
总计		1672	100.000	368			

图32 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-487-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 23:45:30
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:28:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	1467	100.000	314	1634	1.410	--
总计		1467	100.000	314			

图33 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-488-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 23:48:23
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:28:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	1545	100.000	349	1667	1.261	--
总计		1545	100.000	349			

图34 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-489-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 23:51:15
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:28:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	1750	100.000	381	1695	1.417	--
总计		1750	100.000	381			

图35 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-490-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 23:54:07
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:28:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	3646	100.000	811	1702	1.316	--
总计		3646	100.000	811			

图36 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-491-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 23:57:00
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:28:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	1613	100.000	361	1556	1.227	--
总计		1613	100.000	361			

图37 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-492-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/02 23:59:54
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:28:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	1559	100.000	336	1592	1.302	--
总计		1559	100.000	336			

图38 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-493-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/03 00:02:47
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:28:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	8240	100.000	1823	1680	1.380	--
总计		8240	100.000	1823			

图39 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-494-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/03 00:05:41

处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:28:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	2153	100.000	468	1552	1.175	--
总计		2153	100.000	468			

图40 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-495-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/03 00:08:34

处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:28:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	1600	100.000	365	1686	1.260	--
总计		1600	100.000	365			

图41 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-496-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/03 00:11:27
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:28:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.158	1354	100.000	312	1622	1.256	--
总计		1354	100.000	312			

图42 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-497-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/03 00:14:20
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:28:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	1501	100.000	328	1636	1.384	--
总计		1501	100.000	328			

图43 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-498-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/03 00:17:12
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:28:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	1397	100.000	325	1615	1.224	--
总计		1397	100.000	325			

图44 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-499-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/03 00:20:04
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:29:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	1344	100.000	307	1578	1.154	--
总计		1344	100.000	307			

图45 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-500-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/03 00:22:56

处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:29:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	1275	100.000	307	1897	1.344	--
总计		1275	100.000	307			

图46 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-501-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/03 00:25:49
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:29:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	6182	100.000	1389	1662	1.375	--
总计		6182	100.000	1389			

图47 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-502-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm

批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 10 μl

分析时间: 2025/01/03 00:28:41

处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:29:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min


波长:318nm

版本号:6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	3609	100.000	850	1791	1.337	--
总计		3609	100.000	850			

图48 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-503-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/03 00:31:34
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:29:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	1477	100.000	312	1701	1.706	--
总计		1477	100.000	312			

图49 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-504-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/03 00:34:28
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:29:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.163	1181	100.000	286	1903	1.038	--
总计		1181	100.000	286			

图50 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-505-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/03 00:37:22
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:29:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.162	1343	100.000	298	1754	1.308	--
总计		1343	100.000	298			

图51 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-506-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/03 00:40:16
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:29:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.161	1210	100.000	294	1828	1.134	--
总计		1210	100.000	294			

图52 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-507-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/03 00:43:10
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:29:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.159	1300	100.000	301	1768	1.324	--
总计		1300	100.000	301			

图53 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-508-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/03 00:46:05
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:29:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.160	1500	100.000	340	1659	1.428	--
总计		1500	100.000	340			

图54 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-509-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/03 00:48:58
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:29:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	192746	100.000	43200	1478	1.269	--
总计		192746	100.000	43200			

图55 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-222

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温 : 30℃
数据文件名: RC\$JSS-222 - 0-68/11-510-2 - zzp-24122701p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-rcqx-FX260-pH6.8.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-222 - JSS-222-20250102-FX260.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
分析时间: 2025/01/03 00:51:51
处理时间 (V2) : 2025/01/03 09:29:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速:1.5ml/min
波长:318nm
版本号:6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 318nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.108	192889	100.000	43196	1477	1.271	--
总计		192889	100.000	43196			

图56 盐酸鲁拉西酮口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122701批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2