



塞来昔布片项目信息

介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	510141-202102	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	1


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.22	3065692	3063774	3066349	3061798	3061843	3063891	0.07
2	10.23	3051875	3053846				3052860	0.05

单位质量响应值		RSD%	判断
299793.64	298422.29	0.33	数据可信

溶出曲线测定

塞来昔布片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-05

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	204690	-	204690	6.816	7.30	7.21	6.82	7.30	7.19
	2	240943	-	240943	8.023			8.02		
	3	234288	-	234288	7.802			7.80		
	4	215389	-	215389	7.172			7.17		
	5	201260	-	201260	6.702			6.70		
	6	218940	-	218940	7.291			7.29		
10min	1	572420	-	572420	19.061	19.44	4.87	19.07	19.45	4.86
	2	606102	-	606102	20.183			20.19		
	3	620200	-	620200	20.652			20.66		
	4	561564	-	561564	18.700			18.71		
	5	546019	-	546019	18.182			18.19		
	6	596228	-	596228	19.854			19.86		
15min	1	967413	-	967413	32.214	31.87	4.39	32.25	31.90	4.39
	2	974198	-	974198	32.440			32.48		
	3	1007590	-	1007590	33.552			33.59		
	4	913418	-	913418	30.416			30.45		
	5	898655	-	898655	29.924			29.96		
	6	980510	-	980510	32.650			32.69		
20min	1	1322697	-	1322697	44.045	43.18	3.96	44.13	43.27	3.96
	2	1304916	-	1304916	43.453			43.54		
	3	1361812	-	1361812	45.347			45.44		
	4	1240666	-	1240666	41.313			41.40		
	5	1229829	-	1229829	40.952			41.03		
	6	1320867	-	1320867	43.984			44.07		
30min	1	1875644	-	1875644	62.457	60.80	2.72	62.61	60.95	2.71
	2	1825234	-	1825234	60.779			60.93		
	3	1888321	-	1888321	62.880			63.04		
	4	1779588	-	1779588	59.259			59.41		
	5	1764969	-	1764969	58.772			58.92		
	6	1821557	-	1821557	60.656			60.81		
45min	1	2283013	-	2283013	76.022	75.99	1.13	76.27	76.23	1.14
	2	2297615	-	2297615	76.509			76.76		
	3	2313300	-	2313300	77.031			77.29		
	4	2278319	-	2278319	75.866			76.10		
	5	2236425	-	2236425	74.471			74.70		
	6	2283086	-	2283086	76.025			76.27		
60min	1	2489495	-	2489495	82.898	83.35	0.85	83.26	83.71	0.85
	2	2498420	-	2498420	83.195			83.56		
	3	2524444	-	2524444	84.062			84.43		
	4	2503095	-	2503095	83.351			83.70		
	5	2473443	-	2473443	82.364			82.71		
	6	2529247	-	2529247	84.222			84.58		
极限	1	2678911	-	2678911	89.206	89.24	0.58	89.69	89.72	0.57
	2	2662556	-	2662556	88.661			89.15		
	3	2681080	-	2681080	89.278			89.77		
	4	2695958	-	2695958	89.773			90.25		
	5	2663196	-	2663196	88.682			89.15		
	6	2698059	-	2698059	89.843			90.33		



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-05

复核者:

未审阅版本



塞来昔布片项目信息


介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	510141-202102	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.22	3050318	3059476	3054231	3053663	3050445	3053627	0.13
2	10.23	3052332	3050349				3051340	0.05
单位质量响应值			RSD%	判断				
298789.33			0.13	数据可信				

溶出曲线测定

塞来昔布片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-05

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	254458	-	254458	8.490	8.64	3.51	8.49	8.64	3.48
	2	266043	-	266043	8.876			8.88		
	3	248039	-	248039	8.275			8.28		
	4	269302	-	269302	8.985			8.98		
	5	250138	-	250138	8.345			8.35		
	6	264959	-	264959	8.840			8.84		
10min	1	667661	-	667661	22.275	22.96	2.28	22.29	22.97	2.27
	2	691244	-	691244	23.062			23.08		
	3	683265	-	683265	22.796			22.81		
	4	704738	-	704738	23.512			23.53		
	5	675195	-	675195	22.527			22.54		
	6	706173	-	706173	23.560			23.57		
15min	1	1083886	-	1083886	36.162	37.27	2.17	36.21	37.32	2.17
	2	1107528	-	1107528	36.951			37.00		
	3	1140713	-	1140713	38.058			38.10		
	4	1144612	-	1144612	38.188			38.24		
	5	1098858	-	1098858	36.662			36.71		
	6	1126409	-	1126409	37.581			37.63		
20min	1	1476206	-	1476206	49.251	50.10	2.73	49.35	50.20	2.73
	2	1475845	-	1475845	49.239			49.34		
	3	1576270	-	1576270	52.590			52.69		
	4	1495231	-	1495231	49.886			49.99		
	5	1467284	-	1467284	48.953			49.05		
	6	1518391	-	1518391	50.659			50.76		
30min	1	2087508	-	2087508	69.646	69.58	1.60	69.82	69.76	1.60
	2	2069804	-	2069804	69.056			69.23		
	3	2149379	-	2149379	71.710			71.89		
	4	2055846	-	2055846	68.590			68.77		
	5	2068413	-	2068413	69.009			69.18		
	6	2081780	-	2081780	69.455			69.64		
45min	1	2542505	-	2542505	84.826	85.17	0.66	85.11	85.46	0.67
	2	2542054	-	2542054	84.811			85.09		
	3	2583672	-	2583672	86.200			86.49		
	4	2543663	-	2543663	84.865			85.15		
	5	2561476	-	2561476	85.459			85.74		
	6	2543622	-	2543622	84.864			85.15		
60min	1	2716457	-	2716457	90.630	90.55	0.33	91.04	90.96	0.33
	2	2706671	-	2706671	90.304			90.71		
	3	2726499	-	2726499	90.965			91.38		
	4	2705062	-	2705062	90.250			90.66		
	5	2721618	-	2721618	90.802			91.21		
	6	2707402	-	2707402	90.328			90.74		
极限	1	2805402	-	2805402	93.598	93.44	0.47	94.14	93.98	0.47
	2	2799120	-	2799120	93.388			93.93		
	3	2817364	-	2817364	93.997			94.55		
	4	2789163	-	2789163	93.056			93.60		
	5	2810075	-	2810075	93.753			94.30		
	6	2782845	-	2782845	92.845			93.39		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-01-05

复核者:

未审阅版本



塞来昔布片项目信息


介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	510141-202102	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	100
标示量(mg)	100	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.22	3056626	3081438	3063118	3060752	3056696	3063726	0.34
2	10.23	3060053	3062118				3061086	0.05
单位质量响应值				RSD%	判断			
299777.50				0.14	数据可信			

溶出曲线测定

塞来昔布片



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-05

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	299609	-	299609	9.964	9.29	6.29	9.96	9.28	6.28
	2	302008	-	302008	10.043			10.04		
	3	272123	-	272123	9.050			9.05		
	4	258516	-	258516	8.597			8.60		
	5	274330	-	274330	9.123			9.12		
	6	268970	-	268970	8.945			8.94		
10min	1	781979	-	781979	26.005	25.28	3.34	26.02	25.29	3.34
	2	783610	-	783610	26.059			26.07		
	3	756769	-	756769	25.167			25.18		
	4	738294	-	738294	24.552			24.57		
	5	777273	-	777273	25.848			25.86		
	6	722634	-	722634	24.031			24.04		
15min	1	1238605	-	1238605	41.190	40.57	2.56	41.24	40.62	2.56
	2	1219346	-	1219346	40.550			40.60		
	3	1224283	-	1224283	40.714			40.77		
	4	1206437	-	1206437	40.120			40.17		
	5	1261777	-	1261777	41.961			42.01		
	6	1169258	-	1169258	38.884			38.93		
20min	1	1618614	-	1618614	53.827	53.42	2.35	53.94	53.54	2.35
	2	1587450	-	1587450	52.791			52.91		
	3	1593422	-	1593422	52.990			53.10		
	4	1613921	-	1613921	53.671			53.78		
	5	1668647	-	1668647	55.491			55.61		
	6	1556506	-	1556506	51.762			51.87		
30min	1	2163145	-	2163145	71.936	71.81	1.94	72.13	72.00	1.94
	2	2124307	-	2124307	70.644			70.84		
	3	2141911	-	2141911	71.230			71.42		
	4	2178423	-	2178423	72.444			72.63		
	5	2230571	-	2230571	74.178			74.38		
	6	2117993	-	2117993	70.434			70.62		
45min	1	2595865	-	2595865	86.326	86.46	1.01	86.63	86.76	1.02
	2	2580851	-	2580851	85.827			86.13		
	3	2598423	-	2598423	86.411			86.71		
	4	2594630	-	2594630	86.285			86.58		
	5	2650823	-	2650823	88.154			88.46		
	6	2578918	-	2578918	85.763			86.05		
60min	1	2792590	-	2792590	92.868	92.64	0.70	93.30	93.07	0.70
	2	2778077	-	2778077	92.386			92.81		
	3	2781644	-	2781644	92.504			92.93		
	4	2766666	-	2766666	92.006			92.43		
	5	2820782	-	2820782	93.806			94.25		
	6	2774210	-	2774210	92.257			92.68		
极限	1	2871707	-	2871707	95.499	95.52	0.66	96.07	96.09	0.67
	2	2864279	-	2864279	95.252			95.82		
	3	2871741	-	2871741	95.500			96.07		
	4	2849277	-	2849277	94.753			95.32		
	5	2906814	-	2906814	96.667			97.25		
	6	2870029	-	2870029	95.443			96.00		



操作者: 谢超君

日期: 2025-01-05

复核者:

未审阅版本



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-747-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 11:30:53
处理时间(V2): 2025/01/05 10:09:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-748-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 11:35:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:09:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.842	3065692	100.000	495692	4956	1.030	--
总计		3065692	100.000	495692			

图2 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-749-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 11:39:38
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:09:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.840	3063774	100.000	497716	4974	1.030	--
总计		3063774	100.000	497716			

图3 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-750-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 11:44:01
处理时间(V2): 2025/01/05 10:09:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.838	3066349	100.000	497715	4948	1.031	--
总计		3066349	100.000	497715			


图4 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-751-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 11:48:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:09:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.840	3061798	100.000	497394	4972	1.031	--
总计		3061798	100.000	497394			


图5 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-752-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 11:52:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:09:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.836	3061843	100.000	496994	4960	1.031	--
总计		3061843	100.000	496994			

图6 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-753-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-1

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/03 11:57:10


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/05 10:09:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	204690	100.000	34666	5445	1.020	--
总计		204690	100.000	34666			

图7 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-754-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-10

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/03 12:01:31


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/05 10:09:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	240943	100.000	40800	5424	1.019	--
总计		240943	100.000	40800			

图8 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-755-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 12:05:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:09:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	234288	100.000	39563	5423	1.020	--
总计		234288	100.000	39563			

图9 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-756-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 12:10:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:09:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.844	215389	100.000	36448	5425	1.020	--
总计		215389	100.000	36448			

图10 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-757-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 12:14:38

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:09:40

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	201260	100.000	34040	5439	1.021	--
总计		201260	100.000	34040			

图11 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-758-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 5 μl

进样时间:2025/01/03 12:19:01

处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:09:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.844	218940	100.000	37059	5432	1.022	--
总计		218940	100.000	37059			

图12 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-759-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 12:23:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:09:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	572420	100.000	96933	5432	1.022	--
总计		572420	100.000	96933			

图13 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-760-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 12:27:46

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:09:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.843	606102	100.000	102366	5423	1.022	--
总计		606102	100.000	102366			

图14 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-761-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 12:32:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:09:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	620200	100.000	104891	5428	1.022	--
总计		620200	100.000	104891			

图15 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-762-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 12:36:29

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:09:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.844	561564	100.000	95059	5436	1.022	--
总计		561564	100.000	95059			

图16 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-763-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 12:40:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:09:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	546019	100.000	92407	5432	1.022	--
总计		546019	100.000	92407			

图17 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-764-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 12:45:12
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:10:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	596228	100.000	101095	5439	1.022	--
总计		596228	100.000	101095			

图18 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-765-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 12:49:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	967413	100.000	163832	5428	1.023	--
总计		967413	100.000	163832			

图19 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-766-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 12:53:57

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	974198	100.000	165109	5438	1.023	--
总计		974198	100.000	165109			

图20 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-767-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 12:58:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:10:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	1007590	100.000	170563	5428	1.023	--
总计		1007590	100.000	170563			

图21 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-768-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 13:02:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:10:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	913418	100.000	155040	5441	1.023	--
总计		913418	100.000	155040			

图22 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-769-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 13:07:03 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	898655	100.000	152211	5430	1.023	--
总计		898655	100.000	152211			

图23 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-770-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 13:11:25

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	980510	100.000	166449	5447	1.024	--
总计		980510	100.000	166449			

图24 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-771-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 13:15:46

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	1322697	100.000	224030	5420	1.024	--
总计		1322697	100.000	224030			

图25 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-772-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 13:20:07

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	1304916	100.000	221445	5446	1.024	--
总计		1304916	100.000	221445			

图26 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-773-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 13:24:30

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	1361812	100.000	230644	5423	1.024	--
总计		1361812	100.000	230644			

图27 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-774-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 13:28:52

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	1240666	100.000	210405	5447	1.024	--
总计		1240666	100.000	210405			

图28 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-775-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 13:33:15 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	1229829	100.000	208336	5425	1.024	--
总计		1229829	100.000	208336			

图29 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-776-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 13:37:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:10:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	1320867	100.000	224156	5447	1.024	--
总计		1320867	100.000	224156			

图30 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-777-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 13:41:59

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.844	1875644	100.000	317420	5431	1.025	--
总计		1875644	100.000	317420			

图31 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-778-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 13:46:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:10:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	1825234	100.000	309404	5442	1.025	--
总计		1825234	100.000	309404			

图32 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-779-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 13:50:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	1888321	100.000	319724	5424	1.025	--
总计		1888321	100.000	319724			

图33 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-780-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 13:55:05

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	1779588	100.000	301763	5448	1.025	--
总计		1779588	100.000	301763			

图34 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-781-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 13:59:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.844	1764969	100.000	298818	5436	1.025	--
总计		1764969	100.000	298818			

图35 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-782-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 14:03:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	1821557	100.000	309040	5446	1.025	--
总计		1821557	100.000	309040			

图36 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-783-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 14:08:10

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.844	2283013	100.000	386593	5434	1.026	--
总计		2283013	100.000	386593			

图37 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-784-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 14:12:32

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2297615	100.000	389642	5451	1.026	--
总计		2297615	100.000	389642			

图38 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-785-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 14:16:56

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	2313300	100.000	391956	5430	1.026	--
总计		2313300	100.000	391956			

图39 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-786-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 14:21:19

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2278319	100.000	386748	5457	1.026	--
总计		2278319	100.000	386748			

图40 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-787-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 14:25:41

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	2236425	100.000	378914	5431	1.026	--
总计		2236425	100.000	378914			

图41 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-788-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/03 14:30:03

处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2283086	100.000	387062	5446	1.027	--
总计		2283086	100.000	387062			

图42 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-789-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 14:34:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	2489495	100.000	421947	5430	1.027	--
总计		2489495	100.000	421947			


图43 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-790-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 14:38:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:11:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2498420	100.000	423952	5458	1.027	--
总计		2498420	100.000	423952			

图44 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-791-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 14:43:10
处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	2524444	100.000	428228	5437	1.027	--
总计		2524444	100.000	428228			

图45 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-792-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 14:47:32

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2503095	100.000	425327	5462	1.027	--
总计		2503095	100.000	425327			

图46 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-793-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 14:51:55

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	2473443	100.000	419510	5435	1.028	--
总计		2473443	100.000	419510			

图47 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-794-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 14:56:16

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2529247	100.000	429530	5456	1.028	--
总计		2529247	100.000	429530			

图48 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-795-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 15:00:41

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2678911	100.000	453851	5431	1.028	--
总计		2678911	100.000	453851			

图49 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-796-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 15:05:04

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:34

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2662556	100.000	452415	5464	1.027	--
总计		2662556	100.000	452415			

图50 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-797-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 15:09:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:37

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	2681080	100.000	454799	5442	1.028	--
总计		2681080	100.000	454799			

图51 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-798-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 15:13:49
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:11:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2695958	100.000	458263	5467	1.028	--
总计		2695958	100.000	458263			

图52 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-799-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 15:18:12
处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	2663196	100.000	450717	5452	1.028	--
总计		2663196	100.000	450717			

图53 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-800-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 15:22:35
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:11:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	2698059	100.000	458815	5468	1.028	--
总计		2698059	100.000	458815			

图54 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-801-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 15:26:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:11:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.841	3051875	100.000	496374	4992	1.038	--
总计		3051875	100.000	496374			

图55 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-802-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 15:31:23
处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.838	3053846	100.000	498622	4998	1.038	--
总计		3053846	100.000	498622			

图56 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-803-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 15:35:47
处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
溶剂



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-804-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 15:40:11
处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.838	3050318	100.000	497938	4997	1.038	--
总计		3050318	100.000	497938			

图58 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-805-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 15:44:36
处理时间(V2): 2025/01/05 10:12:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.842	3059476	100.000	496484	4995	1.038	--
总计		3059476	100.000	496484			


图59 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-806-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 15:49:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:12:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.837	3054231	100.000	498289	4991	1.038	--
总计		3054231	100.000	498289			


图60 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-807-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 15:53:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:12:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.843	3053663	100.000	495192	4998	1.038	--
总计		3053663	100.000	495192			

图61 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-808-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 15:57:50 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:12:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.837	3050445	100.000	497513	4988	1.038	--
总计		3050445	100.000	497513			

图62 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-809-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-1

版本号: 6.115

进样体积: 5 μl

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/03 16:02:14


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/05 10:12:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	254458	100.000	43058	5469	1.027	--
总计		254458	100.000	43058			

图63 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-810-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-10

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/03 16:06:38


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/05 10:12:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	266043	100.000	45199	5453	1.027	--
总计		266043	100.000	45199			

图64 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-811-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 16:11:01

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:12:19

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	248039	100.000	42041	5467	1.027	--
总计		248039	100.000	42041			

图65 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-812-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 16:15:24

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:12:22

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	269302	100.000	45751	5445	1.027	--
总计		269302	100.000	45751			

图66 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-813-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 16:19:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:12:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	250138	100.000	42486	5472	1.027	--
总计		250138	100.000	42486			

图67 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-814-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 16:24:10
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:12:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	264959	100.000	44953	5457	1.027	--
总计		264959	100.000	44953			

图68 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-815-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 16:28:33

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:12:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	667661	100.000	113358	5475	1.028	--
总计		667661	100.000	113358			

图69 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-816-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 16:32:57 版本号: 6.115
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:12:34 实验者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274) 处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	691244	100.000	116780	5466	1.028	--
总计		691244	100.000	116780			

图70 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-817-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 16:37:20 版本号: 6.115
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:12:37 实验者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274) 处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	683265	100.000	116264	5475	1.028	--
总计		683265	100.000	116264			

图71 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-818-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 16:41:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:12:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	704738	100.000	119331	5469	1.027	--
总计		704738	100.000	119331			

图72 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-819-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 16:46:06

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:12:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	675195	100.000	114883	5459	1.028	--
总计		675195	100.000	114883			

图73 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-820-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 16:50:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:12:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	706173	100.000	119460	5466	1.027	--
总计		706173	100.000	119460			

图74 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-821-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 16:54:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:12:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	1083886	100.000	184217	5451	1.028	--
总计		1083886	100.000	184217			

图75 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-822-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 16:59:15

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:12:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	1107528	100.000	187267	5465	1.028	--
总计		1107528	100.000	187267			

图76 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-823-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 17:03:38

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:12:55

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	1140713	100.000	193883	5449	1.028	--
总计		1140713	100.000	193883			

图77 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-824-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 17:08:01

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:12:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	1144612	100.000	193619	5475	1.028	--
总计		1144612	100.000	193619			


图78 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-825-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 17:12:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:13:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	1098858	100.000	186652	5451	1.028	--
总计		1098858	100.000	186652			

图79 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-826-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 17:16:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	1126409	100.000	190440	5464	1.028	--
总计		1126409	100.000	190440			

图80 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-827-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 17:21:12
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:13:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	1476206	100.000	250543	5445	1.029	--
总计		1476206	100.000	250543			

图81 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-828-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 17:25:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:13:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	1475845	100.000	249411	5472	1.029	--
总计		1475845	100.000	249411			

图82 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-829-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 17:29:58

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	1576270	100.000	266599	5444	1.029	--
总计		1576270	100.000	266599			

图83 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-830-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 17:34:22
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:13:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	1495231	100.000	253451	5467	1.029	--
总计		1495231	100.000	253451			

图84 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-831-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 17:38:46
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:13:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	1467284	100.000	247953	5441	1.029	--
总计		1467284	100.000	247953			

图85 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-832-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 17:43:10

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	1518391	100.000	257976	5462	1.029	--
总计		1518391	100.000	257976			

图86 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-833-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 17:47:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	2087508	100.000	352296	5447	1.030	--
总计		2087508	100.000	352296			

图87 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-834-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 17:51:59

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	2069804	100.000	350838	5460	1.030	--
总计		2069804	100.000	350838			

图88 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-835-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 17:56:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	2149379	100.000	363256	5446	1.029	--
总计		2149379	100.000	363256			

图89 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-836-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 18:00:46

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	2055846	100.000	348988	5455	1.030	--
总计		2055846	100.000	348988			

图90 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-837-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 18:05:09 版本号: 6.115
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:13:36 实验者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274) 处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	2068413	100.000	350088	5457	1.029	--
总计		2068413	100.000	350088			

图91 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-838-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 18:09:33

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2081780	100.000	353440	5451	1.030	--
总计		2081780	100.000	353440			

图92 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-839-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 18:13:57

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	2542505	100.000	430977	5459	1.029	--
总计		2542505	100.000	430977			

图93 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-840-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 18:18:20
处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2542054	100.000	431499	5451	1.030	--
总计		2542054	100.000	431499			

图94 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-841-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 18:22:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	2583672	100.000	437376	5452	1.030	--
总计		2583672	100.000	437376			

图95 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-842-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 18:27:07 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	2543663	100.000	432206	5446	1.031	--
总计		2543663	100.000	432206			

图96 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-843-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 18:31:31
处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	2561476	100.000	434269	5462	1.030	--
总计		2561476	100.000	434269			

图97 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-844-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 18:35:55

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	2543622	100.000	432175	5453	1.030	--
总计		2543622	100.000	432175			

图98 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-845-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 18:40:20
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:14:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	2716457	100.000	460702	5463	1.030	--
总计		2716457	100.000	460702			

图99 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-846-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 18:44:44
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:14:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2706671	100.000	459914	5455	1.031	--
总计		2706671	100.000	459914			

图100 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-847-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 18:49:08

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:14:06

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	2726499	100.000	462330	5463	1.030	--
总计		2726499	100.000	462330			

图101 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

101



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-848-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 18:53:32

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:14:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	2705062	100.000	459740	5447	1.031	--
总计		2705062	100.000	459740			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-849-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 18:57:56
处理时间(V2): 2025/01/05 10:14:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	2721618	100.000	461778	5467	1.030	--
总计		2721618	100.000	461778			

图103 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-850-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 19:02:20

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:14:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	2707402	100.000	460032	5454	1.031	--
总计		2707402	100.000	460032			

图104 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

104




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-851-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 19:06:44
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:14:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	2805402	100.000	475881	5462	1.030	--
总计		2805402	100.000	475881			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-852-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/03 19:11:08

处理时间(V2): 2025/01/05 10:14:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2799120	100.000	475588	5453	1.031	--
总计		2799120	100.000	475588			

图106 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

106



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-853-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 19:15:33

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:14:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	2817364	100.000	478233	5469	1.030	--
总计		2817364	100.000	478233			

图107 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

107



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-854-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 19:19:57

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:14:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2789163	100.000	473784	5456	1.031	--
总计		2789163	100.000	473784			

图108 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

108



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-855-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 19:24:22

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:14:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	2810075	100.000	477288	5478	1.030	--
总计		2810075	100.000	477288			

图109 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

109




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-856-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 19:28:46
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:14:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2782845	100.000	472784	5461	1.031	--
总计		2782845	100.000	472784			

图110 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-857-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 19:33:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:14:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	3052332	100.000	496509	4989	1.040	--
总计		3052332	100.000	496509			

图111 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-858-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 19:37:34

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:14:40

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.841	3050349	100.000	497091	4999	1.041	--
总计		3050349	100.000	497091			

图112 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-859-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 19:41:58
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:14:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
溶剂



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-860-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 19:46:21
处理时间(V2): 2025/01/05 10:14:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.841	3056626	100.000	498291	5001	1.041	--
总计		3056626	100.000	498291			

图114 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-861-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 19:50:44
处理时间(V2): 2025/01/05 10:14:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.843	3081438	100.000	499725	4982	1.041	--
总计		3081438	100.000	499725			

图115 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-862-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 19:55:07
处理时间(V2): 2025/01/05 10:14:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.841	3063118	100.000	498898	5003	1.041	--
总计		3063118	100.000	498898			

图116 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-863-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 19:59:29
处理时间(V2): 2025/01/05 10:14:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.842	3060752	100.000	496102	4981	1.041	--
总计		3060752	100.000	496102			

图117 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-864-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 20:03:51
处理时间(V2): 2025/01/05 10:14:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.842	3056696	100.000	496702	5008	1.041	--
总计		3056696	100.000	496702			

图118 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-865-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-1

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/03 20:08:13


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	299609	100.000	50736	5452	1.028	--
总计		299609	100.000	50736			

图119 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-866-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 20:12:35

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	302008	100.000	51285	5486	1.028	--
总计		302008	100.000	51285			

图120 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

120



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-867-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 20:16:56
处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	272123	100.000	46028	5455	1.028	--
总计		272123	100.000	46028			

图121 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

121

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-868-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 20:21:19

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	258516	100.000	43996	5491	1.027	--
总计		258516	100.000	43996			

图122 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-869-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 20:25:40
处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	274330	100.000	46520	5472	1.027	--
总计		274330	100.000	46520			

图123 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

123

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-870-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 20:30:04

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:15

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	268970	100.000	45815	5494	1.027	--
总计		268970	100.000	45815			

图124 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-871-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 20:34:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	781979	100.000	132622	5465	1.029	--
总计		781979	100.000	132622			

图125 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

125



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-872-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 20:38:48

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	783610	100.000	133231	5477	1.029	--
总计		783610	100.000	133231			

图126 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

126



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-873-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 20:43:11

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	756769	100.000	128093	5469	1.029	--
总计		756769	100.000	128093			

图127 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

127



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-874-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 20:47:32

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	738294	100.000	125536	5481	1.029	--
总计		738294	100.000	125536			

图128 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

128



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-875-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 20:51:55

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	777273	100.000	131280	5453	1.029	--
总计		777273	100.000	131280			

图129 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

129




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-876-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 20:56:17
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:15:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	722634	100.000	122784	5469	1.028	--
总计		722634	100.000	122784			

图130 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-877-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 21:00:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	1238605	100.000	209698	5449	1.029	--
总计		1238605	100.000	209698			

图131 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-878-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 21:05:00

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:15:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	1219346	100.000	207073	5472	1.030	--
总计		1219346	100.000	207073			

图132 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

132

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-879-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 21:09:22

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	1224283	100.000	207481	5449	1.030	--
总计		1224283	100.000	207481			

图133 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-880-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 21:13:44

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	1206437	100.000	204991	5475	1.030	--
总计		1206437	100.000	204991			

图134 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

134



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-881-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 21:18:06

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/01/05 10:15:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	1261777	100.000	214114	5465	1.030	--
总计		1261777	100.000	214114			

图135 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

135




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-882-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 21:22:28
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:15:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	1169258	100.000	198704	5477	1.030	--
总计		1169258	100.000	198704			

图136 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-883-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 21:26:50

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:15:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	1618614	100.000	274825	5466	1.031	--
总计		1618614	100.000	274825			

图137 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-884-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 21:31:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	1587450	100.000	269480	5481	1.030	--
总计		1587450	100.000	269480			

图138 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

138




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-885-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 21:35:32 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	1593422	100.000	270541	5470	1.030	--
总计		1593422	100.000	270541			

图139 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-886-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 21:39:54

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	1613921	100.000	273905	5471	1.031	--
总计		1613921	100.000	273905			

图140 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-887-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 21:44:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:16:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	1668647	100.000	283148	5468	1.031	--
总计		1668647	100.000	283148			

图141 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-888-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 21:48:38

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	1556506	100.000	264387	5480	1.030	--
总计		1556506	100.000	264387			

图142 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

142



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-889-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 21:52:59

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	2163145	100.000	367048	5464	1.031	--
总计		2163145	100.000	367048			

图143 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

143

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-890-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 21:57:21

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	2124307	100.000	360993	5482	1.031	--
总计		2124307	100.000	360993			

图144 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-891-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 22:01:43 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	2141911	100.000	362594	5458	1.031	--
总计		2141911	100.000	362594			

图145 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-892-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 22:06:06

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	2178423	100.000	370269	5480	1.031	--
总计		2178423	100.000	370269			

图146 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

146



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-893-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 22:10:27
处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	2230571	100.000	377355	5464	1.032	--
总计		2230571	100.000	377355			

图147 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

147

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-894-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 22:14:48

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	2117993	100.000	359715	5483	1.031	--
总计		2117993	100.000	359715			

图148 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-895-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 22:19:10

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	2595865	100.000	439265	5468	1.032	--
总计		2595865	100.000	439265			

图149 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-896-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 22:23:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	2580851	100.000	437691	5462	1.032	--
总计		2580851	100.000	437691			

图150 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

150



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-897-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/01/03 22:27:53

处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	2598423	100.000	441611	5485	1.032	--
总计		2598423	100.000	441611			

图151 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

151



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-898-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 22:32:13

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	2594630	100.000	439377	5464	1.032	--
总计		2594630	100.000	439377			

图152 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

152



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-899-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 22:36:35
处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	2650823	100.000	449777	5468	1.032	--
总计		2650823	100.000	449777			

图153 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-900-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 22:40:56

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	2578918	100.000	438519	5486	1.032	--
总计		2578918	100.000	438519			

图154 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-901-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 22:45:17

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	2792590	100.000	472267	5472	1.032	--
总计		2792590	100.000	472267			

图155 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

155



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-902-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 22:49:38

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	2778077	100.000	470886	5482	1.033	--
总计		2778077	100.000	470886			

图156 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

156

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-903-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 22:53:59

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	2781644	100.000	471186	5470	1.033	--
总计		2781644	100.000	471186			

图157 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-904-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 22:58:20

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	2766666	100.000	468375	5468	1.033	--
总计		2766666	100.000	468375			

图158 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

158



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-905-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 23:02:41

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:17:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.858	2820782	100.000	478016	5485	1.033	--
总计		2820782	100.000	478016			

图159 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-906-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 23:07:02

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:17:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	2774210	100.000	469716	5479	1.033	--
总计		2774210	100.000	469716			

图160 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

160



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-907-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 23:11:25

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:17:06

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	2871707	100.000	486524	5470	1.033	--
总计		2871707	100.000	486524			

图161 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

161




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-908-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 23:15:48
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:17:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	2864279	100.000	486279	5466	1.032	--
总计		2864279	100.000	486279			

图162 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-909-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 23:20:10

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:17:12

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	2871741	100.000	488480	5485	1.033	--
总计		2871741	100.000	488480			

图163 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

163




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-910-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 23:24:32
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:17:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	2849277	100.000	481806	5472	1.033	--
总计		2849277	100.000	481806			

图164 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-911-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 23:28:53

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/01/05 10:17:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	2906814	100.000	493444	5470	1.033	--
总计		2906814	100.000	493444			

图165 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

165



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-912-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 23:33:15

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:17:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.858	2870029	100.000	486050	5487	1.033	--
总计		2870029	100.000	486050			

图166 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

166



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-913-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 23:37:38
处理时间(V2): 2025/01/05 10:17:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.843	3060053	100.000	497247	4997	1.043	--
总计		3060053	100.000	497247			

图167 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-914-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 23:42:00
处理时间(V2): 2025/01/05 10:17:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	3062118	100.000	498715	4995	1.042	--
总计		3062118	100.000	498715			

图168 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2