




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-747-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 11:30:53
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:09:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-748-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 11:35:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:09:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.842	3065692	100.000	495692	4956	1.030	--
总计		3065692	100.000	495692			

图2 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-749-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 11:39:38
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:09:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.840	3063774	100.000	497716	4974	1.030	--
总计		3063774	100.000	497716			

图3 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-750-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 11:44:01
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:09:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.838	3066349	100.000	497715	4948	1.031	--
总计		3066349	100.000	497715			


图4 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-751-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 11:48:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:09:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.840	3061798	100.000	497394	4972	1.031	--
总计		3061798	100.000	497394			


图5 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-752-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 11:52:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:09:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.836	3061843	100.000	496994	4960	1.031	--
总计		3061843	100.000	496994			

图6 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-753-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-1

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/03 11:57:10


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:09:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	204690	100.000	34666	5445	1.020	--
总计		204690	100.000	34666			

图7 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-754-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 12:01:31
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:09:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	240943	100.000	40800	5424	1.019	--
总计		240943	100.000	40800			

图8 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-755-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-19

版本号: 6.115

进样体积: 5 μl

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/03 12:05:54


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:09:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	234288	100.000	39563	5423	1.020	--
总计		234288	100.000	39563			

图9 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-756-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 12:10:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:09:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.844	215389	100.000	36448	5425	1.020	--
总计		215389	100.000	36448			

图10 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-757-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 12:14:38
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:09:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	201260	100.000	34040	5439	1.021	--
总计		201260	100.000	34040			

图11 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-758-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 12:19:01

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:09:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.844	218940	100.000	37059	5432	1.022	--
总计		218940	100.000	37059			

图12 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-759-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 12:23:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:09:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	572420	100.000	96933	5432	1.022	--
总计		572420	100.000	96933			

图13 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-760-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 12:27:46

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:09:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.843	606102	100.000	102366	5423	1.022	--
总计		606102	100.000	102366			

图14 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-761-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 12:32:07
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:09:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	620200	100.000	104891	5428	1.022	--
总计		620200	100.000	104891			

图15 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-762-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 12:36:29
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:09:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.844	561564	100.000	95059	5436	1.022	--
总计		561564	100.000	95059			

图16 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-763-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 12:40:50
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:09:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	546019	100.000	92407	5432	1.022	--
总计		546019	100.000	92407			

图17 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-764-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 12:45:12
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:10:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	596228	100.000	101095	5439	1.022	--
总计		596228	100.000	101095			

图18 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-765-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 12:49:35

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	967413	100.000	163832	5428	1.023	--
总计		967413	100.000	163832			

图19 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-766-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 12:53:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:10:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	974198	100.000	165109	5438	1.023	--
总计		974198	100.000	165109			

图20 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-767-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 12:58:20 版本号: 6.115
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:10:10 实验者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274) 处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	1007590	100.000	170563	5428	1.023	--
总计		1007590	100.000	170563			

图21 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-768-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 13:02:42

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	913418	100.000	155040	5441	1.023	--
总计		913418	100.000	155040			

图22 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-769-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 13:07:03

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	898655	100.000	152211	5430	1.023	--
总计		898655	100.000	152211			

图23 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-770-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 13:11:25

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	980510	100.000	166449	5447	1.024	--
总计		980510	100.000	166449			

图24 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-771-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 13:15:46

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	1322697	100.000	224030	5420	1.024	--
总计		1322697	100.000	224030			

图25 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-772-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 13:20:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:10:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	1304916	100.000	221445	5446	1.024	--
总计		1304916	100.000	221445			

图26 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-773-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 13:24:30

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	1361812	100.000	230644	5423	1.024	--
总计		1361812	100.000	230644			

图27 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-774-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-31

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/03 13:28:52


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	1240666	100.000	210405	5447	1.024	--
总计		1240666	100.000	210405			

图28 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-775-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 13:33:15

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	1229829	100.000	208336	5425	1.024	--
总计		1229829	100.000	208336			

图29 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-776-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 13:37:36

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	1320867	100.000	224156	5447	1.024	--
总计		1320867	100.000	224156			


图30 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-777-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 13:41:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:10:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.844	1875644	100.000	317420	5431	1.025	--
总计		1875644	100.000	317420			

图31 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-778-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 13:46:20

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	1825234	100.000	309404	5442	1.025	--
总计		1825234	100.000	309404			

图32 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-779-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 13:50:43

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	1888321	100.000	319724	5424	1.025	--
总计		1888321	100.000	319724			

图33 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-780-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 13:55:05
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:10:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	1779588	100.000	301763	5448	1.025	--
总计		1779588	100.000	301763			

图34 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-781-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 13:59:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.844	1764969	100.000	298818	5436	1.025	--
总计		1764969	100.000	298818			

图35 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-782-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 14:03:48

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	1821557	100.000	309040	5446	1.025	--
总计		1821557	100.000	309040			

图36 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-783-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-6

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/03 14:08:10


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.844	2283013	100.000	386593	5434	1.026	--
总计		2283013	100.000	386593			

图37 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-784-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 14:12:32

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:10:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2297615	100.000	389642	5451	1.026	--
总计		2297615	100.000	389642			

图38 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-785-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 14:16:56

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	2313300	100.000	391956	5430	1.026	--
总计		2313300	100.000	391956			

图39 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-786-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 14:21:19
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:11:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2278319	100.000	386748	5457	1.026	--
总计		2278319	100.000	386748			

图40 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-787-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 14:25:41

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	2236425	100.000	378914	5431	1.026	--
总计		2236425	100.000	378914			

图41 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-788-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-51

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/01/03 14:30:03


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2283086	100.000	387062	5446	1.027	--
总计		2283086	100.000	387062			

图42 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-789-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 14:34:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.846	2489495	100.000	421947	5430	1.027	--
总计		2489495	100.000	421947			

图43 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-790-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 14:38:48

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:17

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2498420	100.000	423952	5458	1.027	--
总计		2498420	100.000	423952			

图44 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-791-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 14:43:10

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:20

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	2524444	100.000	428228	5437	1.027	--
总计		2524444	100.000	428228			

图45 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-792-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 14:47:32

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2503095	100.000	425327	5462	1.027	--
总计		2503095	100.000	425327			

图46 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-793-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 14:51:55

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	2473443	100.000	419510	5435	1.028	--
总计		2473443	100.000	419510			

图47 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-794-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 14:56:16 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2529247	100.000	429530	5456	1.028	--
总计		2529247	100.000	429530			

图48 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-795-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 15:00:41

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2678911	100.000	453851	5431	1.028	--
总计		2678911	100.000	453851			

图49 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-796-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 15:05:04

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:34

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2662556	100.000	452415	5464	1.027	--
总计		2662556	100.000	452415			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-797-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 15:09:26
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:11:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	2681080	100.000	454799	5442	1.028	--
总计		2681080	100.000	454799			

图51 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-798-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 15:13:49

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:40

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2695958	100.000	458263	5467	1.028	--
总计		2695958	100.000	458263			

图52 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-799-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 15:18:12
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:11:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	2663196	100.000	450717	5452	1.028	--
总计		2663196	100.000	450717			

图53 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-800-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 15:22:35
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:11:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	2698059	100.000	458815	5468	1.028	--
总计		2698059	100.000	458815			

图54 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-801-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 15:26:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:11:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.841	3051875	100.000	496374	4992	1.038	--
总计		3051875	100.000	496374			

图55 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-802-2 - zzp-24123101p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 15:31:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:11:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.838	3053846	100.000	498622	4998	1.038	--
总计		3053846	100.000	498622			

图56 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123101批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-803-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 15:35:47
处理时间(V2): 2025/01/05 10:11:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图57 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-804-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 15:40:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:11:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.838	3050318	100.000	497938	4997	1.038	--
总计		3050318	100.000	497938			

图58 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-805-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 15:44:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:12:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.842	3059476	100.000	496484	4995	1.038	--
总计		3059476	100.000	496484			


图59 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-806-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 15:49:02 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:12:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.837	3054231	100.000	498289	4991	1.038	--
总计		3054231	100.000	498289			


图60 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-807-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 15:53:26 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:12:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.843	3053663	100.000	495192	4998	1.038	--
总计		3053663	100.000	495192			

图61 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-808-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 15:57:50
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:12:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.837	3050445	100.000	497513	4988	1.038	--
总计		3050445	100.000	497513			


图62 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-809-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 16:02:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:12:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	254458	100.000	43058	5469	1.027	--
总计		254458	100.000	43058			

图63 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-810-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 16:06:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:12:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	266043	100.000	45199	5453	1.027	--
总计		266043	100.000	45199			

图64 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-811-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 16:11:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:12:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	248039	100.000	42041	5467	1.027	--
总计		248039	100.000	42041			

图65 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-812-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 16:15:24

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:12:22

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	269302	100.000	45751	5445	1.027	--
总计		269302	100.000	45751			

图66 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-813-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 16:19:48 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:12:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	250138	100.000	42486	5472	1.027	--
总计		250138	100.000	42486			

图67 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-814-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 16:24:10

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:12:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	264959	100.000	44953	5457	1.027	--
总计		264959	100.000	44953			

图68 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-815-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 16:28:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:12:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	667661	100.000	113358	5475	1.028	--
总计		667661	100.000	113358			

图69 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-816-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-11 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间:2025/01/03 16:32:57 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:12:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	691244	100.000	116780	5466	1.028	--
总计		691244	100.000	116780			

图70 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-817-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 16:37:20

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:12:37

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	683265	100.000	116264	5475	1.028	--
总计		683265	100.000	116264			

图71 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-818-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 16:41:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:12:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	704738	100.000	119331	5469	1.027	--
总计		704738	100.000	119331			

图72 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-819-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 16:46:06 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:12:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	675195	100.000	114883	5459	1.028	--
总计		675195	100.000	114883			

图73 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-820-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 16:50:28
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:12:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	706173	100.000	119460	5466	1.027	--
总计		706173	100.000	119460			

图74 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-821-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 16:54:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:12:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	1083886	100.000	184217	5451	1.028	--
总计		1083886	100.000	184217			

图75 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-822-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 16:59:15 版本号: 6.115
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:12:52 实验者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274) 处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	1107528	100.000	187267	5465	1.028	--
总计		1107528	100.000	187267			

图76 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-823-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 17:03:38 版本号: 6.115
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:12:55 实验者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274) 处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	1140713	100.000	193883	5449	1.028	--
总计		1140713	100.000	193883			

图77 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-824-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 17:08:01

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:12:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	1144612	100.000	193619	5475	1.028	--
总计		1144612	100.000	193619			

图78 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-825-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 17:12:25 版本号: 6.115
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:13:01 实验者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274) 处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	1098858	100.000	186652	5451	1.028	--
总计		1098858	100.000	186652			

图79 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-826-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 17:16:48

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/01/05 10:13:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	1126409	100.000	190440	5464	1.028	--
总计		1126409	100.000	190440			

图80 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-827-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 17:21:12

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	1476206	100.000	250543	5445	1.029	--
总计		1476206	100.000	250543			

图81 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-828-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 5 μl

进样时间:2025/01/03 17:25:35

处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:13:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	1475845	100.000	249411	5472	1.029	--
总计		1475845	100.000	249411			

图82 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-829-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 17:29:58
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:13:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	1576270	100.000	266599	5444	1.029	--
总计		1576270	100.000	266599			

图83 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-830-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 17:34:22

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:13:15

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	1495231	100.000	253451	5467	1.029	--
总计		1495231	100.000	253451			

图84 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-831-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 17:38:46

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	1467284	100.000	247953	5441	1.029	--
总计		1467284	100.000	247953			

图85 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-832-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 17:43:10

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	1518391	100.000	257976	5462	1.029	--
总计		1518391	100.000	257976			

图86 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-833-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 17:47:34 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	2087508	100.000	352296	5447	1.030	--
总计		2087508	100.000	352296			

图87 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-834-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 17:51:59

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	2069804	100.000	350838	5460	1.030	--
总计		2069804	100.000	350838			

图88 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-835-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 17:56:23

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	2149379	100.000	363256	5446	1.029	--
总计		2149379	100.000	363256			

图89 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-836-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 18:00:46

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	2055846	100.000	348988	5455	1.030	--
总计		2055846	100.000	348988			

图90 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-837-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 18:05:09 版本号: 6.115
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:13:36 实验者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274) 处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	2068413	100.000	350088	5457	1.029	--
总计		2068413	100.000	350088			

图91 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-838-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 18:09:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2081780	100.000	353440	5451	1.030	--
总计		2081780	100.000	353440			

图92 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-839-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 18:13:57

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	2542505	100.000	430977	5459	1.029	--
总计		2542505	100.000	430977			

图93 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-840-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 18:18:20
处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2542054	100.000	431499	5451	1.030	--
总计		2542054	100.000	431499			

图94 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-841-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 18:22:43

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	2583672	100.000	437376	5452	1.030	--
总计		2583672	100.000	437376			

图95 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-842-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 18:27:07

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	2543663	100.000	432206	5446	1.031	--
总计		2543663	100.000	432206			

图96 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-843-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 18:31:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	2561476	100.000	434269	5462	1.030	--
总计		2561476	100.000	434269			

图97 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-844-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 18:35:55

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:13:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	2543622	100.000	432175	5453	1.030	--
总计		2543622	100.000	432175			

图98 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-845-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 18:40:20

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:14:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	2716457	100.000	460702	5463	1.030	--
总计		2716457	100.000	460702			

图99 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-846-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 18:44:44

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:14:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2706671	100.000	459914	5455	1.031	--
总计		2706671	100.000	459914			

图100 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

100



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-847-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 18:49:08

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:14:06

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	2726499	100.000	462330	5463	1.030	--
总计		2726499	100.000	462330			

图101 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

101




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-848-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 18:53:32
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:14:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	2705062	100.000	459740	5447	1.031	--
总计		2705062	100.000	459740			

图102 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-849-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 18:57:56
处理时间(V2): 2025/01/05 10:14:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	2721618	100.000	461778	5467	1.030	--
总计		2721618	100.000	461778			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-850-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 19:02:20

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:14:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.847	2707402	100.000	460032	5454	1.031	--
总计		2707402	100.000	460032			

图104 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-851-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 19:06:44
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:14:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	2805402	100.000	475881	5462	1.030	--
总计		2805402	100.000	475881			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-852-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 19:11:08
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:14:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2799120	100.000	475588	5453	1.031	--
总计		2799120	100.000	475588			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-853-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 19:15:33
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:14:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	2817364	100.000	478233	5469	1.030	--
总计		2817364	100.000	478233			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-854-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 5 μl

进样时间:2025/01/03 19:19:57

处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:14:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2789163	100.000	473784	5456	1.031	--
总计		2789163	100.000	473784			

图108 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-855-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 19:24:22

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:14:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	2810075	100.000	477288	5478	1.030	--
总计		2810075	100.000	477288			

图109 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

109




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-856-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 19:28:46
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:14:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.848	2782845	100.000	472784	5461	1.031	--
总计		2782845	100.000	472784			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-857-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 19:33:10
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:14:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	3052332	100.000	496509	4989	1.040	--
总计		3052332	100.000	496509			


图111 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-858-2 - zzp-24123102p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 19:37:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:14:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.841	3050349	100.000	497091	4999	1.041	--
总计		3050349	100.000	497091			

图112 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123102批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-859-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 19:41:58
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:14:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
溶剂




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-860-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 19:46:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:14:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.841	3056626	100.000	498291	5001	1.041	--
总计		3056626	100.000	498291			


图114 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-861-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 19:50:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:14:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.843	3081438	100.000	499725	4982	1.041	--
总计		3081438	100.000	499725			

图115 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-862-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/01/03 19:55:07
处理时间(V2): 2025/01/05 10:14:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.841	3063118	100.000	498898	5003	1.041	--
总计		3063118	100.000	498898			

图116 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-863-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 19:59:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:14:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.842	3060752	100.000	496102	4981	1.041	--
总计		3060752	100.000	496102			

图117 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-864-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 20:03:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:14:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.842	3056696	100.000	496702	5008	1.041	--
总计		3056696	100.000	496702			

图118 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-865-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 20:08:13

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	299609	100.000	50736	5452	1.028	--
总计		299609	100.000	50736			

图119 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-866-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 20:12:35

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	302008	100.000	51285	5486	1.028	--
总计		302008	100.000	51285			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-867-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 20:16:56
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:15:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	272123	100.000	46028	5455	1.028	--
总计		272123	100.000	46028			

图121 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-868-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 20:21:19

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	258516	100.000	43996	5491	1.027	--
总计		258516	100.000	43996			

图122 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-869-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 20:25:40
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:15:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	274330	100.000	46520	5472	1.027	--
总计		274330	100.000	46520			

图123 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-870-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 20:30:04

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:15

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	268970	100.000	45815	5494	1.027	--
总计		268970	100.000	45815			

图124 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

124

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-871-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 20:34:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.849	781979	100.000	132622	5465	1.029	--
总计		781979	100.000	132622			

图125 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-872-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 20:38:48

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	783610	100.000	133231	5477	1.029	--
总计		783610	100.000	133231			

图126 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

126




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-873-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 20:43:11 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	756769	100.000	128093	5469	1.029	--
总计		756769	100.000	128093			

图127 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

127

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-874-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 20:47:32

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	738294	100.000	125536	5481	1.029	--
总计		738294	100.000	125536			

图128 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-875-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 20:51:55
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:15:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	777273	100.000	131280	5453	1.029	--
总计		777273	100.000	131280			

图129 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-876-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 20:56:17

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	722634	100.000	122784	5469	1.028	--
总计		722634	100.000	122784			

图130 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

130

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-877-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 21:00:38

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	1238605	100.000	209698	5449	1.029	--
总计		1238605	100.000	209698			

图131 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-878-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 21:05:00

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	1219346	100.000	207073	5472	1.030	--
总计		1219346	100.000	207073			

图132 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-879-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 21:09:22
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:15:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	1224283	100.000	207481	5449	1.030	--
总计		1224283	100.000	207481			

图133 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-880-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 21:13:44

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	1206437	100.000	204991	5475	1.030	--
总计		1206437	100.000	204991			

图134 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-881-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 21:18:06

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	1261777	100.000	214114	5465	1.030	--
总计		1261777	100.000	214114			

图135 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-882-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 21:22:28

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	1169258	100.000	198704	5477	1.030	--
总计		1169258	100.000	198704			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-883-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 21:26:50

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	1618614	100.000	274825	5466	1.031	--
总计		1618614	100.000	274825			

图137 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

137

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-884-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 21:31:11

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:15:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	1587450	100.000	269480	5481	1.030	--
总计		1587450	100.000	269480			

图138 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-885-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 21:35:32

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:15:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	1593422	100.000	270541	5470	1.030	--
总计		1593422	100.000	270541			

图139 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-886-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 21:39:54

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	1613921	100.000	273905	5471	1.031	--
总计		1613921	100.000	273905			

图140 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-887-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 21:44:16
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:16:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	1668647	100.000	283148	5468	1.031	--
总计		1668647	100.000	283148			

图141 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-888-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 21:48:38

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	1556506	100.000	264387	5480	1.030	--
总计		1556506	100.000	264387			

图142 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-889-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 21:52:59
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:16:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	2163145	100.000	367048	5464	1.031	--
总计		2163145	100.000	367048			

图143 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-890-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 21:57:21

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	2124307	100.000	360993	5482	1.031	--
总计		2124307	100.000	360993			

图144 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-891-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 22:01:43

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	2141911	100.000	362594	5458	1.031	--
总计		2141911	100.000	362594			

图145 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-892-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 22:06:06

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	2178423	100.000	370269	5480	1.031	--
总计		2178423	100.000	370269			

图146 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-893-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 22:10:27

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	2230571	100.000	377355	5464	1.032	--
总计		2230571	100.000	377355			

图147 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-894-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 22:14:48

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	2117993	100.000	359715	5483	1.031	--
总计		2117993	100.000	359715			

图148 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-895-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 22:19:10
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:16:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	2595865	100.000	439265	5468	1.032	--
总计		2595865	100.000	439265			

图149 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-896-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 22:23:31 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	2580851	100.000	437691	5462	1.032	--
总计		2580851	100.000	437691			

图150 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

150




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-897-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 22:27:53
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:16:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	2598423	100.000	441611	5485	1.032	--
总计		2598423	100.000	441611			

图151 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-898-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 22:32:13

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.850	2594630	100.000	439377	5464	1.032	--
总计		2594630	100.000	439377			

图152 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

152



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-899-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 22:36:35

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.856	2650823	100.000	449777	5468	1.032	--
总计		2650823	100.000	449777			

图153 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

153



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-900-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 22:40:56

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.854	2578918	100.000	438519	5486	1.032	--
总计		2578918	100.000	438519			

图154 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

154



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-901-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 22:45:17

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	2792590	100.000	472267	5472	1.032	--
总计		2792590	100.000	472267			

图155 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

155




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-902-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 22:49:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.857	2778077	100.000	470886	5482	1.033	--
总计		2778077	100.000	470886			

图156 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

156




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-903-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 22:53:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	2781644	100.000	471186	5470	1.033	--
总计		2781644	100.000	471186			

图157 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

157

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-904-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 22:58:20

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:16:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	2766666	100.000	468375	5468	1.033	--
总计		2766666	100.000	468375			

图158 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-905-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 23:02:41

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:17:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.858	2820782	100.000	478016	5485	1.033	--
总计		2820782	100.000	478016			

图159 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

159

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-906-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/01/03 23:07:02

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/01/05 10:17:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	2774210	100.000	469716	5479	1.033	--
总计		2774210	100.000	469716			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-907-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 23:11:25
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:17:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.852	2871707	100.000	486524	5470	1.033	--
总计		2871707	100.000	486524			

图161 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-908-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 23:15:48
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:17:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	2864279	100.000	486279	5466	1.032	--
总计		2864279	100.000	486279			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-909-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 23:20:10
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:17:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.855	2871741	100.000	488480	5485	1.033	--
总计		2871741	100.000	488480			

图163 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-910-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 23:24:32
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:17:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.851	2849277	100.000	481806	5472	1.033	--
总计		2849277	100.000	481806			

图164 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-911-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 23:28:53
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:17:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.853	2906814	100.000	493444	5470	1.033	--
总计		2906814	100.000	493444			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-912-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/01/03 23:33:15
处理时间 (V2) : 2025/01/05 10:17:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.858	2870029	100.000	486050	5487	1.033	--
总计		2870029	100.000	486050			


图166 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-913-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 23:37:38 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:17:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.843	3060053	100.000	497247	4997	1.043	--
总计		3060053	100.000	497247			

图167 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-189/25-914-2 - zzp-25010201p-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-rcqx-20250103-FX274.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/01/03 23:42:00 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/01/05 10:17:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.845	3062118	100.000	498715	4995	1.042	--
总计		3062118	100.000	498715			

图168 塞来昔布片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25010201批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2