



普瑞巴林口崩片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	0	补液体积(ml)	0
对照品批号	101106-202003	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	200
标示量(mg)	75	供试品稀释倍数	1	系数	1


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	16.52	51818	51726	51554	51050	51216	51473	0.65
2	16.51	51672	51858				51765	0.26

单位质量响应值		RSD%	判断
3115.80	3135.37	0.45	数据可信

溶出曲线测定

普瑞巴林口崩片



操作者: 谢鑫慧

日期: 2025-01-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2024121221批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
2min	1	49485	-	49485	94.424	91.86	2.15	94.42	91.86	2.15
	2	47372	-	47372	90.392			90.39		
	3	49314	-	49314	94.098			94.10		
	4	47353	-	47353	90.356			90.36		
	5	47162	-	47162	89.992			89.99		
	6	48163	-	48163	91.902			91.90		
5min	1	54073	-	54073	103.179	103.64	0.79	103.18	103.64	0.79
	2	54548	-	54548	104.085			104.09		
	3	54846	-	54846	104.654			104.65		
	4	54364	-	54364	103.734			103.73		
	5	53613	-	53613	102.301			102.30		
	6	54429	-	54429	103.858			103.86		
10min	1	53792	-	53792	102.643	103.59	0.89	102.64	103.59	0.89
	2	54449	-	54449	103.896			103.90		
	3	54748	-	54748	104.467			104.47		
	4	54764	-	54764	104.497			104.50		
	5	53632	-	53632	102.337			102.34		
	6	54331	-	54331	103.671			103.67		
15min	1	53344	-	53344	101.788	103.48	0.85	101.79	103.48	0.85
	2	54570	-	54570	104.127			104.13		
	3	54452	-	54452	103.902			103.90		
	4	54534	-	54534	104.059			104.06		
	5	54335	-	54335	103.679			103.68		
	6	54135	-	54135	103.297			103.30		
30min	1	53687	-	53687	102.442	103.83	0.68	102.44	103.83	0.68
	2	54576	-	54576	104.139			104.14		
	3	54606	-	54606	104.196			104.20		
	4	54467	-	54467	103.931			103.93		
	5	54451	-	54451	103.900			103.90		
	6	54696	-	54696	104.368			104.37		



操作者: 谢鑫慧

日 期: 2025-01-07

复核者:

未审阅版本



普瑞巴林口崩片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	0	补液体积(ml)	0
对照品批号	101106-202003	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	200
标示量(mg)	75	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	16.52	51531	51508	51411	52023	51834	51661	0.50
2	16.51	51751	51761				51756	0.02
单位质量响应值			RSD%	判断				
3127.18			0.18	数据可信				

溶出曲线测定

普瑞巴林口崩片



操作者: 谢鑫慧

日期: 2025-01-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2024121221批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
2min	1	48238	-	48238	91.885	93.64	1.66	91.88	93.64	1.66
	2	48200	-	48200	91.812			91.81		
	3	49597	-	49597	94.474			94.47		
	4	49473	-	49473	94.237			94.24		
	5	49192	-	49192	93.702			93.70		
	6	50269	-	50269	95.754			95.75		
5min	1	53119	-	53119	101.182	100.02	1.67	101.18	100.02	1.67
	2	50995	-	50995	97.136			97.14		
	3	52290	-	52290	99.603			99.60		
	4	52614	-	52614	100.220			100.22		
	5	52480	-	52480	99.965			99.97		
	6	53567	-	53567	102.036			102.04		
10min	1	53462	-	53462	101.836	100.24	1.52	101.84	100.24	1.52
	2	51442	-	51442	97.988			97.99		
	3	52800	-	52800	100.575			100.57		
	4	52197	-	52197	99.426			99.43		
	5	52344	-	52344	99.706			99.71		
	6	53503	-	53503	101.914			101.91		
15min	1	53126	-	53126	101.196	99.97	1.85	101.20	99.97	1.84
	2	50796	-	50796	96.757			96.76		
	3	52424	-	52424	99.858			99.86		
	4	52437	-	52437	99.883			99.88		
	5	52442	-	52442	99.893			99.89		
	6	53666	-	53666	102.224			102.22		
30min	1	53525	-	53525	101.956	100.26	1.31	101.96	100.26	1.31
	2	51562	-	51562	98.217			98.22		
	3	52479	-	52479	99.963			99.96		
	4	52619	-	52619	100.230			100.23		
	5	52405	-	52405	99.822			99.82		
	6	53203	-	53203	101.342			101.34		



操作者: 谢鑫慧

日 期: 2025-01-07

复核者:

未审阅版本



普瑞巴林口崩片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	0	补液体积(ml)	0
对照品批号	101106-202003	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	200
标示量(mg)	75	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	16.52	51544	51845	51555	51574	51924	51688	0.36
2	16.51	51434	51544				51489	0.16
单位质量响应值			RSD%	判断				
3128.81			0.23	数据可信				

溶出曲线测定

普瑞巴林口崩片



操作者: 谢鑫慧

日期: 2025-01-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2024121321批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
2min	1	45640	-	45640	87.139	92.42	4.40	87.14	92.42	4.40
	2	45687	-	45687	87.228			87.23		
	3	49513	-	49513	94.533			94.53		
	4	49777	-	49777	95.037			95.04		
	5	50006	-	50006	95.474			95.47		
	6	49810	-	49810	95.100			95.10		
5min	1	52193	-	52193	99.650	100.80	1.75	99.65	100.80	1.75
	2	52895	-	52895	100.990			100.99		
	3	51696	-	51696	98.701			98.70		
	4	54340	-	54340	103.749			103.75		
	5	53191	-	53191	101.555			101.56		
	6	52442	-	52442	100.125			100.13		
10min	1	52284	-	52284	99.824	100.77	1.53	99.82	100.77	1.53
	2	52859	-	52859	100.921			100.92		
	3	51688	-	51688	98.686			98.69		
	4	53994	-	53994	103.088			103.09		
	5	53304	-	53304	101.771			101.77		
	6	52539	-	52539	100.311			100.31		
15min	1	51918	-	51918	99.125	101.00	1.77	99.12	101.00	1.77
	2	52959	-	52959	101.112			101.11		
	3	51694	-	51694	98.697			98.70		
	4	54033	-	54033	103.163			103.16		
	5	53673	-	53673	102.476			102.48		
	6	53131	-	53131	101.441			101.44		
30min	1	52834	-	52834	100.874	101.50	1.10	100.87	101.50	1.10
	2	53170	-	53170	101.515			101.52		
	3	52392	-	52392	100.030			100.03		
	4	54025	-	54025	103.148			103.15		
	5	53607	-	53607	102.350			102.35		
	6	52949	-	52949	101.093			101.09		



操作者: 谢鑫慧

日 期: 2025-01-07

复核者:

未审阅版本



普瑞巴林口崩片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	0	补液体积(ml)	0
对照品批号	101106-202003	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	200
标示量(mg)	75	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	16.52	52289	51784	52051	52230	52038	52078	0.38
2	16.51	51664	51538				51601	0.18
单位质量响应值			RSD%	判断				
3152.42			0.61	数据可信				

溶出曲线测定

普瑞巴林口崩片



操作者: 谢鑫慧

日期: 2025-01-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2024121321批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
2min	1	50534	-	50534	96.017	91.55	3.19	96.02	91.56	3.19
	2	45998	-	45998	87.398			87.40		
	3	47765	-	47765	90.756			90.76		
	4	47678	-	47678	90.590			90.59		
	5	47959	-	47959	91.124			91.12		
	6	49177	-	49177	93.439			93.44		
5min	1	52579	-	52579	99.902	99.79	1.30	99.90	99.80	1.30
	2	53379	-	53379	101.423			101.42		
	3	52076	-	52076	98.947			98.95		
	4	51813	-	51813	98.447			98.45		
	5	51992	-	51992	98.787			98.79		
	6	53291	-	53291	101.255			101.26		
10min	1	52609	-	52609	99.959	100.59	0.95	99.96	100.59	0.95
	2	53833	-	53833	102.285			102.29		
	3	52778	-	52778	100.281			100.28		
	4	52409	-	52409	99.579			99.58		
	5	52903	-	52903	100.518			100.52		
	6	53117	-	53117	100.925			100.92		
15min	1	51964	-	51964	98.734	99.39	1.49	98.73	99.39	1.49
	2	53617	-	53617	101.875			101.87		
	3	51854	-	51854	98.525			98.52		
	4	51832	-	51832	98.483			98.48		
	5	51689	-	51689	98.211			98.21		
	6	52903	-	52903	100.518			100.52		
30min	1	52527	-	52527	99.804	99.60	1.63	99.80	99.60	1.63
	2	53297	-	53297	101.267			101.27		
	3	51917	-	51917	98.645			98.64		
	4	50969	-	50969	96.843			96.84		
	5	52833	-	52833	100.385			100.39		
	6	52977	-	52977	100.659			100.66		



操作者: 谢鑫慧

日 期: 2025-01-07

复核者:

未审阅版本



普瑞巴林口崩片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	0	补液体积(ml)	0
对照品批号	101106-202003	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	200
标示量(mg)	75	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	16.52	51457	51276	51343	51278	51347	51340	0.15
2	16.51	51534	51595				51564	0.09
单位质量响应值			RSD%	判断				
3107.75			0.36	数据可信				

溶出曲线测定

普瑞巴林口崩片



操作者: 谢鑫慧

日期: 2025-01-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2024121421批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
2min	1	44319	-	44319	84.841	90.61	4.65	84.84	90.61	4.65
	2	44785	-	44785	85.733			85.73		
	3	48593	-	48593	93.023			93.02		
	4	48045	-	48045	91.974			91.97		
	5	48925	-	48925	93.658			93.66		
	6	49331	-	49331	94.436			94.44		
5min	1	51756	-	51756	99.078	100.29	1.28	99.08	100.29	1.28
	2	52236	-	52236	99.997			100.00		
	3	52944	-	52944	101.352			101.35		
	4	52887	-	52887	101.243			101.24		
	5	53034	-	53034	101.524			101.52		
	6	51481	-	51481	98.552			98.55		
10min	1	51938	-	51938	99.426	100.44	1.15	99.43	100.44	1.15
	2	52376	-	52376	100.265			100.26		
	3	52941	-	52941	101.346			101.35		
	4	52910	-	52910	101.287			101.29		
	5	53043	-	53043	101.542			101.54		
	6	51585	-	51585	98.751			98.75		
15min	1	52192	-	52192	99.913	100.77	1.13	99.91	100.77	1.13
	2	52163	-	52163	99.857			99.86		
	3	52955	-	52955	101.373			101.37		
	4	53266	-	53266	101.969			101.97		
	5	53288	-	53288	102.011			102.01		
	6	51988	-	51988	99.522			99.52		
30min	1	52091	-	52091	99.719	100.59	1.06	99.72	100.59	1.06
	2	52022	-	52022	99.587			99.59		
	3	52848	-	52848	101.168			101.17		
	4	53246	-	53246	101.930			101.93		
	5	53018	-	53018	101.494			101.49		
	6	52046	-	52046	99.633			99.63		



操作者: 谢鑫慧

日 期: 2025-01-07

复核者:

未审阅版本



普瑞巴林口崩片项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	0	补液体积(ml)	0
对照品批号	101106-202003	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	200
标示量(mg)	75	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	16.52	51889	52124	51878	51914	52092	51979	0.23
2	16.51	51542	51383				51462	0.22
单位质量响应值				RSD%	判断			
3146.43				0.67	数据可信			

溶出曲线测定

普瑞巴林口崩片



操作者: 谢鑫慧

日期: 2025-01-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2024121421批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
2min	1	47405	-	47405	90.279	87.84	11.04	90.28	87.84	11.04
	2	35838	-	35838	68.251			68.25		
	3	49088	-	49088	93.484			93.48		
	4	47608	-	47608	90.666			90.67		
	5	48996	-	48996	93.309			93.31		
	6	47818	-	47818	91.066			91.07		
5min	1	51054	-	51054	97.228	98.74	2.32	97.23	98.74	2.32
	2	52879	-	52879	100.704			100.70		
	3	51864	-	51864	98.771			98.77		
	4	50472	-	50472	96.120			96.12		
	5	53633	-	53633	102.140			102.14		
	6	51192	-	51192	97.491			97.49		
10min	1	52050	-	52050	99.125	99.11	1.81	99.13	99.11	1.81
	2	52558	-	52558	100.093			100.09		
	3	52086	-	52086	99.194			99.19		
	4	50554	-	50554	96.276			96.28		
	5	53373	-	53373	101.645			101.64		
	6	51642	-	51642	98.348			98.35		
15min	1	52306	-	52306	99.613	99.56	1.31	99.61	99.56	1.31
	2	52378	-	52378	99.750			99.75		
	3	52427	-	52427	99.843			99.84		
	4	51259	-	51259	97.619			97.62		
	5	53352	-	53352	101.605			101.60		
	6	51946	-	51946	98.927			98.93		
30min	1	52451	-	52451	99.889	99.29	2.57	99.89	99.29	2.57
	2	52850	-	52850	100.649			100.65		
	3	51499	-	51499	98.076			98.08		
	4	50088	-	50088	95.389			95.39		
	5	54051	-	54051	102.936			102.94		
	6	51881	-	51881	98.803			98.80		



操作者: 谢鑫慧

日 期: 2025-01-07

复核者:

未审阅版本




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-1-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 14:10:12
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:44:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-2-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 14:13:38
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:44:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	51818	100.000	11625	1545	1.188	--
总计		51818	100.000	11625			

图2 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-3-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 14:17:04
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:44:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	51726	100.000	11430	1500	1.205	--
总计		51726	100.000	11430			

图3 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-4-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 14:20:30
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:44:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	51554	100.000	11345	1488	1.204	--
总计		51554	100.000	11345			

图4 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-5-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 14:23:56
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:44:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	51050	100.000	11294	1511	1.208	--
总计		51050	100.000	11294			

图5 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-6-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 14:27:21
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:44:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.154	51216	100.000	11278	1487	1.205	--
总计		51216	100.000	11278			

图6 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-7-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 14:30:45
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:44:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	49485	100.000	12764	2158	1.179	--
总计		49485	100.000	12764			

图7 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-8-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 14:34:10
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:44:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	47372	100.000	12174	2151	1.181	--
总计		47372	100.000	12174			

图8 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-9-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 14:37:34
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:44:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	49314	100.000	12707	2143	1.177	--
总计		49314	100.000	12707			

图9 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-10-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 14:40:59
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:44:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	47353	100.000	12338	2174	1.168	--
总计		47353	100.000	12338			

图10 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-11-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 14:44:24
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:44:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	47162	100.000	12189	2152	1.172	--
总计		47162	100.000	12189			

图11 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-12-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 14:47:49
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:44:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	48163	100.000	12370	2150	1.173	--
总计		48163	100.000	12370			

图12 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-13-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 14:51:13
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:44:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	54073	100.000	13881	2153	1.165	--
总计		54073	100.000	13881			

图13 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-14-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 14:54:38
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:44:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	54548	100.000	14085	2160	1.168	--
总计		54548	100.000	14085			

图14 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-15-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 14:58:02
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:44:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	54846	100.000	14087	2164	1.172	--
总计		54846	100.000	14087			

图15 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-16-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 15:01:27
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:44:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	54364	100.000	14054	2172	1.173	--
总计		54364	100.000	14054			

图16 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-17-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 15:04:52
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:45:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	53613	100.000	13908	2191	1.173	--
总计		53613	100.000	13908			

图17 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-18-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 15:08:16
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:45:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	54429	100.000	14040	2162	1.169	--
总计		54429	100.000	14040			

图18 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-19-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 15:11:41
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:45:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	53792	100.000	13896	2158	1.172	--
总计		53792	100.000	13896			

图19 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-20-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 15:15:05
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:45:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	54449	100.000	14067	2159	1.172	--
总计		54449	100.000	14067			

图20 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-21-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 15:18:30
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:45:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	54748	100.000	14163	2163	1.174	--
总计		54748	100.000	14163			

图21 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-22-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 15:21:55
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:45:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	54764	100.000	14173	2159	1.169	--
总计		54764	100.000	14173			

图22 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-23-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 15:25:20
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:45:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	53632	100.000	13975	2184	1.171	--
总计		53632	100.000	13975			

图23 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-24-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 15:28:45
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:45:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	54331	100.000	14074	2161	1.170	--
总计		54331	100.000	14074			

图24 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-25-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 15:32:10
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:45:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	53344	100.000	13850	2181	1.168	--
总计		53344	100.000	13850			

图25 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-26-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 15:35:34
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:45:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	54570	100.000	14106	2171	1.171	--
总计		54570	100.000	14106			

图26 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-27-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 15:38:58
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:45:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	54452	100.000	14197	2187	1.163	--
总计		54452	100.000	14197			

图27 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-28-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 15:42:22
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:45:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	54534	100.000	14131	2174	1.170	--
总计		54534	100.000	14131			

图28 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-29-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 15:45:47
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:45:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	54335	100.000	14017	2168	1.170	--
总计		54335	100.000	14017			

图29 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-30-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 15:49:12
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:45:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	54135	100.000	14037	2181	1.167	--
总计		54135	100.000	14037			

图30 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-31-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 15:52:38
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:45:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	53687	100.000	13831	2167	1.171	--
总计		53687	100.000	13831			

图31 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-32-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 15:56:03
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:45:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	54576	100.000	14104	2174	1.166	--
总计		54576	100.000	14104			

图32 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-33-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 15:59:28
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:45:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	54606	100.000	14195	2174	1.165	--
总计		54606	100.000	14195			

图33 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-34-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 16:02:52
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:45:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	54467	100.000	14027	2174	1.170	--
总计		54467	100.000	14027			

图34 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-35-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 16:06:16
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:45:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	54451	100.000	14017	2166	1.169	--
总计		54451	100.000	14017			

图35 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-36-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 16:09:40
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:45:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	54696	100.000	14095	2169	1.169	--
总计		54696	100.000	14095			

图36 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-37-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 16:13:05
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:45:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.153	51672	100.000	11688	1563	1.179	--
总计		51672	100.000	11688			

图37 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-38-2 - zzp-2024121221p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 16:16:30
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:45:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	51858	100.000	11479	1512	1.200	--
总计		51858	100.000	11479			

图38 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-39-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 16:19:57
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:46:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图39 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-40-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 16:23:24
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:46:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	51531	100.000	11548	1553	1.192	--
总计		51531	100.000	11548			

图40 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-41-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 16:26:51
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:46:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	51508	100.000	11559	1552	1.189	--
总计		51508	100.000	11559			

图41 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-42-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 16:30:18
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:46:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	51411	100.000	11529	1548	1.190	--
总计		51411	100.000	11529			

图42 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-43-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 16:33:44
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:46:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	52023	100.000	11545	1524	1.193	--
总计		52023	100.000	11545			

图43 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-44-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 16:37:11
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:46:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	51834	100.000	11556	1531	1.196	--
总计		51834	100.000	11556			

图44 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-45-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 16:40:36
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:46:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	48238	100.000	12500	2172	1.181	--
总计		48238	100.000	12500			

图45 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-46-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 16:44:01
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:46:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	48200	100.000	12545	2161	1.163	--
总计		48200	100.000	12545			

图46 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-47-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 16:47:26
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:46:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	49597	100.000	12812	2171	1.176	--
总计		49597	100.000	12812			

图47 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-48-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 16:50:52
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:46:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	49473	100.000	12847	2175	1.167	--
总计		49473	100.000	12847			

图48 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-49-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 16:54:18
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:46:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	49192	100.000	12749	2170	1.175	--
总计		49192	100.000	12749			

图49 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-50-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 16:57:43
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:46:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	50269	100.000	13065	2183	1.175	--
总计		50269	100.000	13065			

图50 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-51-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 17:01:09
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:46:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	53119	100.000	13803	2183	1.167	--
总计		53119	100.000	13803			

图51 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-52-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 17:04:35
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:46:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	50995	100.000	13304	2181	1.166	--
总计		50995	100.000	13304			

图52 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-53-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 17:08:01
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:46:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	52290	100.000	13568	2188	1.169	--
总计		52290	100.000	13568			

图53 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-54-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 17:11:27
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:46:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	52614	100.000	13716	2183	1.164	--
总计		52614	100.000	13716			

图54 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-55-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 17:14:52
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:46:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	52480	100.000	13492	2181	1.174	--
总计		52480	100.000	13492			

图55 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-56-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 17:18:18
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:46:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	53567	100.000	13837	2181	1.166	--
总计		53567	100.000	13837			

图56 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-57-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 17:21:44
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:46:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	53462	100.000	13925	2184	1.159	--
总计		53462	100.000	13925			

图57 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-58-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 17:25:10
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:46:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	51442	100.000	13302	2174	1.166	--
总计		51442	100.000	13302			

图58 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-59-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 17:28:36
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:46:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	52800	100.000	13715	2180	1.163	--
总计		52800	100.000	13715			

图59 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-60-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 17:32:02
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:46:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.183	52197	100.000	13561	2225	1.126	--
总计		52197	100.000	13561			

图60 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-61-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 17:35:27
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:46:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	52344	100.000	13465	2178	1.128	--
总计		52344	100.000	13465			

图61 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-62-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 17:38:53
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:47:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.184	53503	100.000	13750	2209	1.133	--
总计		53503	100.000	13750			

图62 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-63-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 17:42:19
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:47:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	53126	100.000	13823	2202	1.127	--
总计		53126	100.000	13823			

图63 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-64-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 17:45:45
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:47:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	50796	100.000	13324	2206	1.129	--
总计		50796	100.000	13324			

图64 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-65-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 17:49:11
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:47:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	52424	100.000	13644	2204	1.126	--
总计		52424	100.000	13644			

图65 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-66-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 17:52:37
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:47:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	52437	100.000	13629	2201	1.134	--
总计		52437	100.000	13629			

图66 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-67-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 17:56:03
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:47:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	52442	100.000	13729	2200	1.129	--
总计		52442	100.000	13729			

图67 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-68-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 17:59:29
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:47:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	53666	100.000	13802	2177	1.134	--
总计		53666	100.000	13802			

图68 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-69-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 18:02:55
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:47:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	53525	100.000	13926	2196	1.132	--
总计		53525	100.000	13926			

图69 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-70-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 18:06:21
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:47:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	51562	100.000	13431	2188	1.134	--
总计		51562	100.000	13431			

图70 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-71-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 18:09:47
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:47:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	52479	100.000	13772	2226	1.131	--
总计		52479	100.000	13772			

图71 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-72-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 18:13:14
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:47:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	52619	100.000	13733	2218	1.137	--
总计		52619	100.000	13733			

图72 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-73-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 18:16:40
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:47:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	52405	100.000	13584	2197	1.135	--
总计		52405	100.000	13584			

图73 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-74-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 18:20:06
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:47:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	53203	100.000	13973	2192	1.132	--
总计		53203	100.000	13973			

图74 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-75-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 18:23:33
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:47:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	51751	100.000	11711	1551	1.156	--
总计		51751	100.000	11711			

图75 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-76-2 - zzp-2024121221p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 18:27:00
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:47:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.152	51761	100.000	11534	1538	1.166	--
总计		51761	100.000	11534			

图76 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121221批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-77-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 18:30:25
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:47:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图77 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-78-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 18:33:50
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:47:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.145	51544	100.000	11546	1524	1.169	--
总计		51544	100.000	11546			

图78 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-79-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 18:37:15
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:47:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	51845	100.000	11484	1528	1.171	--
总计		51845	100.000	11484			

图79 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-80-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 18:40:40
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:47:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.149	51555	100.000	11532	1538	1.177	--
总计		51555	100.000	11532			

图80 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-81-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 18:44:05
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:47:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.149	51574	100.000	11542	1538	1.172	--
总计		51574	100.000	11542			

图81 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-82-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 18:47:30
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:47:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.151	51924	100.000	11510	1527	1.175	--
总计		51924	100.000	11510			

图82 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-83-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 18:50:54
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:47:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	45640	100.000	11999	2216	1.136	--
总计		45640	100.000	11999			

图83 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-84-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 18:54:18
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:47:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	45687	100.000	11980	2200	1.131	--
总计		45687	100.000	11980			

图84 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-85-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 18:57:43
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.180	49513	100.000	12993	2205	1.129	--
总计		49513	100.000	12993			

图85 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-86-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 19:01:08
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	49777	100.000	13113	2223	1.135	--
总计		49777	100.000	13113			

图86 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-87-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 19:04:32
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	50006	100.000	13077	2210	1.131	--
总计		50006	100.000	13077			

图87 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-88-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 19:07:57
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.182	49810	100.000	13049	2213	1.139	--
总计		49810	100.000	13049			

图88 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-89-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 19:11:22
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	52193	100.000	13542	2195	1.137	--
总计		52193	100.000	13542			

图89 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-90-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 19:14:47
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	52895	100.000	13831	2182	1.134	--
总计		52895	100.000	13831			

图90 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-91-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 19:18:11
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	51696	100.000	13568	2189	1.138	--
总计		51696	100.000	13568			

图91 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-92-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 19:21:35
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	54340	100.000	14086	2183	1.136	--
总计		54340	100.000	14086			

图92 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-93-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 19:25:00
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	53191	100.000	13816	2190	1.143	--
总计		53191	100.000	13816			

图93 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-94-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 19:28:24
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	52442	100.000	13764	2183	1.133	--
总计		52442	100.000	13764			

图94 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-95-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 19:31:49
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	52284	100.000	13694	2207	1.137	--
总计		52284	100.000	13694			

图95 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-96-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 19:35:13
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	52859	100.000	13781	2206	1.137	--
总计		52859	100.000	13781			

图96 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-97-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 19:38:38
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	51688	100.000	13556	2192	1.135	--
总计		51688	100.000	13556			

图97 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-98-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 19:42:03
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	53994	100.000	14168	2193	1.138	--
总计		53994	100.000	14168			

图98 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-99-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 19:45:27
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	53304	100.000	13946	2187	1.143	--
总计		53304	100.000	13946			

图99 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-100-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 19:48:51
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	52539	100.000	13807	2189	1.136	--
总计		52539	100.000	13807			

图100 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-101-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 19:52:15
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.170	51918	100.000	13621	2182	1.137	--
总计		51918	100.000	13621			

图101 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-102-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 19:55:39
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	52959	100.000	13728	2183	1.144	--
总计		52959	100.000	13728			

图102 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-103-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 19:59:03
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	51694	100.000	13599	2191	1.136	--
总计		51694	100.000	13599			

图103 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-104-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 20:02:27
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	54033	100.000	14139	2191	1.141	--
总计		54033	100.000	14139			

图104 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-105-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 20:05:52
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	53673	100.000	13928	2175	1.144	--
总计		53673	100.000	13928			

图105 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-106-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 20:09:17
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	53131	100.000	13864	2193	1.134	--
总计		53131	100.000	13864			

图106 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-107-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 20:12:41
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	52834	100.000	13739	2190	1.143	--
总计		52834	100.000	13739			

图107 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-108-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 20:16:05
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:48:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	53170	100.000	13718	2177	1.142	--
总计		53170	100.000	13718			

图108 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-109-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 20:19:29
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:49:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	52392	100.000	13657	2199	1.139	--
总计		52392	100.000	13657			

图109 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-110-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 20:22:53
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:49:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	54025	100.000	13995	2201	1.142	--
总计		54025	100.000	13995			

图110 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-111-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 20:26:17
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:49:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	53607	100.000	13871	2180	1.145	--
总计		53607	100.000	13871			

图111 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-112-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 20:29:40
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:49:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	52949	100.000	13793	2185	1.145	--
总计		52949	100.000	13793			

图112 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-113-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 20:33:05
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:49:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.146	51434	100.000	11694	1558	1.159	--
总计		51434	100.000	11694			

图113 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-114-2 - zzp-2024121321p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 20:36:30
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:49:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.149	51544	100.000	11617	1553	1.169	--
总计		51544	100.000	11617			

图114 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-115-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 20:39:57
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:49:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图115 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-116-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 20:43:23
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:49:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.147	52289	100.000	11845	1550	1.165	--
总计		52289	100.000	11845			

图116 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-117-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 20:46:49
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:49:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.150	51784	100.000	11668	1569	1.171	--
总计		51784	100.000	11668			

图117 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-118-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 20:50:14
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:49:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.146	52051	100.000	11805	1550	1.167	--
总计		52051	100.000	11805			

图118 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-119-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 20:53:40
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:49:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.148	52230	100.000	11841	1553	1.167	--
总计		52230	100.000	11841			

图119 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-120-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 20:57:06
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:49:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.146	52038	100.000	11817	1556	1.162	--
总计		52038	100.000	11817			

图120 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-121-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 21:00:31
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:49:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	50534	100.000	13152	2194	1.144	--
总计		50534	100.000	13152			

图121 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-122-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 21:03:56
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:49:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	45998	100.000	12039	2206	1.147	--
总计		45998	100.000	12039			

图122 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-123-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 21:07:20
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:49:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	47765	100.000	12603	2203	1.145	--
总计		47765	100.000	12603			

图123 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-124-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 21:10:45
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:49:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	47678	100.000	12531	2220	1.147	--
总计		47678	100.000	12531			

图124 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-125-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 21:14:09
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:49:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	47959	100.000	12604	2212	1.147	--
总计		47959	100.000	12604			

图125 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-126-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 21:17:33
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:49:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	49177	100.000	12941	2192	1.143	--
总计		49177	100.000	12941			

图126 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-127-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 21:20:59
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:49:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	52579	100.000	13697	2196	1.140	--
总计		52579	100.000	13697			

图127 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-128-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 21:24:24
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:49:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	53379	100.000	14004	2185	1.139	--
总计		53379	100.000	14004			

图128 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-129-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 21:27:49
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:49:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	52076	100.000	13615	2185	1.142	--
总计		52076	100.000	13615			

图129 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-130-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 21:31:14
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:49:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	51813	100.000	13427	2199	1.149	--
总计		51813	100.000	13427			

图130 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-131-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 21:34:39
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:49:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	51992	100.000	13679	2196	1.142	--
总计		51992	100.000	13679			

图131 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-132-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 21:38:03
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:50:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	53291	100.000	13889	2181	1.140	--
总计		53291	100.000	13889			

图132 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-133-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 21:41:28
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:50:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	52609	100.000	13672	2194	1.145	--
总计		52609	100.000	13672			

图133 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-134-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 21:44:54
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:50:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	53833	100.000	13992	2191	1.141	--
总计		53833	100.000	13992			

图134 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-135-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 21:48:19
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:50:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	52778	100.000	13570	2172	1.147	--
总计		52778	100.000	13570			

图135 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-136-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 21:51:44
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:50:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.181	52409	100.000	13720	2212	1.149	--
总计		52409	100.000	13720			

图136 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-137-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 21:55:09
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:50:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	52903	100.000	13629	2180	1.145	--
总计		52903	100.000	13629			

图137 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-138-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 21:58:33
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:50:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	53117	100.000	13901	2185	1.149	--
总计		53117	100.000	13901			

图138 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-231-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 08:33:12
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:50:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	51964	100.000	13422	2153	1.164	--
总计		51964	100.000	13422			

图139 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-140-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 22:05:24
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:50:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	53617	100.000	13804	2174	1.151	--
总计		53617	100.000	13804			

图140 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-141-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 22:08:49
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:50:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	51854	100.000	13618	2179	1.146	--
总计		51854	100.000	13618			

图141 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-142-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 22:12:15
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:50:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	51832	100.000	13585	2176	1.145	--
总计		51832	100.000	13585			

图142 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-143-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 22:15:40
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:50:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	51689	100.000	13499	2177	1.153	--
总计		51689	100.000	13499			

图143 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-144-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 22:19:05
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:50:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	52903	100.000	13850	2183	1.138	--
总计		52903	100.000	13850			

图144 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-145-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 22:22:30
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:50:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	52527	100.000	13605	2185	1.146	--
总计		52527	100.000	13605			

图145 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-146-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 22:25:55
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:50:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.179	53297	100.000	13902	2187	1.144	--
总计		53297	100.000	13902			

图146 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-147-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 22:29:21
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:50:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	51917	100.000	13463	2183	1.144	--
总计		51917	100.000	13463			

图147 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-148-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 22:32:47
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:50:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	50969	100.000	13355	2183	1.151	--
总计		50969	100.000	13355			

图148 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-149-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 22:36:12
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:50:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	52833	100.000	13584	2178	1.149	--
总计		52833	100.000	13584			

图149 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-150-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 22:39:38
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:50:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	52977	100.000	13897	2181	1.142	--
总计		52977	100.000	13897			

图150 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-151-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 22:43:04
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:50:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.142	51664	100.000	11678	1552	1.168	--
总计		51664	100.000	11678			

图151 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-152-2 - zzp-2024121321p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 22:46:30
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:50:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.145	51538	100.000	11604	1534	1.177	--
总计		51538	100.000	11604			

图152 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121321批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-153-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 22:49:56
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:50:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图153 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-154-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 22:53:22
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:51:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.143	51457	100.000	11618	1555	1.165	--
总计		51457	100.000	11618			

图154 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-155-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 22:56:48
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:51:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.141	51276	100.000	11581	1540	1.171	--
总计		51276	100.000	11581			

图155 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-156-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 23:00:13
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:51:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.141	51343	100.000	11572	1532	1.173	--
总计		51343	100.000	11572			

图156 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-157-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 23:03:38
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:51:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.141	51278	100.000	11512	1521	1.181	--
总计		51278	100.000	11512			

图157 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-158-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 23:07:04
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:51:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.141	51347	100.000	11433	1504	1.181	--
总计		51347	100.000	11433			

图158 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-159-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 23:10:29
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:51:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	44319	100.000	11575	2203	1.153	--
总计		44319	100.000	11575			

图159 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-160-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 23:13:54
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:51:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	44785	100.000	11848	2209	1.150	--
总计		44785	100.000	11848			

图160 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-161-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 23:17:19
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:51:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	48593	100.000	12814	2226	1.143	--
总计		48593	100.000	12814			

图161 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-162-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 23:20:43
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:51:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	48045	100.000	12651	2199	1.148	--
总计		48045	100.000	12651			

图162 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-163-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 23:24:07
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:51:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	48925	100.000	12894	2189	1.146	--
总计		48925	100.000	12894			

图163 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-164-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 23:27:32
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:51:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	49331	100.000	12871	2164	1.147	--
总计		49331	100.000	12871			

图164 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-165-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 23:30:56
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:51:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	51756	100.000	13395	2193	1.149	--
总计		51756	100.000	13395			

图165 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-166-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 23:34:21
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:51:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	52236	100.000	13633	2197	1.146	--
总计		52236	100.000	13633			

图166 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-167-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 23:37:45
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:51:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	52944	100.000	13857	2184	1.140	--
总计		52944	100.000	13857			

图167 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-168-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 23:41:10
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:51:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	52887	100.000	13842	2184	1.145	--
总计		52887	100.000	13842			

图168 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-169-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 23:44:35
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:51:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	53034	100.000	13773	2201	1.149	--
总计		53034	100.000	13773			

图169 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-170-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 23:47:58
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:51:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	51481	100.000	13394	2202	1.148	--
总计		51481	100.000	13394			

图170 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-171-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 23:51:23
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:51:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.177	51938	100.000	13524	2204	1.143	--
总计		51938	100.000	13524			

图171 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-172-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 23:54:48
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:51:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	52376	100.000	13707	2181	1.146	--
总计		52376	100.000	13707			

图172 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-173-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/06 23:58:13
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:51:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	52941	100.000	13732	2195	1.149	--
总计		52941	100.000	13732			

图173 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-174-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 00:01:38
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:51:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	52910	100.000	13850	2186	1.150	--
总计		52910	100.000	13850			

图174 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-175-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 00:05:03
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:51:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	53043	100.000	13909	2195	1.148	--
总计		53043	100.000	13909			

图175 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-176-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 00:08:27
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:51:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	51585	100.000	13503	2187	1.150	--
总计		51585	100.000	13503			

图176 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-177-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 00:11:51
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:52:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	52192	100.000	13691	2178	1.140	--
总计		52192	100.000	13691			

图177 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-178-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 00:15:16
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:52:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	52163	100.000	13523	2203	1.149	--
总计		52163	100.000	13523			

图178 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-179-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 00:18:41
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:52:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	52955	100.000	13832	2188	1.149	--
总计		52955	100.000	13832			

图179 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-180-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 00:22:06
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:52:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	53266	100.000	13801	2186	1.151	--
总计		53266	100.000	13801			

图180 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-181-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 00:25:31
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:52:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	53288	100.000	13898	2179	1.146	--
总计		53288	100.000	13898			

图181 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-182-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 00:28:55
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:52:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	51988	100.000	13630	2183	1.147	--
总计		51988	100.000	13630			

图182 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-183-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 00:32:20
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:52:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	52091	100.000	13638	2187	1.145	--
总计		52091	100.000	13638			

图183 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-184-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 00:35:45
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:52:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	52022	100.000	13673	2191	1.143	--
总计		52022	100.000	13673			

图184 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-185-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 00:39:10
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:52:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	52848	100.000	13811	2204	1.143	--
总计		52848	100.000	13811			

图185 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-186-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 00:42:35
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:52:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	53246	100.000	13910	2173	1.145	--
总计		53246	100.000	13910			

图186 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-187-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 00:45:59
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:52:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	53018	100.000	13929	2188	1.146	--
总计		53018	100.000	13929			

图187 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-188-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 00:49:24
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:52:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	52046	100.000	13630	2187	1.147	--
总计		52046	100.000	13630			

图188 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-189-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 00:52:49
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:52:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.141	51534	100.000	11678	1544	1.168	--
总计		51534	100.000	11678			

图189 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-190-2 - zzp-2024121421p-rcqx-1-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 00:56:15
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:52:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.143	51595	100.000	11365	1489	1.186	--
总计		51595	100.000	11365			

图190 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-191-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 00:59:41
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:52:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图191 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-192-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 01:03:08
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:52:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.142	51889	100.000	11509	1501	1.189	--
总计		51889	100.000	11509			

图192 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-193-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 01:06:35
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:52:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.143	52124	100.000	11523	1498	1.189	--
总计		52124	100.000	11523			

图193 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-194-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 01:10:02
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:52:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.143	51878	100.000	11491	1503	1.186	--
总计		51878	100.000	11491			

图194 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-195-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 01:13:29
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:52:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.143	51914	100.000	11487	1504	1.188	--
总计		51914	100.000	11487			

图195 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-196-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 01:16:56
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:52:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.142	52092	100.000	11528	1501	1.186	--
总计		52092	100.000	11528			

图196 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-197-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 01:20:22
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:52:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	47405	100.000	12457	2191	1.156	--
总计		47405	100.000	12457			

图197 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-198-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 01:23:48
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:52:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.178	35838	100.000	9421	2200	1.149	--
总计		35838	100.000	9421			

图198 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-2min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-199-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 01:27:14
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:52:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	49088	100.000	12802	2164	1.077	--
总计		49088	100.000	12802			

图199 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-200-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 01:30:39
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	47608	100.000	12507	2182	1.150	--
总计		47608	100.000	12507			

图200 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-201-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 01:34:04
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	48996	100.000	12921	2192	1.151	--
总计		48996	100.000	12921			

图201 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-202-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-2min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 01:37:30
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	47818	100.000	12717	2207	1.144	--
总计		47818	100.000	12717			

图202 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-2min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-203-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 01:40:56
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	51054	100.000	13466	2194	1.146	--
总计		51054	100.000	13466			

图203 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-204-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 01:44:23
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	52879	100.000	13712	2179	1.155	--
总计		52879	100.000	13712			

图204 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-205-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 01:47:49
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	51864	100.000	13553	2188	1.154	--
总计		51864	100.000	13553			

图205 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-206-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 01:51:15
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	50472	100.000	13246	2205	1.146	--
总计		50472	100.000	13246			

图206 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-207-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 01:54:41
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	53633	100.000	14056	2192	1.153	--
总计		53633	100.000	14056			

图207 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-208-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 01:58:06
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	51192	100.000	13310	2199	1.151	--
总计		51192	100.000	13310			

图208 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-209-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 02:01:33
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.176	52050	100.000	13490	2201	1.152	--
总计		52050	100.000	13490			

图209 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-210-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 02:04:59
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	52558	100.000	13792	2184	1.155	--
总计		52558	100.000	13792			

图210 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-211-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 02:08:25
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	52086	100.000	13740	2194	1.143	--
总计		52086	100.000	13740			

图211 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-212-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 02:11:51
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	50554	100.000	13315	2189	1.148	--
总计		50554	100.000	13315			

图212 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-213-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 02:15:17
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	53373	100.000	14072	2196	1.144	--
总计		53373	100.000	14072			

图213 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-214-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 02:18:42
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	51642	100.000	13593	2203	1.146	--
总计		51642	100.000	13593			

图214 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-215-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 02:22:09
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	52306	100.000	13730	2191	1.150	--
总计		52306	100.000	13730			

图215 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-216-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 02:25:35
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	52378	100.000	13698	2182	1.156	--
总计		52378	100.000	13698			

图216 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-217-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 02:29:01
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	52427	100.000	13721	2190	1.147	--
总计		52427	100.000	13721			

图217 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-218-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 02:32:28
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.173	51259	100.000	13448	2185	1.151	--
总计		51259	100.000	13448			

图218 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-219-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 02:35:54
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	53352	100.000	14036	2189	1.146	--
总计		53352	100.000	14036			

图219 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-220-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 02:39:20
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.171	51946	100.000	13694	2194	1.144	--
总计		51946	100.000	13694			

图220 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-221-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 02:42:46
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.174	52451	100.000	13696	2187	1.149	--
总计		52451	100.000	13696			

图221 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-222-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 02:46:13
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.175	52850	100.000	13719	2183	1.152	--
总计		52850	100.000	13719			

图222 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-223-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 02:49:39
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:53:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	51499	100.000	13578	2192	1.147	--
总计		51499	100.000	13578			

图223 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-224-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 02:53:06
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:54:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	50088	100.000	13216	2192	1.150	--
总计		50088	100.000	13216			

图224 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-225-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 02:56:33
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:54:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	54051	100.000	14164	2173	1.142	--
总计		54051	100.000	14164			

图225 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-226-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 02:59:58
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:54:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.172	51881	100.000	13641	2185	1.148	--
总计		51881	100.000	13641			

图226 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-227-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 03:03:25
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:54:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.140	51542	100.000	11749	1556	1.168	--
总计		51542	100.000	11749			

图227 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




JSS-3362

<样品信息>

色谱柱:AQ-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$JSS-3362 - 28-8/31-228-2 - zzp-2024121421p-rcqx-2-75mg-jf50z-pH1.2jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC\$JSS-3362 - JSS-3362-20250106-FX280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/01/07 03:06:52
处理时间 (V2) : 2025/01/07 08:54:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

流速:2.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.142	51383	100.000	11403	1511	1.193	--
总计		51383	100.000	11403			

图228 普瑞巴林口崩片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121421批(75mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2