



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-191-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 13:33:53

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:49:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
溶剂



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-192-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 13:37:17

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:49:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	967982	100.000	142784	2675	1.083	--
总计		967982	100.000	142784			

图2 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-193-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 13:40:40

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:49:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	967988	100.000	142825	2674	1.083	--
总计		967988	100.000	142825			

图3 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-2



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-194-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 13:44:03

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:49:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	968943	100.000	142977	2674	1.083	--
总计		968943	100.000	142977			

图4 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-3



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-195-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 13:47:26

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:49:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	966281	100.000	142391	2670	1.083	--
总计		966281	100.000	142391			

图5 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-4



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-196-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 13:50:50

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:49:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	968692	100.000	142775	2669	1.084	--
总计		968692	100.000	142775			

图6 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-5



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-197-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 13:54:13

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:49:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.319	741188	100.000	120186	3309	1.062	--
总计		741188	100.000	120186			

图7 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-198-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 13:57:36

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:49:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	816522	100.000	132500	3307	1.064	--
总计		816522	100.000	132500			

图8 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-199-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 14:00:59

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:49:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	760287	100.000	123864	3308	1.062	--
总计		760287	100.000	123864			

图9 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-200-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 14:04:22

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:49:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	814057	100.000	132632	3311	1.061	--
总计		814057	100.000	132632			

图10 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-201-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 14:07:45

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:49:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	777455	100.000	126157	3306	1.063	--
总计		777455	100.000	126157			

图11 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-202-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 14:11:08

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:49:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	829475	100.000	135571	3308	1.064	--
总计		829475	100.000	135571			

图12 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-203-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 14:14:30

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:49:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	812243	100.000	132960	3312	1.064	--
总计		812243	100.000	132960			

图13 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-204-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 14:17:53

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:49:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	877801	100.000	143171	3305	1.064	--
总计		877801	100.000	143171			

图14 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-205-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 14:21:16

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:49:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	825848	100.000	134467	3298	1.064	--
总计		825848	100.000	134467			

图15 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-206-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 14:24:40

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:49:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	879573	100.000	143386	3303	1.065	--
总计		879573	100.000	143386			

图16 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-207-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 14:28:03

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:50:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	839485	100.000	136909	3301	1.064	--
总计		839485	100.000	136909			

图17 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-208-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 14:31:26

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:50:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	889993	100.000	145191	3304	1.065	--
总计		889993	100.000	145191			

图18 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-209-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 14:34:49

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:50:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	832597	100.000	135950	3307	1.064	--
总计		832597	100.000	135950			

图19 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-210-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 14:38:12

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:50:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	888751	100.000	145270	3309	1.065	--
总计		888751	100.000	145270			

图20 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-211-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 14:41:34

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:50:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.300	844436	100.000	137960	3313	1.065	--
总计		844436	100.000	137960			

图21 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-212-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 14:44:57

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:50:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	891405	100.000	145546	3308	1.065	--
总计		891405	100.000	145546			

图22 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-213-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 14:48:20

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:50:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	855363	100.000	139722	3308	1.065	--
总计		855363	100.000	139722			

图23 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-214-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 14:51:42

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:50:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	895554	100.000	145951	3305	1.065	--
总计		895554	100.000	145951			

图24 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-215-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 14:55:05

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:50:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	837019	100.000	136516	3310	1.065	--
总计		837019	100.000	136516			

图25 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-216-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-13

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 14:58:29

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:50:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.300	888811	100.000	145029	3302	1.065	--
总计		888811	100.000	145029			

图26 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-217-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-22

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 15:01:50

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:50:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	856986	100.000	140062	3311	1.065	--
总计		856986	100.000	140062			

图27 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-218-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-31

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 15:05:12

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:50:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	891876	100.000	145780	3314	1.066	--
总计		891876	100.000	145780			

图28 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-219-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-40

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 15:08:35

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:50:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	856916	100.000	139845	3305	1.066	--
总计		856916	100.000	139845			

图29 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-220-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-49

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 15:11:58

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:50:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	894200	100.000	146250	3316	1.065	--
总计		894200	100.000	146250			

图30 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-221-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名 : RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 15:15:20

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:50:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	843444	100.000	137649	3312	1.065	--
总计		843444	100.000	137649			

图31 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-222-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-14

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 15:18:44

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:50:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	889796	100.000	145198	3310	1.066	--
总计		889796	100.000	145198			

图32 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-223-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 15:22:05

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:50:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.300	864332	100.000	141187	3299	1.066	--
总计		864332	100.000	141187			

图33 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-224-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 15:25:27

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:50:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	893410	100.000	145866	3309	1.065	--
总计		893410	100.000	145866			

图34 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-225-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 15:28:50

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:50:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.300	858586	100.000	140320	3307	1.065	--
总计		858586	100.000	140320			

图35 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-226-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-50

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 15:32:13

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:51:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	892813	100.000	145621	3308	1.066	--
总计		892813	100.000	145621			

图36 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-227-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-6

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 15:35:36

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:51:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	845163	100.000	138129	3311	1.065	--
总计		845163	100.000	138129			

图37 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-228-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 15:38:58

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:51:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	885161	100.000	144411	3306	1.065	--
总计		885161	100.000	144411			

图38 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-229-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-24

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 15:42:21

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:51:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	868291	100.000	141956	3310	1.066	--
总计		868291	100.000	141956			

图39 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-230-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-33

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 15:45:44

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:51:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	894103	100.000	145775	3303	1.066	--
总计		894103	100.000	145775			

图40 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-231-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-42

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 15:49:07

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:51:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	863577	100.000	140849	3310	1.066	--
总计		863577	100.000	140849			

图41 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-232-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 15:52:29

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:51:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	891385	100.000	145194	3302	1.066	--
总计		891385	100.000	145194			

图42 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-233-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 15:55:51

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:51:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	845461	100.000	137967	3308	1.065	--
总计		845461	100.000	137967			

图43 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-234-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 15:59:14

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:51:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	885474	100.000	144587	3308	1.066	--
总计		885474	100.000	144587			

图44 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-235-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-25

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 16:02:37

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:51:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	865131	100.000	141502	3318	1.066	--
总计		865131	100.000	141502			

图45 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-236-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-34

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 16:06:00

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:51:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	891822	100.000	145538	3312	1.066	--
总计		891822	100.000	145538			

图46 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-237-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 16:09:24

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:51:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.299	858641	100.000	140522	3300	1.066	--
总计		858641	100.000	140522			

图47 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-238-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 16:12:46

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:51:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	888454	100.000	144968	3311	1.066	--
总计		888454	100.000	144968			

图48 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-239-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-8

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 16:16:11

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:51:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	917911	100.000	149623	3306	1.066	--
总计		917911	100.000	149623			

图49 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-240-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-17

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 16:19:36

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:51:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	942312	100.000	154073	3308	1.066	--
总计		942312	100.000	154073			

图50 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-241-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-26

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 16:22:59

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:51:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	950186	100.000	155144	3307	1.066	--
总计		950186	100.000	155144			

图51 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-242-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-35

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 16:26:24

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:51:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	945236	100.000	154475	3309	1.066	--
总计		945236	100.000	154475			

图52 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-243-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-44

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 16:29:49

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:51:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	922513	100.000	150462	3305	1.067	--
总计		922513	100.000	150462			

图53 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-244-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-53

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 16:33:13

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:51:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.300	926566	100.000	151274	3304	1.067	--
总计		926566	100.000	151274			

图54 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-245-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 16:36:37

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:51:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	968846	100.000	143987	2667	1.085	--
总计		968846	100.000	143987			

图55 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-2-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-246-2 - zzp-24122301p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 16:40:00

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:52:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	967461	100.000	143876	2668	1.085	--
总计		967461	100.000	143876			

图56 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122301批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-2-2



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-247-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 16:43:25

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:52:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
溶剂



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-248-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 16:46:50

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:52:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	969204	100.000	143763	2673	1.085	--
总计		969204	100.000	143763			

图58 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-249-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 16:50:14

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:52:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.286	967512	100.000	143420	2671	1.083	--
总计		967512	100.000	143420			

图59 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-2



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-250-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 16:53:39

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:52:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.289	970358	100.000	144107	2679	1.083	--
总计		970358	100.000	144107			

图60 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-3



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-251-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 16:57:04

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:52:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.290	970322	100.000	143861	2679	1.083	--
总计		970322	100.000	143861			

图61 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-4



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-252-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 17:00:29

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:52:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	969068	100.000	143217	2678	1.083	--
总计		969068	100.000	143217			

图62 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-5



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-253-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 17:03:52

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:52:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.318	778192	100.000	125969	3308	1.063	--
总计		778192	100.000	125969			

图63 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-254-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 17:07:16

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:52:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.316	685660	100.000	111480	3313	1.064	--
总计		685660	100.000	111480			

图64 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-255-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 17:10:40

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:52:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.314	865960	100.000	141177	3310	1.064	--
总计		865960	100.000	141177			

图65 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-256-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 17:14:04

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:52:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	740469	100.000	120322	3303	1.064	--
总计		740469	100.000	120322			

图66 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-257-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 17:17:28

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:52:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	754818	100.000	122702	3308	1.064	--
总计		754818	100.000	122702			

图67 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-258-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 17:20:51

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:52:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	790581	100.000	129149	3309	1.063	--
总计		790581	100.000	129149			

图68 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-259-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 17:24:16

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:52:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	861352	100.000	141118	3318	1.064	--
总计		861352	100.000	141118			

图69 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-260-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 17:27:40

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:52:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	780798	100.000	127401	3305	1.064	--
总计		780798	100.000	127401			

图70 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-261-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 17:31:05

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:52:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	940917	100.000	153694	3304	1.065	--
总计		940917	100.000	153694			

图71 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-262-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 17:34:27

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:52:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	851012	100.000	138754	3304	1.066	--
总计		851012	100.000	138754			

图72 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-263-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 17:37:51

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:52:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	833517	100.000	135975	3310	1.065	--
总计		833517	100.000	135975			

图73 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-264-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 17:41:15

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:52:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	865763	100.000	141276	3307	1.065	--
总计		865763	100.000	141276			

图74 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-265-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 17:44:40

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:52:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	882849	100.000	143952	3309	1.066	--
总计		882849	100.000	143952			

图75 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-266-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 17:48:03

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:53:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	817602	100.000	133626	3310	1.065	--
总计		817602	100.000	133626			

图76 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-267-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 17:51:26

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:53:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	954597	100.000	155957	3307	1.066	--
总计		954597	100.000	155957			

图77 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-268-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 17:54:49

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:53:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	878637	100.000	143568	3308	1.065	--
总计		878637	100.000	143568			

图78 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-269-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 17:58:14

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:53:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	864756	100.000	141136	3310	1.065	--
总计		864756	100.000	141136			

图79 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-270-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 18:01:37

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:53:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	887678	100.000	144684	3305	1.065	--
总计		887678	100.000	144684			

图80 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-271-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-4

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 18:05:02

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:53:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	890578	100.000	145332	3305	1.065	--
总计		890578	100.000	145332			

图81 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-272-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-13

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 18:08:27

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:53:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	836263	100.000	136433	3303	1.066	--
总计		836263	100.000	136433			

图82 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-273-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-22

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 18:11:51

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:53:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	953975	100.000	155663	3304	1.065	--
总计		953975	100.000	155663			

图83 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-274-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-31

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 18:15:16

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:53:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	884798	100.000	144548	3304	1.065	--
总计		884798	100.000	144548			

图84 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-275-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-40

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 18:18:39

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:53:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	877207	100.000	143036	3303	1.065	--
总计		877207	100.000	143036			

图85 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-276-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-49

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 18:22:04

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:53:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	894262	100.000	145933	3309	1.064	--
总计		894262	100.000	145933			

图86 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-277-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-5

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 18:25:28

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:53:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	892720	100.000	146042	3312	1.064	--
总计		892720	100.000	146042			

图87 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-278-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-14

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 18:28:52

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:53:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	851022	100.000	139046	3309	1.065	--
总计		851022	100.000	139046			

图88 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-279-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-23

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 18:32:16

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:53:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	952334	100.000	155655	3310	1.066	--
总计		952334	100.000	155655			

图89 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-280-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-32

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 18:35:41

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:53:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	888740	100.000	144784	3300	1.065	--
总计		888740	100.000	144784			

图90 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-281-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-41

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 18:39:04

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:53:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	884157	100.000	144462	3306	1.065	--
总计		884157	100.000	144462			

图91 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-282-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-50

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 18:42:27

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:53:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	899948	100.000	146943	3307	1.064	--
总计		899948	100.000	146943			

图92 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-283-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-6

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 18:45:52

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:53:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	894686	100.000	145995	3304	1.065	--
总计		894686	100.000	145995			

图93 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-284-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-15

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 18:49:17

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:53:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	856375	100.000	140100	3315	1.065	--
总计		856375	100.000	140100			

图94 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-285-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-24

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 18:52:41

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:53:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	952641	100.000	155345	3304	1.065	--
总计		952641	100.000	155345			

图95 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-286-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-33

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 18:56:06

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:54:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	888903	100.000	144997	3301	1.065	--
总计		888903	100.000	144997			

图96 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-287-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-42

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 18:59:30

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:54:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	884594	100.000	144451	3307	1.065	--
总计		884594	100.000	144451			

图97 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-288-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-51

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 19:02:55

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:54:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	894291	100.000	146056	3305	1.064	--
总计		894291	100.000	146056			

图98 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-289-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-7

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 19:06:20

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:54:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	891085	100.000	145455	3307	1.065	--
总计		891085	100.000	145455			

图99 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-290-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-16

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 19:09:43

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:54:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	855622	100.000	139539	3307	1.065	--
总计		855622	100.000	139539			

图100 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-291-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-25

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 19:13:08

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:54:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	950020	100.000	154964	3308	1.065	--
总计		950020	100.000	154964			

图101 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-292-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-34

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 19:16:32

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:54:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	890133	100.000	145480	3311	1.064	--
总计		890133	100.000	145480			

图102 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-293-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-43

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 19:19:57

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:54:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	884162	100.000	144315	3308	1.064	--
总计		884162	100.000	144315			

图103 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-294-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-52

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 19:23:21

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:54:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	897891	100.000	146529	3301	1.065	--
总计		897891	100.000	146529			

图104 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-295-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-8

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 19:26:46

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:54:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	967361	100.000	158002	3311	1.065	--
总计		967361	100.000	158002			

图105 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-296-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-17

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 19:30:12

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:54:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	963360	100.000	157284	3308	1.065	--
总计		963360	100.000	157284			

图106 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-297-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-26

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 19:33:38

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:54:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	997411	100.000	162553	3304	1.066	--
总计		997411	100.000	162553			

图107 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-298-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-35

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 19:37:02

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:54:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	978564	100.000	160061	3310	1.065	--
总计		978564	100.000	160061			

图108 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-299-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-44

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 19:40:27

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:54:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	975129	100.000	159520	3313	1.065	--
总计		975129	100.000	159520			

图109 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-300-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-53

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 19:43:51

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:54:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	978666	100.000	160038	3310	1.064	--
总计		978666	100.000	160038			

图110 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-301-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 19:47:16

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:54:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	969765	100.000	143998	2662	1.085	--
总计		969765	100.000	143998			

图111 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-2-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 27-3/27-302-2 - zzp-24122302p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250102-RC-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/01/02 19:50:42

处理时间 (V2) : 2025/01/03 10:54:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	970616	100.000	144310	2667	1.083	--
总计		970616	100.000	144310			

图112 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24122302批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-2-2