




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-1-3 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 14:14:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3): 2025/01/07 11:40:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-2-3 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 14:17:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3): 2025/01/07 11:40:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	385782	100.000	47900	1745	1.258	--
总计		385782	100.000	47900			

图2 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-3-3 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 14:20:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3): 2025/01/07 11:40:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	385886	100.000	47975	1753	1.258	--
总计		385886	100.000	47975			

图3 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质
对照品溶液-1-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-4-3 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 14:24:13 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/07 11:40:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	385663	100.000	47919	1752	1.260	--
总计		385663	100.000	47919			

图4 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-5-3 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 14:27:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3): 2025/01/07 11:41:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	385695	100.000	47919	1748	1.256	--
总计		385695	100.000	47919			

图5 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-6-3 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 14:31:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3): 2025/01/07 11:41:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.160	385543	100.000	47984	1756	1.260	--
总计		385543	100.000	47984			

图6 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质
对照品溶液-1-5




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-7-3 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 14:34:25 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/07 11:41:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.193	397769	100.000	59316	2686	1.230	--
总计		397769	100.000	59316			

图7 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-8-3 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 14:37:47 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V3) : 2025/01/07 11:41:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	388912	100.000	58029	2690	1.229	--
总计		388912	100.000	58029			

图8 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-9-3 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 14:41:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3): 2025/01/07 11:41:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.193	390328	100.000	58221	2696	1.230	--
总计		390328	100.000	58221			

图9 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-10-3 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 14:44:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3): 2025/01/07 11:41:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.193	392832	100.000	58500	2688	1.229	--
总计		392832	100.000	58500			

图10 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-11-3 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 14:47:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V3): 2025/01/07 11:41:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	395904	100.000	59058	2691	1.230	--
总计		395904	100.000	59058			

图11 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-12-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 14:51:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:41:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	385212	100.000	57568	2693	1.228	--
总计		385212	100.000	57568			

图12 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-13-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 14:54:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:41:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	407108	100.000	60778	2692	1.229	--
总计		407108	100.000	60778			

图13 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-14-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 14:58:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:41:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	393734	100.000	58823	2692	1.229	--
总计		393734	100.000	58823			

图14 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-15-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:01:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:41:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.193	399443	100.000	59512	2686	1.230	--
总计		399443	100.000	59512			

图15 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-16-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:04:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:41:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	399862	100.000	59641	2691	1.231	--
总计		399862	100.000	59641			

图16 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-17-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:08:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:41:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.193	403544	100.000	60202	2692	1.228	--
总计		403544	100.000	60202			

图17 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-18-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:11:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:41:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	394672	100.000	58933	2691	1.227	--
总计		394672	100.000	58933			

图18 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-19-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:14:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:41:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	406158	100.000	60648	2693	1.227	--
总计		406158	100.000	60648			

图19 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-20-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:18:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:41:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	393129	100.000	58698	2688	1.227	--
总计		393129	100.000	58698			

图20 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-21-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:21:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:41:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	397268	100.000	59347	2694	1.229	--
总计		397268	100.000	59347			

图21 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-22-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:25:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:41:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.193	398879	100.000	59438	2690	1.230	--
总计		398879	100.000	59438			

图22 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-23-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:28:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:41:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	402219	100.000	60076	2695	1.228	--
总计		402219	100.000	60076			

图23 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-24-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:31:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:41:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	394343	100.000	58947	2699	1.227	--
总计		394343	100.000	58947			

图24 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-25-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:35:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:41:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	404314	100.000	60421	2696	1.227	--
总计		404314	100.000	60421			

图25 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-26-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:38:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:41:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	391680	100.000	58582	2698	1.227	--
总计		391680	100.000	58582			

图26 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-27-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:41:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:42:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	395619	100.000	59137	2694	1.228	--
总计		395619	100.000	59137			

图27 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-28-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:45:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:42:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	396161	100.000	59304	2702	1.224	--
总计		396161	100.000	59304			

图28 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-29-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 15:48:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:42:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	401181	100.000	60003	2698	1.225	--
总计		401181	100.000	60003			

图29 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-30-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 15:52:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:42:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	392102	100.000	58618	2696	1.223	--
总计		392102	100.000	58618			

图30 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-31-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 15:55:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:42:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	403930	100.000	60441	2700	1.224	--
总计		403930	100.000	60441			

图31 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-32-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 15:58:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:42:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	391674	100.000	58641	2709	1.224	--
总计		391674	100.000	58641			

图32 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-33-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 16:02:15 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:42:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	394525	100.000	59095	2709	1.224	--
总计		394525	100.000	59095			

图33 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-34-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 16:05:37 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:42:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	401738	100.000	60345	2718	1.223	--
总计		401738	100.000	60345			

图34 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-35-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 16:09:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:42:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	399725	100.000	59906	2710	1.223	--
总计		399725	100.000	59906			

图35 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-36-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 16:12:22 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:42:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	391273	100.000	58671	2713	1.224	--
总计		391273	100.000	58671			

图36 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-37-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 16:15:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:42:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	403052	100.000	60298	2704	1.226	--
总计		403052	100.000	60298			

图37 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-38-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 16:19:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:42:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	390551	100.000	58539	2708	1.223	--
总计		390551	100.000	58539			

图38 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-39-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 16:22:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:42:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	394647	100.000	59123	2706	1.223	--
总计		394647	100.000	59123			

图39 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-40-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 16:25:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:42:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	395499	100.000	59187	2703	1.225	--
总计		395499	100.000	59187			

图40 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-41-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 16:29:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:42:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	399058	100.000	59785	2705	1.224	--
总计		399058	100.000	59785			

图41 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-42-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 16:32:39 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:42:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	389915	100.000	58335	2700	1.225	--
总计		389915	100.000	58335			

图42 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-43-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 16:36:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:42:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.160	385171	100.000	47991	1755	1.252	--
总计		385171	100.000	47991			

图43 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-44-2 - zzp-2024122121p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 16:39:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:42:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.161	384382	100.000	47943	1755	1.250	--
总计		384382	100.000	47943			

图44 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122121批-均一性1-pH1.0介质
对照品溶液-2-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-45-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 16:42:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:42:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图45 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-46-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 16:46:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:42:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.160	384901	100.000	48041	1762	1.251	--
总计		384901	100.000	48041			

图46 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-47-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 16:49:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:42:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.160	384577	100.000	48061	1761	1.252	--
总计		384577	100.000	48061			

图47 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质
对照品溶液-1-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-48-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 16:53:03 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:42:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.161	385045	100.000	48038	1759	1.251	--
总计		385045	100.000	48038			

图48 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-49-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 16:56:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:43:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.161	384935	100.000	48101	1765	1.250	--
总计		384935	100.000	48101			

图49 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-50-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 16:59:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:43:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.160	384620	100.000	48009	1756	1.250	--
总计		384620	100.000	48009			

图50 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-51-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:03:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:43:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	396557	100.000	59430	2704	1.222	--
总计		396557	100.000	59430			

图51 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-52-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:06:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:43:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	394873	100.000	59000	2698	1.225	--
总计		394873	100.000	59000			

图52 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-53-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:10:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:43:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	405512	100.000	60679	2703	1.226	--
总计		405512	100.000	60679			

图53 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-54-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:13:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:43:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	387584	100.000	57978	2697	1.226	--
总计		387584	100.000	57978			

图54 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-55-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:16:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:43:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	397506	100.000	59420	2700	1.226	--
总计		397506	100.000	59420			

图55 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-56-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 17:20:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:43:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	390265	100.000	58376	2698	1.226	--
总计		390265	100.000	58376			

图56 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-57-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:23:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:43:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.193	397962	100.000	59436	2695	1.226	--
总计		397962	100.000	59436			

图57 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-58-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 17:27:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:43:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	396793	100.000	59315	2695	1.227	--
总计		396793	100.000	59315			

图58 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-59-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:30:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:43:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	397432	100.000	59364	2690	1.226	--
总计		397432	100.000	59364			

图59 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-60-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 17:33:52 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:43:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.193	391753	100.000	58296	2677	1.227	--
总计		391753	100.000	58296			

图60 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-61-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:37:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:43:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	398916	100.000	59591	2686	1.226	--
总计		398916	100.000	59591			

图61 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-62-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 17:40:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:43:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.193	391899	100.000	58424	2682	1.226	--
总计		391899	100.000	58424			

图62 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-63-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 17:44:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:43:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	397232	100.000	59381	2692	1.224	--
总计		397232	100.000	59381			

图63 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-64-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:47:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:43:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	396365	100.000	59169	2688	1.227	--
总计		396365	100.000	59169			

图64 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-65-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:50:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:43:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	397362	100.000	59369	2688	1.225	--
总计		397362	100.000	59369			

图65 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-66-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 17:54:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:43:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	391885	100.000	58569	2691	1.227	--
总计		391885	100.000	58569			

图66 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-67-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 17:57:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:43:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	398954	100.000	59602	2688	1.225	--
总计		398954	100.000	59602			

图67 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-68-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:01:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:43:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	391481	100.000	58558	2689	1.224	--
总计		391481	100.000	58558			

图68 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-69-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 18:04:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:43:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	397088	100.000	59274	2684	1.226	--
总计		397088	100.000	59274			

图69 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-70-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 18:07:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:43:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	395191	100.000	59176	2696	1.224	--
总计		395191	100.000	59176			

图70 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-71-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 18:11:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:43:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	396377	100.000	59305	2694	1.224	--
总计		396377	100.000	59305			

图71 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-72-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:14:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:44:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	391636	100.000	58562	2690	1.226	--
总计		391636	100.000	58562			

图72 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-73-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 18:18:04 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:44:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	398429	100.000	59628	2695	1.223	--
总计		398429	100.000	59628			

图73 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-74-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 18:21:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:44:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	391939	100.000	58543	2691	1.225	--
总计		391939	100.000	58543			

图74 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-75-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:24:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:44:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	397078	100.000	59412	2698	1.224	--
总计		397078	100.000	59412			

图75 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-76-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:28:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:44:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	401452	100.000	60041	2694	1.224	--
总计		401452	100.000	60041			

图76 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-77-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:31:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:44:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	408352	100.000	61188	2702	1.223	--
总计		408352	100.000	61188			

图77 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-78-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 18:35:05 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:44:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	391736	100.000	58647	2698	1.222	--
总计		391736	100.000	58647			

图78 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-79-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 18:38:29 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:44:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	397361	100.000	59467	2695	1.221	--
总计		397361	100.000	59467			

图79 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-80-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 18:41:53 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:44:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	390523	100.000	58465	2697	1.222	--
总计		390523	100.000	58465			

图80 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-81-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 18:45:18 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:44:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	395309	100.000	59191	2696	1.223	--
总计		395309	100.000	59191			

图81 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-82-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 18:48:42 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:44:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	398912	100.000	59663	2697	1.224	--
总计		398912	100.000	59663			

图82 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-83-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 18:52:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:44:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	395480	100.000	59078	2689	1.223	--
总计		395480	100.000	59078			

图83 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-84-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 18:55:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:44:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	412987	100.000	61811	2699	1.223	--
总计		412987	100.000	61811			

图84 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-85-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 18:58:54 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:44:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	397968	100.000	59466	2692	1.225	--
总计		397968	100.000	59466			

图85 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-86-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:02:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:44:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	389501	100.000	58289	2697	1.226	--
总计		389501	100.000	58289			

图86 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-87-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:05:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:44:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	384918	100.000	48034	1762	1.246	--
总计		384918	100.000	48034			

图87 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质
对照品溶液-2-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-88-2 - zzp-2024122221p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 19:09:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:44:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.164	384565	100.000	48054	1761	1.246	--
总计		384565	100.000	48054			

图88 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122221批-均一性1-pH1.0介质
对照品溶液-2-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-89-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 19:12:28 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:44:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图89 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-90-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:15:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:44:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.164	385519	100.000	48270	1771	1.244	--
总计		385519	100.000	48270			

图90 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质
对照品溶液-1-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-91-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:19:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:44:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	385401	100.000	48269	1773	1.245	--
总计		385401	100.000	48269			

图91 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质
对照品溶液-1-2




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-92-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:22:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:44:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.164	385897	100.000	48261	1769	1.244	--
总计		385897	100.000	48261			

图92 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-93-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:25:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:44:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.164	385930	100.000	48319	1772	1.242	--
总计		385930	100.000	48319			

图93 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-94-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:29:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:45:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	385159	100.000	48281	1774	1.243	--
总计		385159	100.000	48281			

图94 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质
对照品溶液-1-5




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-95-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:32:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:45:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	391142	100.000	58626	2711	1.218	--
总计		391142	100.000	58626			

图95 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-96-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:36:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:45:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	389687	100.000	58309	2704	1.219	--
总计		389687	100.000	58309			

图96 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-97-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:39:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:45:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	397051	100.000	59340	2697	1.219	--
总计		397051	100.000	59340			

图97 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-98-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:42:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:45:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	395891	100.000	59163	2699	1.220	--
总计		395891	100.000	59163			

图98 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-99-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:46:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:45:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	389412	100.000	58137	2694	1.222	--
总计		389412	100.000	58137			

图99 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-100-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:49:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:45:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	391154	100.000	58531	2693	1.220	--
总计		391154	100.000	58531			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-101-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 19:52:56 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:45:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	395509	100.000	58930	2685	1.224	--
总计		395509	100.000	58930			

图101 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-102-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 19:56:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:45:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	394968	100.000	59032	2692	1.219	--
总计		394968	100.000	59032			




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-103-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 19:59:40 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:45:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	401859	100.000	59978	2690	1.222	--
总计		401859	100.000	59978			

图103 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-104-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 20:03:02 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:45:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	399096	100.000	59609	2690	1.220	--
总计		399096	100.000	59609			

图104 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-105-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 20:06:24 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:45:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	392260	100.000	58570	2691	1.221	--
总计		392260	100.000	58570			

图105 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-106-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 20:09:46 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:45:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	397015	100.000	59333	2688	1.221	--
总计		397015	100.000	59333			

图106 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-107-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:13:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:45:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	395264	100.000	58966	2689	1.221	--
总计		395264	100.000	58966			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-108-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:16:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:45:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	400256	100.000	59620	2691	1.222	--
总计		400256	100.000	59620			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-109-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:19:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:45:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	400932	100.000	59847	2682	1.221	--
总计		400932	100.000	59847			

图109 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-110-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 20:23:16 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:45:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	402549	100.000	59993	2695	1.220	--
总计		402549	100.000	59993			

图110 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-111-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:26:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:45:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	390184	100.000	58170	2689	1.222	--
总计		390184	100.000	58170			

图111 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-112-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:30:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:45:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	399445	100.000	59529	2687	1.223	--
总计		399445	100.000	59529			

图112 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-113-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:33:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:45:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	394702	100.000	58782	2690	1.222	--
总计		394702	100.000	58782			

图113 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-114-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:36:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:45:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	394498	100.000	58693	2686	1.223	--
总计		394498	100.000	58693			

图114 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-115-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 20:40:08 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:46:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	402900	100.000	60024	2691	1.221	--
总计		402900	100.000	60024			

图115 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-116-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:43:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:46:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	397662	100.000	59270	2682	1.221	--
总计		397662	100.000	59270			

图116 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-117-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:46:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:46:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	390957	100.000	58238	2688	1.221	--
总计		390957	100.000	58238			

图117 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-118-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:50:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:46:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	397188	100.000	59158	2689	1.222	--
总计		397188	100.000	59158			

图118 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-119-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:53:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:46:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	394222	100.000	58731	2695	1.221	--
总计		394222	100.000	58731			

图119 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-120-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 20:56:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:46:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	393106	100.000	58514	2695	1.220	--
总计		393106	100.000	58514			

图120 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-121-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 21:00:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:46:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	400304	100.000	59695	2687	1.221	--
总计		400304	100.000	59695			

图121 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱温:30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-122-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 21:03:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:46:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	397265	100.000	59232	2696	1.221	--
总计		397265	100.000	59232			

图122 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-123-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 21:07:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:46:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	390154	100.000	58187	2695	1.220	--
总计		390154	100.000	58187			

图123 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-124-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 21:10:23 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:46:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	395888	100.000	58890	2694	1.219	--
总计		395888	100.000	58890			

图124 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-125-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 21:13:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:46:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	400392	100.000	59627	2698	1.219	--
总计		400392	100.000	59627			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-126-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 21:17:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:46:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	392777	100.000	58486	2695	1.219	--
总计		392777	100.000	58486			

图126 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-127-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 21:20:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:46:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	399001	100.000	59285	2693	1.220	--
总计		399001	100.000	59285			

图127 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30℃ 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-128-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 21:23:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:46:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	396191	100.000	59060	2692	1.219	--
总计		396191	100.000	59060			

图128 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-129-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 21:27:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:46:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	389524	100.000	57909	2696	1.220	--
总计		389524	100.000	57909			

图129 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4100

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:1.0ml/min
柱 温 :30°C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-130-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/01/06 21:30:31 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/01/07 11:46:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	395211	100.000	58846	2693	1.219	--
总计		395211	100.000	58846			

图130 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-131-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 21:33:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:46:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.167	385631	100.000	48055	1769	1.246	--
总计		385631	100.000	48055			

图131 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:275nm
数据文件名: RC\$QTL-4100 - 27-10/29-132-2 - zzp-2024122321p-rcqx-pH1.0jz-jyx1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4100 - QTL-4100-rcff-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4100 - 20250106-rcqx-FX278.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/06 21:37:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/01/07 11:46:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.167	386386	100.000	48153	1769	1.243	--
总计		386386	100.000	48153			

图132 比拉斯汀片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122321批-均一性1-pH1.0介质
对照品溶液-2-2