




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-1-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-9
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 13:22:48
处理时间(V3)：2025/01/06 14:39:24
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转
溶剂




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-2-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 13:26:11
处理时间(V3)：2025/01/06 14:39:27
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.187	262791	100.000	39590	2670	1.229	--
总计		262791	100.000	39590			

图2 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-3-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 13:29:33
处理时间(V3)：2025/01/06 14:39:30
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	262488	100.000	39555	2671	1.230	--
总计		262488	100.000	39555			

图3 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-4-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 13:32:56
处理时间(V3)：2025/01/06 14:39:33
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	262262	100.000	39513	2671	1.230	--
总计		262262	100.000	39513			

图4 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-5-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 13:36:19
处理时间(V3)：2025/01/06 14:39:36
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	262112	100.000	39511	2672	1.228	--
总计		262112	100.000	39511			

图5 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-6-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 13:39:42
处理时间(V3)：2025/01/06 14:39:39
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	262533	100.000	39529	2672	1.232	--
总计		262533	100.000	39529			

图6 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-7-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-1
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 13:43:04
处理时间(V3)：2025/01/06 14:39:41
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	64084	100.000	9551	2599	1.242	--
总计		64084	100.000	9551			

图7 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-8-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-10
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 13:46:26
处理时间(V3)：2025/01/06 14:39:44
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	77739	100.000	11581	2604	1.244	--
总计		77739	100.000	11581			

图8 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-9-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-19
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 13:49:49
处理时间(V3)：2025/01/06 14:39:46
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	54803	100.000	8147	2604	1.242	--
总计		54803	100.000	8147			

图9 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-10-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-28
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 13:53:11
处理时间(V3)：2025/01/06 14:39:49
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	56864	100.000	8440	2599	1.251	--
总计		56864	100.000	8440			

图10 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-11-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-37
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 13:56:32
处理时间(V3)：2025/01/06 14:39:52
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	86259	100.000	12769	2594	1.244	--
总计		86259	100.000	12769			

图11 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-12-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-46
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 13:59:54
处理时间(V3)：2025/01/06 14:39:54
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	74386	100.000	10999	2584	1.245	--
总计		74386	100.000	10999			

图12 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-13-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-2
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 14:03:16
处理时间(V3)：2025/01/06 14:39:57
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	222754	100.000	33015	2596	1.246	--
总计		222754	100.000	33015			

图13 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-14-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-11
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 14:06:38
处理时间(V3)：2025/01/06 14:40:00
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	222052	100.000	32832	2584	1.247	--
总计		222052	100.000	32832			

图14 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-15-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-20
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 14:10:00
处理时间(V3)：2025/01/06 14:40:02
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	163341	100.000	24181	2595	1.245	--
总计		163341	100.000	24181			

图15 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-16-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-10min-P4.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb

样品瓶号：1-29

进样体积：5 μl

进样时间：2025/01/04 14:13:21

处理时间(V3)：2025/01/06 14:40:05

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	189631	100.000	28099	2591	1.246	--
总计		189631	100.000	28099			

图16 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-17-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-38
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 14:16:42
处理时间(V3)：2025/01/06 14:40:07
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	264795	100.000	39167	2589	1.245	--
总计		264795	100.000	39167			

图17 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-18-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-47
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 14:20:04
处理时间(V3)：2025/01/06 14:40:10
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	222352	100.000	32903	2594	1.245	--
总计		222352	100.000	32903			

图18 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-19-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-3
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 14:23:26
处理时间(V3)：2025/01/06 14:40:13
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	391676	100.000	58008	2595	1.248	--
总计		391676	100.000	58008			

图19 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-20-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-12
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 14:26:48
处理时间(V3)：2025/01/06 14:40:15
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	334284	100.000	49397	2589	1.247	--
总计		334284	100.000	49397			

图20 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-21-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-21
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 14:30:10
处理时间(V3)：2025/01/06 14:40:18
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	253051	100.000	37346	2589	1.247	--
总计		253051	100.000	37346			

图21 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-22-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-30
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 14:33:31
处理时间(V3)：2025/01/06 14:40:21
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	314225	100.000	46374	2582	1.248	--
总计		314225	100.000	46374			

图22 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-23-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-39
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 14:36:53
处理时间(V3)：2025/01/06 14:40:23
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	415193	100.000	61359	2589	1.246	--
总计		415193	100.000	61359			

图23 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-24-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-48
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 14:40:15
处理时间(V3)：2025/01/06 14:40:26
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	363586	100.000	53717	2590	1.247	--
总计		363586	100.000	53717			

图24 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-25-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-4
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 14:43:37
处理时间(V3)：2025/01/06 14:40:28
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	523109	100.000	77394	2595	1.247	--
总计		523109	100.000	77394			

图25 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-26-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-13
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 14:47:00
处理时间(V3)：2025/01/06 14:40:31
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	426839	100.000	63021	2589	1.247	--
总计		426839	100.000	63021			

图26 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-27-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-22
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 14:50:22
处理时间(V3)：2025/01/06 14:40:34
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	330186	100.000	48745	2593	1.246	--
总计		330186	100.000	48745			

图27 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-28-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-31
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 14:53:44
处理时间(V3)：2025/01/06 14:40:37
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	432182	100.000	63897	2589	1.246	--
总计		432182	100.000	63897			

图28 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-29-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-40
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 14:57:06
处理时间(V3)：2025/01/06 14:40:39
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	541933	100.000	79985	2589	1.248	--
总计		541933	100.000	79985			

图29 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-30-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-49
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 15:00:28
处理时间(V3)：2025/01/06 14:40:42
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	479135	100.000	70689	2584	1.247	--
总计		479135	100.000	70689			

图30 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-31-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-5
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 15:03:50
处理时间(V3)：2025/01/06 14:40:45
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	700921	100.000	103592	2597	1.249	--
总计		700921	100.000	103592			

图31 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-32-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-30min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb

样品瓶号：1-14

进样体积：5 μl

进样时间：2025/01/04 15:07:12

处理时间(V3)：2025/01/06 14:40:48

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	547644	100.000	80807	2587	1.247	--
总计		547644	100.000	80807			

图32 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-33-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-23
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 15:10:34
处理时间(V3)：2025/01/06 14:40:51
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	446992	100.000	65956	2595	1.246	--
总计		446992	100.000	65956			

图33 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-34-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-32
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 15:13:55
处理时间(V3)：2025/01/06 14:40:53
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	620603	100.000	91501	2589	1.249	--
总计		620603	100.000	91501			

图34 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-35-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-41
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 15:17:17
处理时间(V3)：2025/01/06 14:40:56
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	739273	100.000	109042	2587	1.250	--
总计		739273	100.000	109042			

图35 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-36-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-50
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 15:20:39
处理时间(V3)：2025/01/06 14:40:58
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	622337	100.000	91728	2588	1.249	--
总计		622337	100.000	91728			

图36 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-37-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-6
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 15:24:01
处理时间(V3)：2025/01/06 14:41:01
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	889644	100.000	131233	2590	1.252	--
总计		889644	100.000	131233			

图37 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-38-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-15
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 15:27:23
处理时间(V3)：2025/01/06 14:41:04
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	668668	100.000	98485	2587	1.249	--
总计		668668	100.000	98485			

图38 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-39-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-24
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 15:30:45
处理时间(V3)：2025/01/06 14:41:06
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	583580	100.000	85876	2586	1.247	--
总计		583580	100.000	85876			

图39 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-40-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-33
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 15:34:06
处理时间(V3)：2025/01/06 14:41:09
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	840214	100.000	123823	2587	1.251	--
总计		840214	100.000	123823			

图40 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-41-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-42
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 15:37:28
处理时间(V3)：2025/01/06 14:41:12
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	923648	100.000	136082	2586	1.253	--
总计		923648	100.000	136082			

图41 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-42-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-51
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 15:40:50
处理时间(V3)：2025/01/06 14:41:15
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	754555	100.000	111155	2586	1.250	--
总计		754555	100.000	111155			

图42 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-43-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-7
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 15:44:12
处理时间(V3)：2025/01/06 14:41:17
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	1035095	100.000	152515	2589	1.254	--
总计		1035095	100.000	152515			

图43 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-44-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-60min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb

样品瓶号：1-16

进样体积：5 μl

进样时间：2025/01/04 15:47:34

处理时间(V3)：2025/01/06 14:41:20

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	776896	100.000	114381	2582	1.250	--
总计		776896	100.000	114381			

图44 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-45-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-25
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 15:50:56
处理时间(V3)：2025/01/06 14:41:22
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	717859	100.000	105734	2590	1.249	--
总计		717859	100.000	105734			

图45 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-46-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-34
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 15:54:17
处理时间(V3)：2025/01/06 14:41:25
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	982410	100.000	144594	2583	1.253	--
总计		982410	100.000	144594			

图46 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-47-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-60min-P5.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb

样品瓶号：1-43

进样体积：5 μl

进样时间：2025/01/04 15:57:39

处理时间(V3)：2025/01/06 14:41:28

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	1033307	100.000	152085	2579	1.254	--
总计		1033307	100.000	152085			

图47 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-48-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-52
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 16:01:01
处理时间(V3)：2025/01/06 14:41:31
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	839136	100.000	123432	2586	1.251	--
总计		839136	100.000	123432			

图48 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-49-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-90min-P1.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb

样品瓶号：1-8

进样体积：5 μl

进样时间：2025/01/04 16:04:23

处理时间(V3)：2025/01/06 14:41:34

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	1173446	100.000	172683	2590	1.256	--
总计		1173446	100.000	172683			

图49 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-50-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-90min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-17
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 16:07:45
处理时间(V3)：2025/01/06 14:41:36
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	928207	100.000	136533	2584	1.253	--
总计		928207	100.000	136533			

图50 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-51-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-90min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-26
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 16:11:07
处理时间(V3)：2025/01/06 14:41:39
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	986640	100.000	145183	2581	1.253	--
总计		986640	100.000	145183			

图51 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-52-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-90min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-35
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 16:14:29
处理时间(V3)：2025/01/06 14:41:42
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	1143511	100.000	168230	2577	1.256	--
总计		1143511	100.000	168230			

图52 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片4
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-53-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-90min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-44
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 16:17:52
处理时间(V3)：2025/01/06 14:41:44
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	1171567	100.000	172383	2580	1.257	--
总计		1171567	100.000	172383			

图53 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片5
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-54-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-90min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-53
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 16:21:14
处理时间(V3)：2025/01/06 14:41:47
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	970861	100.000	142701	2581	1.254	--
总计		970861	100.000	142701			

图54 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片6
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-55-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-120min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-1
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 16:24:37
处理时间(V3)：2025/01/06 14:41:50
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	1265701	100.000	186474	2585	1.258	--
总计		1265701	100.000	186474			

图55 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-120min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-56-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-120min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-10
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 16:28:00
处理时间(V3)：2025/01/06 14:41:52
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	1052293	100.000	154833	2581	1.255	--
总计		1052293	100.000	154833			

图56 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-120min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-57-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-120min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-19
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 16:31:22
处理时间(V3)：2025/01/06 14:41:55
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	1153907	100.000	169818	2578	1.256	--
总计		1153907	100.000	169818			

图57 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-120min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-58-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-120min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-28
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 16:34:44
处理时间(V3)：2025/01/06 14:41:58
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	1262767	100.000	185573	2565	1.258	--
总计		1262767	100.000	185573			

图58 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-120min-片4
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-59-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-120min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-37
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 16:38:05
处理时间(V3)：2025/01/06 14:42:00
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	1245362	100.000	183048	2573	1.258	--
总计		1245362	100.000	183048			

图59 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-120min-片5
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-60-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-120min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-46
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 16:41:27
处理时间(V3)：2025/01/06 14:42:03
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	1097763	100.000	161321	2578	1.256	--
总计		1097763	100.000	161321			

图60 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-120min-片6
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-61-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jx-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-2
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 16:44:49
处理时间(V3)：2025/01/06 14:42:06
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	1309401	100.000	192743	2586	1.258	--
总计		1309401	100.000	192743			

图61 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-62-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jx-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-11
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 16:48:11
处理时间(V3)：2025/01/06 14:42:08
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	1223298	100.000	179832	2574	1.258	--
总计		1223298	100.000	179832			

图62 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-63-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jx-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-20
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 16:51:32
处理时间(V3)：2025/01/06 14:42:11
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	1242255	100.000	182492	2572	1.258	--
总计		1242255	100.000	182492			

图63 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-64-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jx-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-29
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 16:54:54
处理时间(V3)：2025/01/06 14:42:14
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	1304984	100.000	191625	2569	1.260	--
总计		1304984	100.000	191625			

图64 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-65-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jx-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-38
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 16:58:15
处理时间(V3)：2025/01/06 14:42:17
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	1299082	100.000	191093	2576	1.259	--
总计		1299082	100.000	191093			

图65 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-66-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jx-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-47
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 17:01:36
处理时间(V3)：2025/01/06 14:42:19
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	1254537	100.000	184122	2564	1.259	--
总计		1254537	100.000	184122			

图66 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-67-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-27
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 17:04:59
处理时间(V3)：2025/01/06 14:42:22
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	261885	100.000	39385	2697	1.229	--
总计		261885	100.000	39385			

图67 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-68-3 - zzp-24123001p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：1-27
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 17:08:22
处理时间(V3)：2025/01/06 14:42:24
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	261414	100.000	39372	2700	1.226	--
总计		261414	100.000	39372			

图68 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123001批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-69-3 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-9
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 17:11:45
处理时间(V3)：2025/01/06 14:42:28
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转
溶剂




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-70-3 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 17:15:09
处理时间(V3)：2025/01/06 14:42:30
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	264485	100.000	39847	2705	1.227	--
总计		264485	100.000	39847			

图70 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-71-3 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 17:18:33
处理时间(V3)：2025/01/06 14:42:33
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	264811	100.000	39954	2706	1.226	--
总计		264811	100.000	39954			

图71 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-72-3 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 17:21:57
处理时间(V3)：2025/01/06 14:42:36
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	265355	100.000	40012	2707	1.225	--
总计		265355	100.000	40012			

图72 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-73-3 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 17:25:21
处理时间(V3)：2025/01/06 14:42:39
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	265143	100.000	39938	2706	1.227	--
总计		265143	100.000	39938			

图73 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-74-3 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 17:28:44
处理时间(V3)：2025/01/06 14:42:41
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	265201	100.000	39979	2702	1.225	--
总计		265201	100.000	39979			

图74 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-75-3 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-1
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 17:32:07
处理时间(V3)：2025/01/06 14:42:44
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	67473	100.000	10032	2622	1.236	--
总计		67473	100.000	10032			

图75 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-76-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-10
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 17:35:30
处理时间(V2)：2025/01/06 14:42:47
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	95267	100.000	14138	2609	1.235	--
总计		95267	100.000	14138			

图76 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-77-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-19
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 17:38:53
处理时间(V2)：2025/01/06 14:42:49
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	19552	100.000	2912	2592	1.229	--
总计		19552	100.000	2912			

图77 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-78-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-28
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 17:42:16
处理时间(V2)：2025/01/06 14:42:52
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	76036	100.000	11293	2611	1.238	--
总计		76036	100.000	11293			

图78 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-79-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-37
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 17:45:39
处理时间(V2)：2025/01/06 14:42:55
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	15418	100.000	2349	2680	1.213	--
总计		15418	100.000	2349			

图79 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-80-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-5min-P6.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb

样品瓶号：2-46

进样体积：5 μl

进样时间：2025/01/04 17:49:01

处理时间(V2)：2025/01/06 14:42:57

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	17709	100.000	2631	2603	1.230	--
总计		17709	100.000	2631			

图80 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-81-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-2
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 17:52:24
处理时间(V2)：2025/01/06 14:43:00
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	204461	100.000	30306	2612	1.240	--
总计		204461	100.000	30306			

图81 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-82-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-11
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 17:55:48
处理时间(V2)：2025/01/06 14:43:03
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	172374	100.000	25530	2608	1.240	--
总计		172374	100.000	25530			

图82 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-83-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-20
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 17:59:10
处理时间(V2)：2025/01/06 14:43:06
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	75514	100.000	11168	2590	1.239	--
总计		75514	100.000	11168			

图83 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-84-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-29
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 18:02:33
处理时间(V2)：2025/01/06 14:43:08
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	198867	100.000	29385	2605	1.241	--
总计		198867	100.000	29385			

图84 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-85-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-38
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 18:05:56
处理时间(V2)：2025/01/06 14:43:11
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	80099	100.000	11846	2607	1.240	--
总计		80099	100.000	11846			

图85 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-86-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-47
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 18:09:19
处理时间(V2)：2025/01/06 14:43:14
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	103016	100.000	15245	2605	1.238	--
总计		103016	100.000	15245			

图86 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-87-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-3
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 18:12:42
处理时间(V2)：2025/01/06 14:43:17
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	319821	100.000	47348	2613	1.242	--
总计		319821	100.000	47348			

图87 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-88-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-12
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 18:16:05
处理时间(V2)：2025/01/06 14:43:19
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	236311	100.000	34968	2608	1.239	--
总计		236311	100.000	34968			

图88 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-89-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-21
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 18:19:27
处理时间(V2)：2025/01/06 14:43:22
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	140214	100.000	20746	2600	1.240	--
总计		140214	100.000	20746			

图89 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-90-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-30
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 18:22:50
处理时间(V2)：2025/01/06 14:43:25
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	284386	100.000	41938	2593	1.242	--
总计		284386	100.000	41938			

图90 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-91-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-39
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 18:26:13
处理时间(V2)：2025/01/06 14:43:27
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	145318	100.000	21482	2596	1.239	--
总计		145318	100.000	21482			

图91 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-92-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-48
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 18:29:36
处理时间(V2)：2025/01/06 14:43:30
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	227952	100.000	33669	2602	1.242	--
总计		227952	100.000	33669			

图92 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-93-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-4
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 18:33:00
处理时间(V2)：2025/01/06 14:43:33
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	435711	100.000	64400	2606	1.244	--
总计		435711	100.000	64400			

图93 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-94-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-13
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 18:36:23
处理时间(V2)：2025/01/06 14:43:35
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	292657	100.000	43244	2601	1.243	--
总计		292657	100.000	43244			

图94 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-95-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-22
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 18:39:46
处理时间(V2)：2025/01/06 14:43:38
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	214929	100.000	31710	2597	1.243	--
总计		214929	100.000	31710			

图95 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-96-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-31
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 18:43:09
处理时间(V2)：2025/01/06 14:43:41
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	345241	100.000	50962	2592	1.243	--
总计		345241	100.000	50962			

图96 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-97-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-40
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 18:46:33
处理时间(V2)：2025/01/06 14:43:44
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	221165	100.000	32654	2596	1.243	--
总计		221165	100.000	32654			

图97 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-98-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-49
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 18:49:56
处理时间(V2)：2025/01/06 14:43:47
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	325962	100.000	48126	2594	1.243	--
总计		325962	100.000	48126			

图98 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-99-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-5
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 18:53:20
处理时间(V2)：2025/01/06 14:43:50
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	605061	100.000	89333	2600	1.249	--
总计		605061	100.000	89333			

图99 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-100-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-14
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 18:56:43
处理时间(V2)：2025/01/06 14:43:52
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	392827	100.000	58013	2596	1.244	--
总计		392827	100.000	58013			

图100 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-101-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-23
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 19:00:06
处理时间(V2)：2025/01/06 14:43:55
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	322780	100.000	47569	2594	1.244	--
总计		322780	100.000	47569			

图101 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-102-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-32
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 19:03:29
处理时间(V2)：2025/01/06 14:43:58
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	429811	100.000	63305	2588	1.247	--
总计		429811	100.000	63305			

图102 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-103-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-41
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 19:06:52
处理时间(V2)：2025/01/06 14:44:01
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	349220	100.000	51484	2592	1.245	--
总计		349220	100.000	51484			

图103 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-104-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-50
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 19:10:15
处理时间(V2)：2025/01/06 14:44:04
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	456183	100.000	67283	2589	1.247	--
总计		456183	100.000	67283			

图104 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-105-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-6
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 19:13:38
处理时间(V2)：2025/01/06 14:44:07
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	739361	100.000	108912	2588	1.251	--
总计		739361	100.000	108912			

图105 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-106-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-45min-P2.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb

样品瓶号：2-15

进样体积：5 μl

进样时间：2025/01/04 19:17:02

处理时间(V2)：2025/01/06 14:44:10

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	520823	100.000	76805	2593	1.248	--
总计		520823	100.000	76805			

图106 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-107-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-24
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 19:20:25
处理时间(V2)：2025/01/06 14:44:13
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	431729	100.000	63669	2589	1.246	--
总计		431729	100.000	63669			

图107 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-108-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-33
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 19:23:48
处理时间(V2)：2025/01/06 14:44:16
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	522564	100.000	76982	2586	1.248	--
总计		522564	100.000	76982			

图108 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-109-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-42
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 19:27:12
处理时间(V2)：2025/01/06 14:44:19
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	493898	100.000	72830	2592	1.248	--
总计		493898	100.000	72830			

图109 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-110-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-51
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 19:30:35
处理时间(V2)：2025/01/06 14:44:21
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	549857	100.000	81042	2589	1.248	--
总计		549857	100.000	81042			

图110 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-111-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-7
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 19:33:59
处理时间(V2)：2025/01/06 14:44:24
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	828410	100.000	122166	2591	1.253	--
总计		828410	100.000	122166			

图111 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-112-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-16
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 19:37:22
处理时间(V2)：2025/01/06 14:44:27
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	628870	100.000	92715	2591	1.251	--
总计		628870	100.000	92715			

图112 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-113-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-25
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 19:40:46
处理时间(V2)：2025/01/06 14:44:30
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	515436	100.000	76012	2591	1.248	--
总计		515436	100.000	76012			

图113 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-114-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-34
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 19:44:09
处理时间(V2)：2025/01/06 14:44:32
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	593489	100.000	87432	2587	1.251	--
总计		593489	100.000	87432			

图114 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-115-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-43
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 19:47:33
处理时间(V2)：2025/01/06 14:44:35
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	591793	100.000	87247	2592	1.250	--
总计		591793	100.000	87247			

图115 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-116-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-52
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 19:50:57
处理时间(V2)：2025/01/06 14:44:38
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	612949	100.000	90281	2586	1.252	--
总计		612949	100.000	90281			

图116 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-117-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-90min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-8
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 19:54:21
处理时间(V2)：2025/01/06 14:44:41
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	974029	100.000	143481	2590	1.257	--
总计		974029	100.000	143481			

图117 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-118-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-90min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-17
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 19:57:45
处理时间(V2)：2025/01/06 14:44:44
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	814045	100.000	120023	2594	1.255	--
总计		814045	100.000	120023			

图118 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-119-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-90min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-26
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 20:01:08
处理时间(V2)：2025/01/06 14:44:47
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	648056	100.000	95465	2585	1.252	--
总计		648056	100.000	95465			

图119 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-120-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-90min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-35
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 20:04:32
处理时间(V2)：2025/01/06 14:44:50
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	716555	100.000	105444	2582	1.254	--
总计		716555	100.000	105444			

图120 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片4
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-121-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-90min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-44
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 20:07:56
处理时间(V2)：2025/01/06 14:44:52
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	737524	100.000	108521	2583	1.254	--
总计		737524	100.000	108521			

图121 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片5
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-122-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-90min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-53
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 20:11:19
处理时间(V2)：2025/01/06 14:44:55
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	740273	100.000	108947	2583	1.254	--
总计		740273	100.000	108947			

图122 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片6
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-123-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-120min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-3
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 20:14:41
处理时间(V2)：2025/01/06 14:44:58
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	1072673	100.000	158169	2593	1.260	--
总计		1072673	100.000	158169			

图123 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-120min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-124-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-120min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-12
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 20:18:03
处理时间(V2)：2025/01/06 14:45:01
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	959521	100.000	140767	2567	1.262	--
总计		959521	100.000	140767			

图124 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-120min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-125-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-120min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-21
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 20:21:25
处理时间(V2)：2025/01/06 14:45:04
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	753560	100.000	111031	2587	1.254	--
总计		753560	100.000	111031			

图125 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-120min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-126-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-120min-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-30
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 20:24:48
处理时间(V2)：2025/01/06 14:45:07
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	814673	100.000	119970	2586	1.256	--
总计		814673	100.000	119970			

图126 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-120min-片4
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-127-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-120min-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-39
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 20:28:10
处理时间(V2)：2025/01/06 14:45:10
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	838128	100.000	123375	2585	1.257	--
总计		838128	100.000	123375			

图127 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-120min-片5
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-128-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-120min-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-48
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 20:31:32
处理时间(V2)：2025/01/06 14:45:13
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	850977	100.000	125262	2587	1.258	--
总计		850977	100.000	125262			

图128 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-120min-片6
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-129-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jx-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-4
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 20:34:54
处理时间(V2)：2025/01/06 14:45:15
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	1217656	100.000	179125	2583	1.264	--
总计		1217656	100.000	179125			

图129 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-130-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jx-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-13
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 20:38:17
处理时间(V2)：2025/01/06 14:45:18
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	1085604	100.000	159765	2582	1.261	--
总计		1085604	100.000	159765			

图130 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-131-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jx-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-22
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 20:41:40
处理时间(V2)：2025/01/06 14:45:21
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	855626	100.000	125947	2586	1.257	--
总计		855626	100.000	125947			

图131 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-132-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jx-P4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-31
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 20:45:03
处理时间(V2)：2025/01/06 14:45:23
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	954049	100.000	140500	2586	1.259	--
总计		954049	100.000	140500			

图132 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-133-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jx-P5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-40
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 20:48:26
处理时间(V2)：2025/01/06 14:45:26
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	980666	100.000	144368	2584	1.260	--
总计		980666	100.000	144368			

图133 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-134-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jx-P6.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-49
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 20:51:48
处理时间(V2)：2025/01/06 14:45:29
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	1036472	100.000	152526	2581	1.261	--
总计		1036472	100.000	152526			

图134 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-135-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-27
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 20:55:12
处理时间(V2)：2025/01/06 14:45:32
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	265128	100.000	39708	2710	1.237	--
总计		265128	100.000	39708			

图135 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-136-2 - zzp-24123002p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：2-27
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 20:58:35
处理时间(V2)：2025/01/06 14:45:34
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	265156	100.000	39755	2705	1.234	--
总计		265156	100.000	39755			

图136 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-24123002批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-137-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-9
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 21:01:57
处理时间(V2)：2025/01/06 14:45:37
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转
溶剂




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-138-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 21:05:18
处理时间(V2)：2025/01/06 14:45:40
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	263387	100.000	39625	2711	1.234	--
总计		263387	100.000	39625			

图138 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-139-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 21:08:40
处理时间(V2)：2025/01/06 14:45:43
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	262942	100.000	39569	2707	1.232	--
总计		262942	100.000	39569			

图139 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-140-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 21:12:02
处理时间(V2)：2025/01/06 14:45:46
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	263435	100.000	39656	2710	1.233	--
总计		263435	100.000	39656			

图140 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-141-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 21:15:24
处理时间(V2)：2025/01/06 14:45:49
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	263037	100.000	39519	2709	1.234	--
总计		263037	100.000	39519			

图141 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-142-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 21:18:46
处理时间(V2)：2025/01/06 14:45:52
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	263587	100.000	39602	2713	1.233	--
总计		263587	100.000	39602			

图142 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-143-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-1
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 21:22:07
处理时间(V2)：2025/01/06 14:45:54
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	217473	100.000	32221	2617	1.241	--
总计		217473	100.000	32221			

图143 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-144-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-10
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 21:25:29
处理时间(V2)：2025/01/06 14:45:57
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	234355	100.000	34610	2613	1.247	--
总计		234355	100.000	34610			

图144 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-145-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-19
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 21:28:51
处理时间(V2)：2025/01/06 14:46:00
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	365319	100.000	53999	2614	1.247	--
总计		365319	100.000	53999			

图145 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-146-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-2
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 21:32:12
处理时间(V2)：2025/01/06 14:46:03
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	463017	100.000	68390	2609	1.250	--
总计		463017	100.000	68390			

图146 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-147-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-11
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 21:35:33
处理时间(V2)：2025/01/06 14:46:06
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	665049	100.000	98219	2603	1.253	--
总计		665049	100.000	98219			

图147 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-148-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-20
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 21:38:55
处理时间(V2)：2025/01/06 14:46:09
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	710934	100.000	105022	2604	1.254	--
总计		710934	100.000	105022			

图148 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-149-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-3
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 21:42:16
处理时间(V2)：2025/01/06 14:46:12
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	657854	100.000	96955	2609	1.253	--
总计		657854	100.000	96955			

图149 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-150-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-12
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 21:45:37
处理时间(V2)：2025/01/06 14:46:15
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	915746	100.000	135197	2603	1.258	--
总计		915746	100.000	135197			

图150 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-151-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-21
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 21:48:58
处理时间(V2)：2025/01/06 14:46:17
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	927174	100.000	136827	2598	1.259	--
总计		927174	100.000	136827			

图151 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-152-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-4
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 21:52:20
处理时间(V2)：2025/01/06 14:46:20
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	840478	100.000	124035	2601	1.257	--
总计		840478	100.000	124035			

图152 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-153-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-13
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 21:55:41
处理时间(V2)：2025/01/06 14:46:23
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	1083165	100.000	159710	2592	1.262	--
总计		1083165	100.000	159710			

图153 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-154-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-22
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 21:59:02
处理时间(V2)：2025/01/06 14:46:26
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	1066335	100.000	157287	2595	1.261	--
总计		1066335	100.000	157287			

图154 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-155-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-5
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 22:02:23
处理时间(V2)：2025/01/06 14:46:28
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	1056564	100.000	155908	2599	1.262	--
总计		1056564	100.000	155908			

图155 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-156-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-14
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 22:05:44
处理时间(V2)：2025/01/06 14:46:31
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	1226452	100.000	180784	2591	1.264	--
总计		1226452	100.000	180784			

图156 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-157-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-23
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 22:09:05
处理时间(V2)：2025/01/06 14:46:34
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	1196287	100.000	176333	2592	1.265	--
总计		1196287	100.000	176333			

图157 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-158-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-6
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 22:12:27
处理时间(V2)：2025/01/06 14:46:37
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	1183327	100.000	174522	2594	1.264	--
总计		1183327	100.000	174522			

图158 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-159-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-15
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 22:15:48
处理时间(V2)：2025/01/06 14:46:40
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	1300830	100.000	191652	2590	1.267	--
总计		1300830	100.000	191652			

图159 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-160-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-24
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 22:19:09
处理时间(V2)：2025/01/06 14:46:42
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速：1.0ml/min
波长：230nm
版本号：6.115
实验者：jiangjinwei
处理者：jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	1262515	100.000	186155	2593	1.266	--
总计		1262515	100.000	186155			

图160 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-161-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-7
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 22:22:30
处理时间(V2)：2025/01/06 14:46:45
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	1230344	100.000	181282	2589	1.266	--
总计		1230344	100.000	181282			

图161 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-162-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-16
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 22:25:51
处理时间(V2)：2025/01/06 14:46:48
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	1345693	100.000	197932	2583	1.269	--
总计		1345693	100.000	197932			

图162 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-163-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-25
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 22:29:12
处理时间(V2)：2025/01/06 14:46:51
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	1286778	100.000	189530	2589	1.267	--
总计		1286778	100.000	189530			

图163 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-164-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-90min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-8
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 22:32:34
处理时间(V2)：2025/01/06 14:46:54
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	1255672	100.000	184984	2589	1.267	--
总计		1255672	100.000	184984			

图164 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-165-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-90min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-17
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 22:35:56
处理时间(V2)：2025/01/06 14:46:56
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	1342566	100.000	197608	2585	1.269	--
总计		1342566	100.000	197608			

图165 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-166-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-90min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-26
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 22:39:18
处理时间(V2)：2025/01/06 14:46:59
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	1308003	100.000	192154	2575	1.268	--
总计		1308003	100.000	192154			

图166 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-167-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-120min-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-5
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 22:42:41
处理时间(V2)：2025/01/06 14:47:02
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	1261558	100.000	185959	2594	1.267	--
总计		1261558	100.000	185959			

图167 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-120min-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-168-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-120min-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-14
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 22:46:03
处理时间(V2)：2025/01/06 14:47:05
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	1364186	100.000	200623	2580	1.270	--
总计		1364186	100.000	200623			

图168 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-120min-片2
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-169-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-120min-P3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-23
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 22:49:25
处理时间(V2)：2025/01/06 14:47:07
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	1310231	100.000	192970	2591	1.269	--
总计		1310231	100.000	192970			

图169 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-120min-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-170-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jx-P1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-6
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 22:52:48
处理时间(V2)：2025/01/06 14:47:10
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	1261056	100.000	185794	2590	1.268	--
总计		1261056	100.000	185794			

图170 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-171-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jx-P2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：4-15
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 22:56:11
处理时间(V2)：2025/01/06 14:47:13
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	1350838	100.000	198592	2579	1.270	--
总计		1350838	100.000	198592			

图171 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-172-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-jx-P3.lcd

方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm

批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb

样品瓶号：4-24

进样体积：5 μl

进样时间：2025/01/04 22:59:35

处理时间(V2)：2025/01/06 14:47:16

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 230nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	1313298	100.000	193501	2588	1.269	--
总计		1313298	100.000	193501			

图172 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-173-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-27
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 23:02:58
处理时间(V2)：2025/01/06 14:47:19
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	264576	100.000	39671	2703	1.241	--
总计		264576	100.000	39671			

图173 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




SMF-4112

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$SMF-4112 - 0-4/29-174-2 - cbzj-X3456p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-RC-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4112 - SMF-4112-20250104-RC-FX278.lcb
样品瓶号：3-27
进样体积：5 μl
进样时间：2025/01/04 23:06:20
处理时间(V2)：2025/01/06 14:47:22
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min
波长: 230nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 230nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	264650	100.000	39698	2704	1.241	--
总计		264650	100.000	39698			

图174 缬沙坦胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-X3456批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2